

AETII ANTIOCHENI

MEDICI DE COGNOSCENDIS ET CVRANDIS MORBIS
sermones sex, iam primum in lucem editi,

Interprete ~~_____~~ Medico.

Quæ in singulis sermonibus continentur in prin-
cipio cuiusq; habetur.

De ponderibus & mensuris, ex Paulo
Aegineta, eodem interprete.



BASILEAE IN OFFICINA FROBENIANA
ANNO M. D. XXXIII

Cum gratia & priuilegio Cæsareo in sex annos.

AD LECTOREM

POSTEA QUAM hi sex sermones AETII iam sub prae-
lo essent, nacti sumus praeterea alios quinque, nempe primum, &
quatuor qui deinceps sequuntur. Quod si praesentem operam
nostram studiosis gratam ac frugiferam senserimus, illos quoque
uertendos edendosque curabimus. Quin etiam spes est, omnia re-
liqua eiusdem autoris scripta à nobis conquisita publicanda. atque
in hoc nunc gustum eorum praebemus, quo facilius sit de reli-
quorum editione consilium capere. Vale.



TCVNQVE multæ ac uariæ sint artes hominum ingenijs inuentæ, usq; & temporis progressu auctæ, nulla tamen adeo commoda, nulla tam necessaria, nulla tã difficilis ac operosa censenda est, quàm ea quæ cognitionem & curationem humani corporis morborum tradit. Id ipsum si apud fratris. Maiestatem tuam **CAROLE** Cæsar Inuictiss.

Imperator lōgiori oratione adstruere uelim, uidear fortassis rem publice confessam, ac meridiana luce clariorem, tanq̃ admota face uelle illustrare, quum nemo nō: quæ nostra fragilitas est: hinc aliquando auxiliū sensist, atq; eius artis opem necessario implorauit. Quare ut superuacaneum est de commoditate ac necessitate eius artis commemorare, ita ammirari merito licet, tam paucos esse inter ipsos etiā artis medici di professores, qui immensam eius difficultatē exuperare contendant. Multos uero ne animum quidem huc appellere, ut uere cognoscāt quo morbo æger periclitetur, quum tamen interim pleriq; ex eis totam diem sursum ac deorsum cursitent, ægris pharmaca ex omnibus myropolijs propinent, salutemq; si dijs placet: promittant. quibus interrogatis si respondendū sit, quod malū ægrum uexet, eius penitus ignari sint, & ferè nihil aliud respondere possint, quàm quod magnus quispiam artis uenditor omnibus respondisse fertur, Aegrotat. Rursus uero uideas alios uel ætate, aut etiam longi usus autoritate, uel loquacitate, ac mira litigandi cōtentione, apud ægros se efferre, ac gesticulando obtinere, quo putentur rem ipsam & morbum optime tum nosse, tum curare posse, quum interim alius ad hanc rem simul adhibitus (contingit enim in felicibus urbibus aliquando decem artifices simul adhiberi) uel ob maturiorem deliberationem, uel ob linguæ parsimoniam, præ illo nihil esse, nihil scire putetur: & contingit sanè ita ignorantem temeritatem à uulgo probari, ditari, ac in honore esse, maxime quum fortuna etiam huiusmodi hominibus fauere conspiciatur, sicut euenisse uel casu, uel confidentia ægri in medicum compertum est ut aliquando æger conualescat. Sanar enim plures, inquit Hippocrates, in quē plures cōfidunt. Contra uero illum quem ratio ac prudentia cunctatiorem ad rectum rerum iudicium facit, nihil fieri, atq; etiam irrideri. At uero ut non negauerim uehementer amplectendam in medico p̃t̃mptitudinem medendi, sic nemo laudare potest præceps consilium & medicinam ante cognitum morbum, quibus tametsi æger alleuari uideatur, nō longe tamen post grauius recrudescit

ferre possit, quod diuinari potius quàm humanarum uirium existit. Sed quis credat tandem difficile esse hanc artem in tanta ubique terrarum medicantium multitudine? quum etiam in publicis professionis huius gymnasijs ineptissimi quique se ad medicinam tanquam artium facillimam, condiscendam conferant, nullo habito earum artium respectu, sine quibus nulla medicinarum pars rite attingitur, ne dum hæc ipsa curatiua, de qua iam apud facerrimam Maiestatem tuam uerba facio, quæ præcipue exercitatum hominem requirit, non solum in his quæ in humano corpore existunt per eius refectionem cognoscendis, sed eorum etiam quæ ei extrinsecus adueniunt, atque adeo in cognitione totius naturæ. Quid uero his facias, qui uno aut altero medicamine instructi audentes & impune per omnes uicos ac urbes oberrant, non tantum pecunijs nostris inhiantes, sed in corporibus etiam nostris dubium periculum facientes, atque ex his maior pars per fractis uotorum, religionis, pietatis ac pudoris claustris ad hanc negotiationem se quam ocysissime transfert. Porro suspensio ardorem deligendam merito quis dixerit, quum uideat eò impudentiæ apud pluresque gentes progressas ipsas mulierculas, ut non solum magna multorum perniciem publice per urbes septentrionales medentur, sed etiam usque ad doctorum nomen proficiant, ut est uulgus ad ueri æstimationem rude & stolidum, & ad sui similes euehendos prodiuc. Hæc inquam medicantium multitudo facit ut uulgo res leuicula putetur Medicatio morborum, quum tamen ex doctissimis medicorum maxime Græcorum: à quibus medicina tota primum scribi coepta & perfecta est: scriptis constet, nullam partem totius medicinarum difficiliorem esse quam eam quæ Curatiua appellatur. Reliqua enim omnia ob hanc solam recte conficiendam sunt tanquam antegressa, Estque ipsa curandi ars uelut fructus & finis omnis artis. Quanquam non negem & Medicum doctum esse posse & iure haberi, qui se etiam ad hanc exercendam minime conferat, contentus pulcherrima totius naturæ contemplatione & cognitione, maxime si non penitus istas sibi opes abdat, & apud se conclusas teneat, sed tum docendo, tum commentando publice multis profit, Est enim omnino splendidius & laudabilius medicis ipsis quam agris mederi. Quare laudem omnium pulcherrimam, rerum medicarum scriptores meritissequuntur & ferunt, eaque præ reliquis per multa etiam secula conulescant. Cæterum quum in genere hoc multorum omnino commentationes extent, facile patiar quemque suum locum obtinere, Hoc unum saltem Maxime Cæsar CAROLE asseruare non dubitabo, Nullius scripta superesse, in quibus ita perspicuo ordi-

ne ac

ne ac absolute cognitio & curatio morborum contineatur uelut ab Aetio Antiocheno medico est conscripta: atq; hoc ipsum non tantum ex ingenio & rationatione, & sua ipsius industria experientia, quam non infrequenter locis ita ferentibus ammiscet, sed ex optimorum quorumq; medicorum tum fide, tum auctoritate Aetius facit: ut ego sanè sic sentiam, unum Aetium ubiq; & in omnibus tutissime posse in imitationem assumi, neq; posse medicum qui ad illius præscriptum cum ægris suis rationationem inecat, neq; in morbo cognoscendo, neq; in remedijs adhibendis aberrare, Vbiq; enim tum antegressas causas, tum concomitantes & consequentes ad singulos morbos accessiones addit, ut nihil sibi deesse ad indicationis certitudinem diligens medicus queri possit. Quod ubi præstitit, adeo largam optimorum medicaminum tum simplicium, tum compositorum copiam affatim exaggetat, singulorumq; in ipsas compositiones mixtorum rationem ac usum tam diligenter ostendit, ut à quibusdam etiam nimius in hac tractatione iudicetur. Ego uero hac parte adeo non redundantem puto, ut his qui perturbationem quorundam morborum sunt experti, etiam pauciora uideri queant, quam ad tyrannidem eorum coercendam sufficient: atq; id non ex inopia tractationis ipsius auctoris, sed ex nimia auiditate lectoris euenire queat, qui nulla copia exatiari possit, uel certe præ ingenij tarditate, siue iudicii inopia, ubiq; uelut implumes auiculæ ad præmansum cibum hiet: quum id non difficile cuiq; diligenti medico futurum sit, ex his morbis de quibus in his sex sermonibus Aetius tradit, omnium reliquorum indicationem facere, & ex consequenti curationem constituere. atq; hoc amplius omnibus fatendum est, Aetium ea etiam quæ ex Galeno transcribit omnia maiore luce, & paucioribus uerbis tradere, & ut uerbo uno dicam magis *æthius*, quum Galenus ut Asianus in plarissq; penitus superfluis conspiciatur, aliquando etiã præter rem quædã adhibeat, quorū ipse quoq; ueniã lectorẽ deprecatur. Quæ causæ fuerunt ut tamen hi tantū sex sermones ex uniuerso opere, quod terribili nomine inscripsit, & singulos ex his quatuor libris in quindecim sermones digessit, ad manus meas peruenerint, minime tamen cõmittendum censuerim, nimirum ab inuidentiã uitio uix uindicandum, ut eorum sex sermonum thesaurus diutius mortalibus occultus lateret: utpote quum ipse sciam me ex eius operis lectione non mediocriter adiutum, neq; possit ab ullo aliquo etiam non medico, absque summo fructu & commodo hæc de cognoscendis & curandis morbis tractatio legi. atq; utinam non ita penitus horum medicamentorum compositiones exoleuissent quæ ab Aetio tam diligenter ubiq; sunt relatæ, sperarem sanè feliciter medicaturis successurum, quàm ex hodierni temporis compositionibus myropoliorum euenit, quum confectiones quibus ut sacrosanctis hodie utimur, maxima ex parte ab obscuris autoribus sint transcriptæ, uel etiam barbarorū aut Arabum nominibus refertæ: ut affirmare certo possim omnium cõpositionum

quas Mesuas & Nicolaus tradiderunt, ex quibus etiam pharmacopolę suę
 luminaria quę uocant extraxerunt, non decimam partem esse integram,
 tum in uocum ipsarum rerum siue obscuritate, siue ambiguitate, tum in pon-
 derum ac mensurarum inepta appensione. Vt ne dicam de succedaneorum
 importuna & inefficaci subditiōe, in qua singulę ferē officinę suam ex diu-
 turni temporis pręscripto licentiam usurpant. Equidem nihil magis saluta-
 re uniuerso mortalium generi contingere queat, quā si ex hoc genere au-
 torum ueterum, Gręcorum inquam, publica orbis pharmacopolia emen-
 darentur, & in pristinam integritatem restituerentur: id quod doctorum
 & bonorum medicorum auxilio fieri possit, si hęc ipse pharmacorum com-
 positiones de Arabibus medicis nō bene latine transcriptę, neq; enim his
 imputanda sunt, quę ab interpretibus male translata esse constat, ad Grę-
 corum collationem castigarentur. Quanquā & in hac parte difficultas non
 modica oborietur, quod neq; Gręci medici per temporum iniuriā, suam
 integritatem conseruauerunt, & ut de alijs taceam, unus Galenus tantum mu-
 tatus ab illo est Hecstore, ut in plerisq; alijs uideatur, & seipsum si reuiu-
 sceret nō agnosceret in tanta pallij sui dilaniatione, ut de togę etiam assump-
 ptione nullam grauiorem molestiam conceperet. Porro tamen hoc exem-
 plar unde hęc transtuli multis locis tum situ, tum carie ac blattis exesum es-
 set, magno tamen labore, & pertinaci diligentia id assequutus sum quod
 nusquam hęc: sed ut ego iudico, ubiq; tum Gręcus autor suę integritat-
 ti restitutus est, tum nostra translatio ad ipsum q̃ potui proxime & com-
 mode latine explicare correspondet. neq; enim ullis inconsumetis aut pręcis
 uocabulis sumus usi, neq; etiā uulgatas hodie in scholis uoces admisimus,
 sed quantum possibile fuit, puris, latinis, receptis, medicis dictionibus usi id
 pręstitisse nos opinamur, quo ipsius autoris sententię plene intelligat, quam
 rem aliquando in commentarijs nostris medicis palam facimus. atque ut
 neminem sua laude fraudemus, fateor me non parum ex Hippocrate, Ni-
 candro, Dioscotide, Galeno, Paulo Aegineta, Celsoq; ac Plinio esse adiu-
 tum: sicut uicissim multi omnino loci sunt, qui apud Galenum & Paulum
 restitui ex Aetio possint: quum ingenue adeo Aetius in his quę ex Galeno
 transcripsit, Galeni nomen profiteatur, & Paulus sua ex Aetio descripsisse
 cognoscatur. Posteriores enim Aetio Paulum contra quorundam opinio-
 nem puto. Maxime quum ex Eunapio qui Aetij uitam descripsit, constet
 Aetium sub Iuliano uixisse, Oribasijq; contemporaneū fuisse, ætate tamen
 minorem. Fuit autem Aetius, ut aliquot etiam locis horum sermonum ap-
 paret, Christianus, atq; adeo officio Diaconus, uerum hęrescos Eunomia-
 nę, & castrorum Iuliani apostatę ut medicus atq; etiam sophista unā cum
 Oribasio sectator, patria uero Syrus ex Antiochia, unde etiam Syrus
 tum morborum, tum medicaminum appellationes alicubi ammisset. Hos
 ipsos autem sex Aetij sermones ex uniuerso opere eius reliquos, ex nobi-
 lissimę

lissimæ apud Boemos familiæ Hasistenæ bibliotheca, mihi Matthæus Aurogallus insignis trium linguarum professor impetrauit: ad edendum uero eos & conuertendum in latinam linguam, supra publicam utilitatem, hoc uel imprimis me inhortatum est, quod in eam ipsam bibliothecam Bohuslaus Hasistenius heros immortalæ laude dignus optimos quosq; utriusq; linguæ autores per Græciam, Asiam, Cypriumq; & Cretam insulas diligenter perquisiuit, ac magno coemit, ut sic tandem pro illius uoto aliqui à mortalitate adseruarentur: quum prò dolor inæstimabili rei literariæ incendio conflagrata ultra duo milia librorum perdidisset, inter quos reliqui etiam Aetij sermones perierunt. At uero quum hos sex sermones inde mea opera mihi impetratos, meoq; priuato sumptu uersos, in publicum editurus iam essem, statusq; mei ac conditionis, qua me inter philosophiæ linguarumq; ac Medicinæ professores, omnium ipse postremus retuli, perpensio nem facerem, leuem totius operis gratiam propter exilitatem nostram futuram timui, utcunque etiam magnum munus esset nostrum, ex quo salutem & corporum sanitatem multis accessuram speramus: uisum est itaque tam plenum bonæ frugis opus & planè diuinum, nullo digniori nomine orbi commendari posse, quàm per numinis tui clementiam, Maxime inuictissimèq; Imperator CAROLE. Exit igitur Aetius medicus, ac in lucem ex tenebris emergens quasi reuiuiscit, sub tuo nomine CAROLE Cæsar, gaudetq; rursus uelut antea uiuus Imperatoriū agmen sequi ac quàm plurimorum salutem consulere, quo tempore Maiestas tua contra crudelissimum christianarum, & imprimis regni tui Romani hostem Turcam, magnis totiusq; Germani ac Hispaniæ uiribus atq; auxilijs arma mouet ac beligeratur, eumq; usque ad fauces Germaniæ nostræ progressum repellit, & confusis uiribus ac innumero robore ac multitudine militiæ eius profligato, cum in turpem fugam ex omni Europa usque ad Asiam propellet, uel certe quod dei opt. Max. ope omnes speramus penitus prostratum conteret, ne unquam in similem potestatem ulli eius successores inualescere possint. Neque enim alia uota ac preces ad deum à nobis profundi putes quàm ut felicem huius iustissimi belli uictoriam consequaris, quo post deuictum impientissimum hostem, pacatam Europam, literas tandem & pietatem simulq; bona studia ad pristinum statum & dignitatem restituas, atq; inde tantis rebus confectis merito ut terrenum numen ab omnibus colaris, atque inter ipsos diuos uiuus adhuc referaris. Ego uero priuatim etiam pro mea erga sacratiss. Maiestatem tuam reuerentia, qua numen tuum reuerentissime & ueneror & colo, hosce Aetij sermones imprimis in testimonium studiorum meorum Maiestati tuæ consecrare uolui: qui ubi per Maiesta. T. clementiam studiosis rerum medicarum placuerint & probabuntur, audebo in posterum etiam reliquis eiusdem Aetij scriptis, uel alijs

item medicis operibus quæ in manibus habemus absolutis, Clementissi-
mam Maiestatem tuam eorum editione concelebrare. Neque enim aliun-
de quàm ex Clementi magnificencia tua huiusmodi rerum medicarum
publicatam commoditatem à me intelligi uolo. Quod superest precor à
dijs ut M. T. diutius rebus humanis iuuandis conseruent, quo omnes pos-
simus in dies amplius numinis tui bonitate ac clementia foueri, for-
titudineq; dexteræ tuæ protegi ac defendi. Valeat Sacer-
rima Maiestas tua. Zuiccauij Boethlandiæ, Ca-
len. Septemb. Anno Christi. M. D.

XXXII.

AETIVS AD LECTOREM

PAconias quisquis sincere diligis artes
 Me lege, qui precium grande legentis ero,
 Nam neq; te uana uerborum ambage tenebo,
 Ceu modo librorum maxima turba solet.
 Nec te barbarie uocum perplexus, abire
 Incertum, quo nam mente ferare, sinam.
 Sed uelut in triuijs, errantibus indicat *Hermes*,
 Quæ sit legitimæ semita recta uiæ.
 Sic tibi, ceu digito, morbum languentis, & ipsos
 Monstrabo morbos qua ratione leues.
 Plurimaq; adducam medicorum exempla priorum,
 Et qua quisq; malum sustulit arte, dabo
 Heu mihi cui sero superas prodire sub auras
 Contigit, & modica uix quoq; parte mei.
 Qui modo si totus mansissem à morte superstes,
 Et corpus teneat debita membra meum,
 Forsitan & poteram summos æquare magistros,
 Nectibi nunc essem magne *Galeni* minor.
 Sed quæ fara bonis obfistunt inuida rebus,
 Hæc eadem sæua me quoq; clade premunt.
 Quanquam etiam hæc æuo debetur gratia nostro,
 Vita quod exigua reddita parte mihi est.
 Atq; *Coronidæ* si magna est gloria dextræ
 Virbius illius morte redemptus ope.
 Te quoq; magna manet *Cornari* gloria, letho
 Qui medicum medicæ surripis arte manus.

Iacobus Micellus

QVAE IN OCTAVO AETII SER
mone contineantur.

Ad superciliorum ornatum	Caput I
De hypoprijs, hoc est ijs quæ sub oculis fiunt fuggilla/ tionibus.	Cap. II
Vngenta præseruantia faciem ne à sole aut uento exu/ ratur.	Cap. III
Vt ne rugosa fiat facies.	Cap. IIII
Ad faciei nigredines.	Cap. V
Smegmata & medicamenta faciem nitidam reddentia.	Cap. VI
Cataplasmata æstiuæ odorum corpus reddentia.	Cap. VII
Potiones ad eos qui tetrum habent corporis odorem.	Cap. VIII
Ad menti scabriciem.	Cap. IX
Ad faciei lentigines remedia, quibus etiam ad maculas à sole prouocatas, & ad uaros uti licet.	Cap. X
De maculis à sole prouocatis, quas Græci <i>ἰσχυρίδες</i> appellant.	Cap. XI
De stigmatis siue notis ex plaga illatis.	Cap. XII
De uaris faciei, qui tum Ionthi, tum acnæ Græcis uo/ cantur.	Cap. XIII
De ficosis faciei tumoribus.	Cap. XIII
Ad manantes menti papularum eruptiones. Ex Cri/ tone.	Cap. XV
De impetiginosis tum mepti, tum reliqui corporis tumo/ ribus.	Cap. XVI
Ad molestum oris odorem.	Cap. XVII
Ad labiorum fissuras.	Cap. XVIII
De dentium affectionibus.	Cap. XIX
Ad inflamas gingiuas.	Cap. XX
Ad cruentas gingiuas.	Cap. XXI
Ad excrecentes gingiuas putrescentesq; ac tumentes.	Cap. XXII
Ad corrolas & ab ulcere serpente infestatas gingiuas.	Cap. XXIII
Ad parulidas hoc est gingiuarum inflammationes.	Cap. XXIII
De epulide hoc est excrecenti gingiuarum carne.	Cap. XXV
De gingiuarum fistulis.	Cap. XXVI
Cura dentium à calido morbo doloroso affectorum. ex Adamanto sophista.	Cap. XXVII
Cura eorum quibus ex frigiditate dentes dolore affici/ untur.	Cap. XXVIII
	Cura dentium

Cura dentium ab humiditate dolore affectorum, & laxa- torum.	Cap. <u>xxxix.</u>
De dentibus lima atterendis.	Cap. <u>xxx.</u>
Cura dentium à siccitate dolore affectorum.	Cap. <u>xxxi.</u>
Cura dentium ob caliditatem & humiditatem dolore affectorum.	Cap. <u>xxxii.</u>
Curatio erisorum dentium.	Cap. <u>xxxiii.</u>
Vt dens citra dolorem, & absq; ferro tollatur.	Cap. <u>xxxiiii.</u>
Smegmata uaria ad denigratos liuentesq; ac rarefactos dentes.	Cap. <u>xxxv.</u>
De ancyloglossis & qui uix loqui possunt.	Cap. <u>xxxvi.</u>
Ad ranunculum sub lingua.	Cap. <u>xxxvii.</u>
Ad linguam inflammata, desquamata ac tumore inflata.	Cap. <u>xxxviii.</u>
Ad Aphas hoc est oris ulcera.	Cap. <u>xxxix.</u>
De gurgulionis affectionibus.	Cap. <u>xl.</u>
De ablatione columnellæ.	Cap. <u>xli.</u>
De oris inflammationibus.	Cap. <u>xlii.</u>
Illitiones ori commodæ.	Cap. <u>xliii.</u>
Summaria doctrina de usu omnium illitionum ad os apparatarum.	Cap. <u>xliiii.</u>
De tonsillarum inflammationibus.	Cap. <u>xlv.</u>
De crustosis & pestilentibus tonsillarum ulceribus.	Cap. <u>xlvi.</u>
De angina & eius speciebus.	Cap. <u>xlvii.</u>
De glandulis.	Cap. <u>xlviii.</u>
De suffocatorum reuocatione.	Cap. <u>xlix.</u>
De deuoratis in tonsillis spinis, atq; his quæ in asperam arteriam delabuntur.	Cap. <u>l.</u>
De arteriarum pharmacis.	Cap. <u>li.</u>
Ad inueteratas affectiones uariæ Arteriæ.	Cap. <u>lii.</u>
De destillatione siue catarrho, & narium muco.	Cap. <u>liii.</u>
De tussi.	Cap. <u>liiii.</u>
De pharmacis dolorem leuantibus & conferentibus tussi.	Cap. <u>lv.</u>
De suffusionibus.	Cap. <u>lvi.</u>
De orthopnoicis, anhelosis, & egre spiritum ducentibus.	Cap. <u>lvii.</u>
De cordis tremoribus.	Cap. <u>lviii.</u>
De sanguinis reiectione.	Cap. <u>lix.</u>
Curatio eorum qui ob destillationem sanguinem ex- puunt.	Cap. <u>lx.</u>

De his

De his qui ob frigiditatem organorum respirationis, sanguinem expuunt.	Cap. LXI
Curatio eorum qui iuxta alium quemcunque tandem modum sanguinem ex pulmone reieciunt.	Cap. LXII
Communes methodi exhibendorum auxiliorum in sin- gulis reiectionis sanguinis speciebus post sangui- nis inhibitionem.	Cap. LXIII
De asperæ arteriæ ulceribus.	Cap. LXIII
De pectore suppuratis.	Cap. LXV
De peripneumonidis.	Cap. LXVI
De phthisicis seu tabidis.	Cap. LXVII
De pleuritide seu laterum morbo.	Cap. LXVIII
De ea quæ pleuritis esse putatur, quum tamen non sit.	Cap. LXIX

P I N I S .

AETII ANTIOCHENI

MEDICI, DE FACIEI, ORIS, ET TONSILLARVM

AFFECTIONIBVS, SERMO OCTAVVS.

Cui annexum est De destillatione, & tussi, asperæ
arteriæ, pulmonis, ac thoracis affectionibus,
interpretē.

Ad superciliorum ornatum,

Caput I



VAHQVAM QVOD AD HANC REM
attinet, iam ante à nobis dictum sit, ubi de deflu
uio capillorum capitis, Sermone sexto, mentio
nem fecimus, dicemus tamen & hic, licet impor
tune, sed ut habet, paucis.

Illitio augens superciliorum capillos,
atq; etiam aliarum corporis partium,
eadem etiam eosdem nigros reddit.

Nucum ponticarū interiora in uase figulino tor
refacta contere, & pinguedine capræ sylvestris excipe, atque cum hoc ipso
partes inungi præcipe. Aliud. Adianti uncia unam, Iadani sextantem,
palsi cretici cochliare unum, contunde ac subige cum passo: deinde torre ut
dictum est, ac rursus cum pingui capræ sylvestris, aut urfi contere, & utere,
Potes & huc accommodare ea, quorum meminimus Sermone sexto.

De hypoprijs, hoc est his quæ sub oculis fiunt
fugillationibus.

Caput II

QVOD hypopia sub oculis fiant, ipsum nomen indicat: siquidem hypo
pium Græcis hypophthalmium significat, quod Latinis, sub oculis
sonat. Sunt autem hypopia ex genere suffusionum sanguinis in locum con
tusum: fiuntq; ex plaga, quum tenuibus sub cute uenulis contusis, sanguis
per fissuras sub ipsam cutem, affatim effunditur, atque id uno loco. In gru
mos enim coit statim, & liuet locus, progressuq; temporis nigrescit. Quare
medela occurrendum est, antequam nigrescat, cura potissimum ad hoc ad
hibita, ut concretus sanguis discutiatur. Quod si tunicula quoq; rumpatur
uenularum, ex quibus effunditur sanguis, miscendum est his quæ discutiendi
uim obtinent, parum quiddam ex constringentibus. Nam si in principio
sola discutientia exhibeantur, non tantum id quod effusum est discutient,
sed per ipsa uenarum contusarum oscula amplius quiddam elicient: ex san
guine in ipsis uenis contento. Quum uero in naturam suam redierint uenu
læ, etiam citra admixtionem constringētium, ad discussoria transcundum.
Atq; ego sanè in principio utor Nili ex rosas collyrio, ex eo in aqua dissolu

*Suffusionem
sanguinis*

*Collyrium nili
ex rosas*

a to, locum

to, locum sugillatum illinens. Vtor autem pro fomēto, decocto meliloti & fœni græci. Deinde collyrium quoq; in eodem decocto dissoluo, aut etiam in solo fœni græci decocto. Quod si reliquæ quædam restiterint ipsius adfectionis, dissolutis ex myrrha collyrijs in fœni græci decocto, illino bis in die, prius tamen cum sponsia in decocto madefacta loco fotor. Idem præstat in principio, non præsentē ex rosīs collyrio, id quod Glaucum appellatur illitum, & fex olei coquebas contrita. ~~Ad liuores~~ autem iam malum ex sandice collyriū, & similia præclare omnino discutiunt, qualia Dioscorides inter facile parabilia enumerauit. Ea enim quæ sub oculis fiunt sugillata, inquit, & liuores iam inueteratos tollunt, raphani cortex cum melle illitus, bryoniæ radix uino aut cerato excepta, bulbus cum uitello oui impositus, aqua marina calidâ pro fomento, aut muria uel salsugo, cascus antiquus cum decocto hyssopi impositus. Statim autem tollit sepiæ testa cum aceto illita, sinapi cerato exceptum, tucumeris syluestris radix contrita cum melle, lini semen contritum cum lacte. Critonis compositio.

Ad liuores Ad liuores alte infixos, & ea quæ sub oculis fiunt sugillata, seminis uiticis albi drachmas tres, radicis radiculæ drachmas tres, niri rubri, corticis raphani, hyssopi, farinæ fabarum, uniuscuiusq; drachmas tres, myrobalani drachmas XL, cineris pulmonis agni exusti drachmas XL, bulborum rubrorum drachmas XL, radicis thapsiæ aut succi drachmas XL, corticis thuris drachmam unam: excipe cerato ex oleo rosaceo apparato, ac linteo infartum impone. Oportet autem assidue amouere, cum cautione, ne locus exulceretur. Ego autem expertus sum, nucem pinguem uetustate rancidam, certissimum ad liuores remedium. Porro reclinato ac supino remedia adhibere conuenit, ut adhæreant spatio ad minus horarum trium quàm optime contrita.

Circumlitiones præseruantes faciem, ne à sole aut uento exuratur.

Cap. 111

Circumlitio faciei, quæ aurea appellatur: lupinorū siccorum libras tres, aquæ pluuialis choenices quatuor, iniice in uas æreum, sinasq; madefieri per triduum: quartâ autem die decoque ad prunas usquequo dissoluantur lupini: deinde per colum exprime liquorem, ac eum seorsim decoque, atque ubi condensatus fuerit, in uas uitreū repone. Vbi uero uti uelis, quantum satis uidebitur accipe, & cum eo in modica aqua dissoluto faciē illine.

Alia ualde laudata. Similaginem lotam & per pannum percolatam sinas perstillare, aquamq; abijce, secem autem cum albumine oui permisce donec mellis transitiem accipiat: & cum hoc faciem obline uersaturus in sole: quum uero à sole recesseris, frigida multa ablue. Alia. Boni coloris faciem hæc reddit, atq; item uniuersum corpus. Mastichen cum oleo omphacino dissolutam circumlincialiquâdo autem & olei loco medullam cetuinam, aut uirulinam accipimus: aliquando & ceratum liquidum.

Alia

Alia. Cupressi ac ilicis scobem in oleo decoctam oblini. Alia. Nutes pincas cum modico aceto contere, adiecto melle sufficienti, ac oui crudi uicellis, atq; hoc ipso faciem oblineneq; refert etiam si citra acetum eo utaris. Alia. Hac in æstate conuenit, faciem præseruans: tragacanthi, ammoniaci thymiamatis, costi contusi, cuiusque sextantem, aluminis liquidi drachmas quatuor, thuris sextantem, amyli sexuncem, oua cruda recentia xlii, mellis libras tres, muli chœnices tres. Tragacanthum, ammoniacum, & thus in mulso maderieri per noctem unam, in uase uitreo finito: oua autem integrâ in acetum uetus & acre proiecta, per triduum macerato: alumen uero optime lauato: deinde omnia simul in mortariũ fictile coniecta ac diligenter commixta, melle cocto excipito: atque utere, faciem ex eis oblinendo. Ante ingressum uero balinei, medicamentum hoc tollatur: atq; id paritularim auellere conuenit leni tractu ex facie induratum: deinde aqua tepida ablueri, & spongia abstergere: quod ubi factum est, manna thuris in albumine oui dissoluta, faciem illinito.

Vene rugosa fiat facies.

Cap. iiii

Faciem corrugatam extendit medicamentum hoc cornu cerui non antiquum in aqua decoque, donec succulentum reddatur: percola deinde ipsam aquam, & cum ea farinâ fabaceâ subige, ac pastillos informa, eosq; in umbra exsicca. Vbi autem usus postulauerit, quantum opus fuerit in aqua dulci dissolue, ut cerati liquidi crassiciem accipiat, & cum eo faciem oblinere iubeatq; quum adglutinatum fuerit, faciem aqua tepida ablueri præcipe.

Ad faciei nigredines.

Cap. v

Ad faciei nigredines his utendum est, Iridis contritæ, farinæ ptisanæ, farinæ fabaceæ, cuiusq; chœnicem unam & dimidiam, salis ammoniaci, cornu ceruini uisti, ammoniaci thymiamatos, cuiusq; sextantem, in aqua dissolue, & pastillos informa, quos in umbra exsiccatos adserua: atque usus tempore, in aqua resolutos ante balineum faciei illini. Aliud. Farinæ ptisanæ, thuris, iridis, farinæ fabarum, farinæ erui, spumæ nitri, costi, cuiusq; chœnices partem quartâ, amygdalas amaras uiginti, informa cum candido ouorum & lacte asinino, exsicca in umbra: ac utere ut dictum est.

Smegmata & medicamenta faciem nindam reddentia. Cap. vi

Qvandoquidem post unguentorum ablationem pleriq; faciem extergere conantur, utendum ad hanc rem compositionibus infra scriptis.

Smegma illustriorem reddens faciem.

Amygdalas decorticas

xli. thuris, spumæ nitri, gummi, cuiusq; drachmam unam, farinæ fabaceæ drachmas xii. excipe oui candido, & in pastillos digere, quibus cum aqua solutis, passim tum in balineo, tum citra balineum utaris. Aliud. Smegma faciei celebre & admirandum, quod & faciem illustriorem reddit, & rugas expolit, asperitates pellit, incipientem elephantiasin arceat, siquidem cum alijs remedijs adhibeatur: usus eius etiam reliquo corpori conueniens est.

Elephantiasis incipienti

a 2 Mastiches

Mastiches, thuris, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusque unciam unam, tragacanthi sesquunciam, succi uuae acerbæ immaturæ dodrantem, seminis peponis unā cum concluso in ipso humore dextantem, candidum ouorum xxi. similaginis chœnices quinque: contunde omnia ac cum candido ouorū, & humore peponis, succoq; uuae acerbæ commisce, & in pastillos redige, ac exsiccā: post uero contusos ac attritos, in uase uitreo ad usum adserua.

Smegma faciei, quod simul & ipsam rubicundam reddit.

Farinæ erui, fabarum, lupini, psillanæ, ciceris, bulborum narcissi, cuiusq; sex tantj Italici dimidiū, similaginis chœnicem unum, contunde ac cribro tenuissimo excute: deinde oui candido commixta, in pastillos digere, & in umbra desicca. Vsu uero expetente, quantum libet accipe, & in aqua dissolue, atq; à balneo utere.

Aliud, faciem illustrans, & uniuersum corpus:

dissipat autem & rugas, & cutem depurgat.

Vitis albæ radicem delibratam in sole æstiuo exsiccā, deinde contusā ac cribratæ Italici chœnices dimidium accipe, iridis contusæ tantundem, myrobalani siccæ decorticatæ tantundem, farinæ fabacæ chœnicem unum: hæc in uino ueteri odorato subacta, in pastillos digere: quos in umbra exsiccatos adserua: & usu expetente, contusis & cribratis cum aqua utere.

Aliud Cleopatraz reginæ, odoratum & preciosum.

Costi, myrrhæ troglodyticæ, iridis, spicæ nardi, amomi, phylli, cassis, floris iunci odorati, cuiusq; unciam unam, myrobalani libras quatuor, spumæ nitrī libram unam, contundito, cribrato, uitor. confert uniuerso corpori.

Aliud, efficax & odoriferum.

Floris iunci odorati, iridis, cuiusque drachmas duas, mastiches drachmam unam, contere: & cum succo psillanæ crassissimo pastillos forma, & in umbra desicca. Vbi uero usus expetit, in aqua dissolutos illinito, & post horæ spatium frigida abluito.

Aliud, splendidam & erugatam reddens faciem, ac totum corpus.

Farinæ fabacæ Italicum modium unum, similaginis Italicos sextarios quatuor, trifolij contusi sextarios quatuor, myrobalani tantundem, iridis contusæ tantundem, ammoniaci thymiamatis libram unam, costi tantundē, candidum ouorum recentium crudorum sexaginta, seminis peponis unā cum humore chœnicē unam, succi uuae acerbæ tantundē, subige: & informa pastillos, quos sufficienter in umbra exsiccatos à balneo illine. Præclare facit & ad eas quæ in collo sunt, & reliquo item corpore nigredines.

Aliud, ad faciei nigredines, multo usu exploratum.

Thuris sesquunciam, cerusæ probe lotæ, spumæ argenti in decocto cicerum alborū, ad solem frequenter ablutæ, amyli recentis, scobis marmoris albisissimi, mastiches puræ, spumæ nitrī albensis, testarum sepiæ, singulorū unciam unam, saponis Gallici uncias xii, cādīdum ouorum decem, appara, & uterē ut dictum

ut dictum est. Aliud mirabile, faciem depurgans & illustrans. Farinæ fœni græci trientem, terræ samiac quæ aster appellatur quadrantem, amyli trientem, mastiches sexuncem, medullæ ceruinæ recentis sexuncem, tragacanthi trientem. Tragacanthum in lacte muliebri aut asinino macerato, ac cum eo dissoluto, reliqua tenuissime trita in pastillos digerito: quibus in umbra desiccatis, ut prædictum est, utitor. Aliud smegma.

Ricini seminis interioris drachmas octo, bulborum narcissi siccorum ac decorticatorum drachmas octo, similaginis drachmas quatuor, thuris drachmas duas, candidum ouorum octo: appara ut dictum est, & utere.

Smegma ex Ruffi libris, ad totius corporis erugationem.

Ficus pinguisimas, uitis albæ radicem siccam delibratam, sepia testam uistam, farinam crui: unumquodque seorsim contunde: deinde etiam simul, & modico adstillato melle, utere.

Aliud smegma, quod uniuersum corpus odore imbuat.

Terræ cimoliæ bessem, iridis tenuissime tritæ drachmas xxxiii, nardi Celticæ drachmas xxxiii, cyperi, cardamomi, styracis flauæ & pinguis, cuiusque drachmas xii. Styracem in uino ueteri odorato dissolue, & in promptu habere. Terram uero cimoliam in fictile uas cōiectam carbonibus impone, atque ubi satis canduerit ab igne, eam ad dissolutū styracem injice: deinde reliqua sicca tenuissime trita insperge, ac simul sufficienter unita in pastillos digere: quibus in umbra exsiccatis, post uero tritis & cribratis utere.

Cataplasmata æstiuæ odorum corpus reddentia, ex Critone. Cap. vii

QUum sudores corpus uexant, magna oboritur ex eis molestia, præsertim in æstate. Nam & sordes multas inuolunt, & tetrum odorem de se præbent. Quare subscriptis remedijs uti conuenit, non ad mulieres tantum, sed ad ipsos etiam uiros. Non importunum enim esse puto & in hoc smegmatum tractatu harum rerum mentionem facere.

Sudoris molestia

Cataplasma totius corporis odorem bonum efficiens, æstiuum.

Rosarum siccarum quadrantem, calsiæ quadratam, amomi, costi, spicæ nardi, cuiusque drachmas duas, aluminis liquidi sextantem: dissolue in uino ueteri odorato, & in pastillos digere: quos in umbra exsiccatos usu expectante contundito, ac cribrato, atque in balneo inspergendos exhibeto, ita ut diligenter perfricent, & cum frigida aqua illinant. Aliud. Spumæ argenti in decocto cicero ad solem inalbate, amomi, calsiæ, phylli, costi, spicæ nardi, aluminis liquidi, iridis, omnium par pondus, appara, & utere ut dictum est. Potes autem præscriptis cataplasmatibus uti quocunque tempore uelis.

Aliud odorum & lene. Rosarum uiridium & tamen siccarum drachmas xl, myrrhæ troglodyticæ drachmas octo, iridis Illyricæ, spicæ nardi, calsiæ, cuiusque drachmas octo: uino odorato subige, & pastillos informa: quibus ubi uti uelis, contritis & cribratis corpus illini, maxime à balneo.

a 3 Aliud

Aliud. Iridis, spicæ nardi, floris iunci odorati, cuiusq; drachmas quatuor, amomi drachmas duas, myrrhæ drachmas duas, meliloti drachmas quinque appara & utere similiter. Archigenes autem inquit: Ad omnes corporis tetros odores, atq; eos qui grassoniæ à Græcis appellantur, ante omnia conducunt exercitia, inunctiones, sicæ fricationes, collyria assidue adhibita, & uolutatio. Sunt etiam cibi ad destruendū hoc malum commodi. Conueniunt itaq; oleum rosaceum, melinum, myrtum, iris sicca per se in puluerem redacta & intrita. Aut, alumen liquidum in aqua uel uino dilue, & myrrham tenuissime tritam admisce, ac ad mellis crassitudinem redige: & ex eo collum, locos sub alis, inguina, & reliquos exsudantes locos inunge.

*Grassoniæ
odores tetri*

Aliud. Aluminis liquidi drachmas quatuor, spumæ argenti lotæ drachmas duas, calsiæ drachmam unam, contere: & cum eis sub alis locos, inter media coxarum & inguina confrica: tollit enim euestigio eorum fetorem.

Aliud. Calsiæ drachmas quatuor, aluminis scissilis drachmas duas: utere cum uino per se. Aliud. Mastiches quadrantem, aluminis scissilis unciam unam: utere cum uino. Aliud. Myrrhæ troglodytica, iridis ibyricæ, florum rosarum siccarum, æquales partes contunde, & adiecto modo dico costo utere.

Potiones ad eos, qui tetrum habent corporis odorem. Cap. viii

His uero qui fetentem habent corporis odorem, eiusmodi potiones exhibere conuenit. Cardui radicem in uino albo decoctam propina, & eicient urinam crassam & fetentem. Aliud. Resinam terebinthinam oliuæ magnitudine cū pari melle decoque, & quotidie deglutendā exhibe.

Ad menti scabriciem, ex Galeno.

Cap. ix

Fiunt & in mento aspredines ut plurimum seroso humore à capite destillante, & precedentibus furfuracis in collo ac uicinis partibus squamis: aliquando autem usque ad auditorios pertingit ac perrepat meatus. Estq; omnino hæc affectio dolorosa, pruritum inferens ac exhauriens corpus: quare subscriptis remedijs est subueniendum. Critonis. Amurcam ex oliua prius quàm exprimatur destillantem, decoque quousq; cogatur: eaq; assidue locos inunge. Aliud. Myrrhæ unciam unam, ouorum crudorum uitellos quinque: myrrham cum lacte dilue, deinde adijce ei oua, eaq; simul passo excipe, ac assidue illini, & miraberis effectum.

Aliud pharmacū efficax, quo multos hac affectione detentos liberauimus. Glaucij drachmas xvi. gummi drachmas quatuor, lachrymæ oleæ tantum dem: dissolue, & ad limi crassitudinem cum passo redige, atq; assidue illino. Exulcerata autem cute & circundolente, sequentibus utendum.

Pinguis compositio ad faciei manantes & squamosas affectiones.

ac asperitates, utilis etiam existit sedī, conuenitq; ambustis ab igne.

Spumæ argenti unciam unam, ceræ tyrrhenicæ unciam unam stateres tres, ouorum affiatorum uitellos tres, adipis anserini bene subacti trientem: spumam

mam argenti in farinā redige, ac adijce ei oua: deinde his simul unitis infundere quantū sufficit lactis, ut ad limi crassitiem redigatur: postea ceram liquefactam unā cum pingui, refrigeratamq; ac perpolitam cōijce, ac simul cornu misce, atq; in pyxide reconde. Vsu uero exigente, de eo quantum satis esse uidebitur accipe, ac cum rosaceo dilutum impone. Potes autem & sedis remedijs, & quæ ad ambustos ab igne descripta sunt, consimiliter in hac affectione uti.

Ad faciei lentiginēs remedia, quibus etiam ad maculas à sole prouocatas, & ad uaros uti licet.

Cap. x

Vitis alba itemq; nigrae radices cū oleo decoque, donec succulentæ redantur. Tollit etiā tum lentiginēs tum uaros, oleum amygdalarū cum cera, radix lilij cum melle. Maxime omnium autē lentiginēs delet gummi & nitrum aequali pondere, melle permixta. Aliud. Brassicae semen aqua contritum illini, absterfo tamen & confricato prius loco. Vbi uero exaruerit atque cutis attollatur, prolue aqua multa frigida, & illinito pingui anserino, aut medulla cerui, aut etiam cerato ex altero horum apparato. Cauendum autem est, ne quis post excoarationem incidat in ea quæ faciem offendere possunt, qualis est aer frigidus, aut uentus, aut prolutio faciei. Aliud. Sandaracham attere cum melle ad limi densitatem, & per dies sex illinito: arefacta autem cute atq; eleuata, utere galbano cum modico nitro & aceto dissoluto. Ad diurnas autem lentiginēs his utere. Radicis cucumeris syluestris septuicem, cimoliz unciam unam in puluerem redige, ac repone. Vsu uero expetente, quantum suffecerit in aqua dilutum illini. Aliud. Bulborum depuratorum unciam unam, thuris unciam unam: conterere, adiecto cochlearum terrestrum magnarum cruore. Oportet autem ipsas adhuc uiuas stilo pungeretur: id quod effluit mucosum, pharmaco iniicere: quod ubi usus tempore dissolueris, melle exceptum inunge. Eundem effectum præstat ari radix, cerato liquido excepta ac illita.

Cochlearum
cruor

Smegmata ad lentiginēs in calli modum obduratas.

Quandoquidem contingit aliquādo sublatiis pharmacis callosam reddi cutem, ac uix curabilem fieri affectionem: utendum est post lentiginum excoarationem huiusmodi smegmatis. farinæ erui chcenicis Italici dimidium, farinæ hordeaceæ tantundem, scillæ assatæ sextantem omnia in puluerem reducta candido oui excipe, & in pastillos redige, quos in umbra desiccatos adserua: usu uero expetente cum aqua dissolutos illinito, & post modicam temporis intercapedinem frigida ablucere iubeto: aut cremore in quo cascus maceratus est, maxime si adest inflammatio. Aliud. Spumæ niri drachmas octo, galbani drachmas octo, amygdalarum amararum delibatarum drachmas tres, melle excipe, ac illitum linas arefici. Deinde iube faba dentibus contrita extergi, ac ablui aqua moderate frigida: cautosq; esse præcipe, ne aut à uento, aut à sole lædantur.

De maculis à sole prouocatis, quas Græci *ἰσχυρὰς*
ἰσχυρὰς uocant, ex Critone. Cap. xi

Flunt etiam in facie maculae, quas Græci *ἰσχυρὰς* uocant, eo quod à sole prouocentur, maxime circa malas & nasum: & apparent sanè non in alto fixæ, sed instar flosculorum productæ. Quare leniter eas confrictas attollere oportet, ac sinere arefieri, cõmonereq; ut uno aliquo ex smegmaturum genere extergantur. Discutiuntur enim ab illis, aut certe ita abscedunt, ut digitis auelli queant. Verum non uiolenter id facere conuenit, sed leniter & paulatim. Quod si adhuc in hæreant, nihilo leuiores redditæ, subscriptis utendum est. Brasiica contrita, & illita, ad maculas à sole productas, & lentigines, atque omnia alia quæ mediocri repurgatione indigent, utilis est. Similiter autem & sepiæ testæ ustæ, aut testæ purpurarum, ac buccinorum cum melle illitæ. Oportet autè has testas in crudam ollam coniectas in fornacem immittere ac affare.

Oribasij ad maculas à sole prouocatas, uarosq; & uiligines.

Oribasij

Farinæ erui libras duas, seminis erucæ libram unam, amygdalarum amararum, cucumeris syluestris radicis, cuiusq; libram unam, in uino mulso dissoluta & contrita illini, ac post horæ spatium spongia absterge.

Aliud ualde admirabile. Cere tyrhenicæ drachmas xv, olei rosæ drachmas septem & semissem, pinguis anserini drachmā unam, spumæ argenti lotæ & dealbatæ unciam unam, cerussæ unciam unam, gummi drachmas quatuor, mellis Attici unciam unam: dissolutis, illini faciem: & post spatium horarum sex spongia deterge, ac laua cum sponne. Aliud Oribasij.

Lupinos in lixiuio per triduum maceratos contere, & cum eis lentigines illini, donec auelli possint. Aliud. Saponem Gallicum aqua tritum modico adiecto melle inunge, & per horas tres inherere sine: aut sterco columbinum linteolo exceptum ac in puluerem exustū, cum oleo contere, ac illine confidenter. Idem probe efficit myrobalanos contrita illita: itemq; bulbus crudus per se uel cum oui luteo & aceto aut melle. Exusti autem bulbi unā cum alcyonio illiti depurgant lentigines: quod facit elaterium quoq; illitum, & casia cum melle, brasiicæ semen cum aceto, hederæ folia uino decocta, radix umbilici Veneris cum cerato liquido illita, aut cucumeris syluestris radix, aut fici uirgulta in aceto decoque, ac contusis utere: quod idem & uiligines sanat. Aut rubiam contritam, aut costum aqua contusum, aut niri spumam cerato liquidioris exceptam, aut lupinos trudos cum lixiuio ex cinere sarmentorum lutulento decoctos & contusos, cum melle illini. Aliud.

Radicis narcissi delibratas in aceto decoque, iniecta farina erui sufficiente, & pastillos informa: quos in umbra exficatos, in usum adserua. Qui ubi postulauerit, cõtritos cum melle, ad uesperam illine: mane autem rursus abui præcipe. Aliud. Lilij bulbos quinq; contere, & conijce spumæ niri libram unam: deinde melle quātum suffecerit commistum illini, usquequo

integre

integre curentur, ut iam antea dictum est. Aliud. Amygdalarum amararum partes ii, melanthij torrefacti partem i, unumquodq; seorsim conterere, & cum melle commisce: illinito autem ad uesperā, manecq; abluito cum aqua dulci. Vtere autem uno aliquo ex smcgmatibus superius ad faciem nigredines præscriptis: itemq; his quæ sunt illis uicina, ac similia. Vtile autem est & hoc, præsertim si fuerint diurnæ, Buccina exure, ac cum melle conterere, & ad uesperam illine: mane autem ablui cum aqua dulci præcipe.

Aliud ad solares maculas, ualde pulchrum.

Oua integra in aceto macerato, donec testa quàm tenebrima fiat, deinde superius perforato, ac extrahe ab eis candidum: post uero melanthij in tenuissimum puluerem redacti, & thuris equas partes cum eis coterito, adiectoq; melle sufficienti, ut dictum est, utitor. Quod si adhuc perseuerauerit affectio, huiusmodi excoriorijs utendum erit.

Excoriatorium macularum à sole prouocatarum & lentiginum.

Melanthij quadrantem, seminis ocymi quadrantē, radices ari quadrantem, aqua subigito & imponito, ac finito ad glutinari: post aliquatū uero interstirium detrahito, atq; aqua calida quàm plurima proluito. Aliud.

Quod ad callosam faciem conducit, siue per etatem, siue per continuā pharmacorum aciorum excoriationem calli sint contracti, Seminis erucæ sex uncem, ammiij, cardamomi, radices ari, costi, cuiusq; drachmas tres, contūdito, ctribrato, ac reponito. Vbi uero necessitas exigit, quantum satis uidebitur accipito, acetoq; subactum imponito satis condensatum: quum uero ad glutinatum fuerit, acetum aut aquam per spōgiam instillato. Facta autem excoriatione, multam aquam calidam adfundito: à prolutione uero subiectam mixturam panniculo laneo exceptam imponito. Cerussæ drachmas octo, spumæ argenti lotæ drachmas ii, adipis anserini sex uncem, medullæ ceruinæ sex uncem, adipis suilli recentis quadrantē, olei sesamini quantum sufficit. Oportet autem fomentū adhibere bis in die. Eleuata autem cute, sequēs ceratum est imponendum. Adipis caprini à fibris depurati & loti libras ii. olei susini sex uncem, olei rosacei & amygdalini, ceræ, mastiches, cornu cerui ni usti, salis ammoniaci, cuiusq; unciam unā, terræ cimolix trientem. Ea quæ eliquari possunt liquefacito & percolato: deinde rursus ad carbones lente decoquito, & ad ea quæ sicca sunt in mortarium adfundito, ac probe unitis utitor.

De exulcerata menti scabrie.

Utendum est ad eam his, quæ paulo post in capite uidelicet decimoquinto descripta sunt, ad manantes menti papularum eruptiones.

De stigmatibus siue notis à uerberibus illatis.

Cap. xii

Stigmata appellant, quæ in facie aut alia quapiam corporis parte infliguntur, notas, quales uidemus in manibus eorum qui militiam exercent. *Stigmata nota.* Atramento autem utuntur illi talis lignorū acanthi arboris Aegyptiæ & maxime corticis libram unam, tris usti sextantē, gallarum sextantem, atramenti

lutoij

futorij unciam unam contundito ac cribrato: primumq; ac ustum cum aceto terito, deinde & reliqua contrita coniuncto; affusisq; aquae quidem partibus duabus, succi uero porri parte una, & probe unitis unior. Oportet autem locis prius cum acubus punctis sanguinem extrahere, & primum porri succo illinire, postea uero ipsum adhibere pharmacum. Porro quibus eiusmodi stigmata extirpare penitus uolumus, illis subscriptas mixturas adhibebimus. Calcis partem 1, nitri aslati partem 1, cum lixiuio farmentorum cineris lutulento terito, & nitro adperso locum prius extergito: deinde illinito

*Verruca
myrmeciae*

continenter. Idem quoq; ad uerrucas myrmecias dictas, efficax existit. Aliud, quod stigmata tollit. Piperis drachmas 11, rutae drachmas 1111, auripigmenti drachmas 1111, contere, & adiecto melle, in pyxide figulina reponere. Vbi uero usus expetit, supra stigmata prius nitro confricata, resinam terebinthinam impone, uinculo adhibito in dies quinque: postera autem die sexta solue, atq; acu stigmata penetra, & cum spongia sanguinem exterge, salemq; tenuissimum in ipsas puncturas insperge: quem tamdiu inherere sinas, donec stadia decem quis cursu consecerit: deinde praedictum pharmacum linteo exceptum impone, neq; soluas per dies quinque: sequenti uero sexta solue, & stigmata scalpendo expoli: atq; ubi quod nigrum fuerit detraheris, rursus pharmacum ipsum illinito cum penna. Eruit enim in uiginti diebus citra magnam exulcerationem, non relicto etiam uestigio cicatricis. Idem efficiunt mordendo erodentia medicamina in uulneru tractatu descripta.

*Varia
ionthi, acne.*

De uaris faciei, qui tum ionthi, tum acnae Graecis uocantur. Cap. xiiii. S Olet circa faciei cuticulam tuberculum oboriri, paruum quidem, sed durum, quod uari nomine appellatur. Id sane à crasso humore producit. Quare cura eius per ea quae duriciem emolliunt, & tumorem discutunt, medicamina perficitur: quorum syluam eiusmodi tibi parabis. Lilij radicem tritam cum melle illinito, aut cyclamini radicem cum melle, aut narcissi radicem cum melle, aut cassiam cum myrrha & melle, aut plumbaginem cum aceto, aut pulegium tenuissime tritum ac cerato exceptum impone. Aliud.

*Varis diu
turnae*

Mellis & aceti acerrimi, cuiusq; aequalis partes simul permixtas illini, ac digito circumtere. Aliud. Sepiae testae ustae sextantem, costi sextantem, myrobalani unciam unam, cōtere cum aqua & illini, arefactum uero rursus humecta. Aliud. Costum contūde, & cribratum in tenuissimum puluisculum redige: deinde cum felle caprino commixtū in cerati modū effinge, & cum eo uaros ad uesperam illini: mane uero à somno, lacte qualecūq; adfuerit faciem abluere iube. Aliud. Alumen scissile quam tenuissime contere, & resina terebinthina exceptum impone. Quum autem diu perstiterint uari, his utēdum erit, Saponis Gallici drachmas quatuor, ammoniaci thymiamatis drachmam unam, thuris drachmam unam, dissoluito in aqua & ad cerati densitatem reducto, sicq; illinito, ac post horae spatium ablui cum calida praecipito. Aliud. Rhois culinarij, hyssopi, pulegij, salis fossilis, feminis

feminis ocymi, cuiusq; æquales partes, cerato rosaceo excipe ac utere.

Aliud, quod ad eminentiores faciei dispositiones, itemq; pruritus efficax est, necnon ad principium elephantiasis. Gummi albi & niri æquas portiones, acri aceto dilue & illini. Vbi uero exaruerint, subscripta mixtura de purga. Saponis Gallici libram unam, ammoniaci, spumæ niri, cuiusq; quadrantem, saponem & ammoniacum in uase fictili cum aqua chœnice uno decoquito. Vbi uero dissoluta fuerint, sicca contrita ac angustissimo cribro excussa, inijcito: deinde transfer in pilam, probeq; contusum uitreo uase recondito. Necessitate uero expetente faciem illinito, & post paruum interstitium multa aqua abluito: prius leniter facie confricata. Hoc pharmaco semper ad uaros utere. Aliud ad uaros, celebre. Niri rubei sextantem, cimolix unciam unam, thuris drach. iiii, farinæ trui unciam i. Vere autem hoc modo: Accipe halcyoniū ac per se optime contere, deinde iniecto oleo simul tere, & ex eo faciem ad uesperā illini. Mane uero à somno præscripta compositione exterge. Aliud sinegma, quo per omnem curam uarorum uti conuenit. Farinæ fabarum, medullæ peponis sicæ, cuiusq; drach. iiii, contere & cum his exterge. Aliud. Nitrum cum myrrha tritum aqua permixtum exhibe, eoque extergatur.

De ficosis faciei tumoribus. Cap. xiiii. Ex Galeno.

Est & hæc una aliqua ex menti affectionibus, in hoc differens à uaris, quod nō solū crassus existit humor à quo producitur, sed serosa etiam tenuitate participat: ob quam & citius exulceratur, siquidem non ut cōueniē cures: & siccioribus etiamnum indiget remedijs, quā ea sunt quæ uaris adhibentur. Oribasius ad Eustachium. Ficos appellant germina ulcerum, Ficū rosa, rotunda, subdura, rubicunda, quæ consequitur etiam dolor. Nascuntur autem ut plurimum in capite, atq; etiam reliquo corpore: de quibus Crito sic scripsit. Ad ficosas menti eminentias, Critonis. Spumæ argenti drach. iiii, thuris drach. ii, salis fossilis drach. ii, sandarachæ drach. i, contrita simul impone. Aliud ualde præclarum. Elaterij drach. i, salis fossilis tantundem, chalcanti drach. ii, sandarachæ drachmā unam, misce: cum specilli instrumēti, quod melam Græci appellant, extremo admota impone, præhumeſcato prius loco quo pharmacum melius insideat: post impositionem uero cataplasmate feminis lini aqua dissoluti superne contege. Mela, specilli, instrumētū

Aliud, Archigenis, ad capitis & menti ficos.

Calchanti assati, aluminis scissilis, glutinis, cuiusq; æquales partes, squamæ aris duplum: glutinum in aceto maceratū dilue, & cum eo reliqua trita committe. Vbi uero uti uelis in aceto rursus dilue, ac ex eo ficosas eminentias inunge, & rasura tenuis linteoli contege. Inhæret autem pertinaciter, atq; citra cicatricem ficos depurgat. Vror autem & hoc ipso pharmaco ad callos fistularum leniendos in collyria informato. Quod si humidi sint tumores, nimirum aqua effluente ex eis, uelut à fonte, pura, subscriptis remedijs utendum.

erit. Pastillus ad ficosas menti eminentias. Reprimat autem omnes tumores qui accidunt illis, qui male cicatricem obdixerunt: quemadmodum uidemus in his, quibus palpebrae aut labia sunt confusa: Squamæ aeris sextantem, misyos assati sextantem, auripigmenti sextantem, diphyrgis drachmas tres, chalcitidis usti drachmas quatuor, aeris usti drachmas quatuor, glutinis fabrilis drachmas quatuor: compone & utere ut dictum est in prioribus. Nam & ob eius usum, magnum nomen adeptus sum.

Ad manantes menti papularum eruptiones, ex Critone. Cap. xv

Conferunt quidem & his plurima eorum quæ antea ad capitis ulcera manantia præscripta sunt. Proprie autem profunt hæc: Spumæ argenti, chalcanti, mali cori, baccarum myrti, singulorum æquales partes cum uino & oleo myrsinino tritas illinito. Aliud. Præclarum & hoc est: Verbenacæ supinæ drachmas octo, acaciæ drachmas octo, gingiberis drachmas duas: cum uino tritis utere. Aliud. Gingiberis unciam unam, thuris sextantem, acaciæ trientem, utere cum uino. Aliud. Spumæ argenti, ladani, baccarum myrti nigrarum, seminis hyoscyami, mali cori, æqualibus partibus cum uino & oleo myrsinino aut rosaceo permixtis utere.

Aliud, quod & ad ea quæ instar faui melle manant ulcera, melicerides Græcis appellata, conducit siue ea in mento, seu in capite existant: quæ à Syris appellatur Sanalia.

Spumæ argenti & baccarum lauri, æquales partes cum aceto ac oleo myrsinino illinito. Experimentum enim bonum de se præbuit sæpe.

De impetiginosis tum menti, tum reliqui corporis tumoribus, ex Galeno. Cap. xvi

*Impetigo in
psoram & le
pram transit.*

Lichenas

Praterea & hæc affectio ex mixto quopiam generatur humore, nimisrum serosis & tenuibus acribus, per humoribus una cum crassioribus permixtis: quapropter etiam facile in psoram & lepram transit. Indiget itaque hæc affectio pharmacis fortiter desiccantibus. Quod si uero in psoram aut lepram transierit, ad hoc quod desiccantia remedia adhibenda sunt, necesse erit & repurgantibus uti. Itaque Crito ita scripsit, ad eas quæ in mento prodeunt impetigines, lichenas appellatas: Affectio, inquit, est insuauissima, & pruritus inferens, & circumtensionem, & periculum non minus. Proserpit enim aliquando per uniuersam faciem, & oculos ipsos contingit. Quare diligentiori cura utendum erit, ubi ea quæ iam longo tempore perseuerarunt, ab his quæ recens prodierunt disciteuerimus. Ad recentes igitur impetigines conueniunt hæc. Perdicij herbæ folia continenter in loco confrica, aut thus, aut ammoniacum cum aceto terito, aut etiam cum perdicij succo, ac illinito.

Aliud. Liquorem qui ex humidis olæa lignis dum comburuntur effluit, illini. Idem facit quod ex brassicæ succo aut caule dum aduritur, destillat, illitum. Aliud. Maluæ agrestis semen depuratum collige, contere, ac expressum inde succum reponere, cumque assidue illine. Aliud. Portulacæ succum

laxe succum continenter illinito. Aliud. Lachrymam syluestris oleæ cum aqua diluito, & adiecto modico styrace unito, ac imposito. Vbi uero iam diu durauerint impetigines, uiticis folia cum aceto trita illini, aut hastulæ regię radicem in aceto decoctam & tritam adfrica.

Aliud ad diuturnas impetigines. Chamæleonis nigri radicem in aceto decoque, contere, & illine. Verum quum ad diuturnas impetigines multa & uaria excogitata sint remedia, particulatim de singulis dicam, iniñ sumens à pastillis. Pastilli. Pastillus ad impetigines in quacunq; corporis parte consistant, Alcyonij usti drachmas duas, sulphuris uiui, thuris, piretri, spumæ nitri, cuiusq; drachmas duas, chamæleonis nigri radicis drachmas quatuor, hastulæ regię radicis drachmas quatuor, glutinis drachmas quatuor. Glutinū in aceto dilue, & cum eo reliqua excipe, desicca, & utere cum aceto.

Pastillus ualde celebris. Foliorum fici siccorum drach. xii, chalcitidis crudę drachmas decem, calcis uiuę drachmas octo, misyos crudi drachmas quatuor, thuris drachmas quatuor, sulphuris uiui drachmas octo, aceto subige, & cum aceto utere. Pastillus ad impetigines. Qui & callos excirpat, & cicatrices supra opinionem: Thuris, testarum buccinorū ustorum, fimi columbini, alcyonij, gummi, singulorū æquales partes contere cum lacte, & informa pastillos, ac utere cum aceto. Pastillus alius. Lachrymę oleæ drachmas quatuor, thuris drachmas quatuor, sulphuris uiui, alcyonij, spumæ nitri, halicæ contusę & cribro excussę, cuiusq; drachmas octo. halicam in acetum multum atq; acerrimum cōiectam tam diu decoque, donec uiscosa reddatur: reliqua uero cum ea ipsa commissa in pastillos informa, ac cum aceto utere. Circumlitiones ad impetiginem. Ad impetigines maxime feras: Nitri, chalcitidis assatę, ammoniaci thymiamatis, succi sa

Pastilli
lichenet

Impetigo
fira

rapidis tres testiculos habentis, æquales partes contunde, & cum aceto illini: efficax est & ad humentes impetigines, atq; ego sanè usus sum, & ex animi sententia successit. Aliud. Stercoris corcadis unciam unam, thuris unciam unam, cōtulis utere cum aceto, ita ut cum nitri spuma impetiginem prius confrices, & miraberis.

Aliud, quod & ad impetigines & utiligines ac lepras ualde cōmodū existit. Stercoris muris, chalcanthi, sulphuris uiui, cuiusq; drachmas octo, farine farbarum uncias xiiii, aceti sextarios quatuor. Muscardam contunde, & cum aceto decoque; atq; ubi bis aut ter efferbuerit, sulphur insperge & chalcanthum, animaduersione habita, ne efferveant & effundantur: deinde ubi parum saltem cōcocta fuerint, etiam farinam fabaceam iniice, & simul ad limi crassitiem decocta redige, & ablatis ac reconditis utere. Ad lepras quidē lintolo exceptum impone, ac post quintum tādē diem abstrahē. Ad impetigines uero aceto dissolutum continenter inunge.

Illitio cocta, ad diuturnas impetigines, quę citra exulcerationē eas sūmouet. Halicæ mola, tritæ ac cribro quā arctissimo excussę uncias xiiii, chalciti-

dis, cimolix, sulphuris uiui, misyos, cuiusq; sextantem, spumæ nitri, aluminis scissilis, aleyoni, radicis hastulæ regix, thuris, lachrymæ oleæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, cuiusque unciam unam, acetii choenicas tres. Alcyonium, hastulam regiam cum aceto decoquit: atq; ubi ad medietatem redactum fuerit, percolato. In colamento uero ammoniaci, thus, & reliqua sicca dissoluit: halicam uero in aceto quod superest decoquit: deinde reliquis adijcitur, ac simul commisais uitor. Aliud ualde præclarum. Acetii acer rimi sextarios octo, farinæ hordeacæ uncias $xxiiii$, mānæ thuris uncias $xxiiii$, radicis rumicis syluestris drachmas octo, radicis albusi drach. $viii$, ueratri albi drachmas decem, alcyonij drachmas decem, cardamomi drachmam unā, terræ cimolix drachmas $xviii$, glutinis drachmas xvi , spumæ nitri drachmas xvi , uirgultorum halicacabi uiridium fasciculum quantum manu cōprehendere potes, appara & utere ut dictum est. Quod si hæc affectio diutius producat, & in callos trāscat, nihilominus his quæ dicta iam sunt utendum est: maxime uero congruum est quod sequitur, Misyos, ginziberis, thuris, aluminis scissilis, cuiusq; drachmas octo, aloes, sulphuris uiui, cuiusq; drachmas quatuor: hæc cum passo ad limi crassitudinem redige, & bis ac ter in die loco prius confricato, illine: foris autem conseruandi phar maci gratia pelliculam uesticæ aut ex ouo suprapone.

*Impetigini
callose*

Oribasij lichenicum pharmacum, facit idem etiam ad pruritus. Chalcantidis, sulphuris uiui, nitri, thuris, æqualibus portionibus utere: ad impetigines quidem, cum aceto: ad pruritus uero, cum uino.

Aliud, quod impetigines in paucis acceit diebus, ualde commodum, quare prætexigendam suadeo mercedem.

Sulphuris drachmas octo, calcis drachmas octo, chalcitidis crudæ drachmas octo, thuris drachmas quatuor, misyos drachmas quatuor, foliorum capparis uiridium depuratorum drachmas xii . cum aceto tere, ac in forma pastillos, & utere. Emplastrum liquidū, multi ad impetigines experimenti, cuius rei nuper adeo periculum feci.

Picis siccæ, ceræ, resinæ colophonix, ueratri triti, olei, æquales partes. Per experientiam commēdatum hoc tibi habere, propterea & mercedem præexige.

*Emplastrum
illitionibus
præstantiora*

Quādoquidem uero plurimi sunt, qui illitionū usum auersantur, maluntq; adhibere emplastra: utpote quæ neq; per sudores obortos defluant, neque arefacta etiam citem circūtendant, annectam & horum aliquot apparatus.

Emplastrum ad impetigines, quod citra exulcerationem eas submouet. Ceræ, picis liquidæ, thuris, resinæ terebinthine, sulphuris uiui, cuiusq; sextantem. Quæ liquefieri possunt liquefacito, siccæq; cum eis committito.

Aliud quod similiter citra exulcerationem opitulatur.

*Emplastrum
lichenica*

Picis liquidæ libram unam, mannæ, sulphuris uiui, farinæ lupinorū, cuiusq; unciam unam, galbani sextantem. Picem calefacito, & galbanum præmolli tum adijcitur: liquefactis uero, ac ab igne ablatis reliqua inspergito ac unito.

Vtcre

Vtere autem hoc ut uehementer commodo.

Aliud, quod citra exulcerationem auxiliatur.

Chrysocolle sicca qua aurifabri utuntur, chalcitidis assata, misyos assati, squamæ aris, diphrygis, salis ammoniaci, terræ cimoliæ, cuiusq; drachmas quatuor, æruginis drachmas xii, chalcanthi drachmas sex, lapidis alij, aris usti, cuiusq; drachmas sex, sorcorum drachmas v, aluminis liquidi drachmas quatuor, contunde omnia diligenter, & adiecto aceto sedulo in sole sub feruentis caniculæ æstu contere, donec ipsum pharmacum æruginem contrahat. Apparetur autem in alio quopiam mortario, thuris sextans, gingiberis sextans, aloes uncia una, ladani uncia una, opopanacis uncia una: hæc in aceto diluta & ad æruginis crassitiem redacta, illis quæ antea in æruginem commutata sunt iniice, ac rursus contere, atque his omnibus aristolochiæ confusæ & cribratæ unciam unam adijce, & rursus tere. Quum uero omnia in formâ emplastri redacta fuerint, liquefabilia liquefacito ac assumpto. Sunt autem liquefabilia hæc, ceræ drach. centum, terebinthinæ drach. cc, galbani drac. ix, olei libra i. emollita in usum adseruato simul omnia. Hoc ipsum pharmacum duplici aspectu se uidentibus offert.

Pharmacū
duplici
aspectu

Aliud, quod similiter ad dictas impetigines efficax est, ut etiam ea quæ intus relinquuntur reprimere possit.

Picis, bituminis, resinæ pinus, ceræ, sulphuris uiui, mannæ, æquas portiones, olei cyprini quantum sat fuerit densa liquefacito, & inspergito sicca: in tenui autem pellicula excepta imposito. Emplastrum aliud ad impetigines. Picis sicæ quadrantem, picis liquidæ unciam unam, salis unciam unam, resinæ colophonis, ceræ, sulphuris uiui, cuiusq; unciam unam, nitri sului unciam unam, chalcitidis unciam unam, olei sextantem: utere.

Excoriatoria impetiginum. Verum ubi iam affectio stabilis facta fuerit, & pharmacorum adhibitioni & molimini resistit: utendum erit excoriatorijs. Ea enim ex facili superficiem auellunt.

Excoriatorium impetiginum, quo Pamphilus usus est

Romæ: & plurimum sanè profecit, quum in urbe mentagra grassaretur, quæ impetigo fera existit.

Mentagra
impetigo
fera est

Squamæ aris drach. octo, auripigmenti drach. iiii, aris usti, uetati albi, cantharidum reiectis alis & pedibus, singulorum drachmam unam & dimidiam: unumquodq; per se contere: deinde simul confusa cedria excipe, ac in densitatem limi redacta in pyxidem aris Cyprij reponere. Vbi ucto necessitas exigat, nitro ac modico aceto impetigine conficta, pharmacū hoc cum specillo lato, spathomelam Græci uocant, illine: atq; ubi iam adfricuieris, modicumq; temporis spatium intercesserit, cum specillo derade, ac rursus aliud illine: bisq; ac ter eodem repetito: locos illiros cum pellicula uesicæ bouillæ, aut alterius cuiusdam animantis contege: post pelliculæ uero impositionem fasciola leuiter colligato, ac finito pernoctefecere, siquidē tamdiu adhæreat:

Specillum latum,
spathomela

b 2 si uero

si uero non, ad horas aliquot, donec bullas excuscitet sanie crassa & glutinosa repletas: quibus productis lauari iubebimus, atque remorari aliquandiu in balineo: & enim hoc ipsum cura adiuuare solet. Sit autem calidius ipsum balineum. Quod si prohibeat quid balneo uti, fomento utendum est calida aqua multa: quæ ubi iam ad molestiam usque affusa fuerit, extergere conuenit, ac panem cum aqua mulla subactum imponere. At ubi sordibus ulcera scaturierint, emplastrum uiride spleniolo exceptum adhibeto, modico itidem de excoriatorio præscripto admixto. Exclusa autem sanie, & nullo amplius tectorio ulceri incumbente, ex emplastro albo linteolum paruum illitum imponimus: eoque utimur donec omnino ad cicatricem perducatur, quotidie fomento adhibito, ac nouo spleniolo ex emplastro albo illito. Porro ante admotionem excorioriorum, uicinas impetigini partes munire oportet pharimaco quopiam ex his quæ ab inflammatione locos tuentur, atque ita excoriatorium ad impetiginem solam adhibere.

Spleniolorum usus

Excoriatorium ad mentagras, ut citra cicatricis uestigium ad sanitatem perducantur.

Alopecie remedium

Efficax est & ad alopecias ad solem uel ad ignem illitum. Vbi uero bulla producta fuerit, eam acu penetrare oportet, excluso autem humore, ceratis curare: cicatrice enim inducta, enascuntur pili. Atque ita quidem ad alopecias adhibetur. Ad impetigines uero utendum est eo modo qui prædictus est in excoriatorio primo. Pharmacum uero ipsum huiusmodi est: Sandarachæ, auripigmenti, squamæ æris, ueratri nigri, cuiusque drach. ii, elaterij drach. i, pientrium cantharidum drach. i. excipe cedria. Vfus autem iam ante ostensus est.

Emplastra uiridia post excoriatoria adhibenda sunt: nimirum ad ulcerum ipsorum repurgationem.

Viride emplastrum, quo Pamphilus usus est ad mentagram, post eruptionem scilicet bullarum.

Ceræ libram unam, resinæ pinus siccæ libras duas, æruginis quadrantem, olei ueteris bessellem, aceti acerrimi quantum suffecerit. Aeruginem ad solem cum aceto conterito: liquefabilia liquefacito: & singefacta, ac in mortarium coniecta simul unito. Aliud. Aeruginis drach. ii, mannæ drach. iiii, galbani drach. iiii, adipis uitulini drach. xi, ceræ drachmas octo, resinæ pinus drachmas octo, aceti quantum satis uidebitur committe.

Aliud, quod euchrun, hoc est boni coloris, appellatur.

Æris usti quadrantem, aluminis rotundi, æruginis, salis ammoniaci, mannæ, cuiusque sextantem, ceræ libras duas, resinæ pinus siccæ libras duas, olei dextantem, aceti quantum ad sicca conterenda suffecerit.

Emplastra alba ad cicatricem perducunt.

Verum ubi iam per præscripta emplastra uiridia, ulcera ipsa repurgata uideris, utendum erit emplastris albis, quo absque cicatricis uestigio ad sanitatem

tem

tēm perducantur, quare neutiquam hæc relinquenda cenſeo, ut quæ ea mul-
tā ad tactum lenitate committunt.

Emplaſtrum album, quod aquoſum appellatur. Hoc emplaſtro

Magnus medicus uſus eſt. poſt impetiginum excoꝛiationem.

Ceruſſæ, ſpumæ argenti, ceræ tyrrhenicæ, aquæ puræ, ſingulorum libram
unam, olei omphacini libras duas. Spumam argenti, ceruſſam, & aquam
ſimul contere, atq; ubi tenuiſſima facta fuerint, oleum guttatim iſtillatumi
ſimul contere, donec ſufficiēter fuerint cōiuncta: deinde in fictili uaſe ad ignē
adhibe, ac continenter agita: quū uero aqua conſumpta fuerit, iſſice ceram,
atque hoc modo in mortarium inſuſa emollito, ac utere.

Aliud. Ceruſſæ libras duas, miſyos crudi ſextantem, terebinthinæ un-
ciam unam, ceræ ſexuncem, olei libras tres, aquæ chœnticas duas: compoſite
ut prædictum eſt, ac utere. Licebit etiā uti ceratis ſedis, & quæ ad ambu-
ſtos deſcripta ſunt tenerioribus.

Ad moleſtum oris odorem.

Cap. xvii

AD grauem oris odorem, qui citra exulcerationem accidit, Irin in uino
ueteri odorato maceratam, ad colluendū continue exhibe, atq; etiā
in ore retinendam aliquādiu: aut myrrham in uino meraco dilutam collu-
endam præbe: aut acetum colluat quotidie, uespere dormitum iturus:
mane uero ſpicæ garadi decoctum ore colluat, aut ipſam ſub dentibus con-
terat: aut potamogetonis folia quotidie dentibus contrita expuat: aut roſa-
rum floribus continue cōfricato: aut ſici ſylueſtris radicem urito, & cinerem
eius cum melle illinito: aut parum cyperi, aut ſloris iunci odorati cōtūdito,
& gingiuas continue cōfricato: aut cimoliam cum ſale urito, & contuſis ute-
re: aut ſimilaginem uelle ſubactam ac exuſtam adhibe. Aliud. Salis
albi, pumidis, origani, cuiuſq; unciam unam, iridis ſextantem, ſloris iunci odo-
rati ſextantē: his ſimul contritis dētes fricato, & uniuerſum corpus. Bonum
enim odorem facit, & dentes dealbat.

*Dentibus
dealbandis*

Aliud. ad foetorem oris.

Chalcitidis crudæ drachmas xii, ueratri albi drachmas octo, in aceto tere,
& per aliquot dies ad ſolem æſtium expone, deſiccatoq; utere. Vile eſt &
ad ſanguinolentās gingiuas, itemq; putreſcentes. Bibant autē & ipſi ea quæ
præſcripta ſunt illis, à quibus per totum corpus teter odor tranſſpirat, in hoc
ipſo Sermone, capite octauo.

Aliud, ad craſſitiem labiorum.

Prominent in pleriq; ſuperius labrum, aliquando etiā inferius, ex deſluxu
nehementi à capite delato, ut præ denſitate labrum intumeſcat, & ad ſermo-
nis prolationem præpediatur: ultra hoc, quod alias indecentia quadam fa-
ciem dehōneſtet. Quare curabis hos aut incifa uenā, aut purgatos per con-
ſuetas excretiones. Poſt hæc autem adhibebis illitiones ac apophlegmanif-
mōs, quibus deſluxus pituitæ à capite tollitur ac ſedatur. Deinde illitioni-
bus ad os deſcriptis illines palatū: quibus præmiſſis, porri ſuccum cum oleo
ueteruſtiſſimo ad interna labiorum illini, aut foliorum braſſicæ ſuccum unā

b 3 cum

cum oleo ad affectum labrum continue admoue: aut glaucum cum uino, aut cimoliam, aut Musæ pastillum, aut pastillum ex halicacabis cum uino.

Ad labiorum fissuras.

Cap. xviii

OVi internam pelliculam fissuris labiorum adglutina, aut quod pelliculæ similitudine, circa palmarum ossicula adhæret, aut araneorum à tribus dependentium texturam maxime albam. Eas uero quæ in alium magis se extendunt fissuras cum adipe anserino, aut caprino curabis, aut cū mella bouilla aut ceruina, ita ut cum semper uiuo atq; terebinthina unita, illinas. Aliud. Gallam & mastichen quàm tenuissime trita, celsypo, id est lanæ succidæ sordibus, in formam cerati redactis excipe, ac utere.

Aliud. Gallarum unciam unam, cadmix unciam unam, cerussæ quadantem, contere cum rosaceo, & illine. Aliud. Cypri sextantem, gallarum unciam unam, aluminis scissilis drachmam unam, contere, ac siccum insperge. Aliud. Mastichen cum uino tritam & dilutam illine. Aliud.

Ecce acetum uisum, cum myrrha aut cerato rosaceo excepta, impone. Idem etiam ad magnas in extremis ac summis corporis partibus inflammationes conducit. Aliud. Lutei ouorum uisum, gallæ, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum æquales partes lanæ succidæ sordibus exceptas impone.

Ad omnia labiorum ulcera, & ad ea quoq; quæ cacoethe appellant, Ostrea usta tenuissime trita insperge. Ego autem & non usta contriui, eisq; usus sum, neq; male celsit. Aliud, ad fissuras labiorum. Musæ pastillum cum sapa aut uino dilutum, satis crassum illinito. Optime prodest & id quod ex amurca, ad ulcera oris quæ aphthas appellant, apparatur. Idemq; similia remedia efficiunt, quæ ad fissuras sunt descripta, atq; etiam pastillus ex halicacabis cum uino. Ad tubercula in labris. Utendum est & ad hæc præscriptis ceratorum formis, atq; etiam hoc ipso quod subieci: Radicis rumicis uisæ, niri uisæ, terebinthinæ uisæ, singulorum æquas portiones, contritas cerato excipe. Confricatis autem prius ulceribus, cum penna sæpe illini. Repurgat enim tubercula in internis labris oborta. Colluat autem ea & ante illinitionem & post eam, cum lacte.

De dentium affectionibus.

Cap. xix

PArs quædam ex tertia coniugatione neruorum à cerebro utrinq; delatorum, distribuitur quidem in pelliculam quæ ipsum os, & linguam, ac gingiuas complectitur ac ambie, sensum eius suppeditans. Ingenerat autem seipsam tum superiori, tum inferiori maxillæ inuoluens, ac omnibus dentibus ad eorum radices substrata, ut ob hanc causam inter ossa soli dentes dolore afficiantur. Illi ipsi sanè nerui delatum ad se nutrimentum suscipientes: quod in ipso liquidius existit, sibi lucrifaciunt: quod autem siccius quàm conueniat existit, tanquam alienum à se abijciunt. Ea ipsa uero à neruis redundans superfluitas in cõcauitatibus locellorum, in quibus ipsi dentes sunt infixi, aggregatur, paulatimq; tenacior ac densior seipsa facta, ob diuturnam

isthic

Ex amurca
remedium

Dentes solos
inter ossa do-
lore affici

isthic conuersationem, in ofsium formam transmutatur. Atque hoc modo nutrimentum dentibus accedit. Ita q; dentes hac nutritione suscepti, usq; in senectutem augetur. Vnde sane in senibus ob defectum continuentis materiae, attenuantur dentes, mobilesq; fiunt, ac excidunt. Cæterum quantum augetur ipsi dentes, tantum ex attritione ciborum consumuntur. Impossibile est enim citra nutritionem augeri. In uniuersum itaque duabus affectionibus dentes sunt obnoxii, & his quidem contrarijs. Indigentia uiridelicet, & abundantia eius quod defertur ad eos alimenti. Indigentia ergo sicciore & fameliciore, atq; ob id tenuiores eos efficit. Abundantia uero consimilem in eis dispositionem facit, ei quæ contingit in carnosus partibus inflammationi. Huius igitur affectionis cura iuxta eundem scopum fiet, quem propositum habent hi, qui inflammationibus medentur. Nimirum ut abundantia partim discutiendo, partim repellendo euacuetur. Eius uero quæ indigentia alimenti contingit, tenuitatis dentium nullum remedium existit. Necessarium est enim laxari ac commoueri dentes, ubi locelli eorum flaccidiores reddantur, quum non solum ipsi dentes, sed & loculi eos continentes graciles fiant. Hæc igitur affectio necessario accidit senibus, quibusdam citius, alijs serius. Auxilio autem eis erunt pharmaca adstringentia, quæ gingiuas confirment, & ad arctius complectendū dentes adiuuent. Qui uero facile exierunt dentes, eos, siquidem id ex mollicie eorum contingat, duriores reddere conuenit, & affectionibus minus obnoxios, per austeria uidelicet & acerba adhibita remedia.

Dentium affectiones duas sunt

Ad inflamas gingiuas.

Cap. xxx

Gingiuas autem ob inflammationem dolore affectis, optimum remedium existit oleum lentiscinū cōduplicato linteolo calefactum, ac in ore retentum. Sit autem recens oleum. Nocium enim existit inueteratum. Repellit autem oleum lentiscinum citra asperitatem, & discutit absq; mordacitate, quibus maxime indigent inflammata. Atqui asinum lac in ore retentum, ubi maxime infestauerint dolores, eos mitigat, ac ex tempore sedat. Et hoc quod ex uino ad tertiam usque mensuræ partem decocto, apparatur, quod sapam dicimus itemq; heplema, & palmularum stillamentum similiter ore retentum calidum uehementer lenit. Oportet autem aquam calidam ad palmarum stillamentum adfundere, quo transicies eius diluatur. Valet etiam semperuiui minoris decoctum per se aut cum rosaceo melle, aut decoctum aliquod, quodcumq; tandem per se calidum, aut cum sapa, aut palmarum stillamento in ore retentum. Supra opinionem autem lenit succus portulacæ. Insensissimum uero inflammatis gingiuas est acetum, omniaq; acerbissima, & acrida, & fassa.

Oleum lentiscinum uetus nocium

Sapa, heplema.

Ad cruentas gingiuas.

Cap. xxxi

Cruentis uero ob bilis acredinem gingiuas, præter opinionem utilis est foliorum hyoscyami succus, aut decoctum cum sapa, aut cum palmarum

b 4 rum

rum stillamento calidum ore retentum. Folijs autem ad manū non existentibus radicem eius decoque cum passo, & retinendū exhibe decoctum. Utile est & alumen scissile cum myrto, si quā tenuissime trita adhibeantur. Vbi uero adstrictas iam cognoueris gingiuas, colluendam sapam calidam exhibeto.

Aliud, Asclepiadæ, ad cruentas gingiuas.

Balaustiorum, florum rosarum, ramorum myrti, singulorum æquales partes, cum posca diluore decoquito, & liquore inde percolato, ac cum in ore retinendum exhibeto. Aliud. Ramorum lentisci, balaustiorum, radicis mali cotonei, singulorum æquale pondus in posca decoctum exhibeto.

Epithemā ad sanguinem ex gingiuis crumpentem.

Farinæ partem unam, acinorum uix tantundē, succi sanguinariæ quantum satis est, contere, & ad cerati crassitiem redacta, impone ad sanguinolentum locum, aut simul cum succo tamdiu tere donec arefiant, atq; hoc modo trita insperge. Aliud. Spongiam nouam siccam in sanguine taurino made factam in uase fictili exure, contere ac reponere. Vbi uero uti uelis, cineris ipsius drachmas quatuor accipe, thuris drachmas duas, chalcitidis crudæ drachmas duas, & simul trita insperge. Aliud. Terebinthinæ aceto torrefactæ drachmas quatuor, æris drachmas duas, tritis utere.

Ad excrecentes gingiuas, putrescentesq; ac tumentes. Cap. xxxii

AD gingiuarum tumores, easdemq; excrecentes & putrescentes, conueniunt cum colluta, tum ore retenta, oleum ex immaturis oliuis expressum, oliuarum colymbadum muria, cedria cum aceto, gallarum decoctum, pruni folia ex aceto decocta, cytinorum decoctum, corticis mori aut etiam foliorum eius decoctum. Arida uero & trita, gingiuis ad moueri commodè possunt hæc: radix aristolochiæ, plantaginis semen tritum, bitumen tritum, fœniculi radix usta, pulegiū ustum, diphryges, rubigo ferri, chalcantum assatum, gallæ, cytini, malicorium, balaustia. Optime autem prodest gingiuis à fluore affectis: aceti & mellis, cuiusq; libram unam, aluminis sextantem. Decoque ad consumptionem aceti, & utere. Aliud. Aluminis scissilis & thuris æquales partes cum melle misce ac collue. Medetur autem ex his gingiuis & humore prægnantibus, lac asinum calidum collutum, foliorum oliuæ decoctum, aspalathi decoctum. Platani folia in aceto aut uino decocta. Sicca autem adhiberi possunt, rubigo ferri, balaustia, & cytini. Aliud, siccum. Quod ad putredines oris gingiuasq; depastas ac cruentas efficacis est: ad tonsillas etiam, ac glandulas & columellam siccum ad mouetur: ad quassatos uero dentes, aceto dilutum detinetur in ore. Gallarum quæ omphacitides appellantur, aluminis scissilis, æquales partes accipe, ac ut ualde efficaci utere.

Siccum floridum, quod Græci antheron appellant.

Cyperii drach. vii. gingeris, crocomagmati, myrrhæ, aluminis scissilis, iridis, cuiusq; drach. ii, croci drach. i, sandarachæ drach. iii, permixtis utere.

Ad pu-

gingiuarum
fluor

Ad putredines oris. Olæ folia uſta, lactuæ permixta, & mediocriter tepcfacta, ne uidelicet frigus offendat, ore retinenda exhibui, & à dolore liberaui. Maximum etiam auxiliũ affert, ea quæ ex papaueris capitibus paratur antidotus ſoporifera, ſi tepida ore retineatur. Similiter & lac aſini, num aſidue collutum: & ſapa quoq; ore retenta. Optimũ etiam remedium eis exiſtit, paſtillus qui ex ſeminibus cõſtat ſoporifer, & cõſimiles, ſapa ſubacti, & affecto loco obducti. Oportet autem & caput madefacere ex roſæ æco cum modico aceto diluto: idemq; auribus inſtillare cum aceto. Aut terrenos uermes oleo decoctos in propinquã aurem inſtilla. Aut millepedas ſub aquario uafe ſtabulantes, quæ & aſelli à Græcis appellãtur, eodem modo. Similiter & araneos, & blattæ interanea oleo decocta in aurẽ infunde. Nutriantur autem ex piſana, halica, ouis, lactucis, & cucurbita, & quęcunq; tandem his poteſtate ſunt propinqua. A uino autem abſtineant. Ad com manducandum uero exhibe ſub dolentem maxime dentem, herbæ perdicij radicem, aut hyoſcyamum: præſertim in balineo, ita ut contineat in ore ſuccum ex eo donec inde egrediatur. Suffire etiam conuenit ægro hyoſcyami ſemen, aut canis mortui dẽtem. Inde enim ſtatim dolor ſedatur. Eodem modo etiam terrenos uermes ſuffito.

Ad corroſas & ab ulcere ſerpente infeſtatas gingiuas. Cap. xxiii

His qui corroſas gingiuas habent cum tumore atq; etiam dolore, atque etiam, quibus à ſerpente ulcere depaſcuntur, ſumme auxiliatur fomen tum hoc. Specillo auriculario lanam innecte, ac in feruens oleum intinge, eamq; donec exaquentur gingiuis adhibe, & quouſque undiquaq; appareant albæ. Ita enim ulcus ſerpens ſiſtitur, atq; ex ſana carne id quod corroſum eſt connutritur. Poſt hæc autem utere adfrictorijs ad gingiuas deſcriptis. Proprie autem conuenit galla tenuiſſime trita, acetabuli menſura, cum myrrha magnitudine fabæ, quibus tritis utere ſiccis. Præter opinionem autem ad corroſas, & quę ſerpente ulcere infeſtant gingiuas prodeſt id quod ex chalcitide & cadmiã conſtat ſiccum. Sint autem chalcitidis crudæ drachmæ duæ, uncia una. Cadmiã in aceto ad ſolem æſtium aliquot diebus ſufficienter conteratur: deinde adijciatur quoque Chalcitis & ſimiliter cum ea conteratur, aduſo ſæpe aceto: poſt uero ambobus exſiccatis, tritis & cribratis: utere ſiccis, ſed cum cautione, ne quid ex pharmaco hoc deglutiatur. Preclare facit etiam in ſerpente gingiuarum ulcere, id quod Sole uſtum appellatur ſiccum, conſtans ex calcis partibus duabus, auripigmenti una & dimidia. Verum conterere oportet & hoc ipſum in aqua, ſub exorientis caniculæ ardoribus, ita ut ter aqua diffundatur, & poſtea pharmacum deſiccetur. Cauendum etiam, ne ex hoc quicquam deglutiatur. Admirandam etiam opem corroſis gingiuis affert, id quod ex charta uſta conſtat ſiccum, ſiue per ſe ſolum, ſiue cum melle adhibeatur. Aliud, ad ulcera ſerpentia gingiuarum.

*Adfrictoria
gingiuarum*

Aluminis ſciſilis, florum roſarum, cuiuſq; drachmas duas, ſalis foſſilis drachmās

drachmas quatuor, croci drachmā unam: utere sicco, aut cum melle cocto.

Ad gingiuarum abscessus, ac ulcera oris profunda ac crustosa.

Aluminis scissilis, cyperi, cuiusq; drach. iiii, gingeris drach. octo, sandarachæ drachmas quatuor, iridis drachmas tres, croci drachmam unam.

Aliud. Cyperi drachmas tres, sandarachæ drachmas tres, gingeris, croci, aluminis scissilis, iridis, cuiusq; drachmas duas: utere sicco, & cum melle.

*Carnem
gignentia*

Denudatas autem gingiuas carne implet pharmacū hoc. Seminis rosarum non antiqui partes duas, calami odorati Indici partem unam cum cera liquida adhibe. Optime autem carnem gignit & hoc quod ex cruo constat, sic cum capitale. Relatum est aut in his quæ uulneribus adhibentur remedijs.

Ad parulidas, hoc est gingiuarum inflammationes. Cap. xxiiii

*Carnem
eminentem
deprimentia*

Parulis est inflammatio partis alicuius gingiuarū cum tumore, quæ ubi non dissoluitur, suppuratur. Quare in principio adiuuare oportet quo submitatur, per dissoluentes uidelicet collutiones, quales sunt succus puluinae, decoctum seminis lini, aqua mulsa calida, aut mulsum. Deinde siccis deprimenda est eminentia carnis. Conuenit autem eis hoc. Sulphuris uiui, piperis, aluminis scissilis, partes æquales. Deprimit autem parulidas alumen omne ustum, aut etiam fori, si trita adhibeantur. Quod si suppuretur, ferro uenæ incisio distracta & excisa linamento imposito disparato, aut cum linteoli rasura. Amant autem magis excisionem gingiuarū abscessus. Simpliciter enim incisī, in fistulam proficiunt. Post excisionem medicandum est ipsum hulus per collutiones: & cauum quidem eius, eo quod ex cruo constat sicco capitali impleto: ubi uero ad æqualitatem peruenerit, eo quod floridum appellatur utitor.

De epulide, id est excrecente gingiuarum carne. Cap. xxv

Epulis est excrecentia carnis ab inflammatione consequuta, iuxta interiorē dentem molarem, aliquando cum febre & uehementi dolore intermarum mandibularum, ut neq; os ægro aperire liceat, contingens. Primum itaq; inflammationem soluere oportet per collutiones cam submittentēs, qualis est aqua mulsa, succus ptisanæ, decoctū seminis lini. Proderit autem & totam maxillam cataplasmate ex semine lini & aqua mulsa integere. Vbi uero inflammatio soluta fuerit, & hiare iam potuit infirmus, medicari oportet epulidem sicco deprimente: maxime eo quod iam in parulide dictum est, atq; etiam eo quod ad serpentia gingiuarum ulcera descriptū est, ex chalcide & cadmia. Imponenda est etiam rasura linteolorū. Vbi autem senus caro consumeretur, sicutum quod carnem exedit apponatur: uelut est ærugo per se, aut cum æqualis ponderis galla, aut sicutum quod appellatur flauum: deinde rursus rasuram linrei impone. Quod si adhuc moram traxerit epulis forcipe arrepta, excindatur cum tenui scalpello, aut si maioris ensi culo paruo. Sequentibus uero diebus curetur hulus per collutionem aquæ mulsa, & per capitale sicutum, rasura linteoli adimposita. Postremū florido sicco

siccò tota cura compleatur. Deprimit autem epulidas, galla per se, chalcitis cruda usta, fori ustum, alumen omne ustum, balaustia, squama æris in aceto ad solem aliquot diebus exposita, contrita, & rursus exsiccata. Probe facit & hoc aluminis scissilis drachmas 11, gallarum drachmas 1111, salis torrefacti drachmam unam. Vtere sicco.

*Deprimens
epulidas*

De gingivarum fistulis.

Cap. xxvi

Gingivarum fistulas dissecare ac explanare conuenit, atque post incisio- nem curare huius eo modo quem paulo ante diximus. Vbi uero usq; ad radices propinqui dentis fistula ipsa extenderetur, conandũ est, ut quan- tum possibile sit, per fistularia collyria explanetur, & per siccum quod fla- uum appellatur, melle exceptum curetur, & cõsimili modo id quod constat ex eruo postea adhibeatur. Quod si cõfusio & perturbatio ægri comiteretur, tum ubi iam melius habere incipit, priuabis eum dente affecto. Hocq; mo- do eruetur & fistula, & confidet gingiua: atque omnino facilis erit, ea quæ deinceps requiritur cura.

Cura dentium à calido morbo doloroso affectorum, ex
Adamanto sophista.

Cap. xxvii

Ginguiis dolore affectis propter inflammationẽ aut corrosionem, con- uenientia ad hanc rem remedia locis affectis nudis adhibenda sunt, quæ sanè aut omnis mordacitatis expertia sint, aut mediocriter acerba, & terrei tẽperamenti. Vbi uero dentes solum patiuntur, aut cum eis simul con- creti nerui & pelliculæ: tum ipsis curatiuis pharmacis, ea quæ tenuium par- tium in sua substantia existunt adijcimus, quo uis ipsorum in profundum perferatur. Et si quidem frigidus sit morbus, calida tenuium partium adne- ctimus. Si uero calidus, ea quæ refrigerare possunt, & simul tenuiũ partium existunt, commiscemus. Calida itaq; existente affectione, & uigente ætate, & temperamento calido, & regione, & aeris statu cõsimili, ad collutionem oris præparabimus, in aceto albo decoctam radicem haliacabi, semperui- um minus, portulacam, perdicium, & glycyrrhizam. Quod si intolerabilis existat caloris sensus, utendum est hyoscyami folijs, aut semine papaueris hortenlis, & semine lactucæ, decoctis in aceto albo. Si uero unà cum denti- bus gingiue ipsæ doluerint & inflammate fuerint, acetum ut acutum & ho- stile gladium deuicta: suo enim acore gingiuas corrodic maxime itaq; con- solatorum eis existit, lac asininum. Ego autem aliquando cuidam huius- modi temperamenti existenti, & in hanc affectionem delapso, oleum rosa- ceum & myrteum in ore detinendum exhibui, & sanè uri sibi uidebatur hic homo, tanquam à face accenderetur. Niuem itaq; cum melle rosaceo com- mitte, & informa pastillos cum uino, quos in umbra uento exposita desic- ca: deinde contusos & in farinam reductos in pyxidem reconde, bene coo- perta, ne quid inde trãspiret. Vtere autem à balineo aspersis & leniter con- fricatis locis, sinasq; ita imbibi. Post uero frigida os collue, & miraberis odo- rem

*Acetũ quatuor
do noxiũ*

rem inde prodeuntem. Eundem usum probe præstat myrrha cum alumine & uino ac crocomagmate atq; scobe cupressiitem alumen cum uino.

Cura corū quibus ex frigiditate dentes dolore afficiuntur. Cap. xxviii
Frigidus dētium morbus cognoscitur ex figura tum capitis tum reliqui corporis, & ex qua præcessit diætā, itemq; exercitio, ac reliquis quæ ad hunc ordinem referuntur. Medebēris autem diætā omni ad caliditatem ordinata. Sint itaq; cibi, ptisana cum pulegio decocta, similiter & halica, olea, petroselinum, & similia. In potu exhibendum est uinum, modicum tamen, & mulsū, atq; etiam quod appellant Conditum. Sero uero ubi dormire uoluerit, confectiōem ex calamintha cito penetrantem, aut potu, aut linctu deuorandam exhibe. Ad oris collutionem, in aceto decoquito origanum, calamintham, hyssopum, pulegium, dictamnū, satyria, tithymalli radicem, chamæleonis nigri radicem, uerbenacæ rectæ radicem, eryngij radicem, uerbasci radicem, ueratri nigri & capparis radicem. Vnumquodque enim eorum aceto decoctum ac ore collutum dolores dentium sedat, qui à frigiditate sunt oborti. Ad eos uero quorum sensus citius afficitur, hæc cum posca decoquantur. Porro ex uino si decoquas prædicta ac colluas ter aut quater in mense, præmuniunt ac conseruant eos qui frigidiore temperatura sunt, ne dolore dentium adficiantur. Obseruatum est & pinguiū lignorum, ueluti cedrarum ac picearum, decoctum ipsis prodesse: contunduntur autem hæc ac cum caricis decoquuntur adfuso uino: collutum enim hoc ipsum dentium dolores mitigat. At uero & ipsas cedas contusas in oleo decoquere licet, oleumq; calidum in ore continere. Quinetiam ipsas cedas conuassatas solas ore detinere commodū existit, circa affectum maxime dentem. Succus etiam balsami in ore retentus, non paruam de se præbet comoditatem. Itemq; castoreū cum nardo auribus infusum. Quod si omnes ex æquo dolcant dentes, in ingressu balnei cedriam in os coniectam usquequo egrediantur contineat, & dolore liber erit. Commodum etiam erit manducandas & loco dolenti admouendas exhibere, radicem pyretri, radicem tithymalli, & ricini. Similiter autem & theriacen, aut Esdræ antidotum, sapa dilutum ore detinendū exhibe. Præclare facit & Philonis antidotus illita, & quæ apellatur Sorira. Suffito autem canis mortui dentem, ita ut fumus inde progressus ore excipiat. Post uero ipsum dentem ustum, & modico aceto tritum, calidum ore retinendum præbe, & dolore liber erit. Poteris & alyonium suffire. Capitis uero cura imprimis habenda est. Ad id ergo huiusmodi inperione utaris: helenij quadrāte miridis sextantem, aristolochiæ longæ unciam unam. Quod si fortiter infestauerint dolores, somētum adhibe ex milio, aut eruo, aut tritico torrefacto cū baccis lauri, modico adiecto sale.

Ut ne putrescant molares immobilesq; conseruentur.

Succi racemorum uitis albæ libram unam & semissem, corticis radicis mori sexuncem, decoque ad dimidium, calidumq; ore retinendū per septem continuos

Dentes ne
doleant

tinuos dies exhibe. Qui enim hoc vitur nunquam dentis dolore afficietur.
Collutio, proprie ad dentes ualens.

Corticis radicis hyoscyami drach. v. iiii, pyretri drach. iiii, spicæ nardi drachmam unam, mellis dodrantem, aceti libras tres: decoque cum aceto in fūtili nouo, & percola: deinde adiecto melle utere.

Cura dentium ab humiditate dolore affectorum
& laxatorum.

Cap. xxxix

Asumamus autem mox alium ægrotum, qui uniuersam corporis multuram: imprimis uero capitis, habeat humidiorē, uiuatq; delicatius, & domum habeat in humiliore loco sitam: instet autē tempestas humida, & hora uerna quum afficitur. Quis nam sanam mentem habens, his uisus, non dixerit à superabundante humore in hoc morbum esse productum? Etenim quū nerui qui se ad dentes inferunt, permadescunt, laxioresq; fiunt unā cum circumadherentibus corporibus, necessariò dentes mobiles fiunt: uerum multis hoc citra doloris sensum accidit. Sæpe enim iam diximus, humiditatem per se non solere dolores inferre. Et dictum quoq; antea est, ob ætatem senilem quibusdam dentes laxari, & quod pharmacis adstringentibus gingiuas, ac densantibus easdem, senes queant iuuari. Porro percussis etiā dentes laxantur, his maximopere prodest alumen scissile, cum myrrhia troglodytica tritū, ac inspersum ad dolentē dentem, atq; id ubertim & continue facere oportet. Nam ipsum confirmat. Eos uero quibus ab humiditate uacillant, curare conuenit per dietam ad siccitatem ordinatam, & cum diuturniore abstinentia ciborum. Cibi itaq; eis conuenientes sunt forbiles, haliæ, panis ex iure madidus, aut oryza, aut farina cum aqua mulsā. Neq; male conuenit eis milium & lenticulæ: pisces muria conditi: uolucres montanæ & sicciores. Ex oleribus, brassa, & similia. In potu aqua exhibenda est, sed non multa. Quod si cōcoctioni non officeret, aqua mulsā danda esset: itaq; si hanc ferre nequeunt, ad aquam modicum uini addatur. Tempore autem adflictionis, fouere cōuenit locum cum milio & sale. Collutiones exhibendæ adstringentes, & desiccantes, aut salæ, nisi gingiuæ simul sint affectæ. Quare gallas, quas omphacitidas appellant, ex acri aceto decoctas, & alumen aceto permixtum exhibebimus: itemq; spinæ Ægyptiæ semē, mali corium, myrtum, cytinus, balaustia, oliuæ folia, platani folia, cupressi pilulas, rumi eis syluestris radicem, lappæ radicem, folia rubi, & quæcunq; alia acerbam in se qualitatem cōplectuntur: ita ut his cum aceto puro, aut etiā aqua mixto, aut uino, decoctis, os colluere præcipiamus, & in eo detinere adhibitum liquorem, sensui uidelicet ægri maxime gratum & conuenientem, ludicata etiam & perpensa eorum quæ offerimus potentia. Nimirum plus ne an minus exhibere oporteat, iuxta exuperantis humoris multitudinē. Ego autem optimam ad collutionem oris expertus sum, oliuarum muria conditarum aquam, in quam uidelicet coniunguntur. Etenim omnem oris humiditatē mul-

*Humidites do-
lorē nō inferit*

ria ipsa extergit corporum uero hiatum & laxitatem, oliuarum spissamentum coercens corroborat & firmat. Aliquando etiam oliuarum albarum confusarum & expressarum accepimus succum, eoq; cum rutæ succo & melle permixto, confricauimus dentes: postea uero inspersimus Indicam nardum cum pari pondere aluminis rotundi, & salis duplo adiecto. Optime quoque faciunt ad hanc rem illitiones acerbæ: uelut est confectio de moris ori ualde conducent, maxime si alumen scissile habeat adiectum, & ea quæ ex nucum succo apparatus eodem modo. Aut alumen scissile, & misy pari pondere cetera excepta, in cerati liquidi densitatem redige, & cum eis dentes illine, ac proutiam desuere permittit: deinde lacte asinino calido mordacitatem eluant, aut uino dulci. Aut alumen, & myrrham troglodyticen inspergito, aut cum aceto, aut melle illinito. Siccat autem inspersiones semper eis sunt conuenientes. Ultra hoc enim quod dentes commotos firmant, etiam ex humiditate hiantes gingiuas committunt. Itaq; spodium cyprium lotum, & exsiccatum inspergens, os collui præcipe ex aqua myrti aut rubi, aut alicuius consimilis, decocti. Postea rursus spodio insperfo, quiescere iube. Aut etiam rubiginem ferri siccam tritam admoue, aut fori ustum.

Aliud, ad laxatos dentes & gingiuas humectas.

Aluminis scissilis in fictili usti drach. vii, zingiberis drach. iiii, gallarum, florum rosarum, iridis, singulorum drach. ii, croci drach. i, utere. Aliud. Cornu cerui usti drach. viii, rhois culinarij drach. iiii, omphacij sicci drachmas ii, balaustiorum drach. iiii, corticis pinus, zingiberis, croci, singulorum drach. i. Aliud. Alumen rotundum cum duplo salis pondere tritum, dentibus ob humiditatem labantibus inspergito. Aliud. Myrrhæ, aluminis scissilis, amyli, pompholygis, æquales portiones, siccat, tritæ, insperfat, labantes dentes firmant.

Aliud remedium, quod laxatis ac dolentibus dentibus præsentem fert opem. Aluminis scissilis sextantem, radicis struthij siccat tritæ unciam unam, contritis simul affectum dentem adsperge, teneatq; donec salua os impleatur: & tunc sanè ipsam expuat, & effundat, moxq; dolore liberabitur.

Aliud, quod & dentes dealbat.

Aluminis scissilis trientem, mastiches, unc. i, thuris drach. iiii, phylli drach. iiii.

Aliud, quod & firmat & corroborat dentes.

Æruginis, aluminis scissilis, aut magis quod appellatur phorimon, minij, singulorum æquales partes: utere sicco, aut cum passo. Aliud. Florum rosarum, balaustiorum, myrrhæ, mastiches, cuiusq; unc. i, chalcitidis assæ, thuris masculi, corticis pinus, cuiusq; drach. iiii, salis ammoniaci unc. i. Vtere sicco.

Aliud, quod & ad exulcerationes oris commodum est usurpare.

Rubiginem ferri, aut ipsum ferrum multa rubigine oppletum, igni candescito, & in aceto puro, aut cum aqua diluto, aut uino, in his quibus sensus facile læditur, extinguito, ac liquorem ipsum in quo extinctio facta est ore continendum

tinendum exhibeto. Dentes enim firmat, & ulcera curat, præclare etiam facit siccum, quod floridum appellatur.

Aliud, Galeni. Quo ego utor, inquit Galenus, polytrichi palearum ustarum sextarium unum: continet autem sextarius harum unc. xxviii, aluminis scissilis quadrantem, aluminis rotundi quadrantem, spicæ nardi sextantem, phylli unc. i, piperis unc. i, pyrethri drach. v, confusa & cribrata, gingiuis usq; ad dērium radices adhibeto. Vtile etiam existit his, thus cum pipere manducatum: itemq; rubus comman ducata ac ricini radix. Prodest etiam Esdræ antidotus sapa diluta ac ore retenta, eodemq; modo theriace Andromachi. Quinetiam in uesperam potu accepta theriace magnifice auxiliatur. Scribit Archigenes, ut uerum & naturali modo ad labantes dentes accommodatum. Dentem, inquit, canis mortui in nomine eius, qui ægre habet acceptum, super prunas pone, uaporemq; inde prodeuntem æger aperto ore admittat, & firmabuntur ei dentes. Similiter autem & exustum canis dentem cum aceto calido tritum, ore retinendum exhibe. In his uero qui facile ab aceti sensu offenduntur præbe cum uino.

Supplisium

De dentibus lima atterendis.

Cap. xxx

Solent ferè dentes moti ac labantes reliquis esse prominētiore, maxime squā ex uerbere hanc affectionē incurrerint. Quare uisum est mihi eos lima atterendos esse, inquantum scilicet præ alijs prominent, ne in loquēdo uel etiam manducādo, eos qui obijciuntur, offendant. Adtestatur autem & experimentum ipsum, quantum sanè ego eius rei periculum feci. Ferream namq; limulam ad hanc rem apparui, quo citius ac efficacius res procederet, si modo aliqua spes esset, moti dentis firmandi. Sit autem caput ipsius limæ obtusum, forma nucis, & quàm leuissimum. Itaq; aliquando quidem inæquales quædam dentium eminētiæ apparent, in quibus partes tantum aliquas lima atterere opus est. Aliquando aut æquali planicie extremitates prominent, quare æquali etiā ac plana per limam attritione indigent. Oportet autem molle quoddā linteolum gingiuis ipsis usq; ad dentium radicem adhibere. Deinde leniter sinistra manus digitis apprehendere, cauteq; ac citra offensionē limam adfricare: ne sub manu ipsa doloris impatientia affectus æger concutiat. Quod si omnino dolorem percipiat æger dum lima adhibetur, aut ob id quod uehementius digitis dentes apprehendantur, quiescere statim conuenit, interimq; collutiones dolorem mitigantes offerre: dein de rursus, ut dictū est, rem aggredi, & paulatim lima deterere. Atq; hoc non prima saltem die bis aut ter conari, uerum & secunda repetere: ita ut ægro imperes, ut neq; sermone nimium utatur, neq; ullum aliquem duriorum cibum adsumat. Utatur autem cibus forbilibus, aut pane madefacto. Quod si citra laxitatem, quibusdam dentes præter morem augeant, eos similiter lima atterere oportet, ac collutiones eos cohibentes offerre.

f. 2 Cura

Cura dentium à siccitate dolore affectorū, ex Adamanto. Cap. xxxr

Quartus iam ex ordine subiiciendus est ægrotus, qui uidelicet à sicca intemperie afficitur. Eam autem efficiunt, autumnalis tempestatis constitutio imprimis, & uita erummosa, tenui accedente diæta. Præterea regio sicca, & ambientis nobis aeris status cōsimilis. Ad hæc accedit id quod nunc ad est corporis ipsius temperamētum siccum, & maxime si caput eiusmodi sicca intemperie est affectum. Sitis autem insidet semper, nisi adsit frigiditas unā cum siccitate. Minimum etiam sputi eijciunt sic adfecti. Ex ob siccitatem dolor intolerabilis ferè eos concomitatur: austerorum & acerborū usus maxime cōtrarius eis existit. Quare confectio ex moris sæpe his uehementem dolorem induxit. Itaq; collutiones minimum adstringentes, & mediocriter humectantes apparare oportet: aquam calidam per se, aut fursurum decoctum quoddam, aut radices dulcis, aut pīsanæ succum, aut amyllum cum sapā calida dilutum: lac per se, maxime asininum, maluæ decoctū, & alia quæ cunq; his sunt similia. Cibus autem his conueniens est succus pīsanæ, mīcæ madefactæ, cucurbitæ, maluæ, oua forbilia, & quæcunq; his profunt qui humectatione indigent. Atq; hæcenus quidem simplicium intemperierum curam ostendimus. Manifesta uero & hinc fit ea, quam compositæ requirunt, Nimirum ex dictorum mixtura cognobiles, & ex temperatura ostensorum auxiliorum curam accipientes. Verum propter eos qui se nuper ad hanc disciplinam contulerunt & inexpertos adhuc, age paucis unius tantum compositæ intemperiei mentionem faciamus, quæ ut manifestū exemplum ad reliquas cognoscendas statuetur.

*Inexpertorū
ratio habēda*

Cura dentium ob caliditatem & humiditatem dolore affectorum. Cap. xxxii

Sit sanè regio calida & humida, tempus autem anni uernū, & aeris quoq; status calidus & humidus, qualis est austrinus. Contingat itaque æger, qui caput habeat, quod facile eiusmodi humiditate impleatur, cuiusq; corpora plurima sit & subtrusa, & totius corporis temperamētum calidum & humectum, & cōsimili quoq; utatur diæta. Quis autem qui saltem probatus medicus haberi uelit, in hoc calidum & humidum esse morbum non imaginetur. Medebis igitur ita affecto bifariam. Si enim excessus naturæ contigerit iuxta qualitates tantum, scopus curationis dirigendus est ad alterationem solam. Si uero unā cum qualitatum excessu, & humorū multitudine ad fuerit, palam est primum oportere corpus euacuare, deinde ad temperiem reducere: cuius rei in omni corporis intemperie memorem esse conduci. Eum uero qui à calido & humido morbo affectus est, de quo nunc dicere instituius, per uenæ incisionem euacuare conueniens est, utpote à sanguinis multitudine exagitatum. Calidus enim & humidus sanguis ipse existit. Incidere autem oportet uenam cubiti superiorē, quæ Grecis humeralis appellatur: quæ si non contingat, eam quæ media existit. Quod si quid prohibeat

*Intemperiei
omnis duplex
est cura*

beat uenæ incisionem facere, modico & tenui uictu superfluum & non necessarium detrahit humorem. Atq; hoc modo etiam circa reliquas compositiones intemperies operaberis: ita ut eas quæ iuxta qualitatem tantum constiterint, alteres, & contrariis qualitatibus permutes. Eas uero quæ cum substantia quadam consistunt, humore per conuenientes purgationes detracto euacues: nisi quid & in his purgationem fieri præpediat. Reliqua autem quæ adferre oportet auxilia, ueluti sunt collutiones, & uictus constitutio, facile ex prædictis inuenire licet. Qui enim formam tractandi simplices morbos cognouerit, in promptu habebit & circa mixtos conuenientia remedia inuenire. Cognoscitur autem affligens humor, quoniam ex reliquis circa corpus signis, tum ex consequenti dolore. Flauæ namque bili dolor pungitius comes existit. Pituitam uero sequitur unâ cum frigidityte distensio locorum: & fece quidem sanguinis siue atra bile affligente, sensus adest, uelut corpuscula quædam in profundo confringantur: ubi uero æqualiter omnes auferunt, multitudine eorum in corpore coaceruata, grauitas concomitatur. Verum enim uero & sapor ipse influentis humoris, egro specimen sui ostendit. Aut enim amaritudinem, aut falsedinem; aut acedinem sensu percipiat.

*Victus tenuis
loco uenæ
incise*

*Noxij humoris
cognitio*

*Sapore humores
cognosci*

Curatio eroforum dentium, ex Galeno.

Cap. XXXIII

Erosiones & cauernæ dentium ex influxu acrimiarum & erodentis maxime naturæ humorum generantur: quemadmodum etiam ulcera in cute, citra aliquam externam causam. Manifestum igitur hinc erit, quo modo sanandi sint erosi dentes: nimirum per exsiccationem influentis uitioli humoris, qui si paucus fuerit, localia remedia ex desiccantibus pharmacis confecta suffecerint: si uero multus fuerit influens humor, totius capitis respectum habere conuenit: contingit autem aliquando caput affici, ob reliquum corpus affectum, quare in his uniuersi corporis curam nos gerere oportet. Archigenes itaque ad hos hæc remedia descripsit: Sori resina terebinthina exceptum depti circumlinito, atque in cauernam indito. Præclare facit & hoc: Sulphur uiuum lycio exceptum cauernæ impone, & prius depurgatum dentem per orbem ex eo tege: aut galli tritam lycio aut resina terebinthina exceptam ad cauam intrude, similiterque depurgato denti appone. In maximis uero dentium doloribus summe prodest hoc: Senectam anguium uistam ac tritam cum oleo in mellis crassitudinem redige, eodemque modo, ut dictum est, utere. Aut senectam ipsam non uistam dentibus adfrica. Inde enim excidet: aut melanthium torrefactum cum oleo similiter adhibeto: aut melanthium torrefactum & acri aceto adfuso tritum cauo denti indito ac circumlinito. Sistetur enim erosio, neque quicquam addet ultra. Aliud. Melanthij partem unam, allij dimidiam, & salis parum quiddam, simul contrita circumponito. A dolore enim liberat. Proderit autem & ad erosiones dentium uti ea quæ supra ad motos dentes descripta est collutio, ex succo uidelicet bryoniæ & cortice mori. Aliud. Veratrum nigrum tritum & melle cocto exce-

*Caput ex reliquo corpore
affici*

ptum in cauernam impone, & præmundatum similiter ex eo integro dentem. Aliud. Thuris partem unam, atramenti sutorij partes duas, contere cum passo, donec cerati crassitudo fiat: utere ut dictum est, & cito sedabis dolorem. Aliud. Galbani partes duas, thuris partem unam, contere cum passo ad cerati crassitudinem: utere ut dixi, & eo ipso die sedabitur dolor. Aliud. Alumen scissile in caua intrude, & à dolore liberabit.

Fel urfi Aliud. Fel urfi indito, & ab erosione liberabis. Aliud. Rhododaphnes uirgulum exustum & tritum, insperge cauernis, & medeberis.

Andromachi cōpositio, ad dētes molares, quæ eadem hora dolores sedat. Piperis, pyretri, succi tithymalli, galbani, singulorum æquales partes galbano exceptas, cauernis impone. Aliud Asclepiadæ. Eo, inquit, ulus adseruauit caua dentium citra dolorem. gingiber in aceto mulso decoctum, & probe tritum, in caua imposito, similiterq; extrinsecus ad dentem admoueto. Præclare etiam facit ex duobus piperis generibus composita antidotus, cuius indita: atq; etiam oleo amygdalino aut nardino, aut rosaceo diluta, & in uicinam affecto denti auriculam instillata. Aliud. Ego autem ad caua dentium cum dolore affecta, Elsdra Antidoto uror, quam sapa dilutam, & calefactam ore retinendam exhibeo. Mirum enim quàm dolores ea mitiget. uerum si ad manum non adsit, theriaca Andromachi eodem uror modo. Fomentum etiam affecto denti adhibere conuenit huiusmodi. Origani sicci ramulos seruente oleo imbutos ægro denti apprime. Aut ricini uirgulto similiter utere: aut staphida syluestrem scalpello probe adaptatâ, itemq; pyretrum adhibe similiter: aut ceram super affectum dentem pone, eamq; cum specilli extremo ignito apprime. Id enim continue facere non ab re est. Est autem & hæc quædam fomenti species: primum optime præmundato dente, hyoscyami semen suffito. exurgentemq; hinc fumum æger admittat infundibulo adhibito, ad affectû dentis: mirû in modû etiam erosiones dentium mitigat, canis mortui dens, quemadmodû & ante dixi, eodem modo suffitus, & exustus in aceto tritus oreq; retentus, probe etiam auxiliatur uermes terreni suffiti. oleum quoq; in quo uermes terreni decocti sunt, in uicinam affecto denti aurem, tepidum infusum dolorē uehemēter lenit. Idem præstat blattæ domesticæ capite detracto adeps, cû rosaceo liquefactus ac auri instillatus. Eodem modo & hederæ albæ acinos quinque cum rosaceo tritos & in punico cortice calfactos in aurē assidue instilla. Auxiliatur etiam radicis hastulæ regię succus, itemq; nasturtij similiter instillatus. Prodest quoq; in uicinâ affecto denti natem infundere anagallidis ceruleæ succum, aut radicis betæ succum, aut atramentum sutorium cum lacte.

Apollonij Apollonij. Cumini quantum tribus digitis apprehendere potes, myrrhæ, magnitudine fabæ, interioris cucumeris syluestris, duplum, cum lacte muliebri in collyria redige, eaq; in utrâq; narē immitte: atq; ubi tam diu hæserint, donec quinque stadia quis cursu conficere possit, extrahere iube, for
titerq;

titerq; ipsum pharmacū emungere. Idem etiam ad aurium dolores eodem modo sumptum prodest.

Ut dens citra dolorem & absq; ferro extrahatur. Cap. xxxiiii

Quod si dentem tollere animus sit citra dolorem, hocce pharmaco auferendus erit uehementer ad hanc rem congruente. pyretum acerrimo aceto in dies quadraginta cōditum, deinde tritum, in usum adserua: qui ubi postulauerit, reliquos dentes cera prēmunitos custodito: ipsum uero qui dolet circumcirca purgatum hoc pharmaco integito, & post horæ interstitium digitis extrahito, aut scalpello exigit. Aliud. Sori acerrimo aceto, ad dies decem, in sole æstiuo contritum ac exsiccatum, prēmundato denti imponito, & excidet. Aliud. Sandarachā eodē modo apparatus, imponito. Aliud. Sori & tithymalli succum galbano excepta depurgato prius denti apponito. Aut cucumeris syluestris radicem ut pyretū apparatus, eodem adhibe modo. Aliud. Grana midia trita ac galbano excepta, circumponito, & excidet. Aliud. Prædare facit lappæ herbæ radix feruenti cinere calfacta, & denti assidue apposita: pauca enim mora dentes tollit. Aliud. Cucurbitæ syluestris radicē cauo impone, & dentem eruet. Aut ipsam cucurbitam tusam & cribratam per aliquot dies in aceto macerato, donec ad mellis spissitudinē redigatur: deinde in eo ipso pharmaco scalpro imbuto frequenter dentem circumradito, atq; os claudere parumper iubeto: deinde dentem digitis apprehensum trahe, & sequetur.

Aliud. Vermes terrenos in testa exustos, in cineremq; redactos contere, & circumrafo prius denti ubertim adsperge, & per diem ac noctem excidet sua sponte. Itaq; eo confidenter utere: ut mysterium enim celebratū est iam sæpe. Poteris autem & cura scalpelli rasionem inspergere, idemq; opus parabit. Aliud. Corticem radiceis mori tenciosem tritum, ad dentem quem erutum cupis, solum impone, & excidet. Aliud. Sori, gallam, staphida syluestrem, alumen scissum, sulphur uiuum, piper longum, in puluerem redige, & adiecta cedria subige: deinde ceram modicā liquefactam adfunde, simulq; committe. Vbi uero uti uelis ex hoc, quantum opus fuerit emollito, ac depurgato prius denti circumponito. Aliud. Erucam & brassica natam frequentius ad ipsum dentem adhibe, cadetq; sua sponte. Enit etiam dentem syluestris oleæ lachryma cauo eius indita. Itemq; rhus qua coria inficiuntur, & lachryma & succus syluestris fici, itemq; tithymalli. Cauernam autem superne galbano aut cera obturato.

Smegmata uaria ad denigratos, liuentesq; ac rarefactos dentes.

Cap. xxxv

Lucent aliquando dentes per uniuersam ipsorum substantiam, non dissimile quiddam inflammationi patientes, ob influxum uidelicet uitiosorum humorum. Quare cōsimili cum his qui erosionem passi sunt, indigent curatione: nimirum per desiccantia pharmaca: suntq; smegmata eis conue-

nientia. Apollonius itaque ad denigratos dentes hæc præscribit. Sal fof-
file melle subactum in fictili uase torreto, ac tritum modica myrrha misce-
to, & coq̃ dentes confricato. Aliud. Pulegij ac salis æquales partes mel-
le subige, ac acero acerrimo adfuso exure.

Aliud, quod gingiuas adstringit. Farinam aceto acerrimo suba-
ctam in olla exure, ac contere, cumq̃ ea dentes confrica. Hoc enim & gingi-
uas ipsas coerctet. Aliud. Communiter autem ad omnes, cuiusmodi
dentificijs utimur: radice aristolochiæ exusta, aut osse ceruino usto & tri-
to, utere: nam & dentium doloribus medetur. Aliud. Cornu cerui
ure, modicac̃ mastiche admixta utere. Aliud. Talos ouillos exure,
ac contritis utere. Ad eadem pollent etiam buccina sale expleta & usta.
pumex assatus & uino extinctus, sepiæ testa usta, conchæ ustæ, cochlea ter-
restis usta cum melle: his autem singulis odoris commendandi gratia pa-
rum iridis illyricæ miscetur, aut floris iunci odorati, aut calami Indici, aut spi-
cæ nardi. Optime autem facit, inquit Archigenes, tum ad dentes à dolore
præseruandos, tum ad gingiuarū erosionem, atq̃ etiam decorem dentium,
pharmacum hoc. Lanas succidas linteolo illigatas ure, & salis torrefacti ter-
tia earum parte admixta contere, & pro dentificio utere. Aliud.
Mel & salem in cerati formam contrita, linteoloq̃ ligata exure, deinde pa-
rum iridis illyricæ admisce, & dentes ex eo confrica. Aliud dentificium.

Sulphur uiuum tritum dentibus adfricato. Smegma Orbisij.
Salis ammoniaci, cyperorum, iridis, singulorum æquales partes aliquandiu
adfricato, postea uero gingiuas ex uino odorato colluito.

Aliud smegma optimum. Pumicis trientem, testarum sepiæ, quadran-
tem, mastiches, aluminis scissi, phyllorum, cuiusq̃ unciam unam. Aliud.

Pumicis usti quadrantem, testarum sepiæ quadrantem, cornu cerui usti
sextantem, salis assati sextantem, spicæ nardi trientem, cyperorum unciam
unam, costi scrupulos 1111. Smegma pulchrum. Marmoris drach.
1111, phyllorum unc. 1, amomi unc. 1, cornu cerui usti sextantem, balaustrorū
unc. 1, iridis sesquunciam, mastiches drach. 1111, myrrhæ drach. 1, costi dra-
chmas 111. Talus bouis. Bouis etiam talus ustus optime dentes extergit, motos firmat,
affectos à dolore liberat.

Aliud dentificium, quod oris odorem commendat, den-
tes dealbat, & ab erosionē ac labefactione custodit.

Nitri, testarum sepiæ, myrrhæ troglodyticæ, æquales partes committe, ac
utere. Aliud optimum. Aluminis scissi sesquunciam, mastiches un-
ciam unam, iridis unciam unam, rosarum calyces siccos unciam unam, con-
tritis utere, & aqua calida inde os collue.

Aliud dentificium. Buccinorum ustorum, salis torrefacti, testarum
sepiæ ustarum, scobis marmoris proconesi, singulorum unciam unam, co-
sti scrupulos octo, contusis utere.

Aliud

Aliud, Timocratis, quod ad gingiuas humore prægnantes & cruentas: ad putredines, parulidas, hoc est gingiuarum inflammaciones, motos dentes, dolentes, præ omnia item oris vitia prodest.

Accipe perdicij herbe foliorum teneriorum modium Italicum, salis albi & tenuis sextarium unum, mellis sextarium unum, contunde simul ac in massam molliorem redige, quam in ollam coniectam luto obtura: ita ut circa os operculi foramen relinquant, per quod cum uirga agitur. tam diu autem super prunas positam torreto, quousque fumus inde procedens purus uideatur, tum sane ab igne ablatam frige fieri sinito: atque piperis longi drach. iiii. accipito, piperis albi drach. v. piperis nigri drach. v. i. pyretri drach. v. i. aluminis scissilis usti & cum uino austero extincti drach. ii. pumicis usti, zingiberis, hyssopi, pulegij, seminis apij, singulorum drach. ii. mentæ sicce drach. iiii. iridis drach. iiii. hæc omnia in sole prius exsiccata, contundito ac cribra, to, iisque quæ in olla usta sunt admisceto, ac uitior. In aliquibus uero, utpote in frigidis dentium affectionibus, hæc magis conueniunt, siue ex potu frigida, aut pomorum frigidorum comestione sint obortæ. Conueniunt etiam his qui à frigido humore afficiuntur, ubi prius per collutiones ac manducationes pituita sufficienter fuerit detracta.

De ancyloglosis & qui uix loqui possunt.

Cap. xxxvi

Ancyloglosi quidam fiunt ex natiuitate, quidam uero ex aliqua affectione. Ex natiuitate fiunt, quum membranæ inferiores quibus lingua innitur, duriores & mutilæ à natura sunt productæ. Ex affectione autem ancyloglosis & incuruatio linguae contingit, præcedente ulcere, & cicatrice dura sub lingua relicta. Qui hoc modo affecti sunt difficulter loquuntur, quare etiam Mogilali à Grecis sunt appellati. Qui uero ex natura ancyloglosi existunt, principio quidem tarde in sermonem prorumpunt, ubi uero loqui cœperint, citra obstaculum & satis festinanter loquuntur. Impediuntur tamen in prolatione nominum aut uerborum, quorum alias difficilis pronuntiatio existit, ueluti in quibus R, aut L, aut K literæ, frequenter occurrunt: hos sane adhibita manu per solam chirurgiâ curare oportet. Ad eam itaque perficiendam ægrum desidere oportet, cuiusque linguam sursum ad palatum attollet: & si quidem membranæ ipsæ curuitatis causa existant, incuruo uncino eas apprehensas & extensas excindere, animaduersione habita ne simul subiacentes uenas dissecemus. Si uero cicatrix curuitatis causa fuerit, similiter uncino apprehensa extendatur, & quicquid durum adest, & quod cum naturali carne non consentit excindatur. Ab opere autem patrato aqua frigida aut posca os colluant: postea inspergatur manna thuris, imponanturque linamenta conuulsa: sequentibus uero diebus curetur ulcus collutione aque mulse, aut ilitione unguenti Aegyptij, linamentis conuulsis simul impositis, ut per eorum interstitium cicatrix diducta, coalescat, neque rursus eadem cicatrix relinquantur.

Ancyloglosis
lingue
Mogilali

-Adri-

Ad ranunculum sub lingua.

Cap. xxxvii

AD ranunculū sub lingua: est autem tumor earum quæ sub lingua sunt partium, præcipue uenarum: utendum sanè hisdem remedijs quæ ad aphthas oris ulcera describimus, maxime tamen his quæ sunt ex eis fortiora. Proprie aut̃ eis profunt etiā hæc: æruginis rasa, chalcitidis, gallæ, æquales partes insperge. Cum passo potes etiam pro collutione usurpare. Aliud.

Farinam erui cum melle, præfricatis locis, illine. Aut etiam gallam tritam cum melle, aut rosarum semen eodem modo. In corporibus autem molliori sensu præditis, rhoem rubrum cum melle: aut rhois drach. v. iii, florum rosarum drach. i. iii, croci drach. ii, costi drach. ii, misyos, æruginis, æquales partes, commisce, & cum his locos sub lingua confrica. Decoctum uero fortiorū oleæ colluant assidue. Aliud. Nuces iuglandes ueteres integras, unā cum cortice exultas contere, deinde piperis grana x. ii adijce, thuris grana mediocria i. iii. hæc cum melle sufficienti mixta illinito, & miraberis.

Aliud. In inueteratis uero & perfectæ ætatis, eas quæ sub lingua sunt uenas dissecto. Extrinsecus uero mento adhibendum ex ouis pharmacum. Magis autem conuenit id quod Græci uocant Sphætion. Aliud.

Artemisiā maxime uiridem cum sale tritā ad locos sub lingua adfricato.

Ad linguam inflamatam, desquamatam, ac tumentem.

Cap. xxxviii

Glaucium in cote cum aqua dilue, coq; locos illine, & eodem die sedabitur. Aliud, ualens etiam ad linguæ exulcerationem.

Lingue
inflata

Rhois antiqui folia manducent & expuant. Vbi uero lingua inflectur, dolor coq; afficiantur eius obliqua, similiter & mandibula, ita ut loquela præpediatur, folia oleæ tenera trita, & oleo persusa, illinito, egregie enim auxiliantur. aut origanum passo decoctum colluendum exhibeto: aut pruni folijs cum melle tritis utere. Ad linguam uero, cui superficies instat squamarum aut corticis decedit, optime facit, amurca æreo uase, donec cogatur, decocta, & illita.

Ad linguam putrescentem, & ferè demortuam.

Succum foliorum uitis albæ cum misy permixtum illinito: depurgat enim, & carne replet. Quidam etiam hic mel adijciunt. Ut uero ad cicatricem perducatur, radicem uitis albæ, contritam & cribratam insperge. Melius autem erit eam melle permiscere, ne dissipetur.

Ad linguæ abscessus.

Quod si abscessus in lingua fiat, surfures in aqua decoctos donec liquor lubricus fiat, percolato, & huic succo mel adijcito. Simulq; calidū ore detinendum exhibeto. Hoc autem sæpe facere oportet. Aut enim abscessum discutiet, aut rumpet. A ruptura uero florido sicco utendum.

Ad aphthas, hoc est oris ulcera, ex Galeno.

Cap. xxxix

QUæ in superficie oris fiunt ulcerationes, Græci aphthas appellant, habentes in se quiddam igneæ caliditatis: sunt autem ut plurimū infanribus, quum uiciosum existit lac nutricis, aut aliās puer non probè cōcoquit facile

facile autem medelam recipiunt, utpote quæ ex his quæ mediocriter adstringunt, ut plurimum contingit. Aliquando tamen diuturniores existunt, ob temporis uidelicet tractum, indissolubili quodam marcere emergente, aut etiam ea quæ appellatur Nome, malo nimirum semper ulterius serpente. *Nome*
 Fiunt etiam aliquando in his, qui ad perfectam ætatem peruenerunt, tum propter uitiosorum humorum ad os defluxum, tum propter acredinem eorum quæ bibuntur ac comeduntur. Cognitio omnium facilis est, utpote uisui ac tactui subiecta. Ad tactum quidem, calidiores quàm cõuenit loci fiunt, tumoresq; excitantur. Visu uero cognoscuntur ob colorem. Quæ enim rubicundiores existunt, sanguinei humoris dominium indicant: flauiores, bilis amarulentæ; albidiores, pituitæ. Lucentes uero & nigrefactæ, bilis atræ. Etenim qui ista probè discernerit, singulorumq; simplicium uirtutem cognouerit, facile cõstituet modum utendi tum simplicibus tum compositis pharmacis: consideratione simul super corporum naturis habitandum ne molles sint, & humectæ; an duræ, & siccæ. Siquidem fortioribus corporibus, fortiora etiam remedia sunt adhibenda: imbecillioribus autem molliora: infantibus itaque conuenientia sunt, ea quæ in cibis eis offerunt mulieres, uelut est lens cum modico pane, & medulla ceruina aut uirulina. Oportet autem miscere cibis aliquid ex malis acerbis, pirisq; ac mespilis: aliquando etiam lactuæ quiddam & intubi, ac portulacæ cibo admiscendum est, inflammata uidelicet ulceratione existente. Quod si infans ipse cibum capere nõ possit, nutricem citis huiusmodi uictu curare oportet: necnon ora infantum pharmacis conuenientibus illinire. Si quidem enim subtribat infantium ulcerationes fuerint, à principio cum his quæ mediocriter adstringunt & refrigerant: consequenter uero his, quæ citra mordacitatem discutiunt. Si uero subflauæ ulcerationes fuerint, isdem similiter est utendum. Ad maiores uero pueros, pharmacis eiusdem generis facultate præditis utaris, uiribus tantum ipsorum auctis ac extensis. Ad eos autem qui iam perfectæ ætatis existunt, durioraq; corpora habent, efficacioribus remedijs utimur. Moderata itaq; remedia ad oris ulcerationes recentes hæc sunt. Omphacium in uino dissolutum aut mulso, rhus culinarijs eodem modo. Pro infantibus in principio sufficit flos rosarum, ipsaq; rosæ siccæ cum mulso, aut melle rosacco. Inueterato autem iam malo, in minoribus quidem pueris admirandam opem contulit hoc, inquit Asclepiades. Remedium Asclepiadæ. Gallas contusas aqua decoque, & cum decocto percolato parem mensuram mellis permisce: rursusq; decoque, donec ad mellis crassioris spissitudinem redigatur: eoq; ut maximo remedio utere, ita ut locis illis satis diu digitis adfrices, aut tomento læuæ purpureæ digito circumuoluto locis apprimas. In his uero qui perfectionis ætatis sunt, durioraq; corpora habent, in uniuersum satis mihi fuit crudo misy uti, cum uino adstringente: quod sanè tum intendit, tum remittit uires suas, iuxta uini uim aut magis aut minus adstrictoriam, atq;

Pacillima ratio curandi

atq; etiam secundum quod densior aut liquidior uini & misyos mixtura ap-
paratur. Alijs autem & qui adhuc fortioribus indigent remedijs, & cum ui-
no & cum mulso utile existit. Neq; uero malum pharmacum his chalcitis
existit cruda cum oleo trita. Illiniuntur autem ex his pharmacis, solæ parti-
culæ oris affectæ. Quod si collutiones obtulerimus siue mediocriter, siue in-
tense adstringentes, ea cautione utemur, ut fortioribus corporibus fortiores,
mollionibus imbecilliores exhibeamus. Porro si in putredinem aphtha uer-
tatur, non conuenit amplius aphtham, eam affectionem appellare. Neque
enim ea quæ aphthas sanant pharmaca, his adhibemus: sed fortiora, qua-
lia quædam in capite De crustis oris, paulo post dicentur. Atqui si putresce-
re incipiant, maxime in infantibus, prædarè facit præscripta ex decocto gal-
larum & melle illitio, & anthera stomatica cum melle illita, & id quod ex rô-
sarum floribus constat: rhoc, croco, & costo, quod ad columnellas inflama-
tas describetur, siccum pharmacum: oportet autem id illinire cum melle, nec
minus egregie facit centaureæ minoris exustæ cinis illinitus cum melle, &
sphaeritis sphæritus, hoc est cupressi pilulæ, exustæ eodem modo. Proprie autem, in-
quit Archigenes, facit cornu ceruinum ustum, tritum, & adfrictum. Ad aph-
thas autem quæ proserpunt summe efficax est, fœniculi radix usta, per se &
cum melle illita. Itemq; amurca in æreo uase, donec in mellis crassitudinem
coagatur decocta, ac illita.

Aliud, quod & ad aphthas & ad reliqua oris ulcera conducit.
Aluminis fœsilis sextantem, gallarum unciam unam, conterito, ac oleo subi-
gito, aut digito in oleo madefacto siccum excipito, eorū exulceratos locos
quàm plurimum extergito. Detrahit enim cutem, asperitates tollit, ulceraq;
ad cicatricem perducit.

De gurgulionis affectionibus, ex Galeno.

Cap. XL

Gurgulio, cor-
lumnella, uua

Lorum

Gurgulionem quidam etiam columnellam appellant, uocatur & uua,
quo nomine etiam accipienda est quædam in eo affectio, quum salis-
cet uuæ acino simile, summum gurgulionis apparet. Lorum uero uocant
aliam quandam eius affectionem, quum ex suffitu nimium ignitus gracile
scit, & loro similis propendat. Verum hæc affectiones raro circa gurgulionē
accidunt inflammatur autem frequentissime. Euenit etiam aliquando, ut ci-
tra inflammationē nimium humectus laxior fiat: uelut in destillationibus
continuis contingit: itaq; inflammatione incipiente repellentibus pharma-
cis opus erit, quæ adstringentis facultatis esse oportet. Et si quidem modera-
tus fuerit humorum influxus, ea quæ moderate adstringunt sunt adsumen-
da: ubi uero fortius inualuerit, acerba etiam sunt adiungenda. Collutiones
igitur moderate sunt, ex palmis decoctis, aliquando in sola aqua, aliquan-
do etiam adiecto modico melle. Similiter autē & ex rosīs, radice dulci, pam-
pinis uiris, rubis, lentisco, terebintho, sorbīs, cypero, & siliquis. Itemq; ex ra-
dice mori, hypocistideq; & malis cotoneis, ac piris austeris. His autem for-
tiores

tiores existunt, myrti, & baccarum eius decoctum, & uirgultorum mollium ilicis, & uniuersi quercini generis, similiterq; & glandium itemq; decoctum mespilorum & cornorum. Præclarissime autem omnium facit decoctum gal-
larum, rhois culinarij, eiusq; quo coriorum infectores utuntur, spinæ Aegy-
ptiæ, myricæ, aut ericæ feminis, utriusq; mali punici floris & putaminis. Ho-
rum unumquodq; & singulatim & cum alijs decoctum in aqua, gargarisati-
dum exhibere oportet. Mirum uero quantum eorum mixturæ, simplicium
& immixtorum usum excedunt. Vtilis est etiam affricus cochlearij frigidissi-
ma aqua repleti, & postea frigida in balneo colluta. Conuenit quoque arida
trita gurgulioni admoventes: ita ut submisce & paulatim ad superiorem & ex-
trinsecam regionem adferantur, & per cochleare aut specilli cōcauum supra
linguā immitantur. Itaq; ex aridis moderata sunt, rosæ sicca, & flos eari, &
prædictarum plantarū germina exsiccata, hypocisthis, rheō ponticum, lapis
coriariorum quo calciamenta ut resplendeant expoliunt, à Græcis ageratos,
uelut non senescens, appellatus: & is quoq; qui samius aster appellatur, &
omphacium siccum. His imbecilliora sunt minorisq; acrimoniæ, gummi, tra-
gacanthus, sarcocolla, & amyllum, quibus utendum erit ubi gurgulio à ni-
minum adstringentibus remedijs fuerit compressus, aut à mordentibus ac dis-
cussorijs irritatus. Fortiora prædictis sunt, lapis hæmatites, necnō phrygius
ustus, minium sinopicum, & terra lemnia, quæ appellatur sphragis, diphry-
ges, semen Aegyptiæ spinæ, rhus culinarijs. Adstringunt enim hæc eviden-
ter, citra tamen exasperationem. Acerba autem sunt, balaustia, & cytini, &
malicorium, ac galla. Adstringunt etiam sufficienter omnia aluminis gene-
ra. Atq; hæc quidē simplicia sunt huic loco conuenientia. Ex quibus & com-
posita fieri possunt, quum uehementi molle & lenē quoddam adiungimus,
aut discussorio quiddam adstringens admiscemus, iuxta temperaturam cor-
poris cui medemur. Diuturnæ autem adfectioni impossibile est per repel-
lentia perfectum auxilium adferre, maxime ubi ægroti corpus plurimo hu-
more repletum, aut affecta particula natura debilior extiterit. Itaque paulo
post omnino aliquid ex discutientibus ad adstringentia est adiiciendum. Si
uero uehemens adfuerit dolor, etiā ea quæ cum mingant adnectemus, atq;
quum multa omnino sint quæ discussoriam uim obtinent, à mollioribus est
incipiendū. Ab acribus enim inflammata exacerbantur. Ob eam igitur rem
composita in usum uenerunt, tum ad reliquorum membrorum inflamma-
tiones, tum ad eas quæ sunt in gurgulione, ueluti quum alumen miscemus
cum iride Illyrica, aut thure, aut myrrha. Tu uero perspecta caloris in ipsa
inflammatione magnitudine, considerataq; influxus ad eam multitudine,
atq; amplius in toto corpore humorum quantitate ac copia perpen-
sa, uel eorum quæ adstringunt, uel quæ discutunt augebis mixturam. Optimum
autem pharmacum ad inflamos gurguliones, tum in principio, tum in
uigore adhibitum existit hoc: rhois culinarij drach. vlll, florum rosarum
d drach.

*Ageratos
lapis*

*Composen-
di pharma-
ca modus*

*Composita
cur inducitur*

drach. .iiii, croci drach. .ii, costi drach. .i, confusa & cribrata in uitrō repones.
 Vſu uero expetente dimidium cochleare in duobus aqua mulſe aquoſo/
 ris cyathis diſſolutum ad gargarifandū adſumatur. Vtilis eſt etiam eis pa/
 ſtillus ex croco, qui iris à quibuſdam appellatur. Complectitur autem myr/
 rhae drach. v, aluminis drach. centum, croci drach. v. .ii, diſſoluitur in uino.
 Quidam etiam aloen adſciunt, quam nos reprobamus. Hic itaq; paſtillus
 fluidioribus, & magis humectis inflammationibus ſumme conuenit, dila/
 tus in uino ac illitus. Miſcetur etiam gargarifmis. In corporibus durioribus
 prodeſt quoq; paſtillus Muſæ. Prodeſt etiã efficaciffime paſtillus Andro/
 nis, quem Aſclepiades deſcripſit, lapidis agerati drach. .ii, .ii, floris lapidis aſi/
 drach. .iiii, tertiæ famiæ drach. .iiii, aluminis ſciſi drach. .iiii, croci torrefacti
 drach. .i, gallarum drach. .ii. contritis utere. Hoc etiam nos uſi ſumus, inquit
 Galenus, optimumq; ſæpe ſumus experti: præter quàm quod ſtatim à pri/
 cipio, & quum rubicundus & calidus exiſtit inflammationis tumor, minime
 adhibendus uidetur. Vbi uero diutinum adeſt malum, & corpus prius eſt
 euacuatum, ſemel tantum in uſum aſſumptus, magnam ſtatim oſtendit uti/
 litatem. Ad laxatam columnellam. Gallarum drach. .xxxi, diphy/
 gis drach. .xxi, illini cum melle. Aliud philoſophi. Apparatut tempov
 ris neceſſitate inſtante. Inueteratum enim uires amittit. Nuccs uirides acci/
 pe & exſiccato, & palmarum oſſa ubi uelis ſufficienter exurito, & amborum
 æquales partes miſceto, ac ſiccis tritis utitor. Sufficiēt enim diſcuſſoria exi/
 ſtunt. At uero quum in alijs adſectionibus, tum ad colūnellas citra inflam/
 mationem laxatas, gallæ omphacinae, ſalis ammoniaci, amborum æquales
 partes, per cochleare admota, præter opinionem auxiliantur. Prædare facit
 & in his, cyrenaicus ſuccus tritus adhibitus: qui ſi non adſit, ipſum laſer.

Aliud, ad columnellas laxatas. Mellis libram .i, florum roſarum ſext/
 uncem, aluminis beſſem. Alumen & mel ſimul decoquito, deinde reliqua tri/
 ta adijcito, ac rurfus paululum decoquito, eoq; utere aliquando aqua calida
 diſſoluto, aliquando aqua mulſa ad gargariflandum, aliquādo quoq; eius
 illitu ipſam columnellam eleuabis. Bonum hoc remedium eſſe adſtruit Ga/
 lenus, eoq; uni iubet.

Aliud, quod & columnellas iam excidendas ſanat: facit idem
 & ad ulcera gingiuas depaſcentia, omneq; oris ulcus ſerpens.
 Seminis ſpinæ Ægyptiæ, gallarum, fructus myricæ, balauſtiorum, phyllo/
 rum, aluminis ſciſi, caſſiæ, ſingulorum æquales partes. Vtere ſiccō.

Aliud, Aſclepiadæ. Roſarum ſicarum non madafactarum, faſcicu/
 lum manipulare unum: ſimi columbini agreſtis ſicci ex ipſis nidis detra/
 cti drachmas .iiii, zingiberis drach. .v. .ii, gallarum omphaciidum numero
 .xlv, confuſa & cribrata per arundinem inſufflato.

Aliud, ſiccum, ad ualde laxatas columnellas, itemq; tumentes.
 Piperis drach. .i, aluminis ſciſi drach. .ii, gallarum drach. .ii. contritis uteres
 cueſtiſio

euestigio enim eas firmant.

Aliud parabile, quod & ad laxatam & suffocantem columnellam ualet. Nitrum tritum digito excipe & adfrica, destillabit enim inde plurima pituita, eaq; cruenta, & sanabitur. Aliud naturale, Philumeni. Picem li/ *Philumenus*

quidam accipe, eaq; extremum pollicis tui infice, alteraq; manu scincipitis capillos distende, ac picem illine. Recurret enim statim uua. Quod si quis omnino ab adflictione uua & tonsillarum securus esse uelit, quotidie per morborum interualla quū lauatur, & à calido lauacro egreditur, frigidā aquam *Frigide aque sorbitio* sorbēdo deglutiat. Quod ipsum & ad tussim, & lateris dolorem, humidisq; stomachi uitijs, multis utile fuit. Per ea itaq; quæ dicta sunt in naturā suam reducere gurgulionem oportet, omni conatu & molimine adhibito, neq; festinandum ad eius excisionem.

De ablatione columnellæ, ex Galeno.

Cap. XLII

Quod si continue adfligat columnella, periculumq; sit ne suffocatio aut tabes inde inferatur: aut quum gracilis & loro similis sit, propter ea quod alimentū non sentit, quod sanè aliquando accidere solet: aut quum laxitatem patitur: fir enim & hoc in aliquibus: tunc sanè refert utrum excidatur, an non. Optima eius auferendę oportunitas existit, quum suffocatio urget, ut tum imminente periculo, ægroto auxiliū feramus: itaq; quo manum commodius adferas, æger in splendenti & claro loco collocetur: & tunc quidem os eius diducatur: mox uero immisso forcipis extremo, ipsa columnella producta obtorqueatur. Obtorta enim uelut stupida efficitur, & illaqueata curuarur citra magnam sanguinis eruptionem. Quapropter inmorari oportet aliquandiu, ac eam detinere quousq; æger tolerare possit: tuncq; auferre non supra forcipem incisione facta, sed ad eius fundum. Quum enim pellisculis referta sit ipsa columnella, & ob laxitatem cedat, proluxa sanè inspicietur, apparet. Vnde multi inexperti medici, siue per errorem, seu per ignorantiam altius incidentes, eam funditus auferunt, maximeq; incommodi auctores ægro existunt. Quare relinquere oportet fundum eius circa palatum. Ab excisione autem ægro offerenda est posca diluta, qua leniter os colluat donec sanguis sistatur. Sequentibus deinde diebus ex radicis dulcis & palmarum decocto gargarismus exhibeatur. Similiter & illitiones ad tonsillarum inflammationes descriptæ. Porro Galenus ait, ab excisione semper diphryge uror, donec cicatrix obducatur. Cicatricē enim tum huius membri, tum reliquorum omnium exulceratorum probe constringit ac committit. *Columnella obtorquenda* *Diphryges cicatricem obducit*

De oris inflammationibus.

Cap. XLIII

Quam uniuersum corpus multitudinem humorum redundat, aut uhius tantum alicuius noxi humoris multitudo in corpore augetur, conuenienter urimur incisione uenæ, aut purgatione, aut dysetici, & abstinentia ciborum. Quod si neutrum horum adtuerit, ad localium auxiliorum opem statim confugimus: in principio quidē reprimendo per ea quæ adstringunt

d. & tinge

*Stomatica
pharmaca
oricōnemūt*

& frigefaciunt. Ex adstringentium sylua est atramentum sutorium, & similia. Verum adco fortibus, & quæ simul uim uenenosam complectuntur ac nocuam, minime conuenit uti ad oris adfectiones sanandas, nisi magna cogente necessitate. Plurimum enim nocumentum infert, si quid ex his ad stomachum ac uentriculum fuerit delapsum, aut ad asperam arteriam extremum & pulmonem. Inest autem huiusmodi remedijs & circa gustum insauitas quædam, quæ quidem usus tempore molestia infert, & permanet etiam totam diem. De fœminis quid attinet dicere? maxime opulentis, quæ in totum pharmacorum ad os descriptorum adfrictum ægre ferunt. Iam & uiros quosdam uideas, qui non ob delicias solum, sed ex natura fastidientem stomachum habent, atque huiusmodi pharmaca non ferunt. Itaque ea quæ ex stomaticis appellatis pharmacis, hoc est quæ ori conueniunt, mitiora existunt, crocum complectuntur & myrrham & alumen. Cæterum confectio ex moris, & malis punicis, & similes quædam, cum solo melle medentur, habentque gustum amplius suauem. Quin & confectio ex succo nucum cum solo melle apparatus suauem exhibet saporem. At uero succus mororum pro debiliore habendus est pharmaco. Fortius uero & quod nulli inferius existit, est succus corticis nucum. Inter hæc medium tenet, quod ad uim adstrictoriam ætinet, succus mororum nascentium in rubo. His singulis admiscere potes, si quidem uehementius efficere uelis pharmacum, succum uuæ acerbæ non dum maturæ, pari pondere, aut si id non uideatur, eius dimidium.

Andromachus coniicit, croci, myrrhæ, succi uuæ acerbæ immaturæ, aluminis, singulorum drachmam unam.

Illitiones stomaticæ ori commodæ.

Cap. XLIII

Confectio ex moris.

Eræs medicus

Confectio ex moris sic adparatur, quemadmodum docet Eras: succi mororum heminas v, uini austeri heminam i, mellis heminam i. Succum unum cum uino decoquito, donec ad limi crassitudinem redigatur: deinde adiecto melle rursus decoque, donec probe cogatur: deinde in pila cis admisce croci sesquidrachmam, zingiberis sesquidrachmam, omphacii sicci sesquidrachmam. Optimum autem est omnibus oris illitionibus simul incoquere, radice dulcis drach. v, ad cuiusmodi sanè mensuram, qualem præscripsi.

*Radix dulcis
est ism*

Est enim radix dulcis natura mitis, & ob id asperitatem ex adstringentibus illatam lenire potens. Facit, inquit Eras, hæc confectio tum ad tonillas, tum ad inflammationes oris, illita, & gargarismi modo colluta. Poteris autem succum mororum cum solo melle adparatum, in usum recondere, ob dulcedinem ori commendandam.

Confectio ex malis punicis, Galeni.

Accipe mala punica in uigore perfecta, matura, & recentia, ita ut ex triplici eorum differentia, dulcium, acidorum & austerorum, æquales partes unam cum corticibus in mortarium coniectas, contundas, & ab eis succum exprimas: deinde confectionem adpares hoc modo. Conijce succi heminas v, mellis

mellis heminam 1,radicis dulcis drach. v 111. Primum uero succum cum ra/
dice dulci decoquito,ac percolato, deinde adiecto melle simul coagmenta/
to,& uitor. Hæc confectio commodius exhibetur his qui oris inflamma/
tionem patiuntur,habentq; simul stomachum fractum & qui cibum auer/
satur. Vtilis est etiam bibita ad alui adfectiones.Expediit autem ei,ueluti re/
liquis oris remedijs adijcere,in principio quidem ea quæ adstringunt, circa
uigorem,ea quæ concoquunt,iuxta indinationem, ea quæ discutunt.Facit
etiam ad oris ulcera,& quæ adpellantur Aphthæ.

Confectio ex malis punicis,Asclepiadæ.

Pharmacum ad os prospere accommodatū, quod etiam ad ulcera serpētia
conducit.Succi mali punici Italicas chœnices v 1,mellis libram 1,croci drach
mas 1111,myrrhæ drach.1111. Succum per se satis diu decoquito:deinde ad/
iecto melle rursus donec probe coagmentetur,decoquito:postea in mortario
crocum & myrrham simul committito, atque hoc,ut maximo remedio,
utor.

Remedium oris ex musto,Andromachi:

quo,inquit,ut pulcherrimo utor.

Gallarum lib.1,rhois quo coria inficiūtur chœnicem 1, musti optimi ex uua
aminæ alba chœnices v 1. gallas contusas unā cum rhoe per diem & no/
ctem in musto macerato:deinde ad quartas decoquito, & per linteolū per/
colato:rursusq; succum donec mellis speciem accipiat, decoquito, & adie/
cta croci drach.1, aluminis scissi drach.1, zingiberis drach.1. probe misecto
& in usum recōdito. Facit enim & ad aurium & sedis quoq; exulcerationes.

Confectio ex succo uuæ acerbæ, Sorani.

Illitio ad os adparata ex succo uuæ acerbæ,incipientibus inflammationibus
accommodata. Valet etiam ad humore prægnantes gingiuas, & ulcera pu/
ra tonsillarum.Succi uuæ acerbæ ad coagmentationem decocti chœnicem
1,florum rosarum drach.x11,croci drach.1111,mellis heminam 1. adpara ut
prædictum est.Eodem modo etiam adparatur cōfectio ex succo malorum
cotoneorum,& pirorum, pirastrorumq; & melpilorum,ac mororum rubi,
similiterq; ex aliorum pomorum succo,atq; item cornorum:nisi quod plus
mellis inijcitur ad ea quæ magis adstringunt. Succus enim pirorum & reli/
quorum pomorum aliquādo æqualem portionem mellis admittit. Eorum
uero quæ plurimum adstringunt,ueluti est succus corni,aliquando duplum
mellis suscipit.

Confectio ex
succo malorū
cotoneorum

Confectiones
uarie

Confectio ex nucibus,Galeni. Fit etiam ex succo
uiridium nucum pharmacum ori commodum,hoc modo.Extrinsecum cor
ticem nucis uiridem, quo tinētores utuntur, in pilam coniectum contunde,
succumq; expressum per linteolum excola:eiusq; heminam 1,mellis tantun
dem,& radicis dulcis drach.v 111,hoc modo committe.Succum unā cum ra
dice dulci usquequo cogatur decoque, & percola: deinde adiecto melle si/
mul decoque rursus,ac utere iuxta eam quam describemus methodum.Est
itaque pharmacum ex nucibus omnium efficacissimum. Verum stomacho

d 3 uti/

utilissimum existit id quod ex malis punicis est confectum.

Summaria doctrina de usu omnium illitionum

ad os adparatarum.

Cap. XLIIII

IN principio inflammationum, omnibus oris remedijs utiliter quiddam admiscetur ex his quæ restrictoriae facultatis existunt ac repellunt. Quapropter commodum est solum succum cum melle adparare ac reponere. Sunt autem restringentia parabilia quæ in principio miscere convenit: rosæ, flos earum, baccæ myrti, myrtus ipsa, lentiscus, rubus, omphaciū. Post hæc cytini & balaustia, mali punici cortices, gallæ, semen spinæ ægyptiæ, omnia aluminis genera, rhus tum culinaris, tum quo coria inficiuntur: horū unum quodq; aqua decoquitur donec probe cogatur, atq; ita percolatum illitionibus commiscetur. Optimus est etiam mali punici succus in principio ammittus. Frangenda autem sunt ipsa mala ac contūdenda in mortario unā cum corticibus suis. Deinde exprimenda ac percolanda decoquendaq; donec in totum cogantur, atque sic in præsentibus illitiones ex eis ammiscendum est. Quod si sumptuosius adparare uelis pharmacum, nempe diutius utendum, adijcies corticem calsiæ, indicam nardum aut celticam, aut folium malabattri. Post principium autem ubi constiterit influxus, sufficit confectio ex moris, croco modico ac zingibere adiecto, ad inflammationis concoctionem. Quum uerò ad uigorem peruenerint inflammationes, parum utendum est illitionibus oris. Verum collutionibus & gargarismis mitionibus inflammationem conquiere oportet, uelut est ea quæ ex fursuribus fit, & radice dulci. Aliquando etiam remedium oris ex caricis constans gargarisandum exhibere convenit aqua mulsa permixtum, aut sapa calefacta, aut cum sola aqua calida, non præsentem melle aut sapa. Optimum censetur circa inflammationum uigorem oleum lentiscium conduplicato lintecolo calefactum & ore retentum: uerum cauendum ne sit inueteratum. Vbi uero iam concocta fuerit inflammatio, & dolorum uehementia quicuerit: tum sanè & discutatoria ad oris remedia admiscemus, cuius generis sunt, hyssopum, pulgium, thymus, calamintha, thymbra, menta, in aqua mulsa decocta & percolata, ita ut ex decocto cuiuscunq; tandem istorum oris remedium permisceatur. Ex parabilibus discutioris est decoctum caricarum melle dulcoratum. Verum singula prædicta efficaciora sunt, si diutius coquantur. Fortius autem prædictis existit spuma nitri, & nitrum ipsum maxime Bernicarium ustum, atque nitro adhuc potentius est sulphur uiuum. Porro ad diuturnas & obduratas inflammationes adhibenda sunt ea quæ prædarius discutere possunt: & mixta quoq; coniunguntur, de quorum numero hæc sunt. Si diuites existant agri, costus, & amomum, & quod appellatur macer, perquam calidum & adstringens: & succus sanè cyrenaicus ad discussionem obduratarum inflammationum aptissimus, aut aliquis eorum qui ei successerunt, uelut est laser. Pauperibus autem pro sumptuosis illis pharmacis adijcere

Macer

conuenit

conuenit dictamnium, aut acorum, aut meon, aut pyrettrum, aut parum cardamomi, aut sinapis. Sit autem pondus singulorum quæ adijciuntur, iuxta eam quam in principio diximus apponderationem. Nimirum ut ad libras quinque succi, una mellis adijciatur, & annexorum sint drachmæ quatuor uel quinque.

De tonsillarum inflammationibus, ex libris Philumeni. Cap. XLV

Tonsillæ frequentissime inflammationem incurrunt: calidi enim & humidi sunt earum loci. Verum hac adfectione magis arripiuntur hi qui plurimo sanguine abundant, & pueri, utpote mixturâ habentes simplicem, & multo cibo se explentes: & infantes adhuc lactentes ex haustu lactis id malum contrahentes. Infertur autem hæc adfectio plerumq; à nimia meri potione, & à multa ac audiore deuotione ciborû, maxime acrium & asperorum: acciditq; ita adfectis difficultas transglutendi, & dolor, aliquando etiam febris. Incipiente itaq; inflammatione, cibum subtrahere oportet, & aquæ potû exhibere, præsertim febre simul irruente. Exhibendi etiam gargarismi adstringentes & repellentes, uelut est lenticulæ decoctum, cum rosâ, myxis, & palmis: reliquæq; quæ in principio inflammati gurgulionis adsumuntur. Cauendum autem ne quid in principio ad gargarismos conijciamus, ne per actrimoniam malum iritemus. Verum quum uehementius adfectio ipsa inualefcit, & periculum suffocationis suspectû est, uena cubiti incidenda est; repetita sanguinis detractione: maxime si iuuenis sit eger, & multo sanguine abundet. cibi autem offerendi sunt forbiles & uentri commodi: quod si uenter non probe egerat, iniijciendus est clyster: infantium uero uentres glande immissa, & sedis illitionibus irritare oportet. Post euacuationem gargarissent decoctione furfurum calidam, aut ptisanæ succum, in quo decoctæ sunt uuæ passæ, aut sapam tepefactam, aut decoctum radices dulcis, aut passum cum decocto ficuum & hyssopi. Hæc omnia tepida exhibenda sunt: frigus enim non tolerant inflammata, sicut neque plurimum calorem. multum autem proderit oleum amygdalinum auribus infusum. Extrinsecus leniter fouere conuenit spongijs impositis, & cataplasmata quoq; imponenda sunt ex farina ordeï aut semine lini, aut sceni græci, aut his simul mixtis. Remittente autem iam inflammatione & decrefcente, mel in gargarismos admiscere conuenit: quod in principio, & in augmento minime facere oportebat: quo tempore etiam calidiores gargarismi profunt. Extrinsecus autem lana mollis oleo tincta collo circumponenda. Quod si ex usu actiorum colutionum aut illitionum inflammatio exasperetur, & mordacitas inde accedat, leniores gargarismi colluendi sunt, quales sunt, succus ptisanæ, aut haliçæ, & micarum siliginearum cremores, qui tepidissimi offerantur: lac etiam tepidum gargarilandum. Remittente autem inflammatione & dolore, prædicta oris remedia sunt illinenda, immisso digito medio, ita ut cum leni adhibita illitione partes tonsillarum quæ intumuerunt comprimantur, quo con-

*Frigus inflam-
matis nocet,
itemq; calor*

tentam in se materiam excludant. Verumtamen non uiolenter comprimere oportet, quemadmodum quidam faciunt, qui autores ob id fiunt, quo in flammario amplius augeatur. Si tamen obtigerit aliquis ab eiusmodi curatione laesus, contenti erimus exhibitione gargarismatum leniētium, nihil illinentes. Permanente uero ac immorante diutius inflammatione, atque ubi tonsillae ipsae subrubri coloris fuerint, neque melius à praedictorum remedium ad motionem habuerint, permutationem in pus expectare oportet: cito enim abscedit. Abscessu autem facto, inflammationis signa augetur, & exacerbationes ad uesperam fiunt fortiores, cum horrore & inaequalitate: aliquid quando etiam cum febre. Quare ubi suppurationem futuram speramus, coadiuuare oportet ut quam citissime fiat. Sint autem gargarismi eis exhibendi calidiores, uelut aqua mulsa calida, & decoctum caricarum ac hyssopi. Verum ad molliendos & maturandos tonsillarum abscessus, maximopere auxiliatur unguentum quod appellatur aegyptiacum, quod ex resina terebinthina, & melle & oleo dulcissimo adparatur: & extrinsecus cataplasma impositum ex ordeacea farina & foeno graeco cum decocto caricarum & althaeae melle. Quum autem pus perfectum fuerit, dolores minuuntur, & inflammationis tumor mollior redditus digito cedit: tunc sane actiores collutiones exhibendae sunt, atque praedictae quoque oris illitiones. In cibo accipiant frusta panis aqua macerata quam maxima, & reliqua similiter quae eis pro cibo offeruntur acruatim ingerant. Vehementiore enim ex his circa tonsillas obuolutione facta, consimili modo tumores adficiuntur, ueluti sectionem sustinerent. A ruptura autem aqua mulsa gargarisanda per se, postea etiam admixta lenticula & rosis, atque his sane immorandum est, donec penitus ad cicatricem perducatur. Neque uetat saepe adijcere quiddam ex praedictis oris remedijs. Quod si ruptura eis serius contingat, ob soliditatem uidelicet corporis pusculorum incumbentium, inferatur inflammatio ipsa dolorem, diducere abscessum conuenit ad proliciendam ignei caloris excretionem.

*Suppuratio
ne quae inuenit*

*Dolores pure
perfecto minui*

Leonidae. Itaque si perfecta aetatis sit aeger, eum desidere facito, postea diducto ore linguam cum specillo lato, aut instrumento linguae deprimendae apto, deprimito, ipsumque abscessum cum scalpello aut acicula penetrante diducito. Si uero puer sit aeger, caput eius intra genua eius qui manum admolitur contineatur. Deinde facta abscessus dissectione caput eius inclinatur ad humoris commodiorem exclusionem. Ab opere autem patrato aquam lactis frequenter colluant. Post multam autem intercapedinem ab opere patrato, & insequentibus deinde diebus aquam mulsam gargarissent: adhibeanturque eis unguentum ad exulceratas tonsillas conueniens: quale est quod aegyptium croceum adpellatur, & quae ei similia existunt. Est autem aegyptium hoc.

Vnguentum aegyptium croceum.

Croci drachmas tres, mellis sesquilibram, olei rosacei sextantem, succi foeni graeci & feminis lini decocti quadrantem. Crocum in succo dissolue: deinde oleo

oleo adiecto, ea simul commisce, & mel prius despumatum conijce, & permixtis utere.

De crustosis & pestilentibus tonsillarum ulceribus.

Cap. XLVI

CRUSTOSA & pestilentia tonsillarum ulcera ut plurimum nullo præcedente tonsillarum fluxu incipiunt, aliquâdo autem à consuetis fieri inflammationibus, maxime efferatis perficiuntur. Fiunt autem frequentissime pueris, atq; etiam ætate iam perfectis, maxime his qui vitiosis humoribus abundant, in his quæ uere contingere solent pestilentibus constitutionibus. In pueris uero oris ulcere, quod aphtham uocant, præcedente omnino perficitur, colore similia crustis, quæ ferro inuruntur. Accidit autem ægris siccitas in transglutiendo, & suffocatio coaceruatim incidit, maxime quum rubor subeat mentum: aut ubi hæc acrimonia præterierit, Nome quæ depascitur, locos excipit, succeditq; unâ putrefactio. Archigenis. Festinanter itaq; auxilium adferre oportet, his qui sunt ætatis perfectæ, atq; confidenter uenam brachij incidere, siquidē nihil sit quod id fieri prohibeat. Multæ enim uitgines circa uigoris ætatem mensium purgationem appetentes, hac affectione apprehenduntur, quæ præcipue uenæ incisione opus habent. Incidentæ autem sunt in eis tali uenæ, & unica sanguinis detractione facta euacuandæ, non autem ad usq; animi defectionem. Deinde glandulis & sedis illitionibus ac clysteribus utendum erit: itemq; cucurbitulis iuxta lumbos, ac colligationibus extremitatū, atq; omnibus modis conandum est ut diuersio ab affectis partibus fiat. Postea etiam gargarismis uti conuenit: uelut est lentiuscule decoctum, & myxarum ac palmarum cum melle & pisanæ succo: deinde furfurum decoctum in decoquendo uiscosum factum, adiecto melle. Potest etiam remedium oris ex moris, & maxime id quod ex malis punicis constat, colluendum exhiberi, hydromelite permixtum. Philumeni. Infarcitur autem hydromeliti & costus & iris, ac aristolochia, & similia post principium. Probe autem facit id quod ad columnellas præscriptum est, scilicet cum pharmacum ex rhoe, flore rosarum, crocoq; & costo. Foliorum etiam glaucij siccorum decoctū oprime facit, quanquam gustus uehementer amarj existat. Ego autem & glaucij succo, cuius ad collyria usus existit, in aqua mellis meraciore diluto, pro gargarismate utor, aut etiā cum iridis decocto. At uero fruticis ipsius sicci, glaucij inquam, contusi & cribrati optimus usus existit si insuffletur. Conādum autem est in uniuersum ne digitum quidem locis admoueamus, aut leni saltem tactu manū admoliamur. Etenim insensj ad quos maxime in rebus dubijs homines cōfugiunt, uehementius illinūt, simulq; inflammatū locum comprimūt, simulq; crustam detrahunt: quod minime facere conuenit prius quam eleuatam & uix innitentē crustam conspiciamus. Quod si enim adharentē adhuc crustam auellere aggrediamur, ulcerationes magis in profundum procedunt, & inflammationes consequuntur, augenturq; dolores, & in ulcera serpentina proficiunt. Itaq; sicca quidem remedia

Veris consilio
tutio pestilens

Vene tali

Diuersio Gra
cis anisipasis

In medicos
ignaros

*Crustas
tollentia*

remedia insufflare conuenit: liquida uero cum pinnula illinire, ita ut quantum licuerit quam penitissime pinnulam immitamus. Vendum est etiam compositio ex semine rutæ ad anginam descripta, & ea quæ ex uistis hirundinibus constat, ita ut cum melle liquefactas illinamus, & cum hydromelite permixtas colluendas exhibeamus. Profuit etiam aliquibus aristolochia, & iris, & chalcitis adhibita cum melle. Aliquando etiam Andronis & Musæ pastilli. Mirabiliter autem crustas aufert caninum crementum melle illitum, & uistarum hirundinum cinis, & centaureæ minoris uistæ cinis cum melle, & cochlearum terrestrium maxime nudarum uistarum cinis cum melle. His uero de quibus medici desperarunt, fel crocodili exiccatum & tritum ad crustam insperge, aut illine cum melle. Oportet autem post irritationes à phar macis pus prouocantibus factas, lenire cum radice dulcis decocto, & qui ex uino scybelite, mastiche chia, zingibere & croco constat gargarismo, deinde cum amylo & tragacantho. Cohibito autem iam ulcere pascente, lac gargarissandum samia terra permixtum: & febrium quoque curam habere conuenit: euentes enim incidere solent atque in repurgandis explanandisque ulceribus maxime follicitum esse: conuulsionem enim infantes plurimi passim sunt in ulcerum repurgatione: aliqui uero uia transglutendi exiccata, sunt strangulati. Sunt etiam quibus corroduntur gurguliones, atque ubi diutius persistierint ulcerationes, in profundum proserpunt reflectunturque in ipsas nares. Nam & ego puellam noui quæ post quadragesimum tandem diem consumpta est, quum se iam à morbo recolligeret. Verum ad septimum usque diem plurimi periclitantur. Vbi uero inflammationes & ulcera serpentina semper amplius extendantur, forinsecus fomentum adhibere oportet, & cataplasmatibus communibus uti, cum cautione ne refrigeremus. Feliciter enim res procederet si intrinsecus detentam materiam extra queant transferre. Contingantur itaque semper post cataplasmatum ablationem, partes circa mentum, cum nardino & cyprino cerato, cum circumpositione lanarum mollium. Vbi autem crustæ solutæ fuerint, & ulcera ipsa mundata, antheris, hoc est floridis remedijs utendum est. Sanant enim in totum ulcerationes ipsas, tum sic adhibita, tum illita cum melle. Sint autem crustarum tum oris, tum tonsillarum, composita pharmaca huiusmodi.

*Anthera, res
media florida*

Asclepiadæ illitio ad exulceratas inflammationes.
Florum rosarum drach. v. iiii, croci drach. iiii, balaustiorum drach. i, zingiberis drach. i, nucum pinearum repurgatarum drach. iiii. Subactis melle ad illitionem utere. Asclepiadæ, ad oris putredines. Rhoeis culinarij drach. iiii, acaciæ drach. i, omphacij drach. i, medullæ ceruinæ aut uulinæ drach. iiii. in uino dulci diluta melle despumato excipe, & ad illitionem utere. Andromachi remedium oris odoratum ac tene-
rum ad inflammationes ac crustas optimum.
Nucum pinearum depuratarum drach. iiii, amyli drach. ii, aluminis scissilis drach.

drach.1,florum rosarum drach.1,croci drach.1,mellis quantum suffecerit.

Aliud,ad omnes tum oris tum tonsillarum adfectiones.

Rhois culinarij drach.1111,florum rosarum drach.1,croci drach.1,coſti dra-
chmam 1,illine cum melle,aut cum aqua mellis gargarifandum exhibe.

Critonis ad cruſtas. Miſy aſſatum aut crudum illine cum melle ſta-
tim enim caſ tollit. Sint autem miſyos drach.111, & una mellis,quo modo
etiam uti poteris chalcitide. Archigenes autem inquit,Ad cruſtas opti-
me conuenit ſtercus caninum cum melle:quod tum optimū erit,quum oſi-
bus canes fuerint nutriti.Magnopere enim auxiliatur,neq; odium fui indu-
cit in cibo oblatum. Licebit etiam uti plurimis eorum quæ ad anginam de-
ſcripta ſunt auxiliorum.

*Stercus
caninum*

Aliud Archigenis,ad cruſtas in ore.

Hirundinum uſtarum & ſtercoris humani æquale pondus cum melle illi-
ne,Acciptendum eſt ſtercus non quodcūq; obtigerit,uerum puerum biduo
prænutrire oportet pane & lupinis,ac uino modico, atque deinde tertia die
ſtercus eius accipere & exiccare,atq; repositum ſeruare. Vſu uero expeten-
te cōrito uti.Efficax enim & ad anginas exiſtit.Experti etiam ſumus,inquit
Galenus,pharmaca à Sorano deſcripta præclare facere, quæ ſanè ille iuxta
dictionum ſeriem deſcripſit.

*Stercus
humanum*

Remedium ad cruſtas oris,conferens & ad gin-
guas humore prægnantes & graueolentes.

Miſyos uſti drach.7 111,iris illyricæ drach.1111,croci drach.1. in puluerem
redige,ac pyxide lignea reponere. Vtere autem per ſe uel cum melle.

Florida compositio,ad prædicta ſimiliter efficax.

Iris illyricæ drach.1111,ſandarachæ drach.1111,cyperī drach.1111,aluminis
ſciſi drach.11,zingiberis drach.1,in puluerem redige ac utere. Quidā etiam
flores rosarum,& gallas adiſciunt,ſingulorum drach.11. Vtere autem ad pu-
treſacta,& ad abſceſſus gingiuarum ſicco:ad cruſtas uero cum melle.

Philagrii,ad oris eroſiones.

Seminis lentici nondum denigrati

Philagrius

drach.1111,gallarum drach.1111,coſti drach.1,phylli drach.1.utere.

Theodori,ad tonsillarum ulcera,gingiuarumq;
& pudendorum,ad putreſacta & carbunculos.

Theodorus

Aluminis ſciſiſilis, ſandarachæ, myrrhæ troglodyticæ, ſingulorum æquale
pondus accipe,ac utere ſicco.

Hermi,ad omnes oris adfectiones,ab ulcere quod
aphtha adpellatur uſq; ad cruſtas & carcinomata.

Hermus

Ericæ ſemen tritum, ſucco hyoſcyami excipe, & utere cum melle.

Aliud,ad ulcera quæ ſerpunt in ore,gingiuis,ac lingua.

Miſy cum ſucco foliorū uitis albæ,quam bryoniam adpellant,dilue, & con-
ieſto ſimul melle tere, ac ad illitionem utere. diuinitus extergit ac repurgat.
Vbi uero repurgata fuerint & carne expleta,bryoniæ radicem contuſam &
in puluerem redactam adhibe.Ea enim ad cicatricem perducit.

Aliud

Aliud eiusdem, ad oris putrefactiones, ardores, & ulcera quæ serpunt. Foliorum uitis albæ quadrantem, aluminis scissilis trientem, misysos crudi drach. iiii, atramenti sutorij drach. ii. contere quousq; arida fiant, & in puluerem redactis utere siccis. Repurgat, explet, reprimat illatum fluxum. Ego uero præcedens expertus sum. Collutione autem utendū est ad omnia oris ulcera, & ea quæ serpunt, putrefactionesq; & gingiuas denigratas, Verbenacæ rectæ decocto ex uino, quod calidum ore retinendum exhibe.

Aliud diuinum remedium. Oleæ uiridis folia aqua decocta colluenda exhibe. Arctæus autē inquit, Anginæ causæ multæ existunt, maxime autem frigiditas magis quàm ardores, & plagæ, & ossa ex piscibus ad tonsillas impacta, & potus frigida. Archigenes autem ait: Occultæ anginæ causam esse intendentes, nervos qui ad stomachum deferuntur, ab coctis male adiciuntur, & post inferioribus membris pulmōi inquam & cordi, respirandi principium inflammant. Arterijs uero quæ carotides adpellantur, itemq; alijs adiacentibus inde inflammationem transmittunt. At uero quod hi qui sic adiciuntur non fiant attoniti, inde est quod huius adfectio nis causa intemperies sola existit, non etiam coartatio locorum. Conueniūt igitur, inquit Archigenes, eis ea quæ uomitoriam uim obtinent, uelut est elaterium, & squama aris illita cum melle: Ego autem, inquit, ab occulta angina prehenso ex sinapis gargarismo releuo, moxq; in balneum induco, atque ita multos à periculo liberaui, quibus instar lapidis adfecta particula fuit indurata, per distributionem uidelicet in uniuersum corpus sanatos. Arctæus autem inquit: Cucurbita accipiat, primumq; infra umbilicū adhibeatur, mox ad latera dorsumq; & scapulas, ita ut assidue à loco uno ad alterum transferatur, & in admotione ex supernis locis deorsum trahatur. Quod si uehementer urgeat suffocatio, sinapi aqua tritum & uili panniculo exceptum pectori impone. Ad delingendum uero conueniunt eis: sinapi, nitrum, hyssopum, scilla asia, sulphur uiuum. Quæ omnia cum melle permixta delingenda exhibe per cochleare.

De angina, & eius speciebus, ex Galeno.

Cap. XLVII

Angine differentie IIII

Anginæ quattuor differentie existunt. Vna, quā fauces fuerint inflammatae: fauces autem pharynga Græcis adpellatā, uoco intra os locum, ubi tum stomachi, tum asperæ arteriæ extrema conueniunt. Altera, quum neq; circa oris regionem, neq; iuxta fauces, imò nec forissecus quicquā adparet inflammatus: & tamen suffocationis sensus infestat ægrum iuxta asperæ arteriæ extremum. Tertia, quum exterior gutturis regio unā cum interna fuerit inflammata iuxta mentum. Ad hæc autem & circa ceruicem quedam adfectio oboriri solet, ex luxatione & discessu cuiusdam in collo uerticuli in anteriore regionem: unde cauius adparet locus, & quum extra attingitur, dolore adficiunt: quod contingit ob distracta intro uerticula, & consistentem circa internos gutturis musculos inflammationem. Hæc autem species propria

prie cynanche à ueteribus est adpellata. Lingua enim à luxato uerticulo iuxta radicem suam impulsâ, ex proprijs locis excedit, & difficultas magis circa respirationem infestat, unde coguntur aperto ore semper hiare, atq; aerem adtrahere. Omnes autem prædictæ adfectiones communem habent difficultatem transglutendi: ita tamen ut in alia plus, in alia minus hoc malum augeat. Accidit etiam eis potum adsumptum ad nares reflecti. Atq; hæc sanè sunt adfectiones: curatio autem earum in paucis uariat.

Archigenes. In principio igitur compendiarium & præceptum auxilium omnis angina requirit, quandoquidem ut in totum ferè iuuenibus accidit. Itaq; cuestigio cubiti uenam eis incidere oportet, nisi quiddam maioris periculi impediatur: auferre autem sanguinem parce, non usquequo animi defectio sequatur: citius enim hi animo linquuntur, & alias sanè ex refrigerationibus & animi defectione per facile materia à faucibus ad pulmonem deferatur, & ineuitabile periculum infert. Curandum etiam ut modica fiat diductio uenæ. Nam quum in alijs, tum in magnis uenæ diductionibus accruatim animi defectus irruit: neq; tamen angustioiorem facere uenæ incisionem conuenit, ne sanguis uelut percoletur, & crassior eius pars intus remaneat, quæ causa huius adfectionis existit. Vtilis est autem eis repetita detractio in sequenti die, nisi præpediat ægri timor, aut animi deliquiū. Quod si quid uenæ incisionem fieri prohibeat, per clysterem infundendū est centaurea, absinthij, calaminthæ, & aristolochiæ decoctum. admixto melle & plurimo nitro: postea etiam purgatiua danda, quæ magis pituitā ducunt: conuenientissimum autem aliquando in angina esse uidetur clatenuū: uerum non oportet nisi cum sero lactis & cinico ipsum propinare. Conuenient etiam eis ex aloë & colocynthide catapotia, si modo queant ea deglutire. Si uero confidentior contingat medicus, bonum est & hieræ Archigenis ex colocynthide drachmas tres, cum aliqua ex prædictis decoctione per clysterem infundere, ubi prius aliquo stercorum eductiuo euacuauerit. Post uniuer sales autem euacuationes, cucurbitas adponere oportet. & siquidē tumor circa maxillas, aut sub mento persistat, in ipsum tumorem, & cum scarificatione plurimum sanguinem extrahere, saleq; respergere scissuras, & conficcare. quod si nullus extrinsecus tumor adpareat, ueluti fieri solet in ea quæ occulta adpellatur cynanche, retro sub colli neruo insigenda enī cucurbita iuxta primum uerticulum, & constanti adtractione utendum, & frequentius cucurbita auellenda. Ea enim instantia factis uertebrae rum discelsibus, ac luxationibus probe se opponit. Deinde ubi paulisper à reliquorum remediorum adhibitione quieueris, cataplasmati utendum, tum eadem die, tum etiam in sequenti. Maiorem uero spem in sequentibus diebus in illitionibus & gargarismis reponere conuenit. Itaq; ubi initium sit cum multa inflammatione, ea quæ leniter adstringunt offerenda sunt primum: uelut est rosarum, lentium, palmarumq; decoctum, flos rosarum ex hydromelite, rhus cum hy-

*Sanguinis
detractio
repetita*

c dromelite

Siccum
pharmacum
Archigenis

dromelite decoctus, & decoctum myxarum. Quod si excoriatio contingat corpusculorum, panis cremor exhibendus est calidus, aut fursurum decoctum colluat, aut etiam lac solum. Ego autem, inquit Archigenes, siccum pharmacum in promptu habeo. Ex rhois culinarij drach. viiij, florum rosarum drach. iiii, costi autem & croci, cuiusq; drach. ii. Ex quo sanè in aquam mulsam inspergo, & in gargarismate utor, atq; inflammationes & ulcerationes consillarũ facillime sano, etiam si contingant quibus illæ ad superna progressum minentur. Quin & illitiones mansuetiores inflammatis commodæ sunt, uelut est ea quæ ex moris constat, & rhois culinarij cremor hydromeliti incoctus donec cogatur. Oportet autem premacerare sufficietè rhoem ipsum, donec abunde aqua mulsæ ex eo colorem accipiat, & in sapore uim eius repræsentet. Probe etiam facit mali punici integri unâ cum corticibus fracti ac confusi succus melle permixtus: ita ut ad succi partes tres una mellis coniiciatur, & donec cogatur decoquatur, ac illinatur. Quod si ad nullum dîctorum remedium malum cedat, sed semper multitudo humorum augeat, uenæ sub lingua incidendæ sunt, aut quæ sunt in fronte, aut etiam circa magnos angulos oculorum: forinsecus autem assidue lanæ circum collũ ponantur oleo calido madefactæ, aut ceratum ex oleo cyprino adparatum adhibeat, aut si malis ex gleucino siue musteo. Quod si diutius moram traxerit, abscessum expectare oportet: & tum sanè conuenientius erit siccum decoctum ad colluendum, multoq; magis si hyssopum ei coniiciatur. Neq; uero incòmodus fuerit in his qui aliquo modo sunt exulcerati, crocus cum aqua mulsæ, & decoctum radices dulcis. In uigore autem omniũ utilissimus existit succus pisanæ aut halicæ ore collusus: nam & à multis minis liberat, & abscessus metum eximit confestim. Qui si non adsit, fursures probe cocti ei succedere possunt. At uero ubi iam morte circumuentos propter suffocationem uideas, in his quæ aciora sunt periculum est faciendum. Sunt enim tunc etiam in principio conuenientiora, post uniuersales tamen euacuatioues: itaq; hydromeli nitracius profuerit, si cum eo hyssopum aut origanum decoquatur. Si uero in superioribus partibus iuxta fauces malum persistet, sinapi tritum cum aqua mulsæ & percolatum gargarisandũ exhibebimus. Conuenit etiam calsiæ decoctum, & iridis, & radices panacis, gentianæ, centaureæ, aristolochiæ, agarici, & radices cucumeris agrestis: unumquodq; autem cum hydromelite satis diu decoquatur, donec succulentum reddatur. Vfus sum etiam in occulta angina ex sinapi gargarismo, & sæpe à periculo ægros liberaui. Illitio autem his ualde conueniens, his inquam, qui citra exulcerationem anginam patiuntur, est ea quæ ex semine rutæ adparatur: & quæ ex ustis hirudinibus constat: quarum adparatum paulo post unâ cum alijs remedijs describam. Iuuantur etiam fotu uaporis intra os accepto, hoc modo. Origanum, hyssopum, saturiam, sceniculi semē, cum aceto plurimo & nitro serucfacto, in olla diligenter operata, operculo foramen habente in medio

Fomentum
per uaporem

medio, deinde arundine ori ægri & foramini adaptata, finas foueri. Si uero ex feruore arundinis os aduratur, ouum uacuum paruum utrinq; perforatum ore contineant, & per ipsum arundo immitatur. Mollius autē fomentum fuerit, si pro aceto poscam affuderis, aut aquam. Cæterum & magis uaria offerre illis oportet, quo rursus insurgat caro, & transmutare queat eam quam in profundo pertulit coarctationem. In dubium enim sæpe uenit & ferè desperationem præ feritate morbus, ut & odiosa exhibere quibusdam necessarium fuerit: siquidem humano stercore quosdam usos esse constat pro illitione, & magnum sanè commodum repererūt. Alij autem recenti usi sunt, alij uero exiccato & trito, ita ut cum nardo uel myrrha id permiscentes foetorem celarent. Ab acrioribus autem & his quæ dilaniantem uim obtinent, ad mediocria est transeundum uelut est Andronis pastillus, & similia. Vtilia etiam his sunt, ea quæ uomitoriam uim obtinent, maxime illis quibus grauitatis sensus circa uentrem hæret.

Archigenis remedium, quo utor, inquit, ad occultas anginas: mirabiliter etiam conducit anhelosis. Elaterij oboli dimidium, spumę nitri obolos tres, sinapis drachmam unam, contere cum aqua & informa. Mouet autem uomitum elateriū cum oleo aut melle tritum & penitissime illitum. Multo autem efficacius id præstat, si squama ætis ei cõmiscatur, aut ipsum es ustum, oleo cyprino tritum & illitum. Probe etiam facit fel tauri illitum, & nitrum cum aceto mulso potatum, & centaurea, & aselli sub aquario stabulantes uase cum melle delincti. Quidam nasturtij semen tritum bibendum exhibuerunt, quantum cochleari accipi potest cum aqua mulsa. Nec ita longe post pituitam uomuerunt illi crassissimam & tenacem, statimq; à plurimis molestijs sunt liberati. Aliud. Stercoris gallinacci albi & colore cerusam referentis, bonam copiam exiccata & reposita adserua. Vbi uero usus postulât, quantum cochleari accipi potest, in aqua aut aqua mulsa dilutū propina. Et enim desperatos etiam sanat: quod si bibere nequeant, tritum cum melle quàm penitissime illini. Aliud, ad idem. Centaureæ drach. v i i i, nitri drach. v i i i, salis communis drach. v i i i, contere & repone siccum. Vsu uero exigente melle imbue, & cum pinnula illine, aut quomodo uidebitur utere confiderenter. Nam periculum eius factum est. Aliud. Abinthium contusum & cribratum, adiecto nitro trito, illine cum melle. Aliud. Elaterium cum felle taurino & melle contritum illine.

Vomitoria in angina

Stercoris gallinacci

Compositio ex semine rutæ ori commoda, Andromachi.

Ad anginas & desperatos, inquit, hac utor. Summe etiam prodest stomachicis, & ad tormina intestinorum, fabæ magnitudine exhibita ex frigida. Seminis anisi, seminis apij, floris iunci odorati, ammi, aluminis scissi, iridis illyricæ, seminis rutæ, quod quidam harmala, alij besafa adpellant, cinamomi, myrrhæ troglodyticæ, aristolochiæ longæ, singulorum unciam unam, cassiæ, crocomagmatis, rosarum siccarum, cuiusq; unc. i, costi quadrantem,

Harmala, besafa

cineris hirundinum recens ustrarum quadrantem, croci sesquiunciam, spicæ nardi drach. iiii, amomi drach. iiii, gallas omphaciidas numero octo, contere & melle excipe ac utere. In principio quidem pharmacum hoc cum decoctione aliqua mediocriter adstringente, quales sæpe diximus, dilue. Iuxta remissionem autem & declinationem melle, aut hydromelite, aut uino mulso. Inueterata autem & uelut indurata inflammatione aceto mulso.

Philagrius

Philagrius autem inquit, Aliquando post prædictas uniuersi corporis euacuationes, & adhibitiones cucurbitularū, & incisionem uenarum sub lingua, miscemus etiam alia quædam ad præscriptum pharmacū, quæ partim quidem irruentem fluxum restringunt, partim autem omnia quæ iam insident discutiunt. Conijciuntur autem ex rutæ compositione drach. vii, gallæ omphaciidis drach. vii, & stercoris canini albi, ac humani stercoris sicci, cuiusq; drach. vii. Verum quemadmodum & ante dictum est, stercus canum accipere oportet eorum, qui antea per biduum ossibus sunt nutriti humanum uero ex puero biduo pane & lupinis nutrito.

Vomitium Marciani, quod & ad opertas & manifestas anginas prodest: præexige, inquit, mercedem.

Æris usti drach. xii, atramenti furoris drach. xii, myrrhæ drach. i, elaterij drach. i, spumæ nitri drach. i, fellis taurini drach. iiii. excipe melle & cum

Archigenes

pinnula quàm penitissime illine. Archigenes autem inquit: Stercus humanum quale prædiximus accipe & exicca, ac in uili panniculo ligatum exure, atq; cum aqua mulsa dilutum propina. Est enim remedium eorum, qui iam suffocantur.

Antonius

Musa

Antonius uero Musa inquit: Stercus caninum quale prædiximus accipe & exicca, contusoq; & cribrato utere ad anginas cum melle, quàm penitissime illinens, ut transglutire possint. Eo enim nullum potentius pharmacum existit. Galenus uero: Nihil noui, inquit, neq; ex angina laborantibus, neq; ad magnas tonsillarum inflammationes, neq; ad glandularum tuberculorumq; gutturis suffocationes iam periculum minantes, commodius quàm cum aceto mulso & pice liquida illitum caninū stercus. Summe etiam auxiliatur ad anginas, confectio ex ustis hirundinibus, cuius compositio hæc est.

Compositio ex hirundinibus ustis.

Cineris hirundinum syluestrium ustrarum drach. vii, croci drach. ii, spicæ nardi drachm. i. excipe melle, & permisce ubi iam incubuerint adfectiones. Oportet autem exurere hirundines hoc modo: Pullos hirundinum uiuos non deplumes, addito congruentis modi sale in fictile uas conijcimus, idq; obturatum super prunas ponimus, donec puluis & cinis fiat, quo contrito utimur.

Aliud, ex hirundinibus, iidem ualens ad anginas.

Hirundinum ustrarum numero undecim, succi myrtilis uiridis cyathos duodecim: hirundinū pullos exure & contere, deinde omnibus simul mixtis utere.

Aliud, cuius experimentum constat. Foliorum costi, careophylli, piperis, cuiusq; unc. i, sandarachæ trientē, excipe melle despumato, & utine.

Aliud

Aliud. Cochleas nudas citra testam in hortis repertas in ollula exure ac contere, cinereq; melle excepto utere. Est enim eiusmodi remediū, quod præsentem opem affert. Simili modo etiam cancrorū ustorum cinere utendum est cum melle: & decoctum quoq; cancrorum ore collutum utile existit. Ego autem cancrum in aquæ hemina coctum percolo, ipsamq; aquam calefactam gargarisandam exhibeo: crassa enim educit multa, & releuatur confestim æger. Aliud. Centauream minorem siccata exure, cinereq; illine cum melle. Aliud. Maxillæ porcelli ustæ unciam 1, mali corij unc. 1, costi drach. 1111, piperis torrefacti scrupulos sex, misce cum melle ac utere. Valde autem magna sollicitudine ac contentione opus est etiam tum quum malum remittere uidetur: & enim ea quæ iam ex profundo adtracta sunt, ex improviso in pulmonem transferuntur, si corpus circa fauces negligatur, atq; ita repentina mors ægro infertur.

De glandulis.

Cap. XLVIII

OMnibus hominibus carunculæ quædā exiguæ naturales iuxta utrasque tonsillas extant, antiades Græcis, Latinis glandulæ appellatæ, Antiades, glandulæ quæ quum naturalem modum seruant, nihil molesti inferunt. Verum ubi iuxta affectionis proprietatem augeſcant, & modi maioris quàm secundum naturam fiant, tunc sanè & transglutitionis & spirationis difficilis causa existunt. Consistunt autem ferè in totum citra inflammationem, & paulatim etiam augeſcunt. Aliquando autem & inflammationem patiuntur. Diducto itaq; ore manifeste adparent glandularum tumores maiores, citra quidem inflammationem tonsillarum corpusculis concolores. Inflammatæ uero rubicundæ & inferentes dolorem. Quare quum inflammatio affuerit, gargarismis & illitionibus ad tonsillas inflammatas descriptis est utendum. Quum uero citra inflammationem consistunt, conari oportet ut per commoda pharmaca paulatim deprimantur, & per admoti digiti compressionem. Remedia autem ad glandulas absq; inflammatione auctas, talia conueniunt. Gallæ omphacitidis, salis ammoniaci, aluminis scissi, cuiusque unciam 1, adhibe siccum. Aliud. Myrrhæ sextantem, gallarum drachm. v 111, misyos drach. 11, salis torrefacti drach. 11, utere sicco. Aliud. Gallarum, misyos, myrrhæ, aluminis liquidi, æquales partes accipe, & siccis utere, uel cum melle. Aliud, Asclepiadæ. Asclepiadæ Remedium ad glandulas accomodatū, gallarum omphacinarū drach. 1111, diphrygis drach. 1, myrrhæ drach. 111, croci drach. 11, mellis quantum suffecerit. Hoc pharmacum citra ulcerationem glandulas reprimat. Aliud, Apolloniadæ. Apolloniadæ Diphrygis drach. 11, chalcitidis assatæ drach. 11, gallarum drach. 1, excipe melle & utere.

Chirurgia. Verum si pharmaca uincantur, excindere glandulas oportet. Quod ut commodius fiat, æger in claro & splendido loco collocetur, & diducto ore unaquæq; glandula uncino producat: excinditur autem ex ea id quod supereminet, iuxta medium eius quod præter naturam excreuit.

qui enim omnem quæ præter naturam accreuit carnem excindunt, etiam naturalem carnem ex fundo auferunt, periculosa: quæ sanguinis eruptionis auctores sunt. Post excisionem autem postea frigida colluenda detur, ad sanguinis uidelicet inhibitionem, & post eam frigidissima aqua. Postquam autem sanguinis eruptio constiterit, satis longa intercapedine temporis facta, aqua multa tepida exhibeatur. Sequentibus uero diebus etiam cum ea illutiones adferantur, quales sunt ad ulceratas tonsillas descriptæ. Raro autem quando uidelicet ulcera eminentiora adparent, florido sicco ipsas tonsillas attingimus. Per hoc enim eminentiæ deprimuntur, & cicatricis inductio perficitur.

De suffocatorum reuocatione.

Cap. XLIX

*Naufragis
reuocandis*

Reuocantur aliquando suffocati, aceto ori infuso cum pipere, & semine Rurticæ. uerum difficulter tractari possunt ut admittant: cogere itaque oportet ac ori infundere, ad uomitionemque irritare. Rubore autem circa collum dissoluto, statim respiciunt ac tela xantur: quare oleo multo calido & lana, aut cerato, collum assidue circum circa est amplectendū. Similiter etiam naufragos reuocare oportet, siquidē respiratio adhuc in eis seruetur. prius autem capiti eorum sonum immittere conuenit, ac cogere quo absorsitam aquam cuomant, siue pinnularum seu digitorum irritatione: forinsecus uero manuum impositione iuuare oportet uentris firmitatem.

De deuoratis in tonsillas spinis, atque his quæ in asperam arteriam delabuntur.

Cap. L

*Spinis aut es-
sibus deuoratis
in extrahendis*

Si in asperæ arteriæ extremum, atque ipsam adeo asperam arteriam, aliquid eorum quæ deglutiuntur delapsum, tumorem induxerit, tussis pro uocanda est, per acetosam aliquam qualitatem, & sternutatorium quoque naribus admouendum. Ex uehementi enim agitatione, & instantia, spiritu si mul expulsionem adiuuante, eiusmodi consueuerunt externi. Si uero iuxta tonsillas, aut iuxta principium stomachi seu gulæ spinæ aut ossa fuerint infixæ, ita ut oculis subiaceant, atque plurima sui parte extra tonsillas promineant, uolsella adprehensum extrahere oportet. Quum uero in inferioribus gulæ locis adhæserit, hoc modo educatur: Spongiam paruam resina terebinthina madefactam, aut carunculam crudam recetem exsculptam, unā cum filo ualido ipsi alligato, deglutire coge, & mox comprehensam per alligatum filum rursus extrahe. Hoc enim modo sæpe etiam id quod infixum fuit, si mul extrahi consueuit. Conuenit etiam panis recetis interioris buccellas deglutendas exhibere citra comman ducationem: aut caricam aliquantisper circummanducatam, non tamen penitus dissolutam. Quum autem ad fundum usque ipsorum corporum penetrant, neque extrahi potuerint, aqua multa gargarienda exhibeatur, & tibi forbiles, uelut posana cum melle, aut haliça similiter: aut tnicæ aqua multa calida macerata offerantur. forinsecus uero ceruici atque uniuerso collo lanam oleo calido imbutam imponere oportet: similiterque cataplasmate calido laxante ac deprimente collum contigere conuenit.

conuenit

conuenit uelut est id quod ex semine lini cum aqua malsa adparatur. Hoc enim ductu tum locus ipse suppuratur, tum spina commota, simul cum his quæ deglutiuntur, deducitur. Aliud. Ad educationem eorum quæ in tonsillis deutorata sunt, statim te ad ægrum desidentem conuertere, ipsumq; tibi attendere iubeat dic, Egredere os si tamen os, aut festuca, aut quicquid tandem existis. Quemadmodum Iesus Christus ex sepulchro Lazarum eduxit, & quemadmodum Ionam ex ceto, Atque adprehensio ægri gutture dic: Blasius martyr & seruus Christi dicit, Aut ascende aut descende.

Supplio,um

De arteriarum pharmacis.

Cap. 11

A Speræ arteriæ extremum & subiacentem ipsi asperam arteriam, cum suis proprijs musculis, pellicula quædam fortiter completitur & ambit. Quando igitur adfectio aliqua, siue iuxta eam ipsam pelliculam, aut circa extremi ipsius arteriæ musculos contingit remedia quæ uim medendi eam obtinent arteriaca communiter adpellantur. Afficitur autem pellicula hæc aut ob nimiam humectationem, aut asperitatem, aut ulcerationem. Vocis enim nocumenta, uidelicet eius interceptio, hoc est non posse loqui, & rauditas in loquendo, ad plures causas consequuntur: aliquando quidem propter diuturnos ex capite defluxus, aliquando uero propter suppurationem thoracis & tabem. Ex uociferatione etiam magna & plurima, rauedo uocis oboritur, & ob frigidi & insueti flatus inspirationem, & ob plurimam ac insuetam potionem meraciorem. Verum hæc affectiones magnitudine inuicem distant. Etenim uehementius humectis uocis instrumentis, uocis interceptio contingit: mediocrius autem rigatis, uox raucosa perficitur. Itaq; qui ex uehementi clamore, amplius uoce uexantur, consimile quiddam patiuntur his, qui reliquis corporis particulis fatigatis & ex labore afflictis afficiuntur. Nam & pellicula quæ arteriæ extremum atq; ipsam asperam arteriam ambit, per magnas uociferationes extra prolato spiritu perculsa, inflammatur. Et iuxta arteriæ extremum, ultra hanc plagam, musculorum ipsum mouentium actio offensa, maiorem adfectionem operatur. Musculi enim illi uocem operantes, ob magnas uociferationes non solum ab erumpente spiritu percussi læduntur: uerum etiam superextensi uehementer, maximum sustinent dolorem. Curatio autem horum coincidit cum his, qui alias particulas corporis habent fatigatas. Balneum enim dulcium & bene temperatarum aquarum magnopere iuuat omnes phonscos Græcis appellatos, qui uocis exercitio magno utuntur: citharædos inquam, & præcones, & tragædos, quum contendendo oblaserint uocem. Quemadmodum autem oleum forinssecus illud omne corpus à fatigatione refocillat: sic & cibi mordacitate carentes & deprimentes, & pharmaca arteriaca uim obstruendi meatus habentia, affectam tum arteriæ, tum musculi pelliculam iuuant. Quum igitur afflictiones uelut distendentes circa extremi ipsius arteriæ musculos, & ipsam pelliculam generantur: in principio quidem lenissima edulia conueniunt

Arteriaca remedia

Vox lesa causa

Vox intercepta
Vox rauca

Phonsci

Simile
Arteriaca obstruenda
medicina

e 4 pharmaca

pharmaca uero obstructoriam meatuum uim habentia. Confecta autem inflammatione aliquod ex modice repurgantibus est adhibendum: deinde rursum aliud, sed priore praestantius, ut paulatim ad medium repurgantium perueniatur: deinde ab hoc adhuc fortius discussorium adhibeatur, ut hoc modo semper ad uehementius progressus fiat, quando uidelicet diutius ueluti indurata adfectio in uocalibus organis perstiterit. Primi itaque ordinis erit tragacanthus, & gummi, & aster samius, amyllumque, & ex halica ac trago probe decoctis sorbitio: lac etiam conueniens est, & dulciani panes, oua sorbilia, & nuxes pinæ madafactæ, sesama, & sapa quæ sireon quoque & hepsēma adpellatur. Hæc itaque inflammationis affectionibus circa arteriam arteriacæ extremum conueniunt: quibus utendum, ut moderatior inflammatio fiat. A uini autem potu abstineant hoc tempore in totum. Postquam autem inflammatio moderatior reddita est, passum theracum exhibendum est, & sapabutyrum quoque conueniens est, & amygdalæ & mel unâ cum sorbitio: nibus decocta, & amyllum ad decoctiones iniectum: quod si non adsit, pennis siligineus siccus contusus & cribro exaussus lacti dum coquitur infarciendus est. Manifestum itaque est, quod per huiusmodi uictum, cum pellicularum, tum musculorum circa arteriæ extremum atque ipsam arteriam, inflammatio sedatur. Relinquitur autem humiditas multa, propter quam impossibile est uocem esse claram, nisi rursus edulsi utantur & pharmacis mordacitate carentibus & repurgantibus: uelut est, faba elixata, & pisana, & semen lini torrefactum. Hæc enim medium obtinent, inter ea quæ mediocri uis prædita sunt, & ea quæ meatus obstruunt pharmaca. His autem amplius repurgat resina terebinthina, & thus cum despumato melle, amygdalæ amaræ, brassicæque probe decocti porri. His uero adhuc fortiora sunt, farina erui, homini semen, iridis radix & panacis. Omnibus autem prædictis maxime mollibus, passum creticum, deinde theracum & scybelites conuenienter miscentur: sapa quoque quam sireon & hepsēma uocant, ex musto ad tertiâ partem mensuræ decocto adparata, omnium maxime meatus obstruit, citra etiam mordacitatem meatus lenit. Quod uero ex cancis adparatur decoctum mellitum, magis discuit ac repurgat. Omnium itaque simplicium pharmacorum uires nosse oportet, cum qui aliquod compositum est facturus. Qui enim eas nouerit, etiam eis quæ ab alijs composita sunt recte utetur, maxime quum indefinite fuerint descripta. His igitur præexplicatis, arteriacas compositiones à ueteribus descriptas subnectemus.

*Simplicium
cognitio ad
quid ualet*

Arteriaca ad uocis asperitates, in principijs exhibita lenissima: gummi drach. ii, tragacanthi drach. i, sapa chœnicem i. Gummi & tragacanthum contusa & cribrata, cum sapa conterere donec dissoluantur: deinde super prunas fumum non emittentes decoque, donec non inquinent testæ instillata. Exhibe autem ex ea sub lingua tenendum. Alia arteriaca. Gummi quincuncem, palsi sextarium i, mellis libram i. Gummi modica aqua dilue,

& ad

& ad reliqua coniectū super prunas non fumantes decoque, ut prædictum est. Ante somnum uero delingendum exhibe.

Antonij Musæ, ad uocis interceptiones.

Brassicæ uiridis cauliculos depurgatos manducandos exhibe, & quod in star palearum exucum est expuere iube: succum autem ipsum deglutire.

Aliud. Succus eryngij aqua decocti heminam i, succi ficuum aqua decoctarum tantundem, mellis bessem, decoque simul diligenter donec ad arteriacæ crassitudinem redigatur, & delingendum exhibe ex eo ante somnum usque ad cyathi mensuram.

Alia arteriaca, ad asperitates, rauicitates, tussescip & sputū sanguinolētum. Amygdalarum amararum decorticatarū numero xxxv, seminis lini torrefacti drach. iiii, tragacanthi drach. ii, oui in fermento afflati uitellum, tragacanthum in modica aqua maceratam, unā cum reliquis omnibus passo excipe. Si uero sonus uocis sit fractus, mel pro passo ammisce, maxime si ex petore aliquid educi oportet. Aliud. Brassicæ succum cum melle decoctum delingendum præbe, & confestim auxiliabitur.

Ad inueteratas affectiones uariæ arteriacæ.

Cap. LII

Oribasij, ad asperitates & suppressam uocem.

CRoci drach. vii, radiceis dulcis, spicæ nardi, cuiusq; drach. iiii, myrhæ drach. iiii, thuris drach. iiii, seminis hyoscyami drach. i, mellis desputati uncias x xv i, piperis albi grana l, exhibe sub lingua tenendam magnitudine fabæ.

Alia arteriaca sub lingua tenenda, ad suppressam uocem, raucosos & cruenta reiectantes.

Tragacanthi drach. vi, gummi drach. vi, zingiberis drach. ii, obolos ii, thuris sesquidrachmam, piperis albi grana xx, croci drach. i, succi radiceis dulcis drach. vi, carnis phoenicobalanorum drach. iiii, passi cretici quantum satis est. Gummi & tragacanthus contusa & cribrata passo macerantur cum radiceis dulcis succo: quod si non adfit succus, radicem tusam, & donec cogatur decoctam coniicimus quadruplici pondere.

Alia arteriaca, quæ etiam ad tussim prodest.

Seminis lini contusi & cribrati, uuarum passerum pinguium & exacinarum, nucum auellandarum mûdatarum, æquales partes in farinam redactas melle cocto sufficienti excipe, & cochleare exhibe ante somnum.

Elegma, quo utimur. Vini scybelitæ chœnicem i, gummi sexuncem, mellis dodrātem. Gummi pauca aqua præmacera, deinde omnia simul contrita in diplomate decoque, ac utere. Aliud, Charixeni. Succus radiceis dulcis drach. v i, tragacanthi drach. vi i, croci drach. ii, zingiberis, thuris, cuiusque drach. i, spicæ nardi drach. i, passi protropi chœnices iiii. decoque donec in mellis modum cogantur, siccis probe commixus, ac utere. Eadem enim potestate ualet qua & sequens.

Charixeni

Aliud

Aliud, sub lingua tenendum, ad suppressam uocem, ac reliquas circa arteriam affectiones.

Tragacanthi drach. xii, gummi drach. xii, zingiberis drach. iiii, thuris drach. iiii, carnis phoenicobalanorum drach. vi, radice dulcis drach. vi, pasci pro tropi aut theraci quantum excipiendis his satis est. Sit autem passum ipsum præcoctum ad mellis crassitudinem. Exhibe fabæ ægyptiæ magnitudine sub lingua detinendum, & dissolutum deglutendum.

Alia arteriaca, faciès ad uocem fractam, raucosam, & suppressam, inflammationes tonsillarum: utilis est phonscis & ante & post certamen exhibita: iuuat refrigeratos: prodest ueteri & recenti tussi, spuentibus sanguinem, & sursum reiectantibus, & coeliacis: conducit etiam ad pulmonis fectorem.

Croci drach. iiii, zingiberis drach. i, succi radice dulcis drach. i, pasci cretici chœnicem i. passum ad tertias decoque & cum eo prædicta excipe, ac utere.

Charixenus
Phonsci

Aliud, ad ulceratam arteriam, Charixeni: conuenit etiam phonscis, hoc est qui uocis exercitio utuntur, ante certamen & post, exhibita: facit & ad circumdolentes oculos, extra imposita lana ex eo madefacta, & ad interaneorum adfectiones delincta.

Gummi drach. xii, tragacanthi drach. xi, thuris drach. iiii, zingiberis drach. iiii, croci drach. ii, succi hypocistidis drach. ii, pasci scybeliæ sextariū unum. Gummi & tragacanthum contundito & cribrato unumquodq; seorsim, & cum modico passo diluito. reliqua uero fracta & præmacerata similiter cum modico passo conterito. Crocum uero in raro laneo panno ligatum, in ollam appendito, in qua reliqua coniecta ac assidue agitata decoquantur: deinde extracto croco, & probe contrito, reliqua omnia in pilam consiciantur, & ut cocta sunt cum croco uniantur, & utitor.

Alia arteriaca, ex cuius usu sæpe magnam laudem adsequutus sum. Nuces pineas sexaginta, amygdalas amaras delibratas quadraginta, carnē phoenicobalanorum sex, succi radice dulcis scrupulos xii, croci scrupulum i, zingiberis scrupulum i, tragacanthi scrupulos vi, pasci cretici quātum sufficit. Quibus uero eductione ex pectore opus fuerit, mel & sapam adde.

Mel & sapam
è pectore edu-
cunt

Alia, Andromachi. Pinguedinis gallinæ recentis quadrantem, mellis heminam i, decoque simul, & cum rutæ ramulis agita donec cogatur. Exhibe eam ieiunis, & post cibum, & ad noctem.

Sorbitio ad suppressum sonum, maxime ab humore: conuenit etiam phonscis.

Porros in aqua ad tertias decoque, atq; ipsos quidem abijce: aquæ uero halicæ succum ammisce, & mel, & ouorum lutea iiii, quæ ubi commiscueris ad tertias decoque, & excola: deinde adfusa sapæ optimæ chœnice una, rursus donec cogantur decoque, ac ramulis anethi circumagita. Da ex ea mane & uesperis cochleare unum.

Arteriaca

Arteriaca necessaria, phonascs commoda: expertus sum etiam eius ualore ad rauescentes ob humiditatem plurimam. Costi, phyllorum, spicæ nardi, amomi, piperis, calsiæ, mastiches, cuiusque drach. v, opij drach. ii, mellis & succi mororum æqualiter mixtorum quantum satis fuerit. Excipe pharmacum cum eis quo viscosa coactio reddatur, & utere. Exhibe sub lingua tenendum magnitudine nucis auellane: caueto ne nimis aquosum facias, ut facilius sub lingua liquecat.

Alia arteriaca, ad affectiones asperæ arteriæ, & pulmonis, ad reiectantes sanguinem, & omnia uitia manifesta: maxime uero prodest crebrum & reiectum anhelitum ducentibus. Scillæ depurgatæ coctæ drach. vi, seminis lini drach. ii, seminis urticæ drach. ii, succi uerbenacæ exiccati drach. ii, thymi drach. i, farinæ erui drach. ii, pulegij, indis, betonicæ, anisi, nasturtij, apij, seminis fœniculi, seminis anethi, piperis, fœni græci, cuiusque drach. i. excipe melle attico: exhibe mane & uesperis quantum cochleari accipi potest.

Alia, ad arteriæ affectiones, & pulmonis ulcera, reiectiones puris & sanguinis, destillationes ad pectus, & ad educationem eorum quæ in pulmone coaceruata sunt ualde efficax. Resinæ terebinthinæ, croci, thuris, myrrhæ troglodyticæ, terræ quæ aster appellatur, cinamomi, tragacanthi, carnis palmarum pinguium, cuiusque drach. iiii, spicæ nardi drach. ii, calsiæ drach. ii, costi drach. i, galbani depurati obolos iiii, mellis attici libras vi. Mel & terebinthinam in diplomate decoque: atque ubi condensari cœperint, galbanum præmollium ammisce, ac donec non inquinari amplius decoque: deinde agitando frigesacito, & cum reliquis contulis in pila permisceto. Vfus eius est sub lingua detentæ.

Alia, quæ similiter ad omnia prædicta efficax est.

Spicæ nardi drachm. iiii, croci drach. i, piperis grana triginta, radicis dulcis drach. i, nucum pinearum depurgatarum numero centum, styracis drach. ii, balaustiorum drachm. iiii, tragacanthi drach. i, cinamomi drach. i, thuris drach. i, mellis lib. iiii. Mel ad spissitudinem decoquitur, & ad reliqua arida in pila trita affunditur. Tragacanthus autem tunditur, cribatur, & diluitur una cum styrace in uino modico dulci, atque ita ammisceatur. Exhibe ex eo cochlearium unum. Expertus enim sum ambo hæc adscripta magna celebritate probari.

Compositio ex capitibus papaueris uaria. Capita papaueris centum & uiginti in aquæ chœnices iiii coniecta, ad dies quinque macerato, deinde ad tertias decoquito, & abiectionis capitibus ad aquam mellis chœnicem i, ammisce: quibus simul ad spissitudinem mellis decoctis, quod in attollendo agnosces, croci, myrrhæ, acaciæ, succi hypocistidis singulorum drachm. i, infarcito, & ante somnum delingendum exhibeto. Prodest reiectantibus sanguinem, cœliacis ac dysentericis. Ego autem ad huiusmodi ex capitibus papaueris compositionem, quando scilicet ad sextarium unum aquæ, decem papaueris capita injiciuntur, prædicta commisco

lico

leo, & pro pharmaco fluxiones sistente ac repressiuo utor.

PANACEA Alia, ex libris Asclepiadæ, panacea Michridatis. His qui uocis exercitio
Michridatis utuntur ante & post certamen utilis: facit ad glandularum inflammationes, columnellam laxatam, & ad gingiuas humore turgentes, & ulcera serpentina oris, ad motos dentes, & destillationem, tussim ueterem & recentem citra admixtionem, aliquando autem passo aut scybelite uino, aut aqua calida diluta. Etenim ad tonsillarum inflammationes atq; con similes adfectiones utendum est pharmaco hoc diluto: ad eas uero quæ in profundo hærent, immixto & puro. Verum compositio ipsa hoc modo habet. Radices filicis quàm crassissimæ diligenter lauantur, donec terrenæ sordes in totum discedant, deinde refrigerantur, in frusta digitali magnitudine dissectæ: ex quibus xxxiii frusta accipimus, & capita papaueris agrestis mediocria centum & quinquaginta, radices symphyti depuratæ, corticis radices mandragoræ, rhei ponici, rosarum siccarum, iridis illyricæ, radices dulcis, balaustrorum, singulorum quadrantem, calsiæ trientem, nardi celticæ sesquunciâ, aquæ pluuialis chœnices quindecim. Omnia prædicta crasso modo contunduntur & per triduum madescunt, deinde sequenti die in diplomate ad tertias decoquuntur, exprimuntur & percolantur: in huius autem decocti parte, subscripta per diem & noctem maceramus. Sunt autem gummi puri libra i, tragacanthi pellucidi libra i, myrrhæ troglodyticæ sextans, succi radices dulcis sextans, croci sextans, mastiches unc. i. Sequenti deinde die diligenter & paulatim hæc trita diluimus: & quod superest ex ipso decocto in uas fictile diffusum rursus decoquimus, donec ad mellis crassitudinem redigatur: deinde adiectis etiam tritis omnibus, rursus ad coactionem decoquimus, & ablatis utimur. Datur ex hac quantum cochleari excipi potest.

Compositio ex capitibus papaueris, ad ruses humidus, dolore adfectam arteriâ & fauces, & ad destillationes à capite ad pectus: utilis est etiam ad uigilias. Capita papaueris Thebaici mediocria unâ cum ipso semine decem, aquæ pluuialis chœnicem i, radices dulcis parum quiddam, per diem unum præmacerato, deinde donec flaccida tactu fiant capita decoquito, ex primito & percolato, æ ad decoctum dimidium eius mellis adijcito, & rursus super prunas ad mellis crassitudinem decoquito, ac utitor. Accuratio huius antidoti adparatus, atq; etiâ partim usus, prædictus est Sermone quinto De proprijs agrorum potionibus, loco. Quod si magis adstringens alui profluuiorum facere uelis, & sanguinem spu entibus commodû, succi rhois rubri drach. ii, adijce, & acaciæ drach. ii. hæc autem in passo diluta, tum demum quum ab igne ablaturus es phar macum, in ollam conijce, & parum per ferue fieri sine, ac utere, cochlearium exhibens ante somnum.

De destillatione siue catarrho, & narium mucos, ex Galeno. Cap. Liii

Destillationis & muci causa est cerebrum, quod quidem à frigore ad frigidam intemperiem deducitur, ab æstu uero calefit & repletur. Vinum quoq;

quoq; ultra modum potatū caput replet, & balnea calidiora, & largior per-
fusio capitis ex aqua calida, maxime si alias calidius caput existat: & cibus sa-
nè qui in uētre incoctus perseverat, neq; infra excernitur, in caput impetum
facit. Repletum itaq; caput rursus ad subiecta membra humores demittit
& siquidem ad nares hoc ipsum extremētum defluat, coryza siue mucum
adpellare consueverunt: & Latini amplius grauedinem: si uero ad gurgulio-
nem, qui & uua adpellatur, defertur, catarrhum seu destillationem generat:
quæ ipsa adfectio circa gurgulionem consistens aliquando tumorem exci-
tat in ipso. Promptissima itaq; est ad nares & ad os defluxus delatio, quam
uis aliquibus etiam ad oculos, aliquando & ad aures deferatur. Atqui dela-
tionem ad os etiam stomachus siue gula excipit, & aspera arteria, atque ip-
sum ad co arteriæ extremum. Quod sanè extremū, ob ipsum ad se delatum
à capite defluxum superhumectatum: in principio raucofam uocem produ-
cit, & progressu temporis etiam paruam. Quod si amplius augetur malum,
uox ipsa in totum perditur. Nam ipsa aspera arteria unā cum suo extremo
obtorquetur. At si acior fluxus ipse existat, non tantū uocis, damnum prædi-
ctæ particulæ patiuntur, sed grauissima etiā erosio ad hanc naturā accedit,
quales circa cutem accidere sepe uidemus citra ullam externā causam: eoq;
modo etiam pulmo ipsis exulceratur: uocaturq; hæc adfectio tabes. Quod
si ad gulam & in uentriculum fluxus deferatur, siquidem frigidus existat, in
frigidam intemperiem corpora perducit, calidus uero in intemperiem cali-
dam: exulcerat etiam ea temporis progressu, in principio uero appetitioni
nocet & concoctioni. Si itaq; frigidus fuerit defluxus, tardas concoctiones,
& cruditates, ac ructus acidos efficit. Si uero corruptus fuerit, in corruptio-
nem adiget cibos: unde nidorose, aut foetentes, aut acide eructationes pro-
ducentur, aut etiam alterius cuiusdam quæ nominari non potest, aut etiam
nomen habentis qualitatē. Vbi uero altius penetrarit nocumentum, etiam
intestinum iciumum adficit, & ad colum usq; pertingit, atq; ad mesenterij ue-
narum uasa, per quæ ad hepar distributio atq; digestio alimenti contingit:
aliquibus itaque defectio appetitus accidit, aliquibus uero appetitiones re-
rum præter naturam, quas adpellat caninas, aut etiam uiciosorum ciborum
concupiscentia, qualis mulieribus prægnantibus pica morbo infestatis coti-
tingere consuevit. Manifestum autem est & gurgulionem & tonsillas adfi-
ci. Quin & parulides & glandulæ, & dentium erosiones, ulcerationesq; &
putredines oris, ad ferolas ex capite in ipsum os destillationes sequuntur.
Cæterum uulgus medicorum aut gurgulionem resecat, aut pharmaca exhi-
bet quæ per asperam arteriam sputi eiectione in pulmonē dilapsa educant:
uentriculum uero nihil male adfectum suspicatur: quemadmodum etiam
aliq; neq; dentes, neq; os, neq; nares, neq; oculos, neq; aures inde affici præ-
iudicant. Principium inuentionis Galeni. Melius autem erat, mea
quidem opinione, uelut fontem malorum excindere, sanato uidelicet capi-
te, quod

*omnia ista que sequuntur
habent a gal. in d. spum.
val. ad*

*Coryza, mu-
cus, grauedo*

*Vox quomodo
intercipitur*

*Tabis genera-
tio*

*Ex defluxu a capite quidam, seu
defectio appetitus, quidam ap-
petitus caninus.*

f te, quod

*Indicatio
curationis*

te: quod si impossibile sit facere, ob uehementiam naturalis intemperiei, omnino tamen eius saluti consulere oportet, indicatione ex figura ipsius accepta quomodo ei subueniri possit: non enim mox ueluti aliqui medici omnibus capitibus semper ex thapsia & sinapi cataplasma adhibent, sic & te facere uolo. Extenuum si a calida intemperie caput uexatur, omnia calida pharmaca nociua existunt. Oportet itaque ipsos balneis multis calidis potabilibus & dulcium aquarum consolari, simulque generatos in capite uapores calidos discutere, & complexionem omnem in melius mutare. Nocuius autem est eis usus

Aquarum natura sua calidarum uires

aquarum natura sua calidarum. Quaecunque enim sulphurenta sunt & bitumen olent, coarctatione sua caput offendunt uerum calidas dulces non adpellamus sua natura calidas: neque enim inuenire est quae suapte natura calidae existant, ac non aliqua medicamentaria qualitate participant. Qui uero caput uehementer calidum & perustum habent, & ob id assidue a destillationibus uexantur, his melius est hora aestiua ex rosacco ungi, ex solis rosis & omphacino oleo citra spissam etorum adiectionem adparato. Quaedam autem capita propter calidiorem arteriarum temperaturam tum uertigine, tum capitis dolore adprehenduntur: in quibus etiam arteriarum incisione utimur. Quare considerare oportet praecedentem destillationis causam, & praehabitam dietam, atque ita remedia contraria afferre: in uniuersum autem paucis cibo & quiete utendum est, uitato etiam frigore & calore: si uero tibi incocti amplius in uentre innatent, ad uomitum aeger est inhortandus.

Arteriarum sectio

Plantarum frictio destillationi comoda

Philumeni. Valde utile est his qui destillationem patiuntur, si eorum plantae pedis cum pice in oleo plurimo dissoluta constanter fricentur, ex ea demum inguina & lodes perungantur: nares uero ex thure & myrrha cum uino & oleo contritis, ac ad mellis crassitudinem reductis illinantur, & unguentum irinum simul naribus instilletur. Melanchium etiam torrefactum lintecolo illigatum odorent, aut hedychroon manibus teneant & assidue odorent, aut cyphi eodem modo. Conuenit etiam inflammationem arcentia emplastra fronti imponere, uelut est Icesia, & emplastrum oxcrum adpellatum, itemque barbarum cruentis uulneribus destinatum, & athena. Gargarissent autem assidue passum scybelites, aut sapam calidam: sorbitionibus uero utantur decocto hyssopi, ficuum & nucum pinearum, atque iridis, item halica ex passo decocta. Si uero ab his nihil leniatur destillatio, neque tamen amplius augetur, sed eodem modo ad plures dies persistat, praesentissimum auxilium capitis irroratio existit, maxime in aestate, & capitis temperatura calidiore. Oportet autem in balneis ex alto frigida aqua delabente caput subdere, ut uiolentum inde sustineat insultum: cucstigio enim destitatem dissoluit. Animaduersionem tamen habere oportet, an thorax inde facile offendipossit: consuevit enim prompte a capite frigiditatem transsumere, ac fortissimas uexationes perferre. Porro diurnas destillationes fortis clyster faciat, aut uomitus a raphanis ieiunis factus, aut purgatio exuberantis humoris, &

Irroratio capitis

ris, &

ris. Et irrigatio capitis ex unguento irino, aut optimo nardino. His uero qui continua & inueterata iam destillatione adficiuntur, caput radere oportet, & factis scarificationibus bituminosa emplastra imponere: pharmacis autē deglutitijs utendum huiusmodi. Eclegma ad destillationem.

Mellis sextantem, butyri recentis unc. 1, decoque, & in duas partes diuisum delingendum exhibe, his qui eductione opus habent.

Manducatio ad eandem. Semen hormini, semen papaueris, semen lini torrefactum, contunde, & cribro exute, melleq; cocto exceptum, com manducandum mane exhibe. Probe etiam ad destillationes facit antido tus ex capitibus papaueris soporifera, ante somnum exhibita: etenim som num dulcem infert, & reprimat influxum. Eius adparatus paulo ante inter arteriacas compositiones dictus est, & in quinto similiter sermone De pro prijs ægrorum potionibus loco.

Catapodium ualde celebre ac dolorem leuans.

Syracis drach. ʒ 1, zingiberis drachmam unam & dimidiam, terebinthinæ drach. 11, opopanax drach. 11, iridis drach. 11, piperis albi, spicæ nardi, niri, seminis hyoscyami, opij, cuiusque drach. 1. arida contundito ac cribrato, reli qua uero in pila citra liquoris admixtionē contusa simul committito, & gra na in erui magnitudinem informata ante somnum deglutienda exhibeto, neq; quicquā ultra sorbitionis admittito. Dantur ad summum grana 1111, medium 111, minimum 11. Aliud: quod etiam dolorem leuans, tum tussi, tum destillationi opitulatur. Syracis, drachm. 1111, zingiberis drach. 1, opij drach. 1, galbani drach. 1, contunde in pila, & sapa affusa subige, & cata podia erui magnitudine informa, quorum similiter ad summum 1111 exhi be, medium 111, minimū 11. absorbeant etiam insuper palsi calidi diluti cy a thos duos. Asclepiadæ remedium. Pyretri drachm. 11, piperis albi

Capitis diarrhœ

Stermutoria

drach. 1, contusa & cribrata reponere. Vsu uero expetente apprehensis naribus pharmacum adtrahere præcipe. Aliud. Piperis drach. 11, seminis urticæ drach. 1, croci, zingiberis, costi, cuiusque drach. 1. Vtere ut dictum est. Caseus autem tener & recens comestus utilis est, & cauliculi brasiicæ crudi à ieiunis comesti, similiter & brasiica calidior cocta & comesta. Qui uero ca lidiori præditi sunt temperatura, lactucæ cauliculos parumper feruifectos comedant, in posca madefectos.

De tussi.

Cap. 1111

TVisis causis uariæ sunt. Nam & humor à capite ad asperam arteriam destillans tussim efficit, & asperitas sola pellicula asperam arteriam in trinsecus ambientis tussim iritat qui præterlabitur etiam cibi ac potus tussim mouent: & lumbrici stomachum infestantes, tussiculas paruas excitant: & acris humor stomachum perturbans, ac irritatiuam aliquam qualitatem ad fauces demittens, imaginariam tussim producit, quemadmodum etiam in his qui stomachi mortuum sentiunt, & saliuæ ad eum influxu uexantur,

Tussis causæ

f 2 cucurere

euenire solet, quum nihil molesti iuxta asperam arteriam obuersetur. Intemperies quoq; frigida respirationis instrumentorum, tussis causa existit: eorum hi moderate ac minime uolenter tussunt, adeo ut non solum per spiritus compressionem, retinere queant & impedire tussim, sed sanare etiam facillime, per respirationis inhibitionem frigefactas particulas calefaciendo. Signum autem ob solam intemperiem frigidam tussientium est, si per crebras inspirationes irritentur, frigidityte uidelicet exinde intensiore facta & aucta. Quando igitur hi leniter inspirant ac aerem adtrahunt, & in calida domo uersantur, parum uel omnino nihil tussunt. Quæ uero cum titillatione partium, ab utraq; palati parte contingunt tussis, palam ostendunt de fluxum à capite ad asperam arteriam deferri, itemq; ad pulmonem, quod si nihil expuant sic adfecti, tenuem esse defluxum indicat, qui expulsionem spiritus dissecit, præ tenuitate sua rursus fluxum reflectit: id uero ex humore per spiritum reiecto manifeste apparet: crassiotem enim priore habet compositionem, etiam si sit à spiritus impulsione reiectum. Manifestum autem est, quod humor in pulmone & thorace detentus, in morbo laterali, inflammatione pulmonis, & tabe, maximæ tussis causa existit. Medemur autem tussi à tenui defluxu factæ, per antidotum ex papaueris capitibus inspissantes, aut per alterius cuiusdam pharmaci dolorem leuantes ulum, & per cibos boni succi. Si uero crassius aut uiscosus fuerit affligens humor, per ea quæ extenuant & discindunt medebimur. Instrumentorum autem respirandi frigiditytatem per calefactionem emendamus. Quæ uero ab asperitate fit, per lenientiam & mordacitatem arcentia sanatur, qualia sunt ex arteriacis compositionibus simpliciora. His itaq; præexplicatis, ea quæ à ueteribus descripta sunt ad tussim remedia subnectemus. Nos uero ad præscriptam methodum animi conuertentes, atq; uniuscuiusq; simplicium pharmacorum uires edocti, facile ad quacumq; affectionem conuenientia remedia afferemus, etiam si à prisca indefinita sint descripta. Remedia autem hæc sunt. Stryx, nucis auellanæ magnitudine deuoratus, tussis sedat ac destillationes. Utilis est etiam ad raucedinem. Aliud. Ficus siccas pingues in uino dulci diluto madefactas, unâ cum uino deuorandas exhibe: hoc enim attenuat, & educit. Aliud. Filicem contusam & cribratam passo instar farinæ insperge, & absorbendam exhibe. Prodest etiam sanguinem reiectantibus.

Methodi
utilitas

Aliud, quod ad tussis noctu molestiam exhibentes conducit. Mentæ ramulos tritos, affuso aceti cochleari, ante somnum absorbendos præbe. Adiuvat concoctionem, stomacho utile est, & crassitiem discindit.

Aliud. Nucum pinearum torrefactarum, amyli, radicis dulcis, seminis urticæ, cuiusq; sextantem, iridis, piperis, hyssopi, seminis nasturtij, amygdalarum amararum, singulorum unciam 1. Excipe melle probe despumato, & præbe ex eo cochlearium mediocriter.

Compositio ex marrubio ad tussim.

Marrubij sextantem, hyssopi unciam

undiam i, iris drach. iiii, pulegij drach. iiii, calaminthæ montanæ drach. iiii, bulborum scillæ scrupulos vi, nucem unā pincam bonam & integram, caricas pingues v, aquæ chœnicem unā & dimidiam, mellis heminam unam, utere. Edegma tussientibus aptum. Nucum pincarum repurgatarum drach. xii, palmarum pinguium drach. xviii, iris drach. xii, seminis lini torrefacti drach. viii, tragacanthi drach. xii, amygdalarum dulcium delibratarum drach. xvi, mellis despumati quantum sufficit. Tragacanthum in uino dulci modico maceratam & dilutam, primum cum despumato melle decoquito, atq; ubi semel ebullierit, reliquis in mortario probe contritis affundito, & utitor, cochlearium exhibens mane & uespere de digito delingendum. Mellis enim tantum adhibere oportet, ut delingibile pharmacum fiat. Aliud edegma ad tussis recentes. Vini dulcis ucteris chœnicem i, mellis attici libram i, decoque, cum rutæ ramulis assidue agitando: exhibe ex eo mystri i mensura. Est etiam utile stomacho.

Alia remedia ad tussim conducentia.

Coptarium, hoc est placentula, tussi accommodata.

Seminis lini contusi & cribrati, uuæ passæ pinguis & exacinata, cuiusq; chœnicem italicam i, nucum pincarum torrefactarum, nucum auellandarū repurgatarum, singulorum chœnices tres & dimidiam, piperis sextantem, zingiberis unc. i, croci unc. i, mellis sextarios iiii. Semen lini contusum cum melle decoquito: atque ubi coactum fuerit & inspissatum, reliqua optime contrita ammisceto, & simul unito. Exhibe ex eo magnitudine nucis auellanæ.

Ad tussim inueteratam remedium optimum.

Cumini, piperis, seminis urticæ, cuiusq; unc. i, mellis despumati chœnicem i, contrita cum melle subigito, ac parumper feruifacito, reponito: ac utitor ex eo præbens cochlearium delingendum. Aliud admirabile.

Piperis, pulegij, hyssopi, calaminthæ, cuiusq; sextantem, petroselinū unc. i, mellis despumati chœnicem i. da cochlearium. Aliud simplicius bonum.

Mellis quadrantem, butyri recentis quadrantem, cumini quā tenuissimè triti drach. iiii, Melli prius despumato butyrum ammisceto, & simul calefactis cuminum insperge, & paulatim delingendum cochlearium unum exhibe.

Aliud, ad tussis pituitam repurgans.

Hyssopi unc. i, pulegij sextantem, iris, sinapis, cuiusq; drac. i, melle despumato. sufficiens excipe & cochlearium exhibe. Hyemis autem tempore, & febre non infestante accepturum: piperis etiam sextantem adijce.

Aliud, ad diuturnas tussis.

Comæ hyssopi, pulegij, perisynces, ammi, piperis, crui tussis decorticati, iris cuiusq; sexuncem, spicæ nardi drach. iiii, terebinthinæ trientem, butyri recentis sextantem, mellis despumati chœnices ii. Butyrum & terebinthinam cum melle liquefacto, ac reliquis unito: utere exhibitio cochleari paruo.

Aliud, thoracis affectionibus commodum. Lomenti fabacei tenuis

f 3 sine

lime tritici septuncem, iridis contritiæ quadrantem, nucum pinearum torrefactarum drach. ii, pulegij usti drach. ii, seminis urticæ drach. i, piperis drach. ii, mellis despumati chœnicem i. Melli despumato lomentum insperge ac parumper decoque: deinde reliquis in mortario ammixtis utere.

Aliud, Acholij. Hyssopi, pulegij, ammi, piperis, erui rufi, iridis, cuiusq; drach. vi, cerebinthinae drach. ii, spicæ nardi drach. ii, butyri recentis sextantem, mellis despumati sesquibram, utere.

Aliud, ad tussim ex styrace. Amomi sextantem, cassiæ sextantem, styracis sesquunciam, spicæ nardi sesquunciam, croci unci. i, piperis unc. i, mellis despumati chœnicem i. exhibe cochlearium. Ad tussim siccam.

Siccam tussim sanant etiam paulo ante præscripta pharmaca. Aliquando autem & aquæ feruifactæ sorbitio. Qui enim ob pituitæ crassitudinem nihil educere possunt, ab humectantibus plus emolumenti sentiunt: maxime si simul extenuatoria participant facultate.

De pharmacis dolorem leuantibus & simul
conferentibus tussi.

Cap. LV

Hocce pharmacorû dolorem leuantium genus, hi qui ante ætatem nostram fuerunt, composuerunt, tussientibus & sanguinem reiectantibus præcipue conducens: atque etiam his, qui ultra has affectiones tabescunt itemq; ad alios dolores & affectiones quæcûq; circa pulmonem & pectus, ac asperam arteriam, reliquaq; interiora membra consistunt, præterquam quæ proprie colicæ appellantur. Differunt enim hæc à colicis similiter anodynis, hoc est dolorem leuantibus appellatis, tum aromatum & odoratorum seminum, tum eorum quæ urinam cient admixtione. Colicæ autem facultates his uehementiores sunt, excellentem uim stupefactoriam complectæ, ob multitudinem uidelicet eorum quæ refrigerantis naturæ existunt, uelut est hyoscyami semen, & cicuta, papaueris succus, & mādāgoræ cortex quibus sanè ad colicos necessariò ob doloris magnitudinem utimur. Atqui in thoracis affectionibus aliqui styracē & crocum ammiscuerunt: aliqui autem calefaciētia: alij etiam aromatica, & cum pauca ui adstrictoria exsiccantia: quidam etiam nobis familiaria, uelut anisum, apium, foeniculū, daucum, & fœli, quæ uehementium pharmacorum uires & iniucunditatem obtundunt, ampliusq; urinam expellūt: quidam etiam ea quæ asperitates leniunt addidere, uelut est tragacanthus & radix dulcis, ac uinum dulce. Quæcûq; autem ex his, de pharmacis stuporem inducentibus minus participant: ea etiam tabidis exhibemus. Sunt autem à ueteribus composita doloris leuantia huiusmodi. Catapotium. Pharmacum ad tussim accomodatū, in ueterata in maxime existente affectione. Efficax est ad diuturnam destillationem, dolorem capitis, difficulter spirantes, & inflammationes pulmonis, ad uesciæ quoq; ac uulue affectiones. inscribitur Panacea, ab alijs etiam Suchus. Myrrhæ, opij, piperis, styracis, castorei, galbani, æquales partes

Colica anodyna stupefaciūt

Panacea qui
Stichus

partes cum sapa dulci subige, & in catapotij figuram redige, ac ciccris magnitudine exhibe: absorbeat autem à sumptione aquæ mullæ cyathos duos.

Harmonia. Aliud pharmacum uehementer efficax, quod harmoniæ adpellatione inscribitur: ualet ad destillationes, & inexuperabilem defluxû: Harmonia
Styracis, castorei, piperis, cardamomi, cuiusq; drach. iiii, opij, zingiberis, seminis hyoscyami albi, cuiusq; drach. iiii, passo probe cocto excipe, & catapotia ciccris magnitudine informa, & ante somnum prabe deuoranda.

Alia confectio, ad tussés diurnas egregie & concinne ualens: itemq; Symphonos
Lexipretos
ad humentes & ob humoris crassitudinem diu durantes, quæ Symphonos adpellatur: & febrem optime sedat. Ea omnes ueteres celebres usi sunt.

Piperis, opij, cardamomi, cuiusq; drach. i, croci, sulphuris utui, zingiberis, seminis hyoscyami albi, cuiusque drach. iiii, mellis cocti cochlearia iiii. Hoc enim modo nos apparamus: uerum sunt qui gentianæ, & dauci, cuiusq; drachmas ii, ammiscent. Alia, ad tussim & tabem isostathmos appellata. Isostathmos

Phylli, petroselini, hyssopi, rosarum siccarum, anisi, opij, croci, costi, seminis Isostathmos
nis hyoscyami, myrrhæ troglodyticæ, spicæ nardi, iridis, æquales partes cum melle sufficienti subige, datur fabæ magnitudine ad noctem.

Alia, isotheos adpellata, ad tussim, tabem, omnes morbos internos, & certo circuitu affligentes affectiones. Isotheos
Spicæ nardi drach. ii, myrrhæ drach. i, croci, costi, piperis albi, cuiusq; drach. i, galbani drach. i, opobalsami, cinamomi, mandragoræ succi sicci, castorei, cuiusq; drachmas duas, seminis dauci sesquidrachmam, mellis despumati quantum satis erit. Facit ad dolorem stomachi, iecoris, pulmonis, oculorum, sanguinis reiectionem, abscessus dysentericos, uoluum, renum ac coxendicum affectiones, difficulter suspirantes, dolores laterum, unice tamen iliorum, profluuium muliebre, & muliebres suffocationes. Prodest cõtra lethalia uenena ante & post cibum sumpta, & ad omnem sanguinis eruptionem cum frigida, ad uiperæ & phalangij morsus in uini cyathis iiii. quartanarijs ante febris accessiõnem dantur ex ea oboli duo, sed præloti tamen antea ægro: Sanat ægre spirantes, & qui nisi erecti spiritû ducere non possunt, & anhelosos, etiam si iam ad multos annos affectio durauit. Sanat quoq; antiquas à capite ad pectus defluxiones.

De suffitionibus.

Cap. LVI

Q Vanquam antea sufficiētissimè de suffitionibus dictum sit, in sermone De clysteribus & euacuantibus ac alijs quæ ægris offeruntur, qui sane tertius huius operis fuit, dicitur tamen nunc quoq; sed paucis.

Pastillus suffumigabilis tussientibus & orthopnoicis commodus.

Abrotoni, sandarachæ, sinapis, cardamomi, æquales partes contundito & cribrato, & cum aqua in pastillos redigito ac suffito, ita ut æger ore fumum suscipiat. Alius pastillus. Sandarachæ sextantem, terebinthinæ sextantem, costi scrupulos vi, laseris scrupulos iiii, piperis grana xli, redige in pastillos ac utere eodem modo. Alius. Castorei, sandarachæ, galba-

f 4 ni, sul

ni, sulphuris uiui, colophoniz, propolis, terebinthinæ, mastiches, croci, chamæleuces: his conyzam paruaui aut capparis corticem adijce.

Suffumigium ex illi rebus Aliud bonum suffumigium, per experientiam à nobis inuentum, quatuor speciebus constans. Styrcis, terebinthinæ, sandarachæ, mastiches, æquales partes excipe, ac similiter utere. Creditur anhelosos & purulentos sanare: itemq; tussim & laterum adfectiones, quemadmodum etiam ea quæ paulo ante hic sunt præscripta, atq; ea quoq; quæ tradidimus in tertio sermone.

Epithema ad tussim optimum, ex fertula campana. Samsuci, fertulæ campanæ, prassij, iridis, cuiusq; sextantem, zingiberis unc. i, thuris quadrantem, resinæ pinus libram i, olei ricini libram i, utere.

De orthopnoicis, anhelosis, ac ægre spiritum ducentibus, ex Galeno.

Cap. LVII

Asthmatici, anhelosi, Orthopnoici

Qui frequenter respirant citra febrem, quemadmodum solent à uehementi cursu fatigati, eos asthmaticos, hoc est anhelosos, medici uocare consueuerunt, ab accidente uidelicet, hoc est anhelando: eosdem etiam ab altero accidente orthopnoicos adpellant. desident enim ac pectus erectum habere uidentur, ob timorem ne suffocentur: & stratum quoq; iuxta superiores partes, ad quas pectus ipsum reclinatur, erectius sibi adparant, ne dormientes strangulentur. Inspiratio enim minor ipsis contingit, quàm respirationis frequentia exposulat, quamuis pectus plurimum ipsis diducatur. Ex quo manifestum sit, coarctatione locorum præter naturam intrinsecus adesse, cuius etiam manifeste ægri sensum perceptant. Fit autem coarctatio locorum inspirationis, quum aut crassorum & tenacium humorum multitudo pulmonis bronchia obstruxit, aut tumor quispia abscessui similis in ipso consistat. Similiter autem difficulter spirant, qui asperam arteriam à multa destillatione habent repletam: qui sanè defluxione ex uicinis locis acutatim in ipsas arterias delabente, facile distinguunt inuicem has adfectiones: nempe quod destillatio etiam sanis ex manifesta causa repente accidit, in totum serè citra febrem, concomitantibus etià proprijs destillationis signis. Si uero tumor abscessui similis in pulmone fiat, necessario febris consequitur: neq; ita diu post, inflammatione in pus transmutata, pus rejicitur cum tussi. Si autem crudum tuberculum gignatur, uelut Antipatro medico contigit, iuxta leues pulmonis arterias, hi neq; grauitatem magnam sentiunt, neq; ab orthopnoia in tantum infestantur. Qui uero proprie orthopnoici & difficulter spirantes adpellantur, in totum febrem non habent: grauitatis autem sensus eis contingit, neq; quippiam purulentum per sputum reieciunt. Porro curatio prædictarum adfectionum quiddam commune habet, quiddam etiam cuiq; proprium. Commune quidem ut superflua substantia humoris has adfectiones generantis consumatur & expendatur. Proprium uero ut si à crasis & tenacibus humoribus fiant, per extenuantia & incisua phar maca consumptio fiat: si uero à tumoribus abscessui similibus adfectiones fiant

Bronchia pulmonis

Antipater

fiant, per extenuantia & deficcantia confumantur: quæ curatio omnibus in profundo corporis abscessibus communis existit. Vini autem potio ambabus conuenit tenuis saltem temperaturæ: in uniuersum autem paucus potus conuenit, quibus abscessus alicubi adest: multis uero quibus bronchia tenacibus & crassis humoribus sunt obstructa. Etenim repurgantia hos humores pharmaca necessario tussis commouent: uerum non facile per sputum rejicitur ob crassitudinem id quod repurgatū est humectatione igitur multa indiget, quo facilius efferatur: & ob id sanè largior potus anhelosis est exhibendus. Pharmaca uero eis conueniunt incidentia citra uehementem calefactionem. Crassi enim & tenaces humores à uehementi calore uiscosiores redduntur, glutinosi quæ, & ut difficulter auelli possint: quapropter maxime prodest eis acetum scillinum, & ipsa quoque scilla assa cum melle tria & delincta, & acetum mulfum ex ea adparatum. Maximum autem remedium, inquit Archigenes, purgatio frequetior existit per pharmaca fortiora: & uolunt à radicibus, per interualla suscepti. Cataplasmata uero ex ficibus & ordeacea farina: magis uero ex loliacea habente resinam & mel ac ceram ammixta infarciri potest etiam ei iris & manna. Malagmata autem conueniunt, quæcumque exulcerant cutem & attrahunt saniem: quale est Cissophonitis, & quod constat ex baccis lauri: & quod ex semine rosmarini constat: & emplastrū ex herbis: & quod icesiū adpellatur: itemque quod uocatur Thrasee. Quod uero cyzicenum emplastrum dicitur, si irim, aut cerati æqualcm sibi portionem assumat & uniuerso pectori imponatur, humiditates consumit, & habitum corroborat. Omnium autem conuenientissimum huic affectioni hocce est, inquit Archigenes.

Largior potus anhelosis commodus

Emplastrum nigrum Archigenis. Cerae libram 1, resinæ pinus sicæ lib. 1, iridis sesquibram, bituminis lib. 1, picis lib. 1, æruginis unciam 1, zingiberis sexuncem, thuris sexuncem, radicis cucumeris syluestris, centaureæ, lapidis asij, styracis, cuiusque sextantem, misyos crudi sesquiunciam, chalcitidis crudæ sesquiunciam, salis ammoniaci unc. 1, galbani, terræ cimolique, terræ ampelidis, cuiusque unc. 1, olei libras 11, aceti lib. 1. aut ut ego soleo lib. 11. Styracem cum modico oleo liquefactum in mortario probe contere: metallica uero cum aceto dissolue: herbas autem contunde & cinbre excute: liquefactis uero quæ eliquari possunt, & percolatis, ac ab igne ablatis, contrita adijce, atque herbas insperge, omnibus autem simul unitis & emollitis utere. Hoc sanè multos occultos abscessus discutit, & in uaporem resoluit, alios autem aperit: quicunque autem iam rupti sunt, & fluidi tamen adhuc permanent, eos mirabiliter exsiccant. Eiusmodi enim pharmacis uix aliud præstantius reperiri possit. Conueniens est etiam prædictis affectionibus Amythaonis epithema, atque eo adhuc magis Polyarchion, maxime tempore coarctationis locorum. Pectus uero cum urticis confricetur ac credatur, deinde lauacro ac oleo calido loci rubefacti curetur: assidue autem lenioribus solutiuis aluum emollire

Epithema Amythaonis. Polyarchion

emollire oportet: quale est, cnicus acetabula duo optime confusa & cum sero lactis decocta: ita ut percolatum serum, & modico melle permixtum bibatur. utendum est etiam ex thymo, lasere, & pipere falsamentis, quibus addita est scammonia, aut etiam his quę sunt ex rosmarino. Ego uero etiam herba fabina: optimum usum expertus sum, si per seipsam drachma pondere trita sumatur, & sequenti die duarum drachmarum pondere, tertia trium. In aliquibus autem & quarta die usque ad quartam drachmam pondus auxi. Quod si bene procedat purgatio, si mulier cruenta educat, non est quem non melius spirantem in posterum reddat. Porro interiectis duobus aut tribus diebus, absinthium potandum exhibui, maxime si stomacho aeger langueat: quod si non contingat stomachum languescere, irim bibendam dedi, aut abrotonum, aut castorium ex aceto mulso. Mirum in modum autem efflux cax est, quod ex elaterio constat & octaobolon appellatur. Elaterij aereolos 11, spumę nitrı obolos 111, sinapis drach. 1. hæc in aqua diluta in octo capitota informo: maneque duo, tantundemque uesperı exhibeo. Purgat enim citra molestiam superne, aliquandiu quidem permanens & soluens. His uero qui robustiores sunt, post trium dierum spatium rursus exhibeo. Atque hæc ex colocynthide constat hiera nostra, hoc est Archigenis, assidue præbita mitiorem spirandi difficultatem corripit sæpissime, atque id breui & perfecte. Verum si magis in profundo hæserit, auxiliatur cum aceto mulso potata. Aliud, ad difficulter spirantes, qui etiam asthmatici adpellantur. Aristolochiæ, clematidis, abrotoni, sulphuris uiui, seminis rutæ agrestis, cumminum thymi, ammoniaci thymiamatis, æquales partes cum aceto tritas in pastillos redige, & ex eis obolos 111 exhibe cum aceto mulso ad triduum.

Aliā remedia asthmaticis commoda, ex Asclepiade & Dioscoride. Aristolochia rotunda cum aqua bibita, anhelosis auxiliatur: item centaureæ maioris radix, & minoris succus: & stœchas trita ac cum aqua potata, & sphondylii semen, & calaminthæ montanæ coma, & hyssopū, & iris, ac melanthum, & radícula alba. item asellos, qui & millepedæ appellantur, sub aquario uasæ stabulantes, sextarij mensura in fictile uas coniectos, ad carbonem ignitos torrefacito, atque ubi inalbuerint terito, ac melle exceptos cocto, ante & post cibum duorum cochleariorū mensura delingendos exhibeto.

Aliud. Scillæ crudum succum exprime, & cum eiusdem mensuræ melle permixtum ad prunas decoque, eiusque cochlearia 11 delingenda præbe ante & post cibum. Summe autem hoc prodest, euidentisque eius rei periculum feci, inquit Archigenes. Aliud, Archigenis. Radicis centaureæ maioris drach. 1, petroselini drach. 1, ammoniaci thymiamatis drac. 111, sulphuris uiui, bituminis, cardamomi, radicis panacis, seminis urticæ, iridis illyricæ, cuiusque drach. 11, thuris, zingiberis, castorei, nitrı, sagapeni, abrotoni, polij, chamæpityos, saluiæ, cuiusque drach. 1, piperis albi drach. 111. Hæc omnia trita cum melle miscentur despumato, dantur ex hoc oboli 111. Extremum asidue

Vomitorium
octaobolon

Hiera Archigenis

Aselli in
eclegmate

due potatum hoc, etsi non perfecte medeatur, citra molestiam tamen effi-
tax existit, dato hoc cum hydromelitis cyathis 1111.

Aliud, quo etiam ego utor, ad multos usus commodum.

Scillam fuluam manum magnitudine sua implentem, sermēto obductam,
in furnū conijcio ut quā optime asseretur, deinde ubi mollissima facta fue-
rit, superficie eius exusta reiecta, reliquum optime conterō, atq; ei quātum
trimembri sectione facta, duæ assætæ scillæ partes ponderant, tantum fari-
næ erui albi adijcio, & ammoniaci thymiamatis drach. 1111, radices panacis
drach. 1111, iridis, & abrotoni, & acori, cuiusq; drach. 11, piperis grana v 111.
hæc omnia simul trita & unita in orbiculos digero pōdere sesquiobolares:
ex eis autem drach. 1, aut etiam obolos tres, aut duos, cum tribus cyathis la-
ctis asinini recens multati, aut aquæ mulsæ exhibeo. Pueris uero tantū unum
orbiculum præbeo. Aluum hæc mensura mouet: quod si hæc amplius quid-
dam exhibeas, & urinam cies, & compactam mali irritationem dissolues:
etenim & comitiales sanat, & uulvam strangulatam, & lumborum langu-
dos dolores, & febres debiles ac per circuitum repētes. Cum aceto men-
ses ducit per crassitudinem suppressos, ad quos consequūtur utrigines, in-
terceptiones uocis, contractiones, dolores, articulorum lentores, & spirandi
difficultas. Euestigio enim sanguinem euellit, & ab omnibus molestiis liber-
tat: quare tenuitatem huius pharmaci ne contempnas, sed abundante uirium
eius supellectilem, quasi per manus à maioribus traditam, assumas.

*Ad menses
suppressos
quæ sequuntur*

Alia potio ad suspinosos. Polij, abrotoni, castorei, chamæpityos,
ammoniaci thymiamatis, æquales partes melle excipe, & fabæ magnitudi-
ne exhibe. Quidam spumæ nitri albi cochleare, in aquæ mulsæ cyathis tri-
bus exhibuerunt. Aut hoc modo. Spumæ nitri drach. 1 x, piperis drach. 1,
laseris drach. 1. da cochleare cum aqua calida. Alia. Castorei drachmi
v 111, ammoniaci thymiamatis drach. v 111, piperis grana x L. excipe passo;
& fabæ magnitudine præbe in aqua mulsæ. Alia. Abrotoni drach. 11,
radicis bryoniæ drach. v 111, rutæ hortenſis drach. v 111, castorei drach. 1111,
artemisiæ drach. 1, epithymi drach. 1111. dantur ex ea scrupulus unus & di-
midius cum aceti mulsæ cyatho 1. Alia. Iridis drach. v 111, ammoniaci
thymiamatis drach. 1111. datur drachma una cum hydromelitis cyathis tri-
bus. Alia. Herbæ sabinae, his qui integra ætate consistunt, scrupulos
vi, alijs uero scrupulos 111, butyri scrupulos xii, mellis sextantem. Præbe
delingendam ad dies 111, & intermissione per triduum facta tursus præbe.
Pastillus doloris leuamentum orthopnoicis & ægre spirantibus præbens.
Oprij drachm. 1, sulphuris uiui, plantaginis, seminis hyoscyami, succi radices
dulcis, styracis, zingiberis, thuris, cerebinthinæ, cuiusq; drach. 11, croci drach.
1, cum uino maris experte contere, ac in pastillos triscrupulares digere, quos
bibendos exhibe. Porro si radices dulcis succus non adsit, ipsam radicem fra-
ctam ac tussam satis diu decoquito, atq; hoc totum cum decocto eius com-
mittiq

mittito. Alius, Andromachi, ad idem. Scillæ assatæ, sulphuris uiui, bituminis, æquales partes, melanthij drach. 11, castorei drach. 11, anisi obo/ los 1111, cum aqua pastillos in forma trium aut quatuor scrupulorum: exhibe ante somnum, cum aqua calidæ cyathis duobus.

Catapodium, suspiriosis dolorem leuans.

Rutæ uiridis sextantem, styracis sextantem, terebinthinæ sextantem, opij trientem, ex his catapodia siliquæ pondere singula in forma, tria; ante somnum exhibe deuoranda, à sumptione autem ebibant aquæ calidæ cyathos duos.

Remedium pulchrum Philagrii, ad anhelosos.

Radicum symphyti in petris nascentis, radices centaureæ maioris, iridis illyricæ, singulorum sextantem: aquæ sextarium 1. radices fractas per biduum in aqua macerato, deinde ad tertias decoquito, & percolato, & tantundem mellis decocto adijcito, rursum; donec cogat decoquito: deinde rhei pontici contusi ac cribrati unciam 1 inspergito ac unito. Exhibe circa primam horam dici cochlearia duo. Quod si non adsit rheon, centaureæ maioris radicem cōtusam & cribratam uncia pondere iniice, aut eodem modo radicem symphyti. Hocce pharmacum pulmoni & thoraci firmitatem & robur præbet, simul; humores ad eum delatos repurgat, desiccet, & expellit.

Aliud, ad orthopnoicos.

Boli armenia; drach. 1, cum uino diluto bi-

isotheros

bendam præbe. Ad tussis autem inde sequentes antidotum Isotheum appellatam, paulo ante inter tussis remedia descriptam, exhibe ante somnum, nucis auellana; magnitudine cum aqua mulla. Assiduus enim huius antidoti usus in totum ab hac affectione liberat, etiam si fuerit inueterata: cōfiden-

Peonia

zopyrios

tet itaque ea utaris. Quod si non adsit, pæonia antidotum præbe: quæ ipsa quoq; si haberi non possit, eam quæ zopyrios appellatur, quarum descriptiones in sermone De colicis, habentur. Suffitiones etiam eis sunt commo- dissimæ: de his in tertio sermone plenissime dictum est, & paulo ante inter remedia tussis. In earum autem usu undiquaq; stragulis contogantur, atque ore sedulo hiantes fumum fortiter admittant: mucus enim & lachrimæ multæ spumæq; ubertim ducuntur, & per uehementem tussim pituita uiscosa ex profundo effertur. Verum quod latere te nolim, antequam ad eiusmodi rerum ac lauactionum adhibitionem perueniatur, uentrem subducere oportet uel per clysterem, uel pharmacum solutiuum. Profunt etiam suspiriosis

Fricationes

pectoris

fricationes pectoris, ex pumice cum nitro, fece uini uista, flore iunci odorati. Cuius generis & hoc est. Auripigmeti, pumicis, spumæ niri, cuiusq; unciam unam, alcyonij sextantem, hæc contusa & cribrata cum unguento aliquo calorifico commisceto, pectus; & dorsum donec ignescant confricato. ex frequenti enim huiusmodi perfrictionis adhibitione spirandi difficultatem, & tussim, omnem; ignitam pectoris affectionem propulsabis. Cæterum inueterato malo, & medicina omni frustra adhibita, ad uersionem confugiendum erit: itaq; iuxta medium clauicularū utrinq; una crusta inuratur, cum

cautione

cautione tamē ad motis manibus, ne aspera arteria oblædatur. Deinde aliæ duæ parvæ iuxta carotidas colli arterias infligendæ paululum sub mento utrinq; una, incumbentis cutis tantum perustione facta. Infligendæ autem adhuc aliæ duæ sub mamillas, inter tertiam ac quartam costam: rursusq; aliæ duæ reitorsum uersus inter quintam ac sextam costas. In medio etiam pectore utrinq; unam inurere oportet: & iuxta principium olsis pectoris, (quod à capitis gladij similitudine Xiphoides Græcis appellatur) supra os ipsius uentris, unam simili modo. Et adhuc alias duas inter octauam & nonam costam, utrinq; unam. Tres etiam retro inurendæ sunt crustæ, una iuxta medium dorsi, reliquæ duæ ab utraq; uertebrarum parte, paululum infra mediam crustam. Omnes autem infra collum inustas, mediocriter latas esse conuenit, neq; ualde in superficie consistentes, neq; rursus nimium profundas. Ulcera aut crustarū sanis multo tempore fluida permittere oportet.

De cordis tremoribus, ex Galeno.

Cap. LVIII

Cordis tremor siue palpitatio, multis tum adulescentibus, tum senibus sanis accidisse uisus est. Dolent autem caput ita affecti, citra aliquam alteram externā causā: atq; omnes hi ex uenæ incisione opem senserunt: aliqui etiā ex eis in totum ab hac accessione sunt liberati, per extenuatoriam dietam & pharmaca consimilia, post uenæ incisionem adhibita. Noui autem & ego quendam qui singulis annis, ueris tempore, tremoris accessione afficiebatur. Hunc ubi expertus essem per triennium ex uenæ sectione iuuari: quarto per uenæ sectionem euasit, antequam hoc malo apprehenderetur: atque hoc modo pluribus deinceps is agebat annis, consentanea simul utens dieta: uerūtamen & is quoq; ante senectutem fato functus est, quem admodum alij omnes. Aliqui quidem in febribus acutis cōprehensim animo destituti, similiter mortui sunt: aliqui uero etiam citra animi deliquium, stuporis attoniti modo affecti repēte uitam cum morte commutarunt. Plures autem hac affectione laborantes ad ætatem peruenerunt, minorem quidem quinquaginta, quadagesimū tamen ætatis annum excesserunt.

De sanguinis reiectione, ex Galeno.

Cap. LIX

Sanguis qui ex pectore & pulmone, aut aspera arteria educitur, omnino cum tussi reijcitur. Si uero ex locis circa fauces aut gurgulionem sanguis feratur, per excreationes excernitur. Si uero ex aliquo loco oris aut gingiuarum, simpliciter expuitur. Aliquando autem à capite aut partibus gurgulionis delatus, sanguis ad asperæ arteriæ extremum incidit, & tussim commouet, imaginationemq; facit uelut ex pectore educatur. Itaq; si quis pluribus ex ordine diebus sanguinē exeret & emungat, neq; capitis dolore, aut grauitate, aliqua quæ etiamnum adsit, antegressis, neq; plaga isthic illata: confiderare oportet diligenter omnem narium meatum, atque etiam oris locum illum ubi nares ad palatum sunt perforatæ. Contingit enim aliquando hæc accessio hirudine ad locum hunc affixa. Cæterum aliqui per uomitum citra

g tussim

Exemplum
curationis

tussim sanguinem ex uentre reiectant, aut ex uenis adiacentibus in ipsum delatum, aut hirudine deuorata. Verum sanguis uenarū ex hepate aut splene in uentrem delatus grumofus est, nigerq; euomitur: qui uero ex hirudinis praesentia procedit, tenuis est & saniosus, siue ex uentre, siue ex naribus, siue ex ore proferatur. Atqui & localis dolor qui cōcomitatur, affectam particulam ostendet. Si enim ex stomachoeductio fiet, non magna sanguinis eruptio continget: graciles enim stomachi uenae, similiter ut eruptio, existūt. Quod si uomitu sanguis efferatur, in deglutendo mordacitas percipietur, maxime si adstringentia aut acria deglutiantur: si uero ex uentre educatur, nauisae plurimae comitantur & uomitus, & si à cibo sumptoeductio contingat, sanguis cibus permixtus efferetur. aliquando etiam pituita ac bilis simul euomentur. Si uero ex hepate & splene sanguis in uentrem deferatur, aderit tumor. Si uero ex pectore & pulmone, aut aspera arteria sanguis expuatur, impossibile est eum citra tussim per sputum reijci. Fit autem sanguiniseductio ex pectore, aut ob uenae rupturam, aut oris uenarum apertionem, aut ob corrosiōem. Venarum itaque pulmonis rupturacognoscuntur ex eo, quod unā cum praecedēte causa, statim manifesta sanguiniseductio cognoscitur. Praecedentem autem causam dico, delapsionē ex alto, aut si grauius aliquod corpus pectori inciderit. Aliquibus autem ob clamorem magnum quomodocunq; editum uasis uenarum ruptura accidit: & citra manifestam externam causam extendenti pulmonem uenae ruptura inferitur. Ceterum & ob sanguinis multitudinem ruptura contingere solet: eius uero cognitiōē exhibet sanguinis effusio repente & coaccruatim facta. Magna enim pulmonis uasa existunt, ac arteriarū speciem habentia: sanguis autem in eis tenuis & calidus est, perq; saltum pulmonis ui ac impetu excernitur.

De uenarum apertione.

Venarum autem ora aperiuntur, si quidem dispositiones praecesserint calidae: ueluti si calidis balneis plurimis usus sit homo, habitetq; in calida regione, consimili existente maxime anni tempore, cibus quoq; & potionibus calidis utatur. Etenim multitudo sanguinis calida existens, uenarum pulmonis incumbentium ora aperit & dilatat, atq; hoc modo coaccruata effusio contingit.

De uenarum corrosione.

Quibus uero ex corrosione uenarum pulmonis sanguinis euacuatio contingit, his per interualla modica sigillatim cum tussi expuitur. Ipsa autem uasorum corrosio ex acribus contingit humoribus, siue a capite in pulmonē delabentibus, seu in ipso pulmone generatis. Possibile est etiam propter corrosiōem, coaccruatam sanguinis eductionē cum tussi fieri. Quum enim praecedenti tempore per modica interualla sigillatim, ut dictum est, & cum tussi sanguinem expuerit quispiam: & post sequētib; diebus neq; casus, neq; alia quaedam externa causa acciderit, & tamen sanguinis eruptio multa prodierit, magnam corrosiōem factam esse ostendit. Multi autem

hoc

hoc modo affecti particulas pulmonis simul cum sanguine extulerunt, aut tectoria ulceribus obducta. Impossibile est autem latere educationem propter corrosionem uenarum factam. Quare diligentem animaduersionem habere conuenit, num ne spumofus sit sanguis: nam & hoc firmissimum signū educationis ex pulmone existit: deinde num ne bronchij particula quędam, aut tuniculę arterię seu uenę simul efferatur. Horum enim nihil apparet in his, qui ex succingente thoracem membrana sanguinem spuendo educunt. Maximum etiam signum elationis ex pulmone est, si omnino citra dolorem effertur.

De educatione sanguinis ex alijs pectoris partibus.

Sanguis autem qui ex alijs pectoris partibus educitur, nigrior est, & iam in grumos coactus cum tussi etiam & dolore reijcitur particulę affectę, ac foetidum odorem de se præbet: aliquando & pure ammixto effertur. Verum hoc signum commune est. Si uero iuxta asperam arteriā ulceratio fiat, paucissimus sanguis expuitur, paucissimo omnino pure permixtus, doloris autem sensum iuxta exulceratam arterię partem æger perceptat.

De sanguinis à capite educatione.

Si uero à capite sanguis deferatur, siquidem plurimus sit, plurima adest capitis grauitas aut dolor: si paucus, pauca. aurium sonitus iuxta proportionē affectionis, rubor faciei, uenę frontis emicant, & uertigines accedunt. causa autem ista præcedens manifesta est, nimirum plagā, aut frigiditas, aut calor aut ebrietas. Vini enim potatio larga cumulatim caput replet, & cumulatim etiam ex rupto uenę uase effundit. In parua autem ebrietate, modicum adest sanguinis sputū, & cōsuea fieri per nares sanguinis excretio cohibetur: aliquando etiam ad palatum conuersa, imaginationem exhibet ueluti ex pectore sanguis ipse educatur. Si itaq; à capite sanguis deferatur, titillatio palati accidit, & frequens excretio, atq; hoc modo expuunt: irritantur enim ad tussim, & tamē non ualde tussunt. Si autem à palato ad asperam arteriam destillat, tum tussunt, & quod delapsum est educunt: & ob id quidam decepti, ex pectore educationem fieri autumant. Defluit autem aliquando à capite per gulam seu stomachum in uentrem, uomituq; reijcitur, atq; ob id putatur à stomacho prodire. Habet autem & suam figuram sanguis à capite delapsus. Est enim non adeo paucus, colore nigro, leuis, æqualis, immixtus, altero uidelicet aliquo pure uel pituita, & cum excreatione statim se in linguam infert rotundus, facileq; reijcitur per sputum. Si uero palatum confideraueris, densius atq; uelut exulceratum ipsum inuenies, & ut plurimū sanguinolentum, propter destillantem ad ipsum à capite sanguinem. Curatio autem his qui sanguinem à capite educunt, sufficit simplicior & exigua. Ad stringentia enim per collutiones palato adhibita frigida sufficiūt: nam à calidis & rarefacientibus collutionibus plus sanguinis erumpit: quare signum id est adeo à capite prodeuntis educationis. Si itaque à capite feratur, mul-

*partem oio / sanguis
exulceratam arteriam
ne moratur.*

*Vini largi &
modici nocu-
menta*

*Sanguis à ca-
pite destillat
tis figura*

tumq; sit quod defertur, euacuatione opus erit. Quare citius per nares aut per uenæ alicuius incisionem euacuare oportet, ne per negligentiam consuetudo fiat sanguini in hos locos delabendi.

Curatio eorum qui ob destillationem sanguinem expuunt. Cap. LX

Q Vi ob destillationem sanguinem expuunt, his uenam incidere oportet statim in principio, acri simul clystere adhibito & euacuata aluo: deinde confectis quàm plurimū manibus, brachijsq; ac cruribus per pharmacum calefactorium ac extenuatorium, extremæ eorum partes colligentur: postea uero capiti raso pharmacum ex stercore syluestriū columbarum impone, & post horarum trium interstitium in balneum deducito, citraq; capitis cum pinguedine contactum lauato: post uero mediocriter cōtectos, sorbitione multa ex solis austeris pomis connutrito: deinde dormire uolenti, theriacen Andromachi ex uiperis recens adparatam exhibeto. Sequenti autem die omnibus corporis partibus capite tantum excepto, confectis, in quiete adseruato, rursusq; in uesperam theriacen exhibeto. Quod si ex his destillatio sistatur, tertia die mane mel parum coctum prebeto, quiescereq; finito, ac totum corpus defricato. In cibo exhibe ptisanæ succum, modicūq; panem madesactum. Quarta autem die mane post acceptum ex uiperis pharmacum, rursus plurimum mellis præbeto, capiti simul pharmaco ex stercore columbino imposito. Deinde lotis & mediocriter nutritis, quinta die ea quæ humores qui in pulmonē defluerunt, uehementer repurgare queant exhibeto. Post uero per interualla ad caput cerato ex thapsia apparato utaris. Vniuersam autem curationem renutriendo ac refocillando corpori destinaram impendito.

De his qui ob frigiditatem organorum respirationis sanguinem expuunt, ex Galeno.

Cap. LXI

Q Vi uero ob frigiditatem membrorum respirationis, ruptis pulmonis uenis, sanguinem expuunt, his cūestigio uenam scicare cōuenit, secundaria facta detractione, uidelicet ut paulatim euacuationem faciamus, & ut *Antispas* ad contrarium diuersio fiat, quam antispasin Græci appellant. Eius enim gratia uenæ sectio adhibetur. Deinde frictione extremarum partium, & ut dictum est, ligatione facta, in uesperam ex seminibus pastillum exhibeto. Sequenti uero die post repetitam sanguinis detractionem, uniuerso pectori ceratum ex thapsia imposito: quod in uesperam rursus ne ulterius quàm conuenit calefaciat, detrahito, atq; iterum pastillos ex seminibus dato. Tertia autem die ex thapsia ceratum ad horas circiter tres rursus imposito, horum minemq; lauato. Cibum autem præbe primis diebus sorbitionem, tertia autem ad succum ptisanæ pisces qui facile concoquuntur probeq; conditi sunt adde: ante somnum etiam rursus pastillum ex seminibus exhibe. Nam & somnum conciliat, & dolores leuat, & excitat. Inflammatione autem ruptarum uenarum sedata, & particulis ad bonam temperiem reductis, ea quæ

thoicem

thoracem repurgant præbe, adhibito simul usu theriaces ex uiperis appa-
rae. Deinde etiam lactis potu alijsq; cibis utaris. Hoc modo sanè eos qui se
mox eodem die medicandos exhibent poteris curare, non tamen similiter
qui post duos aut tres obuenerit dies. Aliqui enim eorum immedicabile ul-
cus habent, maxime qui per vitiosos humores erosionem sunt passi. Quo-
rum aliquibus sputū ipsum saluginis aut muræ saporem exhibere refertur.

Curatio eorum qui iuxta alium quemcunq; tandem modum ex
pulmone sanguinem reieciunt.

Cap. LXII

Difficiliorem autem curam ulcera in pulmone consistentia habent: cona-
ri itaq; oportet quemadmodū nos fecimus, ita ut ægro præcipiamus,
ne respiret ualde, & ut sileat semper. Incidere autem statim uenam oportet
in cubito internam, ac sanguinis detractionē reiterare, bis aut etiam ter, pau-
latim, gratia diuertendi. Non enim euacuatione indigent tales, nimirum ab
affectione ipsa euacuati. Quapropter etiam fricationibus utatur, aut etiam
totius corporis membrorum cum latis linteolis constrictione. Posteaquā
uero hæc exacta fuerint, primum quidem poscam dilutam & tepidam bi-
bendam exhibere conuenit: ut si quis sanguinis grumus in uiscere hæreat
inde dissolutus, eiciatur, neq; quicquā obstat bis & ter in tribus horis hanc
potionem iterare. Post hæc autem pharmaca inductoria & obstruendi mea-
tus uim habentia, simulq; adstringentia exhibeantur, aut ex posca diluta in
prima sanè die, aut ex decocto malorum, aut baccarū myrti, aut alterius cu-
iusdam adstringentis. In uesperam uero rursus exhibendum est pharma-
cum: abstineatq; æger ab omni cibo, si uiriū robur adsit: sin minus, satis erit
sorbitionem præbere. Optimum autem est & *secunda die* rursus parū san-
guinis detrahre ex eadem quæ prius incisa est cubiti uena, si modo uires ad
id tolerandum sufficiant. Cibis etiam & pharmacis similiter utendum usq;
ad diem quartum, pectore in orbem madefacto, æstate quidem ex uino,
oleoq; melino & rosaceo, hyeme uero ex unguento nardino. Si uero empla-
stris uti uelis, optimum pharmacum nostrum Barbarum appellatum habe-
bis. Conducunt etiam reliqua ex bitumine, aceto & pice appa-
rata, & maxi-
me quod ex falicibus, & quod ex lolijs constat. Maximum enim hoc est, cui
diligenter attendere animum oportet, ac mox facta uasorum ruptura inde
remedium offerre incipere, quo cruentum adhuc uulnus concreseat, prius
quā inflammatio apprehendat: etenim si inflammatio præuenierit, parum
spei est ad huiusmodi uulneris conglutinationem, quippe quæ se in multum
tempus extendit. Eluere enim oportet, tum pus, tum serosum sanguinem ip-
sius ulceris postea quā inflammatio fuerit soluta: reliquam autem curam
quemadmodum ad tabidos fieri solet ordinare.

Ex Archigene.

Porro si à stomacho aut uentre sanguinis reiectiones cum uomitu procedāt,
uena incidenda est in cubito superior, humeralis appellata, etiam si ex hepa-
te in ipsum uentrem deferatur. Si uero à splene sanguis feratur, quod ex tu-

Vena hume-
ralis

Vena inter
paruum &
anularem di-
gitum.
Frigiditas
plagas inferit
Aque fontis

more circa splenem confidente cognosces, incisa uena quæ inter paruum & anularem digitum in sinistra manu est, probe ac proprie auxiliaberis. Cæterum & cibos & potus magis adstringentes dare conuenit his, qui ex uentre per uomitum, citra tussim sanguinem reiectant, non tamen uehementer & actu frigidos, Ex uehementi enim frigiditate plagæ inferuntur, Quare suffecerit, si non calidi existant, neque nimiam humectationem inferant. fontana igitur aqua non ualde frigida, neque multa, in potu exhibetur, Et cibi pauci similiter mediocriter frigidi, ac naturæ quoque refrigerantis.

Communes Methodi exhibendorum auxiliorum, in singulis reiectionis sanguinis speciebus post sanguinis inhibitionem. Cap. LXIII

EX Galeno. Primum periculū in reiectione sanguinis, est ne ultra modum eius euacuatio fiat. Curatio autem post eius cohibitionē ciusmodi existit. Reiectatio quidem sanguinis quæ ob apertionē fit uenarum, per obturationem occlusionemq; dilatati oris ipsius uenæ curatur, quæ uero ob uenæ rupturam fit, per cōglutinationem sanatur, Quæ ob corrosionem, per renutricationem, & ea quæ carne implent corrosa. Obturatur quidem dilatatum & apertum os uenæ ab adstringentibus. Conglutinatur autem rupta uena ab iisdem, & quæcumq; in compositione eis ammixta citra mordacitatem deficcant, ac glutinosum quiddam in se complectuntur, uelut est lemnia terra, & quæ famius aster appellatur, & his similia. Renutritur autem corrosa à cibus boni succi, & pharmacis carne explētibus, siue sarcoticis à græcis appellatis. Conueniunt igitur adstringentia eis qui non tussunt, qui corpus boni succi habent, & qui ob apertionem oris uenarū, aut rupturam sanguinē reiectant. Adstringit autem optime acetum, & portulaca comesta: succus autē eius bibitus efficacior existit: plantaginis succus cyathis tribus, aut sanguinariæ succus eodem modo, Succus uuæ acerbæ in sole probe deficcatus drachma una, Rhœis aut gallæ decoctum cyathi mensura, Cortex glandis maxime Cestianæ drachma una, radicis rubi decoctū mensura cyathorum trium, Mora rubi, & flos balaustriorū drachma una, Acacia & hypocisthis eodem modo. Acini uuæ cochlearij mensura, Similiter lapathi acuti semen. Efficacius autem operatur radicis Althææ decoctum, atq; ipsa quoq; siccatrica potui inspersa, Centauræ radicis drachmæ duæ, quas febricitantibus cum aqua, febre carentibus cum uino exhibebis: lapidis hæmatitæ drachma una cum mali punici succo, aut Corallij lapidis eodē modo, Radix equiseti, Mora ualde cruda & immatura. Forinsecus autē pectori irrigatio adhibenda ex uino adstringente cum oleo rosaceo aut myrti. Si uero multa sanguinis eruptio fiat, maxime in æstate, & citra tussim eius reiectiones continant, neq; debilis sit æger, sed robustus & carnosus, Acetum pro uino adhibendū est, non in sordidis amplius lanis sed spongijs exceptum, fasciāq; lata

Pharmaca
sarcotica

Adstringētia

Gūs cestiana

lata æger conuincendus. Aliquando autem acaciam, aloen, aut omphacium aceto permiscete conuenit, & autem ex oleo myrteo præillinit, ne mordacitas ex irrigatione succedat: aut etiam Emplastrum Barbarum, aut ex salicibus, aut aliud simile imponere: Quod si æger ferre nequeat ex irrigatione prouenientem inlucunditatem & molestiam, neque toleret item emplastrorum incommodatam, huiusmodi cataplasma est admoendum: ex palmis uidelicet & acacia, alumine, mali corio in puluetem redacto, symphyto, polenta aut lentium farina apparatus. Si uero neque cataplasmatum grauitatem ferre queat, neque califieri sustineat, illitionibus utendum. Loti itaque aut mespili corticem, & rhoem culinarium, paucam rhamni aut sanguinariæ folia in aceto decoquito: deinde in eo decocto aloes succum, aut acaciæ, aut omphacij, paucumque gummi diluito, & pectus ac dorsum ex eo illinito: atque ubi exsiccatum fuerit rursus inungito, qui crassitudinem accipiat illitio seu unguentum, & ne denudati frigore circumueniantur. Illa uero hora qua arescit illitum, ab ægro multus aer est arcendus. Quod si inflammationes succedentes febres inferant: solent enim uehementer acutæ irruere & periculose, aliquando etiam lenes & obtusæ, quum uidelicet in tabem sunt transitura: tum omnis ueluti in febribus est ordinanda diæta: non tamen aceruatim, sed quiete & paulatim: abstinendum à uino: exhibenda palmæ, & similia. Cataplasmate utendum pane calido, deinde semine lini. Vbi uero perseveret malum, omnia ut ad tabidos facienda. Exsiccatorem porro citra mordacitatem uim obtinet: succus ocymi, qui si aceto commisceatur conuenientior fiet, & est quoque nobis in usu familiaris, citraque fortitudinem cum porrexeris. Adstringit autem & desiccatur simul, rheon ponticum. Assumere autem oportet hanc ipsam ponticam radicem ad recentes ac inueteratas sanguinis reiectiones, & ad pectoris fluxiones, in principio quidem ex posca decoctam. Si uero per circuitus redierit reiectio, omnino parum quiddam bibendum præbe cum aqua. Quum uero asperitas & tussis molestiam intulerint, passo cretico decoctam, deinde contritiæ præbe. Magis autem desiccatur arefacta in potum inspersa: Exsiccat etiam citra mordacitatem, samius aster, & minium sinopicum, & terra lemnia bis in die data drachmæ pondere ex aqua. Citra mordacitatem etiam & præclarè omnino desiccatur, bolus armeniacus, ut nihil eo hac parte præstet: eius itaque drachmam unam exhibere potes confidenter. Exsiccat etiam coagulatum hædi, cerui uero magis inspissat. Quod si stomachus æger sit, semel exhibe quod adstringit, & semel quod desiccatur. Aliquando autem mane adstrictorium damus, citra sextam autem horam desiccatorium: in uesperam uero quod inspissat. Quando uero inspissantibus opus fuerit, amygdalum detur, & gummi, ac tragacanthus, quodlibet per se, atque etiam inuicem permixta.

Exsiccatia

lemnia terra

bolus armeniacus

Simplicia ad sanguinem reiicientes pharmaca.

Huius generis inspissantium uidelicet, est & gluten piscium, & symphytum manducatum ac deuoratum. Cibos etiam eiusdem cum prædictis pharmacis facultatis exhibere oportet, tum his qui propter apertionem uenarum, tum qui ex stomacho sanguinem reiiciunt nimirum adstringentes, uelut est halica ex posca, aut micæ panis eodem modo, aut oryza, oua mollia rhoem culinarium tenuissime tritum infarctum habentia, plātago cocta, intubum, lens cum prædictis condita, aut lapathum acutum: in quibus uero inspissante materia magis opus est: lac coctum refrigeratur, daturq; tum ob corrosio nem, tum à stomacho sanguinem educuntibus. Hi enim adstringente materia & carnis expletionem opus habent: aliquādo autem lacti cocto amyllum infarcitur, ac modicum omnino coaguli. Cauere enim oportet immodicum eius usum, neq; statim post eius admixtionem lac ipsum exhibere, sed post aliquantulam dilationem: ualde enim in uentre concretum mortem inferre consuevit. Conducit etiam palmas cum halica decoquere aut cum siligine. Inspissant autem simulq; adstringunt oua crassiora rhoem infarcta maxime si sint assata, lens cum ptisana decocta, milium coctum. Fugienda autem in omnibus uehementer adstringentia, & excellenter inspissantia. Eligenda uero simpliciora ex uniuerso genere eorum quæ sunt prædicta.

De compositis ad sanguinem reiicientes pharmacis, Galeni.

Iuxta primam quidem rationem ex adstringentibus & desiccantibus ac inspissantibus pharmaca componuntur ad curationem reiectionis sanguinis conuenientia. Quum uero adstrictoria, & tenacia ac desiccantia, uias præcludant, & difficulter per corpora digerantur, ui quadam opus habent præparante ac aperiente eis uias ipsas: & ob hoc ipsum calida & tenuium partium eiusmodi pharmacis miscentur, quæ iuxta omnem ipsorum considerationem contraria sunt sanguinis sistendæ reiectioni. Miscentur etiam eis stuporem inducentia, quo profundiorum somnum inducant: quæ sanè commo dissimæ sunt his qui à tussis lancinantur omnibus, maxime tamen qui simul sanguinem reiiciant. Hi igitur scopi sunt compositionis pharmacorum ad sanguinis reiectionem conuenientium: quæ uero per experientiam cognita sunt à priscis medicis composita pharmaca deinceps dicentur.

Potio hæmoptoicis commoda.

*Composita ex
perimento co
gnita*

Lapis coralli, terræ samiz quæ alter appellatur, succini, mastiches, cuiusq; drach. v. i, amyli, thuris, gummis, cuiusq; drachm. iiii. Exhibe cochlearium unum siccum cum posca aut cum aliqua prædictarum decoctionum.

Alia potio. Terræ samiz asteris, lapidis agerati, terræ lemniz, æqualis omnium partes accipe, & ex eis cochlearium unum præbe cum cyathis duobus decoctionis plantaginis. Alia. Terræ lemniz drach. x. v. i, terræ asteris drach. v. iiii, sarcocollæ drach. iiii, gummis drach. ii, præbe cochlearium cum decocti palmarum cyathis duobus. Sit autem decoctum ipsum crassum

crassum.

Alia, Andromachi.

Corallij torrefacti drachmam unam, thuris obolos quatuor, acaciæ drachmam unam, balaustiorum obolos quinque, gummis obolos duos, candidum ouorum duorum. Huius quartam partem cum aquæ cyathum uno & dimidio exhibe.

Alia, Asclepiadæ.

Radici sanguinarie manipulum, radici symphyti tantundem, rhois rubri acetabulum, aquæ chœnices tres, decoque ad tertias, & expressi ac percolati liquoris cyathum unum præbe, & ad singulas exhibitiones gummis triti drachmam unam conijce.

Alia, ualde præstans, cui testimonium præbeo.

Thuris, terræ asteris, cuiusque drachmas octo, croci drachmam unam, amyli drachmam unam, succi plantaginis sicci drachmam unam, contusorum & cribratorum cochleare unum dato cum posca.

Alia, per experientiam.

Corallij drachmas octo, thuris drachmas octo, dato cochlearium cum uino myrtite diluto. Eadem etiam ad fluxum muliebrem efficax est.

Fluxum muliebrem sistens

Pastillus ex electro. Præclare facit ad hæmopticois undecunque sanguis efferatur, ad tussim ueterem & recentem, tabidos, cruenta reiectantes, suppurationem pectoris, tormina intestinorum, uesicæ fluxiones, & ad inflatos: est etiam aurium affectionibus commodus.

Psyllij drachmas quadragintaquinque, tamentorum electri, iridis, mastiches, croci, cuiusque drachmas quatuor, opij drachmas quindecim. Psyllium in aquæ calidæ chœnices tres coniectum, parumper macerato: atque ubi uiscosum ac lubricum factum fuerit, liquorem inde exprimito, eoq; præscripta diluito: terito, ac pastillos informato. Ex his, obolos tres cubi- rum ituris exhibeto.

Pastillus Dositheci, ualde celebr.

Virgultorum rubi sextantem, radici symphyti, seminis spinæ ægyptiæ, succi hypocisthidis, lycij, opij, thuris, rhei pontici, terræ asteris, singulorum sextantem, rhois culinarij quadrantem, rosarum siccarum drachmas quatuor, baccarum myrti quincuncem, croci, terræ lemnix, corticis qui macer appellatur, cuiusque drachmas duas. Excipe succo plantaginis, aut uino scybelite, & informa pastillos. Eos cum decocto symphyti aut sanguinarie exhibeto.

Alius pastillus, ex cuius usu magnam nominis famam sum adeptus.

Terræ asteris quadrantem, amyli recentis quincuncem, tragacanthi, fescui- unciam, gummis quadrantem, glutinis piscium unc. i, aceti q̄tum suffecerit.

Gluten

Gluten more eorum qui arcus faciunt dissoluito, per triduum in sufficienti aceto maceratum, quarta deinde die exemptis ex eo pelliculis repurgatum paulatim tolle, & in mortario cum pistillo contunde, & q̃ diligentissime dissolue, aut super calidum cinerem pone. Difficulus enim solubile existit. Vbi uero solutum fuerit, rursus in ære, aut ferro, aut ut dictum est, cinere calido cum aceto decoque, & sufficienti tempore assidue agita, ut quàm crassissimum fiat, deinde in mortarium coniectū satis diutere, Atq; unum quodque prædictorum per se contusum ac cribratum in promptu habens, maxime tamen tragacanthum, in mortarium ad dissolutum gluten insperge, Omniaq; diligenter unita uitreis lancib. solidis excipe & exicca, pastillosq; informa mediocres. Durant autem aliquandiu donec formentur, Eos cum posca exhibe, & utere ualde confidenter.

Pastillus ex Corallio, qui nunc celebris & in usu apud omnes empiricos existit. Terræ asteris, balaustiorum, coralli, succi hypocisthidis, acaciæ, zingiberis, rhei pontici, dauci, omphacii, tragacanthi, cuiusque unc. i, thuris sextantem, opij drachm. iiii, amyli scrupulos sex, aluminis scissi scrupulos xii, terræ lemnis scrupulos vi, rhois rubri quadrantem, radices dulcis feruuncem, symphyti radices trietem, gummis scrupulos xvi, croci scrupulos vi, seminis spinæ ægyptiæ drach. iiii. Digere in pastillos cum posca. Facit etiam ad tormina intestinorum.

Pastillus ex ægyptia spina, quo plurimum utor.

Pharmacum elidion appellatum, quod prospere omnibus sanguinem reijcientibus conducit: itemq; coeliacis, intestinorum torminibus, & stomachi fluxionibus. cytinorū, seminis spinæ ægyptiæ, balaustiorum, acaciæ, succi hypocisthidis, singulorū drach. vi, lycii, rhei pontici, opij, cuiusq; drach. iiii. Zingiberis drach. iiii. Cōtusa & cribrata diligenter baccarū myrti aut rosarū decocto excipito, aut uino myrtite, & in pastillos redigito, & iuxta cuiusque uires cū rosarū, aut baccarū myrti, aut pampinorū uitis, aut palmarū decocto exhibeto, aut cū frigida aqua. Quod si lycio non abūdes, hoc modo apponere potes. Rhus, qua coriorum tinctores utuntur in quadrupla aquæ portione ad triduum maceratur, uirga frequenter agitata: quarta autem die decoquitur usq; quo aqua ipsa rhois comam exæquet. Et tūc quidem rhus expressa abijcitur: aqua uero percolata, donec in mellis spissitudinem cogatur decoquitur, atq; ita pharmaci adijcitur. Quum uero bibendum præbes hoc prædictum pharmacum, spongiæ posca madefactas stomacho aut pectori impone: atque ubi restiterit sanguis, pectus aut locos fluxione laborantes ex omphacio in aceto diluto & aliquantulum tepesfacto inunge. Conuenit etiam sanguinem reijcientibus pastillus Philippi, qui in tractatu de intestinorum torminibus describetur.

Potio ad sanguinem reiectantes. Succu saluæ cyathos ii, mellis unicam unam, exhibe ieiunis in potu, & euestigio sanguinem sistes.

Rhus pro lycio quomodo preparetur

Quæ

Quæ grumos sanguinis concretos dissoluant.

Sanguinem in grumos cōcretum lixiuium ex cinere uitis & quercinum dissoluit, similiter etiam Thymus & saturcia, Coagulum leporis aut hædi, cicris magnitudine ex aceto. Itaq; mox ubi quis ex alto ceciderit ac sanguinem reiecerit lixiuium per se bibendum exhibeto, aut cum modico aceto.

De asperæ arteriæ ulceribus.

Cap. LXIII

Quæcunq; in aspera arteria ulcera fiunt, iuxta pelliculā eam intus ambientem, & maxime prope eius extremum, aut in ipsā adeo arteriæ extremitate, sanabilia omnino existunt, Et nos non paucos hoc modo affectos curauimus. Reijciunt autem hi per sputum purulenta pauca ac cruenta, aliquando etiam tectoria quædam ulceri obducta, sensusq; doloris ab eis manifeste percipitur iuxta exulceratū locum. Hos itaq; in quiete adseruare oportet supinos reclinatos, atq; ips quæ capiti subijciuntur sublimius instratis, Admonere etiam ut quantum possibile sit renitātur, & Ne tussiant, Deinde forinsecus loco affecto desiccantia imponere. Veluti sunt Emplastra Barbarum, Ex salicibus, & ex sale adpellata, ac eis similia. Pharmaca autem eis exhibenda sunt, quæ supra ad ulcera inter arteriaca, & ad pectore suppuratos sunt descripta, Quæ etiam sub lingua detinere conuenit, ut paulatim liquefacta in asperam arteriam delabātur, Tum uero maxime obniti & nō tussire. In potu autem exhibendum est lac quoddam recens multum ab adstante ad huc animali: adijciendum etiam mellis quiddam his qui lac difficulter concoquunt, & quibus in casei modum in uentre concreuit.

De pectore suppuratis. ex Archigene.

Cap. LXV

Empyici, hoc est pectore suppurati uocantur, quibus abscessus in succin-gente costas intrinsecus membrana, aut in aliqua alia pectoris pellicula factus, acruatim ruptus est, & in uacuum pectoris locum effusus, inter pulmonem & membranam costas succingentem. Qui si non quæ citissime per sputum reijciatur, Tabidi fiunt. febricitant autem pectore suppurati indesinenter hectice, hoc est habitualement febrem. Rumpuntur autem suppurationes aliquæ quidem sursum uersus, aliquæ uero deorsum. Quæ deorsum rumpuntur, in aluum & intestina ac uesicam transfunduntur, per uasa quædam transmissione ad ea membra facta. Quæcunq; uero sursum rumpuntur in uacuum uidelicet thoracis locum, periculosiores existunt. Cognosces autem suppuratos hoc modo. Quum lateris dolor præcesserit, deinde uehementes febres quieuerint, & ex magna parte quoq; dolor, grauitatis autem sensus remanserit intus in latribus in profundo thoracis, simulq; transfluere aliquid appareat, iuxta multiplices reclinacionis permutationes, & maxime quum ab uno latere in alterum decumbunt: tunc sanè multitudo puris manifestatur, & fluctuationis cuiusdam sonitus sæpe sensibilibiter in reclinacionibus ipsorum auditur. Cognoscitur itaq; suppuratio facta tum ex prædicto, tum quod nihil relatu dignum per sputum reiecerant in eo qui præcessit

mulas raga huiusmodi
indicatione praedicta
punctuati in modis
modis, suppuratis.

Remedia irri-
gentia.

7 and 219 suppurat.

Cataplasma
ex stercore
caprino.
Cataplasma
ex lolys.

cessit uehementi lateris dolore. Nouimus autem quosdam citra febrem sup-
puratos, ex seroso aut pituitoso humore ex reliquo corpore in uacuū thora-
cis delapso, isthiciq; putrefacto. Itaq; quibus ex gymnasiōū exercitijs, aut
ex casu aliquo saepe sensibilis conuulsio facta est, quæ dolorem circa pro-
fundum thoracis intulit, Nitrum, acetum, & oleum cyprinum coniiciantur,
his addatur Rosmarini semen Canchry appellatū large probeq; contritū,
aut pyrethrum eius loco, seu staphis sylvestris: hæc simul calefiant, deinde
excolata ipsis locis ex lana succida repletis irrorentur. Vtilis enim hæc irri-
gatio existit, sæpeq; sola malum omne discussit. In quibus autem inflam-
matio præcessit, ultro uenam cubiti incidere oportet, si nihil prohibeat, &
mediocriter euacuare, ut alleuatio tantum aliqua contingat. Nutrire uero
ex ptisanæ succo & aqua mulsæ, excretioni consulendo, & in quiete diligēter
custodiendo. Ac primum quidem ex oleo pingui irrigationes lana conuo-
luta exceptæ ac impositæ conducunt. Quod si febris absit passum etiā mo-
deratum cum multo oleo cōmiscetur lanæq; succida excipiat. Hæc enim
irrigatio in his qui febre carent usq; ad tertiam sufficiet diem. Si uero febres
simul adsint, & ruptura cōsequatur ipsius puris, Rutæ aut anethino oleo
fœniculum aut flos cypri madescant, Aut quod magis ad hanc rem conue-
niet, ipsi oleo incoquantur, cum radice maluæ, & ungento cyprino cum spiss-
samenti apparato, Hæc autem calefacta & lana molli excepta imponantur.
Post hæc autem cataplasmata adhibere conuenit ad febres uomitorias se-
dandas, ex panē in aqua mulsæ decocto, uiridi apio, aut fœniculo, simul de-
coctioni injecto. Commodius autem ad hæc butyrum pro oleo adijcitur.
Deinde Cataplasma quoq; ex semine lini adhibeatur: quod si maius sit,
etiam scenum græcum addatur. Quod si frigiditas suppuracionis causam
præbuit, irionis etiam semen cataplasmati indatur. Tardantibus autē sup-
puracionibus, ordeacæ farinæ caricas coctas addere oportet, & althææ ra-
dicem, terebinthinamq; resinam ac sterces columbinū. Fit etiā ad tardantes
rupturas utile cataplasma ex solo stercore caprino, quod & collectionē ma-
turat & discutit. Optimum etiam discussorium est ex Lolys cataplasma si
bitumine permisceatur. Ablatis autem cataplasmatibus, ceratis affectæ partes
contegantur ex butyro apparatis, & habētibus quoq; admixtam irin, parū
de bacca lauri, & rutam. Etenim ad hoc quod à frigore tutantur, adiuuant
etiam reiectionem. Tempore reiectionis congruit Emplastrum ex succis
constans, & Mnaferæ, & simpliciora Melina, post etiam Ircisæ, & quod ex
lolys apparatur. Si uero fluxus timor immineat, id quod Thraseæ appella-
tur erit aptū. Ego uero assidue eo quod ex syluestri cucumere constat utor,
omnium enim efficacissimum existit. præscriptum autem hoc est in anhe-
losorum tractatu. Adiuuare igitur oportet puris excretionem siquidem re-
pere cognoscatur. Quod si ad aluū proreptet, magis emolliētia sint ea quæ
offeruntur: si uero ad uescicam serpat, ea quæ urinam magis cient adhibēda.

Si uero

Si uero per tussim puris repurgatio fiat, nihil cōuenientius aut familiarius exhiberi potest quā puriana optimo melle permixta. Cæterum ea quæ urinam cient cibis commodè ammiscentur, undecunq; tandem puris excretio contingat. Commoda est etiam faba cocta in omni suppuratorum differtia exhibita, si ei parum ex seminibus erui maceratis, & duplici ex aqua decoctione dulcoratis adijciatur. Alij comestio quoq; utilis ad repurgationem existit. Inter potionum genera simplicissima est aqua Mulla cum iride & plurima radice dulci decocta, Radicis dulcis succus cōmanducatus & cum ammixto sesamo temperatus. Conuenit etiam hyssopum aqua mulla decoctum. Edegma autem prodest hoc, Nucum pincarum tum quæ

Edegmata suppuratis.

piryides, tum quæ strobili appellantur, amygdalarum amararum, seminis lini, amyli recentis, æquales partes, mellis quantum suffecerit. Optimū autem est & piperis parum ac seminis Irionis addere. Quod si tussis infestet, butyrum recens tepidum cum melle tepesactum delingendum præbe.

Aliud eclegma. Internos abscessus repurgans, ut etiam pelliculas maximas educat. Cardamomi, drach. v. sagapeni, drach. iiii. Zingiberis, drach. iiii. opij, drach. ii. castorei, drach. ii. piperis, drach. i. cum aqua in pastillos duorum obolorum pondere redige, & cum aqua calida pastillum unum pro una uice exhibe.

Thespiana ad internos abscessus.

Thespiana

Seminis apij, drach. iiii. opij, drach. iiii. melanthij, drach. iiii. castorei, drach. ii. seminis dauci, Iridis, sinapis, cuiusq; drac. v. excipe melle cocto, & præbe nucis auellane magnitudine ex aqua.

Edegma ex eruo.

Edegma ex eruo

Suppuratis commodum. Erui madefacti & inde torrefacti, decorticatiq; & in farinam redacti, drach. v. nucum pincarū drach. v. amyli, drach. vi. piperis, drach. v. succi rutæ, drach. i. mellis trudi quantum suffecerit.

Edegma magnum ex Marrubio.

Spicæ nardi, piperis, succi

Edegma magnum ex marrubio

Marrubij, cuiusq; unciam. i. mellis, libras. iiii. uini ueteris dulcis, libras. ii. Succum cum uino & melle decoque, atq; ubi ea coacta fuerint, sicca contusa & cribrata insperge, ac simul unitis utere.

Aliud.

Amomi, sextantem. Cassiæ, quadrantem, styracis calamitæ, sesquiunciam, spicæ nardi, sesquiunciam. Croci, unc. i. piperis, unc. i. Nasturtij, drach. iiii. Thuris, drach. iiii. mellis, libras. iiii. utere ut optimo.

Antidotus pancrestus ab omnimoda utilitate appellata.

Antidotus pancrestus

Conducit tussis antiquæ, suppuratis, otthopnoicis, tabidis, præcordiorum distensionibus, & omni inflationi, Mouet menses feminari, & quæ ex abortu aut partu relinquuntur, secundas etiam ac partus educit, Et uellicæ aboler affectiones. Terebinthinæ, drach. v. styracis, drach. vi. Zingiberis, drach. v. Croci, iridis, Galbani, cuiusq; drach. iiii. seminis hyoscyami, Coricis mandragoræ, irionis torrefacti, opopanacis, cuiusq; drach. ii. piperis, drach. i. Spumæ nitri drach. i. cum passo coge in pastillos, ex quibus obolos. ii. cum aquæ mullæ cyathis. iiii. præbe.

Alia antidotus Aristarchi, Paulina appellata. Vim habet admirandam. Prodest tussientibus, reiectantibus sanguinem, tabidis, suppuratis, pulmonis abscessibus, conuulsionibus, & rupturis: ad stomachi subuersiones, furda/stros, bilis per uomitum ac secesum eruptionem: ad exitialia pharmaca, & uenicatorum morsus. Haber autem hoc modo: Cinamomi, costi, galbani, castorei, opij, pipæris nigri & longi, styracis, singulorum unc. i., mellis chæni/tem i. Sicca contūdito ac cribrato: galbanum autem cum modico melle decoquito ac excolato: deinde omnia simul unita in uase uitreo reponito, ac fabæ ægyptiæ magnitudine exhibeto cum aquæ mulsæ cyathis duobus, irro/rato podice ex modico aceto. Vtere etiam his quæ ad tabidos describemus. Exhibe quoq; confidenter antidotum isotheum appellatam, ad tussientes supra præscriptam. Licbit & pæonia appellata antidoto uti, quæ in sermo/ne tertio & decimo cū alijs multi usus antidotis describetur. Farinas quoq; apparare conuenit ex cruīs albis madefactis primum, deinde resiccatīs & mola tritis. Hæc enim farina & lacti dum decoquitur adijcitur, ammixto etiam melle, & uehementer commoda redditur. Admiscetur etiam alijs sor/bitionibus: & edegmata ad difficulter purulenta reijcientes apparata, ex hac cōsunt. Commodum est autem & amygdalas amaras delibratas sorbitio/nibus infarcire. Facilem autem puris reiectionē facit portum capitātū cum sorbitionibus decoctum, atq; etiam per se aquæ incoctū, & in cibo acceptū. In potu aqua offeratur probe cocta: si uero uino opus habeat, therēum de/rur aut aliud dulce paucum. Ab aceto autem & omni alio uinoso genere, & ab aqua quoq; frigida abstineant. Tempore uero quo cicatrix obducitur, uinum scyllinum utile est præpotatum, aut absinthites & oenanthinum in uo/mentibus & purgatis per uescicam: hyssopites uero & scyllinum, his qui per tussim: pulegiatum, qui per aluum purgantur: maxime si nigricantia subeant unā cum purulentis, aut grumose: quædam coactiones. Quoniam autē per interualla colligi solent & rumpi quoq; suppuraciones, curam adhibere conuenit ne post factam earum curationem recurrant id fieri potest per lactis potationem, & hieræ ex colocynthide constantis purgationem. post etiam dropaces locis adhibeantur, & smegmata seu exterforia aciora cutem tūbe facere porētia, & epithemata eiusdem usus, uelut est id quod ex euphorbio fit: item quod ex bacis lauri. Assumēdæ etiam arenæ ingestiones: & acrium ciborum comestio utilis eis existit per interstitia adhibita, maxime uero aliorum coctorum. Multos autem suppuratos post cicatricis obductionem illæsos conseruauimus per salamētorum comestionem. Assidue etiam acetum mulsū præbendum est, sit autem ex scylla apparatus. Pectus quoq; assidue ex abrotoni decocto repurgandum: item ex centaureæ & hyssopi alijsq; consimilibus decoctionibus frequenter potatis. Quod si sæpe puris collectio contingat, securius est crustas per cauteria pectori in orbem inure/re, quemadmodum in anhelosis est prædictum.

Vina siccitia

De pcti

De peripneumoniacis.

Cap. LXVI.

Peripneumonia inflammatio est pulmonis, cum febre acuta. Consequitur autem affectos thoracis grauitas absq; dolore. Quod si pellicula ipsius, quæ cum thorace secundum longitudinem ipsius sunt connexæ, sint inflammatæ, etiam dolor percipiunt, & spirandi difficultas simul irrepens persundare eos gessit. Pulmo enim cordi incumbens suffocationem infert. Rur-
 bicunda eis est facies & maxime malæ, nasus in summo fit si mus, uenæ tem-
 porum eleuantur, prostratus est appetitus, respiratio calida, linguæ siccitas, aquæ frigida, magis autem aeris frigidi concupiscentia, tussis sicca. Si uero, quid efferatur, spumofum est ac biliosum, estq; amplius cruetum & floridum uehementer, quod etiam pessima significationis existit. & siquidem mortale malum fuerit, uigiliæ amplius adcrunt, aut somni breues stuporem inducentes: & imaginatione mentē uicissim perturbante non sentiunt ualde præsentia mala: extremitates frigida, ungues liuidi incuruantur, quarta aut summū septima die hi moriuntur. Verum si ad salutem permutetur morbus, sanguinis eruptio abundanter sequitur, aut alui perturbatio multis excrementis biliosis & spumosis humoribus. Aliquando autem inflammatione in pus commutata, per uetrem aut urinam pus excernitur, statimq; ab omni molestia liberatur. Quod si in pulmonem iruperit accruatim, aut suffocat, aut cum grauius accessioibus in tabem permutatur. Itaq; si nihil obstitit, statim uena secanda est in cubito, & si sustinuerint uires ex utroq; brachio sanguis extrahendus. Primum quidem modicus & non usq; animi defectionem, ut uide licet adseruetur ad repetendam detractionem. Si uero quid prohibeat fieri uenæ incisionem, acri clystere subluere oportet ex decocto hyssopi, & colocythide, & ruta melleq; ac olco plurimo, iniecto etiam nitro ac sale. Eorum uero quibus uena incisa est, ledem illinire oportet his quæ flatus educunt & secessum subluunt: ueluti est mel cum cymino & ruta, ac modico nitro. Post uniuersales autem euacuationes peripneumoniacis aqua mulsæ in potu exhibenda est, in qua decoctum sit hyssopum, aut iris sicca trita mensura duorum cochlearium aquæ mulsæ inspergenda. Quod si suffocatio urgeat, etiam nitrum inspergere cōuenit ad decoctionem hyssopi. Cibus sit extenuatior, posiana cum origano aut hyssopo decocta, aut modico pipere trito ad eius succum insperfo. Aliquando autem sal pro nitro coniiciendus est, prout sustinuerint uires. Porrum etiam capitātū bis coctum præbeatur, & halica cocta ex aqua mulsæ: quæ omnia inflationis sint expertia. Potus exiguus sit quantitate: humiditas enim noxia pulmoni existit. Sub lingua autem detinendum præbe mel in pastillos redactum, cui in decoquendo insperla sint hyssopum & calamintha quàm tenuissime trita. Vi quoq; conueniet eclogmatis quæ in pleuriticis describuntur: atq; uniuersa diæta eorum qui à peripneumonia conualescunt, eadem sit quæ pleuriticorum & suppuratorum. Perctus uero lanis cooperiatur cum olco & nitro. Conueniet etiam cetrato con-

Clyster peripneumonicus

Nihil salis in dli
modum or affluens
ad dli.

Humiditas noxia pulmoni

regere tum pectus, tum latera, ex oleo rutaceo aut cyprino apparato, quod habeat simul iridem siccam tritam inspersam. aut epithema ex cera, & terebinthina, medulla cervina, hyssopo humida, butyro, & inde tenuissime trita imponatur. Sint autem horum partes æquales.

De phthisicis seu tabidis, ex Galeno. Cap. LXVII

Phthisis proprie est exulceratio pulmonis; ad sanguinis corruptiones consequens, quum uidelicet sanguinis eruptio in suppuratis & peripneumoniacis, aliquando etiam in adfectionibus pleuriticis cohibetur difficilime autem curantur ulcera pulmonis, propterea quod citra tussim nō repurgantur: tussientibus autem mutuo ulcus dirumpitur, ipsisq; quasi per circulum reuoluuntur mala. lancia nāq; à tussi inflammatis, altera tussis maturatio inflammatio opus habet, rursusq; periculose per tussim pus repurgare necesse erit: quare ex omnibus difficilis curatio ipsis subornatur, quod neq; pharmacorū uires ulcus pertingere ualeant, prius quā in uentre permulentur: & quod iuxta respiraciones pulmo semper mouetur, & tussiendo lanciaitur. Progressu uero temporis cartilagine quoq; asperæ in pulmone arteria: aduruntur: quemadmodum in externis ulceribus ossa, quæ scalpturam ad squammularum discessum ac detractionem non admittunt. Diuturna aut pulmonis ulcera etiam si aliquando curentur, callosas tamen & fistulosas reliquias post se in ipso pulmone relinquunt, quæ temporis progressu ex leui occasione facile refricantur: unde contingit aliquando & pectorium ulcери obductū, & modicas sanguinis guttas una cum alijs quæ inde per spiritum reijciuntur, efferrī: ut alio planè principio opus sit ad ulceris curationē. Notæ aut quæ ex spūto sumuntur, in tractatu de febribus sunt præscriptæ, nimirum quinto huius operis sermone: unde superfluum existimo hic de eis uerba facere. Medicari itaq; pulmonis ulceribus oportet, eo apparatu quo facile sursum efferantur, cura simul adhibita ne alia congregentur. Itaq; cataplasmata in principio assumenda sunt, ex semine lini & tenuissimo polline, cum decoctione fœni græci & althææ, oleoq; & melle: ammisceri possunt etiam ipsis althææ folia trita. Adhibeantur autem hæc omnia statim post exacerbationū remissionem. Post temporis deinde interapedinem, ad ceratam transeūdum ex butyro & oleo laurino aut cyprino apparata, & ex medulla cervina, ac adipe taurino, iridisq; farina, & cypro, hoc est lanæ succide sordibus, equalibus omniū partibus commistis. Post etiā emplastro Mina scæ, aut aliquo ex simplicioribus melius utendum. Locis autem fluxione laborantibus, id quod ex salicibus constat adhibendū, quod etiam cum præscripto, exsiccationis tempore cōueniens existit. Sicut & hoc quod ex sylvestri cucumere apparatus supra ad anhelosos descriptum, & quod ex sale sit eodem modo. Ne autem os pectoris distēdatur primum locum ipsum inungito, atq; ita glutinosa pharmaca imposito: sic enī facilius auelluntur. Optimū autem ad eos malagma tempore quo cicatrix obducitur, hoc est.

Cera

Ulcera pulmonis difficile curari

Oxyptum

Ceræ libram 1, picis libram 1, uisci quercini unc. 1, ammoniaci thymiamatis trientem, gallæ, hypocisthidis, aluminis scissilis, acaciæ, mali corij, seminis apij, rhois culinarij, cuiusq; unciam 1, olei myrtini aut rosacei trientem. In hyeme autem paulo plus. Sicca cum succis in aceto contere, liquefactisq; quæ eliquari possunt & ab igne ablatis uiscū injice: ad quod deinde liquefactum in cacabo etiam reliqua trita conijce, ac simul unita in pilam transfunde, & emollitis utere. Inter pharmaca uero potabilia simplicissimū est aqua mullā per se, & cum amylo, aut iride & radice dulci in ea decoctis. Omniū autem conuenientissimum phthisicis est lac asininum potatum: quod si non adsit, bubulum, aut caprinum: & cancri crudi triti cum lacte potati, aut cocti in cibo sumpti, absidue iure eorum in super absorpto. Conuenit etiam eis adeps ceruinus recens in forbitionibus eliquatus. Quod si molesta tussis incubuerit, thymus tritus & hyssopum melle cocto excipiuntur & sub lingua tenenda exhibentur. Congruit etiam butyrum recens cum mellis & terebinthinæ æqualibus partibus decoctis. In his uero qui tolerare possunt plus butyri accipiat, si tamen recens existat: optime enim repurgat. De hac itaq; mixtura cochlearium unum ieiunis detur. Bonum est & amygdalas, amaras maxime, cum ptisana decoquere: & porrum capitatum cum ptisana in altera forbitione decoctum, aut etiam per se bis coctum accipere. Vinum autem theærum & scybelites præbatur, mediocri tamen ualde mensura. Eclegma uero phthisicis congruum tale est. Mellis optimi libram 1, uuarum passerum pinguium exacinatorū sextantem, croci, iridis, seminis hyoscyami, tragacanthi, cuiusq; drach. 1111, styracis flauī unc. 1, nucum pinearum drach. v 1, amyli unc. 1. Exhibe ex eo cochlearium ieiunis. Tragacanthus in uino dulci modico teritur: styrax uero in pila dissoluitur reliquis coniectis ac permixtis.

Aliud. Fœniculi succum cum pari melle decoquito, & ad sextarii mensuram croci drach. 1, thei pontici drach. 11. aliquando etiam hypocisthidis drach. 1 adijcto. Quod si iuxta asperæ arteriæ extremū asperitas adsit, conijce & radiciis dulcis tritæ drach. 11. detur cochlearis mensura à cibo. Aliud.

Scillam optime assato, eiusq; medium siue medullam terito, & ad unam scillæ sex mellis partes conijcto, & ieiunis inde cochleare exhibeto.

Aliud eclegma celebre. Marrubij, hyssopi, iridis, cuiusq; unc. 1, crassus contundito, ac in aquæ chœnicibus tribus ad triduum madefacito: dein de ad tertias decoquito ac percolato, mellisq; libra una adiecta, rursus donec cogatur decoquito, & post farinæ orobi scrupulos x 11, terebinthinæ unciam 1, amyli drach. 1111, mastiches tritæ drach. 1111, tragacanthi unc. 1, adijcto. Tragacanthum primum in modico decocti madefactum conterito: deinde adiectis ei reliquis siccis, etiam ea quæ decocta sunt affundito, simulq; coactis utitor, exhibito ieiunis cochleari. Licet & ante somnum exhibere. Experimento eius utilitas cognita est.

Aliud, ad phthisicos fluxioneq; thoracis laborantes.

h 3 Seminis

Butyrum ulcera repurgat

Seminis cucumeris satui desquamati drach. v. iii, amygdalarum delibratarum drach. iiii, seminis lini drach. ii, seminis papaueris albi drach. ii. Contusa & tribrata cum tragacanthi cremore cogito, & in pastillos digerito. Iuxta uirium autem tolerantiam alijs drach. i, alijs obolos ii, præbeto: eis qui febre carent, cum uino dulci & myrti cremore: febricitantibus uero, cum cremore solo.

Aliud, quod & ad phthisicos & suppuratos præclare facit.

Farinam erui albi succo scillæ subactam exiccato: aut scillam assatam ac tritam, farinaque erui subactā, eodem modo exarescere finito. Vsu autem expetente, pastillos ipsos exiccatos contūdito ac cribrato, melleque permixtos cochlearis mensura ieiunis dato. Optime enim repurgat.

Aliud, multo usu cognitum, citra molestiam repurgans.

Farinæ erui unc. i, hyssopi quadrantem, seminis urticæ quadrantē, iridis unciam i, mellis quantum suffecerit. exhibe ieiunis cochleare, ac cōfidenter utere.

Aliud, experimento cognitum, quod ad phthisicos & suppuratos facit: magis tamen frigidis temperaturis conducit.

Iridis illyricæ sextantem, hyssopi, pulegij, capni, seminis urticæ, cuiusque drach. v. iii, piperis drach. x. ii. Excipe melle, ac præbe cochlearia duo: mane unum, alterum ad uesperam. Potes & catapotia inde formare, atque alternis diebus exhibere.

Aliud, phthisicis & tussi ueteri aptum.

Cardamomi torrefacti drach. x. v. i, thuris, galbani, iridis, piperis, cuiusque drach. iiii, cassiæ, croci, zingiberis, cuiusque drach. iiii, opij drach. i. contūdito, ac cribrato: & cum aquæ cyathis tribus, ac passu duobus, cochleare unum, aliquando etiā duo præbeto. Licebit etiam pastillos inde formare cum passo.

Aliud copiarium, siue placenta, ad phthisin, ex amygdalarum materia apparata. Ex amygdalis uidelicet amaris decorticatis, nucibus pineis recentibus, propter oleaginosum in eis saporem aqua præmaccratis: semine lini, amylo recenti. Hoc modo. Nucum pinearum quæ pityides appellantur sextarium i, seminis lini sextarii quartam partem, amyli, quincuncem, piperis drach. i, mellis boni cocti & despumati quantum satis erit. In his qui caput quod facile oblaeditur habent, pityidas uitare oportet: proque eis, semen candidum coniungere. Eclegma ex orobis apparatus Dionysio prætori.

Erui albi torrefacti & desquamati ac triti unc. i, costi trientem, croci sextantem, iridis unc. i, nucum pinearum unc. i, piperis grana z, seminis lini, uuarum passifarum ab acinis depuratorum, terebinthinæ, singulorum unc. i, butyri drach. iiii, mellis quantum his cogendis satis erit. Summe hoc phthisicis auxiliatur.

Antidotus ex orobo, ualde celebris, ad phthisicos, suppuratos,

& inueteratam tussim: optime repurgat, & cicatricem obducit.

Amygdalarum amararum delibratarum sextantem, farinæ erui trientem, hyssopi trientem, iridis trientem, amyli sextantem, piperis, panacis radicis, croci, cuiusque scrupulos v. i, succi omphacij exiccati drach. iiii, nucum pinearum tota refectarum sextantem, mellis despumati libram unam, acci unciam unam.

Farina

Pityides ea
que oblaedunt

Farina trui in aceto per diem unum maceretur, postea simul coactis omnibus, ex eis cochleare unum ieiunis præbeatur.

Alia antidotus ad phthisicos, quæ etiâ ad omnem tussim inueteratâ cōducit.

Amygdalarū amararum decorticatarū sextantem, seminis urticæ torrefacti drach. iiii, succi radiciis dulcis siccis, radiciis symphyti, cuiusq; sextantē, terræ asteris, nucum pinearum torrefactorū, seminis lini torrefacti, sesami, uuarum passarum ab acinis depuratarum, singulorum sesquunciam, farinæ trui albi sextantem, sapæ & mellis quantū suffecerit ad eorum coactionem. Exhibe ieiunis cochlearis mensura aliquādo etiā ante somnū. Vtere & uaria ex capitibus papaueris compositione, supra ad destillationes descripta, exhibens ex ea ante somnū. Vtere & his quæ ad suppuratos sunt descripta, itē arteriacis remedijs supra præscriptis. Conuenientissima etiā eis est confectio isotheos appellata, ad tussim descripta: & antidotus pæonia, quæ in sermone xiiii, cum alijs multæ utilitatis antidotis, est relata: ea confidenter utaris. Prodest & Mithridatis cōfectio, & quæ Elidre inscribitur miro modo: item ex uiperis theriace Andromachi, per interualla exhibita: quæ omnes in tertio & decimo sermone sunt descriptæ. Ultra opinionem autem efficax est, bolus armeniacus drachmæ pondere ex uino tenui albo.

Catapotion phthisicis ualde commodū & bonum, cui nullū comparari potest: faciens ad omnem tussim inueteratam, & purulētas reiectiones: quod in tribus diebus utilitatem suam demonstrat.

Syracis flauis, piperis albi, myrrhæ troglodyticæ, castorei, galbani puri, opij achaici aut asiani, omnium æquales partes, cum galbano & lityrace subige, ac catapota in forma trui magnitudine, quorum tria aut v ante somnū exhibe deuoranda: calida aqua insuper ad sorbendum data, & admirandam uim uidebis. Porro diutius perseverante malo, ac iam inueterato, cauteria admodum oportet, pectore in orbem inusto, quemadmodū in suspensioforum præ diximus curatione. De pleuritide, siue laterū morbo. Cap. lxxviii

Pleuritis exquisita & propria, inflammatio est mēbranæ intrinsicæ latera succingentis, dolorē pungitiuū uchemēter inferens cū acutissima febre. Consequitur hac affectos spirandi difficultas, & tussis aliquādo quidē sicca: aliquādo uero cum reiectione, ac primū quidem cruentorū: inflammatione uero matura facta, purulentorū: pulsus adest durus, & secātis quippiā modo habens. Si itaq; dolor circa mammas innititur ac usq; ad clauiculā se extendit, citra dilationē confidēter uena secanda est. Si uero deorsum ad præcordia uergat dolor, corpus purgandū. Quod si mediocriter infestet dolor, & nō pūgituius: neq; adsit tussis, neq; febris acuta, nō opus est magna remedia adhibere. Clyster enim efficacior eis primū infunditur, deinde euacuatio ali quod operæ precii faciens adhibet, & fomētatio lateris affecti: facculi ex surfuribus & pulegio ac mēta impleti: & diætā extenuatorem uim habens.

Archigenes. In his uero qui acuto morbo, ut diximus, infestantur: si qui

Dolor pur
gitiuus

Pulsus secātis
quippiā modo
habēs, alij ser
uinū & xerum

ab opposito latere mitti
 20. i pleuritis.

reprehensio magis laudat
 2. sing. miss. quia epistola
 missa. (i. r. d. d. r.)

terebinthina & butyro
 & oleo menthae. clyster.

cataplasma laet apponit
 4. d. d. r.

cataplasma acris i suppu-
 ratione.
 Canthi sive rosmanini.
 variis i formis calida
 cataplasma.

post suppuratam scarificatione
 cucurbitula. Ibi autem utilitas
 scarificata.

in cucurbitula d. r. sequen.

osypum

osypum & laur. f. d. r.
 2. d. d. r.

dem circa mammas ac claviculam hareat dolor: uenam incidere oportet, ut dictum est, in brachio, non eo quod recta ab inflamato latere procedit, sed opposito. Sanguinis autem multitudo extrahatur non usq; ad animi deliquium, periculum enim ne in peripneumoniam morbus permuteur: siquidem refrigerato ualde sanguine, pulmo rarus & calidus existens laterisq; uicinus prompte & facillime morbum susceperat. Itaq; modicum extrahere oportet, & post sufficientem temporis intercapedinem, rursus repetita incisione modicum auferre. Quod si animi defectionem timeamus usq; in sequentem diem eius ablatio differenda erit. Deinde clyster aluo infundatur, si non ut conuenit, feratur. Clysteri autem confidenter uti oportet ex oleo rutaceo, eliquatis in eo terebinthina & butyro: deinde forinsecus latus ex oleo calido fouere, ita ut insperfo modico thymo trito imponatur, leniterq; ac prouide colligetur, atq; hac sane irrigatione utendum est ad tertiam usq; diem: quarta deinde cataplasma adhibeatur ex puluere molendini ac lini semine, melleq; ac oleo rutaceo: sitq; uehementer leue ipsum cataplasma. Quod si liquidior reiectio existat, farina etiam lolij, & seminis irionis ammiscenda, aut foenum graecum ac nitrum inspergendum. Si uero repurgamento liquido prodeunte adhuc perseueret dolor: suppuratum fieri hominem spes est. Quare sinapi etiam in cataplasmata commiscendum, & nasturtij semen, ac rosmanini semen canchry appellatum, itemq; pyrettrum: aut farinam lolij, cere, & bitumini, cum oleo eliquatis permixtam impone. Cura etiam adhibenda est ut calida permaneat cataplasmata: quod hoc modo fieri potest. Oleo calido uesica bubulam semiplenam redde, eamq; frequenter cataplasmati admoue. Post septimum autem diem, si eodem modo dolor persistat, cucurbita lateri affigenda est, & cutis scarificanda. Manifestissima enim in pleuriticis utilitas ex cucurbitula appositione apparet. uulnuscula autem scarificati loci sale aut nitro inspergenda, siquidem sustinere queant: in alijs uero linteolum oleo madefactum ac sale conspersum imponatur. Sequenti deinde a scarificatione die optimu est rursus cucurbitam affigere, quo sanguis saniosus ex impactis uulnusculis extrahatur. Haec enim detractio priore comodior existit: non enim sanguis sed sanies in secunda detractioe auferit. Tertia uero die post abstersionem, ceratum cyprinum tum pertusa cuti, tum uniuerso lateri imponendum: neq; unquam affectus locus nudus relinquendus. quod si permutati in pus humoris signa appareant, xgerq; partim per sudorem resoluatur, coadiuuare permutatione oportet, althaea & caricis in complexu cataplasmatum coiectis. Post uero etiam epithematis utendum: reiectionis maxime tempore, huiusmodi mixtura apparatis. Butyri, terebinthinae, celsypi, id est ex lanae succida: foribus pharmaci, cere, medullae ceruiniae, iridis, omnium aequales partes coniijce, modico oleo cyprino aut rutaceo ammisce. Optimu est etiam sulphur tequissime tritum cerato liquefacto inspergere. Admirabiliter quoq; eis auxilium praestatur brassica sicca una cum cauliculis exusta, cinere eius axungia ueteri nulla lar

ge ex

ge excepto, ita ut perfluat in corpus, ipsumque inquinat. Præclare enim discutit, & mitigat dolores. Probe etiam auxiliantur cupressi folia tenera trita & cum axungia imposita, aut marrubium eodem modo, aut cinis sarmentorum, aut ficus pingues cum pari axungia commixte. Eundem usum præstat Stercus caprinum ex aceto impositum.

Aliud epithema, pleuriticis ualde commodum.

Opopanacis unc. i, foliorum rutæ sextantem, olei cyprini libram i, ceræ sexuncem, terebinthinæ sexuncem, galbani sesquiunciam. Opopanax in oleo cyprino dissoluitur: galbanum autem cum rutæ folijs conteritur: quæ uero eliquari possunt, liquefiunt, & refrigerata tritis ammiscentur.

Aliud, experimento cognitum. Rutæ sextantem, sulphuris uiui unc. i, nitri sesquiunciam, adipis suilli trientem, ceræ sexuncem; terebinthinæ unc. i.

Aliud epithema ad pleuriticos, in quibus dolor diu perseverat.

Ceræ, resinæ pini, picis, baccarum lauri decorticatarum, singulorum libram unam, ammoniaci thymiamatis sexuncem, galbani trientem, pyretri sextantem, euphorbij unc. i, alij tantum dimidiam accipiunt: olei laurini aut communis antiqui trientem. Appara & utere. Rubefacit cutem, & grauitatem leuiorem facit. Epithema fecit, pleuriticis commodum.

Resinæ pini libram i, ceræ sexuncem, rutæ uiridis trientem, olei cyprini sexuncem, sulphuris uiui, opopanacis, sagapeni, galbani, cuiusque drach. iiii.

De potionibus pleuriticorum. Potionibus iuuantur pleuritici in principio quidæ aquæ mulsæ, in qua ruta est decocta, post etiam hyssopū, aut calaminthe, aut origanum, aut iris, aut radix aristolochiæ.

Alia, euestigio auxiliatur. Radicis uiolæ purpureæ fasciculum in tribus aquæ sextarijs decoquito: & expresso liquore ad sextarium unum, mellis trientem conficito, rursusque decoquito, ac cyathos tres ante cibum exhibeto. Alia. Chamæpityos manipulum in tribus aquæ chœnicibus appara, & utere, ut dictum est. Alia. Stœchadis tenuissime tritæ drach. i exhibe ex aqua mulsæ, aut simili modo chamædryn, aut chamæpityos modo apparatus præbe in potu. Prodest & dracunculæ radix cocta in cibo sumpta, aut ari radix eodē modo. Sub lingua uero ressellas ex melle cocto eliquantes deuorent. Edeigma autem eis conueniens hoc est.

*Tessella
ex melle*

Edeigma ad pleuriticos. Seminis urticæ, seminis lini, nucum pinearum, amyli, singulorum cyathum unum, amygdala amara decorticata xxv, piperis grana quinquaginta. Noces pineas ac lini semen parumper torreto, deinde alia trita ac cribrata simul cum his melle despumato sufficienti excipito, & ieiunis cochleare unum exhibeto. Aliud.

Butyrum recens cum pari mellis mensura decoquito, ac inde cochleare præbeto. In pleuritide uero diuturna exhibe seminis balsami drachmam unam ex aqua mulsæ, aut etiam gentianæ drachmam unam, radicis centaureæ maioris drachmas duas ex uino, aut radicis symphyti ex aqua mulsæ.

Quod

Quod si liquida & cruda reiectet, conuenit hoc: Zingiberis troglodyticæ drach. ii, croci drach. i, piperis grana xv, mellis despumati libram i, cõgito simul, ac inde cochleare dimidium præbeto.

Oribasi antidotus ad pleuriticos & omnes pectoris fluxiones. Seminis rosmarini, opopanacis, sagapeni, castorij, anisi, fescis, cuiusq; drach. vii, zingiberis, opij, cuiusq; drach. iiii, bituminis drach. tres & dimidiam, piperis drach. ii, thuris sesquidrachmā. Vtere, araci magnitudine exhibens cum hydromelitis cyathis tribus.

Antidotus alia pleuriticis ualde commoda.

Baccarum lauri drach. viii, seminis rutæ syluestris drach. vii, aristolochiæ longæ drach. vi, zingiberis drach. iiii, gentianæ drach. iiii, mellis despumati librā i. Datur nucis ponticæ magnitudine, aut fabæ, aut araci. Prodest super puratis, conuulsis, itemq; ruptis. Cæterum & antidotus quæ ex quatuor rebus appellatur præclare facit. habet autē hoc modo: Gentianæ, zingiberis, aristolochiæ, baccarū lauri, æquales partes melle cõcto excipe, & fabæ magnitudine præbe: his qui febre carent ex uini cyathis iiii: febricitantibus uero cum aqua mulsa. Efficax est ad conuulsiones, fluxiones, orthopneam, tormina interancorum, & morbum regium, & eos qui uenenum hauserunt: resistit etiam serpentium uenenis potata: præstat idem & ad morsus locum imposita. Quidam eam mysterium appellant.

Alia antidotus ad pleuriticos pharmacum accommodatum. Extrahit menses & partus & quæ à partu relinquuntur secundas. Dictamni, sagapeni, opopanacis, trifaginis, cuiusq; drach. iiii, myrrhæ, seminis rutæ syluestris, herbi fabinæ, comæ centaureæ minoris, piperis, cuiusq; drach. vii, radices gentianæ drach. vi, baccarum lauri drach. xvi, aristolochiæ rotundæ drach. vi, mellis despumati quantum cogendis his satis est. Datur nucis auellanæ magnitudine cū hydromelitis cyatho uno. Cibi porro pleuriticis exhibēdi sunt forbiles qui in principio uentrem subducant: uelut est ptisanæ succus cum melle, citra salem aut alterius rei admistionem. Post hæc etiam non colata integra ptisana exhibenda: deinde micæ quoq; ex aqua mulsa. quod si à melle abhorreat ager, oleum optimum in principio ptisanæ affundes, decoquesq; simul capitatum portum, deinde modico sale condies, & exhibebis. Remittente uero ac declinante iam malo, in petrosis aquis degentes ptisces exhibendi, & columbæ, omnisq; diætæ tenuis constituenda. Aluus autem assidue subducatur, in maximis præsertim doloribus: sed tamen cauendum ne fortiora solutiu exhibeantur. Mastichen itaq; tenuissime contectito, eiusq; scrupulos nouem cum aqua tepida, aut lactis aqua præbeto. Solutur enim à calida aluus. Vbi uero hanc potionem obtuleris, amygdalas amaras decorticatas vii, in promptu habere easq; tritas cū pauco melle delingendas præbe, aquam etiam calidam modicam insuper bibendam. Profectu autem ex his consequēte, etiam cum subscripta Asclepiadæ hiera purgabis

Antidotum ex
iiii rebus

Mysterium

Mastichecum
calida exhibi
tū uentrem
soluit

gabis, quo omnes morbi reliquæ extergantur: quæ enim relinquuntur à morbis recidiuas facere consueverunt: & non pura corpora quo plus nutries, eo amplius lædes.

Hiera Asclepiadæ, quæ omnes abscessus in profunda corporis parte consistentes unâ cum tuniculis ipsorum educit, phthisicis ac pleuriticis commoda: facit & ad eos qui assidue reuomunt cibum. Colocynthidis medullæ drach. xxxv, marrubij, stæchadis, trifaginis, cuiusq; drach. xiiii, zingiberis, spicæ nardi, piperis longi, floris iunci odorati, calsiæ, cinamomi, cuiusq; drach. iiii, croci drach. iiii, radicis centaureæ maioris drach. iiii, galbani drach. iiii. Excipe melle cocto, & pleuriticis duarum nucum ponticarum magnitudine exhibe ex aquæ mullæ cyatho i. phthisicis uero & suppuratis unius tantû nucis magnitudine itidē ex aqua mulla.

De ea quæ pleuritis esse putatur, quum tamen non sit. Cap. lxxviii
EX cruditanibus plurimis, & cibis humoris crassi ac pituitosis, ueluti sunt bulbi, ac fungi, & consimiles, crudi humores uiscosiq; & tenaces in corpore generantur: qui aliquando repente se in uacuum thoracis locum ingerunt, aut in ipsum etiam pulmonem. Multitudine itaq; sua succingentem latere intrinsecus pelliculam distendentes inferunt dolores: ut imaginatio facit inflammationis in expertis exhibeatur: quoniam etiam uias spiritus interceptas, uehementem spirandi difficultatem inducunt. Vnde quidam medici errore seducti, uena cubiti incisa, multoq; sanguine euacuato, mortis causam ægris præbuerunt. Quare interrogare oportet, num eo cuius mentionē feci, uisi sint cibo, diligenterq; perdiscere formam ipsius respirationis, contingere etiam pulsus, & tactu explorare caloris qualitatem. Etenim in his non obdorem respiratio ut plurimum reflectitur, sed quod uix spiritus sunt obturata, & respirationis forma uelut strangulatione imminente in collo contingit. Supini autem ferè in totum decumbunt semper, præ impotentia etiam neq; probe loqui ualentes. Ut plurimum uero non febricitant hi: aliquando & frigidius solito corpus eorum inuenitur. Quod si febre afficiatur aliquando, debilissima ipsis febricula existit, minimeq; sunt siticulosi: & quod ad hæc uel maximû signum est, pulsus difficulter mouetur, minimus & tardissimus præter solitum morem existens. Horum itaq; curatione suscepta, calfacientia, incisua, & repurgantia intrinsecus & extrinsecus offeremus: & primum quidem à simplicioribus incipiemus. Clysteri ergo consueto aluum à stercoribus repurgabimus: deinde etiâ efficaciori utemur ex decoctione calaminthæ, aliquando centaureæ, melleq; plurimo ac nitro. Colocynthidis autem in his quod ualde stomacho aduersetur deuotanda. Post alui euacuationem, rutam & anethum in oleo decoquimus, & ex eis quàm plurimum fouebimus affectos locos: lanas etiam oleo madefactas imponemus. In potu dabimus aquam mullam, in qua hyssopum, aut pulgium, iris, caricæ plurimæ sint decocta. Succum etiam ptisanæ tenuissimum exhibebimus cum melle, quo inde uenter leniter subducatur.

Bulborum & fungorum esus

Vena incisa
nocius

Colocynthidis
stomacho
aduersa

Edeigma

*Eclegma ex omni
crasso & huiusmodi*

Eclegma autem ipsis commodum huiusmodi est. Seminis urticæ, hyssopi, iridis, nucum pincarum, amygdalarum amandarum, singulorum æquales partes, modico pipere adiecto, optimo melle despumato excipe, ac inde ad summum cochlearium unum ieiunis præbe: deinde interstitio facto, exhibe aquam mulsam, ut dictum est, ac post horas duas succum pisanæ tertius deinde die ex farina ordeï, ac semine lini, multoque sæno græco cataplasma imponatur: adjiciamus etiam sinapi tritum, & lauri baccas, ac parū nitri, & ex liquidis oleum rutaceum, aut cyprinum aut anethinum. Apparandū autem est eo modo, ut thoracem & latera comprehendat. Ablato autem cataplasmate, thorax cerato ex butyro & terebinthina, hyssopoque humida, & cera, taurino adipe, ac iride, æqualibus portionibus acceptis contragatur. Aliquando etiam ex medulla ceruina & oleo cyprino. Sulphur quoque uiuum cerato liquefacto infarciendū. Stomacho uero lanam conuolutam, unguento nardino ac modico uino madefactam imponemus, cuius incumbere semper sinemus. In his uero quibus suffocationis periculum imminet, uomitorijs ad anginam descriptis confidenter utemur: & maxime eo quod ex elaterio, sinapi ac nitro constat, primum quidem ipsum cum oleo & pauco melle quam penitissime illinendo: deinde etiam bibendum, quemadmodū illic diximus exhibebimus. Assidue etiam aquam mulsam absorbendam præbebimus, in qua hyssopum est decoctum. Porro humoribus dissolutis reiectare eos incipient, & tussis in eis augetur: quare antidotum isothericum appellatū tunc eis ante somnū exhibebimus, nucis auellanae magnitudine ex aqua mulsâ. Somnum enim dulcem infert, & humores quo facile fursum effertur præparat, ac tussim sedat, doloresque dispergit. Est autem supra ad tussim descripta. Quando uero etiam uenter eis non bene excernit, mastiche tenuissime trita scutupulorum nouem pondere cum aqua tepida aut lactis bibeda offeratur, deinde amygdalæ amaræ decorticatæ tritæ ex melle præbeantur delingendæ, & aqua calida post eorum sumptionem absorbenda. Feliciter autem procedente curatione & columbarū pullos in cibo offeremus, cum porro capitato cocto, anethoque & oleo, modico sale & pipere adiecto. Vinum bibant rufum, uetus, mediocri mensura. Atqui eclegma prædictū ex semine uidelicet urticæ quotidie ieiunis præbebimus. Ante somnum uero isothericum antidotū donec ab omnibus molestijs ægri liberentur. Ceratū autem quod pectori adhibetur singulis diebus renouetur. Et siquidem ueter adstrictus sit, mastiche cum amygdalis & melle præbeatur.

Eclegma Galeni, ad diuturnum pectoris dolorem citra febrem. Fœnum græcum aqua macerato, deinde decoquito: & prima aqua diffusa, & palmarū carne adiecta rursus coquito, ac exprimito succum: quem deinde de melle largius permixtum rursus ad prunas decoquito, donec ad mediocrem spissitudinem redigatur: & ex hoc multo ante reliquū cibum tempore delingendum exhibeto.

SO AETII ANTIOCHENI

MEDICI, DE STOMACHI, ALVI, AC IN-
TERANEORVM AFFECTIONIBVS
SERMO NONVS.

interprete.

CAPITA NONI SERMONIS AETII

De cardiacis.	Caput	i
De his quibus atra bile stomachus infestatur.	Cap.	ii
Ad eos qui flauam bilem euomunt.	Cap.	iii
Ad eos qui stomacho exuruntur, & siticulosi sunt.	Cap.	iiii
De singultu.	Cap.	v
De bulimo, hoc est ingenti fame.	Cap.	vi
De animi deliquio: ex Philumeno.	Cap.	vii
De his qui in balinco animo linquantur.	Cap.	viii
De stomachi imbecillitate, & supinitate, ac subuersione: ex Galeno.	Cap.	ix
De nausea: ex Galeno.	Cap.	x
Cataplasmata & epithemata ad nauscas & uomitus.	Cap.	xi
De cholera seu bilis effusione.	Cap.	xii
De stomachi adstrictione.	Cap.	xiii
De humoribus à capite in uentrem destillantibus.	Cap.	xiiii
Dieta conueniens his qui stomachum habent dissolutum, alium autem adstrictam.	Cap.	xv
De stomachi inflammatione.	Cap.	xvi
De stomacho exulcerato.	Cap.	xvii
De his qui à stomacho, comitialis morbi modo conuelluntur.	Cap.	xviii
Viridis iaspidis usus.	Cap.	xix
De appetitus perditione.	Cap.	xx
De appetitu canino.	Cap.	xxi
De appetitu canino, qui ex immodica transpiratione, ac cutis exolutione contingit.	Cap.	xxii
De uitioso appetitu.	Cap.	xxiii
De cruditate: Galeni.	Cap.	xxiiii
De crapula: Philumeni.	Cap.	xxv
Quæ cura aluo adstrictæ exhibenda: ex Galeno.	Cap.	xxvi
De inflatione: Galeni.	Cap.	xxvii
De uoluulo: Archigenis.	Cap.	xxviii
	i	De his qui

De his qui ab acro humore coli dolore infestantur: Galeni.	Cap. xxix
De his qui a frigidis & pituitosis humoribus, coli dolore infestantur.	Cap. xxx
Pharmaca ad colicos.	Cap. xxxi
De antidotis dolorem leuantibus, in quibus conis accommodatis.	Cap. xxxii
Quæ colicis infundantur, & per anum subdantur.	Cap. xxxiii
Cataplasma colicum: ex libris Seueri.	Cap. xxxiiii
Quomodo alium fluxione laborantem curare oporteat: ex libris Philumeni.	Cap. xxxv
Cura eorum qui ex debilitate, alui fluxione laborant: ex Galeno.	Cap. xxxvi
De coeliaca affectione: Archigenis.	Cap. xxxvii
De colliquatione.	Cap. xxxviii
De lumbricis: ex Herodoto.	Cap. xxxix
De lato lumbrico.	Cap. xl
De ascaridibus.	Cap. xli
De abscessu in intestinis.	Cap. xlii
De dysenteria, hoc est torminibus intestinorum.	Cap. xliii
De tenasmi cura.	Cap. xliv
Cura dysentericorum.	Cap. xlv
Cura eorum qui aurum, aut as, aut tale quippiam deglutiuerunt.	Cap. xlvi
Communia remedia dysentericorum, quæ superne exhibentur.	Cap. xlvii
Composita pharmaca, quæ superne exhibentur.	Cap. xlviii
Quæ inferne dysentericis infundantur.	Cap. xlix
Epithemata dysenterica.	Cap. l
De lienteria.	Cap. li

F I N I S

De cardiacis.

Cap. 1



Vomodo eos qui cardiaci appellantur curare oportet, aut eos etiam qui aliter ob stomachi compunctione animo liquuntur, iam absolutissime predictum est in quinto huius tractationis sermone, ubi ad febrium curam hac anneximus. Nunc uero quum affectionum stomachi ac alui remedia oportune ex ordine describamus, necessarium uisum est & hic paucis eorum mentionem facere. Cognoscemus igitur eos qui cardiaci dicuntur, quum acuta febris & maxime astuosa affliguntur hoc modo. Pulsus si inuenero densum & obscurum, & extremarum partium frigiditatem, sudores circa faciem & ad pectus usque glutinosos, & nitorem cutis ablatum, & terrestrem redditum, & pulsus circa ipsum cor uehementiores & magnos: & ad hec accedant desperatio, angor animi, & corporis iactatio. Hoc modo affectum, cardiacum esse dico. Os uero uentris primum est quod in ipsis afficitur, per censem uehementer oblaedens cor ipsum, propter uiciniam. Porro ueteres os uentris cordis appellatione Cardiacum uocarunt, ab accessionibus nimirum que ex eo accidunt & inferuntur. Aeris itaque frigidi admissione & uentilatione eis auxiliari oportet. Spongia igitur ex posca frigida imbuta facies permadeat, & aqua lactis paulatim absorbenda praebeatur. Odoramenta uero uaria offerantur, malum cotoneum, pulegium, cucumer, & similia. Stragula eis incumbencia tollantur: operimenta uero quibus conteguntur mollia sint, & usu priore detrita: pauimentum itroretur, ac folijs consternatur myrti, platanis, ac quercus, maxime uero uitis, atque ipsis etiam rosis. Solem autem domus in qua decumbit non admittat, sitque minime alta, sed depressior, & non ualde lucida. Exudantibus uero partibus myrtus sicca trita inspergatur, aut cimolia, aut cenanthe, aut ordeum: imprimis uero collo & thoraci, & locis subalidis ac inguinibus ea sunt adhibenda. Eodem modo auxiliatur malicorium eum manna inspersum: aut galla per se, & cum sulphure uiuo: aut famia terra admixtum habens gummi. Illinuntur etiam ad coercendos sudores, oleum myrteum, cenanthinum, rosaceum, melinum, & lentiscinum. Circumlata autem sudores cohibent, manna & amyllum, candido oui excepta, aut bulbus albus, & piper, acurtica semen, & gummi, modico cerato myrteo excepta, aut oui candido subacta, quae sane crassius inungere conuenit: adglutinantur enim & exarescunt, & potissima in eis spes consistit naturalis caloris reuersione. Neque uero pinguefactae cuti huiusmodi inunctiones sunt adhibendae: uerum linteolo probe prius extersae inungantur. neque mox ubi calor apparere incipit auferantur, sed postquam sufficienter extremae corporis partes fuerint concalescent: quod ubi contigerit statim tollantur, & thorax cooperiatur, atque sicubi uarosum quippiam aut ulcerosum ex inunctionis additione circa thorace appareat, blande tractetur, ac aliquo ex his quae ad ambustos ab igne descripta sunt, pharmaco locus curetur. maxime uero conue-

Os uentris cardiaci, id est cor, apud ueteres

Sudores coercencia

niet id quod ex hordeo constat. Extremæ uero corporis partes, siue ad genua usq; & cubitos, siue usq; ad locum sub alis & inguina sint refrigeratæ, sece usta & sulphure uiuo conspergendæ, aut pyretro, aut piperide, aut bulbis tritis cum pipere illinendæ: à brachijs usq; ad digitos, & à femore usq; ad extremos pedes, gracilibus lintcolis simul circūpositis. Idem præstat sinapi & pyretum, ac adarce. Porro mollibus corporibus sufficit aliquando oleum si cyonium aut gleucium illitum, cum multa fricatione ac cōcafectione partium extremarum: quanquam nihil uetet piperis ac ceræ modicum his ammiscere, quo spissiora fiant & melius adhaerescant. Fasciculus quoq; ex lana pura in oleo calido madefactus incumbat semper circa uesicę regionem. Capitis fomēta frigida sint, qualia ad phreniticos sunt descripta: frons spongia ne madescat, sed ex acacia, galla, terra samia, ac syluestris punici flore illinatur. Optime facit etiam omphacium, & gummi: uerum unūquodq; eorum ex rosarum decocto aut succo, aut aliquo consimili diluatur prius & deinde illinatur. Quod si quis sanitatis tempore nimium repletus existat, & stercora antiqua recto intestino insideant: tunc sanè clysteri simpliciore euacuare oportet: ex succo ptisanæ, & modico melle, paucissimoq; sale & oleo quoq; modico adiecto. Illinēda est etiam singulis diebus sedes ipsa ex cumino, ruta, & nitro, cum modico melle commistis, ob inflationum uidelicet eductio nem. Si uero nulla stercora in intestino recto subsideant: neq; alias etiam excrementorum multitudo insit intestinis: ægri autem cibum nō sentiant & tabescant, ptisanæ succum aut halicæ per clysterem infundere oportet tepescitum, conuassato cum eo ouo crudo. Ultra hoc enim quod ea quæ stomachum inferne molestia afficiunt, euocat & educit, etiam alimentum optime corpori sufficit ex languore ob non acceptum cibum misere affecto. Auxiliantur item cardiaci cataplasmati modo, stomacho ac sinistra māmā imposita, folia rubi cum pane, aut myrti folia, ipsæq; myrti baccę, aut pampini uicis, aut plantago cum pane, aut mala cotonea & palmę, aut intubus cerato exceptus. Imbecillioribus polentam cum palmis imponere sufficit, aut palmas uino madefactas uncia: unius mensura conterere: deinde adiectis aloes drachmis 1111, mastiches drac. 1111, simul tere, & affuso eliquatæ ceræ sextante, & olei siquidem hyems sit, neq; multus caloris sensus ægrum contingat, nardini: in æstate uero rosacę, aut melini, triente simul misce ac utere eodem modo. Quod si ex uisceribus quoddam inflammatum sit, panem cum modico uino & melle decoctum imponere admixtis in his qui imbecilliores sunt malis repurgatis aut œnanthe. Reprimat autem sudores stomachūq; & cor ipsum firmitatis autorem placat ac cohibet cataplasma ex palmis, & œnanthe, & acacia, rosis, alumine, hypocisthide & rhoe rubro: ita impositū ut sinistra mamam atq; ipsum uētre m complectatur: sit etiam tactu molle & leue, ac assidue permutetur. Reuocato autem ex accessione ægro, si loci quidam circa præcordia sint inflammati, providere oportet ut per cōmuniā cataplasmata

Milia sedis

Cibū non sentientes ex clysteri cōmiseri

Cor autem firmitatis

Cataplasma sudorem cohibens

taplasmata ab inflammatione liberentur. Cibi offerendi, panis ex aqua frigida, aut ex uino albo & tenui frigidoq; ac diluto: pedes suilli, talicq; & rostra ex uolucris macrae & non foetidae, in pitisanæ decoctione eliquata, aut etiam per se. Frigida autem hæc exhibeantur, si caloris sensus circa stomachum sit, & æger inflammatione non uexetur. Alijs calida exhibenda, similiter autem & potus calidus dandus, uinum tenue album dilutum: immodicam autem uini exhibitæ multitudinem pulsus ægroti ostendet. Eo usque enim exhibendum est uinum, donec pulsus subtremlus esse desinat, & robustior fiat.

Vinū pulsum permuat

De his quibus atra bile stomachus infestatur. *Cap. ii*

EX Herodoto. Quibus stomachus ab atra bile in febribus uexatur similes accessiones cardiacis patiuntur. Accedunt autem ad hæc, fortis stomachi morsus, cum eius exolutione, & oculorum uertigine, ac frigido sudore, paruusq; & obscurus adest pulsus. progressu uero temporis augetur morsus, atq; hinc in dolorem qui difficulter leniri potest, transit. Caterum manifeste apparens flauæ bilis uomitus has accessiones leuiores reddit, atra autem bilis soluit. Vomunt autem ferè in totum hoc modo affecti pituitam acidam in uentre coaceruatam ex assidua cruditate, propter uentris ipsius debilitatem. Qui uero citra febrem ab atra bile stomacho infestantur, his accedit tempore quo humor ipse generatur & producitur, tristitia, & somnus cum accessione imaginationum alienarum, contractioq; & dolor poplitum ac surarum. Acutius quam ante consueuerunt cernunt, & deiectum habent appetitum: ructus autem & excreationes foetidas & pisces olentes. Coaceruata uero bile cum multa desperatione intolerabiliter ignescunt, ut omnia eis membra ardere uideantur: in primis autem stomachus uelut à palis igne candefactis pungatur, afficitur. Sudores animi deliquium inducentes per omne corpus destillant: & ferè semper sputi influentis reiectione uexantur, quum morsum sentiunt, multamq; habent uomendi cupiditatē. Et aliquando quidem frustra lancinantur, quandoq; autem pauca quædam biliola aut acidam pituitam, quæ in uentrem defluerunt euomunt, modicoq; tempore à malo leuati, rursus idem patiuntur, atq; in uniuersum his qui ueratrum sumpserunt similes existunt. Pulsus autem aliquando densiores, aliquando etiam rariiores & minores fiunt. plurimum uigiles permanent, & si quidem dormierint cum perturbatione æstuosiores exurgunt, ebulliente ut uerisimile est delato in uentrem humore. Sæpe etiam acceptum cibum unà cum atræ bilis humore euomunt: ferè in totum enim post duas ab accepto cibo horas accessione apprehenduntur, maxime quum acrem aliquem aut salsum cibum aut potum ingesserunt. Excrementa alui retinentur, aut præter naturam incocta excernuntur. Effertur autem aliquando & bilis inferne per aluum, atque adiuvat affectionis declinationem. Aliqui autem ob retentam bilem, etiam atræ bilis affectionibus, & delirij mentem alienantibus sunt apprehensi. Quod

Atra bilis uisum acuit

si contingat, siue febris adsit, siue non: siquidē iuuenes sine sanguineq; abundent, & reliqui numeri ad uenæ incisionem requisiti adsint: uena secāda est, repetita sanguinis detractio, & hoc tamen per infusum clysteris corpore prius euacuato. Atqui ad animi usq; deliquium id facere non oportet, propter stomachi imbecillitatem. Colligandæ autem adstrictæ extremæ corporis partes, & ad paucum cibum ægri cogendi; stomachus uero lanis succidis fouēdus est ex aceto plurimo, modicisq; rosaceo, aut melino, aut lentiscino.

*Stomachi im-
becillitas quō
corrigatur*

Quod si amplius permaneat stomachi imbecillitas, ex rosarum succo foueantur, siue intubi aut portulacæ cum rosacco: adstringentia etiam & lenientia cataplasmata imponantur. Qui uero unā cum morsu circa uentrem ac intestina inflantur, ijs conuenientissimum est acre acetum, in quo pulegium est decoctum, & cuminum calidum forinfecus uētri per spongiam impositum. Dolore uero perseuerante, alumen liquidum cum atramento sutorio trito, & aloe, melle excepta imponito, & alumine in acetum coniecto & calefacto stomachum per spongas foueto: aut aluminis ac aloes æquales partes cera to myrteo exceptas ad os uentris apponito: aut hederæ folijs in uino decoctis uentrem integito, aut plantagine cum sale trita, aut marrubio cum pane & rosaceo subactis, aut bulbis rutis cum pari pondere aluminis cooperito. Optimum enim hoc est inueterato malo remedium: quin & bulbi ipsi cum nitro triti & impositi celerem curationem præstant. Optime etiam conducit eis gregarij bouis sterces aridum uino decoctum & impositum. Epithema quoq; ex seminibus adhibendū: item bulbi cum stercore bouis ac nitro permixti. Ex Dioscoride.

Frigida usq;

Conuenientissimū omnium his qui atramentum generant, inflatisq;, & morsum sentientibus pulegij decoctum existit potatum: aut aqua in qua ferrum est extinctum: item intubi succus potatus: bibant autem aquam, eamq; calidam. Si uero plurimi caloris sensum percipiant, frigida danda, sed modica, & maxime tempore exacerbationū. Astuantibus enim & in lectu existentibus, omniq; miseria afflictis, frigida ad absorbendū concedenda, per interualla tamen, & non ultra cyathi mensuram. Non enim humectatione opus habent, sed refrigerationis tantum gratia, frigida permittitur, & ut melior intrinsecus temperatura fiat. Vtilis est ipsis & mentæ succus cum succo mali punici dulcis. Quod si aquam bibere non possint, parum uini aquosi concedendum est inter cibos, calida aqua probe diluti. Cibis maxima ex parte sit frumentaceus & optimi succi in omnibus simplicior autem & qui facilius concoqui ac commutari possit in febricitantibus. His uero qui febre carent adijci possunt ex olenibus, lactucæ cauliculi ac malux, pisces petrosi aquis degentes: & ex uolucrum genere, non graue olentes, macræ & montanæ: ex ostreis quæ testa integuntur, herinacci recentes. A falsis uero & acris in totum abstinant. Molestas autem mordacitates & nauseas, hausta plurima tepida aqua per uomitum soluant. Si uero id non bene tolerant, quiescere iubeto, & extēdæ manus palma stomachum foueto

Foueto: quo delatum ad ipsum biliosum inferne per aluum excernatur. Quod si uenæ incisionem non faciamus, secunda ac tertia die per dysterem euacuandum est, & modico cibo æger connutriendus: deinde in potu exhibendum pulegij decoctum ieiunis, reliquæq; supra dicta. Fomentum etiam ex aceto adhibendum, & cataplasma ex stercore bubulo ammixtis bulbis & nitro. Porro postquam febris cessauerit, aut ubi etiam in totum non febricitauerint: & tamen diutius malum molestia afflixerit, & irritationes per longa interualla repetuerint: purgandum est corpus ex hiera Archigenis, aut Ruffi. Qui uero sputi multitudine stomacho uexantur, his conyza arida maxime tenuis manducanda, aut pulegium, & mastiche chia ex aqua potanda. Exhibendum est etiam lac in potu iisdem, quemadmodum in proprio capite de ipsis ex professo est ostensum. His uero qui stomachum ualde exolutum habent, serum lactis per acetum mulsum hñsi exhibeatur, ita ut ad primum feri haustum epichymi tenuissime triti scrupulos nouem, & scammonia obolum unum aut duos iuxta uirium tolerantiam inspergamus. Deinde serum ipsum per interualla paulatim bibant: sitq; eius potati mensura ad minimum quinque cyathorum. Bonum est & cucurbiulam ad dorsum affigere, aliquando etiam ad stomachi regionem, & scarificatione facta, sufficientem sanguinem ex fissuris extrahere. Quo uero penitus affectio hæc destruat, quotidie horam unam ante ciborum sumptionem exerceantur, ac frigida lauentur, maxime in mari, & arena sub caniculæ ardoribus obruantur. Abstineant autem ab omnibus atram bilem generantibus, maxime carnibus bubulis, uino nigro, brassicæq; & lente. Diligentissime autem de ipsorum diæta in sexto sermone, ubi De atra bile egimus, est prædictum. Quod si inflatio eis augetur, rutam & cuminum in oleo decoquemus: indeq; uentrem quàm plurimum irrigabimus: ex eodemq; oleo quincuncem per dysterem infundemus, si tamen dysteri stercoreum eductiuo prius ipsos euacuauerimus, in quo decocta sint ruta & cuminum. Deinde splenium magnum aluo ac uisceribus imponendum ex epithemate quod ex seminibus constar. In cibo uero succus ptisanæ detur, qui ex aceto, melle, cumino, & aniso sit conditus. post etiam gallina iisdem condimentis apparata exhibeatur. potus uero sit uinum rufum mediocri mensura.

Ad eos qui flauam bilem euomunt. Caput 111

EX libris Philumeni. Qui flauam bilem euomunt, siue in febris, siue citra febres id contingat: eis conueniunt ea quæ ad nauseam, ac nimiam stomachi humectationem describentur. Quare omnibus ad illos descriptis odoramentis, manducatorijsq; & fomentis utantur. Decubitus autem eorum, à cibo præsertim & potu supinus adornetur: & spongia ex posca imbuta ad os uentris imponatur, maxime si non uilis & contempnibilis sit æger. Fricatio etiam & constrictio iuncturarum manuum ubi

Sputi multum
do stomachum
affligens

Stomachus
exolutus

conuulsus & prostratus
in aqua & oleo tritus
serum & uisceribus affligens

Atram bilem
que generant

pulsum exploramus adhibeatur, & reliquarum similiter extremitatū corpō
 ris partium. Cataplasmata autem ex palmis, mali corio, & similibus accipiū
 tur, quæ ex uino quidem aut posca sint decocta, cum pane autē & acacia, &
 hypocistide permixta ac contrita: quin & rhus & sylvestris punici mali flo
 res commode cataplasmati admiscuntur. Atq; uniuersi corporis curatio ex
 oleo fiat, modico nitro ammixto, quo sudorem ex cute eliciamus, & fluores
 transferamus: & ob id etiam alui per inferna excretio plus quā oportet fa
 cta uomitus desiccatur: quare ex absinthio & aloë potionem conuenienter ex
 hibebis. At uero affectione diutius perseverante, si ægri uires non repugnēt,
 etiam hieræ catapotia ex colocynthide ab Archigene descripta apparabi
 mus, de q̄ eis minimum drach. i. summum iiii. dabimus. Ex si nihil obstat cat
 aplasmate ex sinapi præcordia rubefacimus. Prædare enim sensum ipsum
 ad cutem transfert. Verum hæc diuturnæ affectioni remedia conueniunt.
 Tempore autem exacerbationis & circa accessioneis acumē, cucurbitula plu
 rimum auxiliatur cum multa flamma ori uētris affixa, fortiterq; abstracta;
 rursusq; secundo ac tertio adglutinata. Cibos quales uomentibus solemus
 exhibebimus, sæpe & paulatim sumendos, & quotiescunq; reuomuerint ac
 ceptos, roties alios post modicū interuallū offeremus. Ante cibum aquam
 tepidam dabimus, & uomere cogemus: bilioso enim humore circū acutū ad
 hærente unā cum aqua reiecto, stomachus elotus ac leuior redditus statim
 retinet oblatum sibi cibum. Mitigat autem dolores & stomachi morsus por
 tulacæ succus tum per se, tum cū unguento nardino aut melino mixtus. Qui
 uero stomachum habent uehementer exustum, eis utile est lapathi acuti lea
 men, triū obolorū pondere ex aqua: aut mastiches tenuissime tritæ cochlea
 re bibendum præbe ieiunis ex aqua. Maxime omnium autem morsus sedat
 lac asininum: aut si hoc nō adsit, bubulum recens multum potatum, absq;
 dilatione enim auxiliatur. Si uero neq; hoc adsit: quartam eius partem aque
 calidæ accipere oportet, & feruefactā bibendam præbere. In balneum quoq;
 & ad uini potationem celerius ducendi sunt qui bilem uomūt, quo uidelicet
 ad cutem materiam transferamus. Ceterum & uinum subadstringens firmē
 tatem corporibus addit, ac cibos retinere cogit. Utendum est etiam aliquan
 do ceratis ex lentiscino aut cenanthino oleo, admixtis absinthio, aut aloë,
 aut galla, aut cenanthe.

Vinum firmat
 corpora

Ad eos qui stomacho exuruntur, & siticulosi sunt. Cap. iiii

Situm sedat

Sitis fit aut ob penuriam humiditatis, aut abundantiam caliditatis: siccit
 as remedium est somnus, caliditatis uigiliæ. Verum his qui ob multi uini
 potum sitiunt, frigida aqua potata auxiliatur. Quibus autem lōgo iam tem
 pore stomachus æstuat, eis auxiliatur, simulq; sitim sedat, radices dulcis succ
 us potatus, atq; ipsa etiam radix ex aqua, pampinorū uitis cremor, & por
 tulacæ succus. Ab imbecillitate autem uires recolligētib; sitim sedant, hucus
 siq; cibo acceptæ, & symphytum in petris nascens commanducant. In cat
 plasmati

plasmatis uero ad stomachi ardores conducunt, sanguinaria, intubum, sonchus, apium hortense, pampini uitis, portulaca, unumquodq; cum polenta aut pane. Qui in superficie uruntur, his ramentorum cucurbitæ succus opitulatur cum rosaceo, aut omphacij succo. Sitim autem quæ in febribus oboritur, lenire solet capitis irrigatio ex frigidissimo oleo, aut rosaceo, ex alto nimium sincipite irrorato. Sitim etiã adimit stomacho exustis cucumeris semen commanducatum, decorticatum uero & tritum, ex aqua potatum ualde ijsdem axiliatur. Eodem modo prodest lactuca semen manducatum & potatum item semen portulacæ. Aliud adipson, sitim optime tollens.

Cucumeris faciuu feminis decorticati drach. v. iii., tragacanthi drach. iiii. Tragacanthum contundito & cribrato: semen uero conterito, eisdem ouorum crudorum recentium candida adijcito, & simul omnibus contritis catapotia in formato, ac in umbra exiccato. Ex his deinde unum sub lingua detinendum præbeto, ut paulatim dissolutum deglutiatur.

Aliud adipson, ad stomachi nimiam humectationem commodum, in his præsertim quibus humida & calida dispositio adest. Rosarum uiridium unguibus earum resectis drach. v. i., radices dulcis drach. iiii., spicæ nardi drach. iiii. excipe uino dulci, & redige in catapotiorum formam, indeq; ciceris magnitudine sub lingua detinendum præbe: refrigerat, & firmitatem addit. Aliud. Seminis cucumeris, feminis portulacæ uiridis, tragacanthi, cuiusq; drach. iiii., radices dulcis drach. ii. Excipe portulacæ succo, & in catapotia redige magnitudine fabæ, & utere uno pro uice sub linguam exhibito. Absorbeant etiam malorum cotoneorum cremorem, aut pitorum aut omphacij succum cum aqua. Aliud adipson. Seminis portulacæ uiridis, feminis peponis, succi radices dulcis, tragacanthi, singulorum recales partes aqua subigito, & ad fabæ magnitudinem reducito, ac uitor.

De singultu.

Cap. v

Singultus accessio stomacho accidere solet ob repletionem, aut euacuationem, aut frigiditatem aliquando etiam ob humorum acrimiam & medicata qualitate præditorum mordacitatem, quos ubi uomitu reiecerint, statim à plurimo singultu liberantur. Quin & hi qui pharmacum ex tribus piperis generibus biberunt, aut ipsum adeo piper, si statim uinum à sumptione eorum ingesserint, omnino singultiunt. Cibus quoq; in mordacè qualitatem corruptus aliquos singultire facit, & oris uentris frigiditas singultum inducit: maxime uero omnium pueris frequentes singultus accidunt ob stomachi frigiditatem, & alimeti corruptionem. Fit etiã in febribus singultus, stomacho præsertim aut aliquo alio uiscere inflâmato. Frigiditate itaq; singultum præcedente, oleum lana exceptum stomacho imponendum, in quo ruta, cuminũ, & absinthiũ sint decocta. In potu etiã ruta cum uino exhibenda, aut apium in aqua mulsæ decoctum, aut cuminũ tritum, aut calaminthe, aut asarũ, aut pulegiũ, aut dictamnũ, aut celtica nardus, quodlibet eorum per se aut simul mixta. Vtile est &

acetum

Catapota ad sitim.

Singultus ex frigiditate

acetum scyllinum forbillando acceptum. Castorium autem eis qui integræ sunt ætatis, tum ob frigiditatem singultientibus, tum ob humorum multitudinem similiter affectis, drachmæ pondere ex posca dandum: quin & stomacho forinsecus impositum utrisq; commodum existit cum oleo sicyonio aut antiquo. Quando uero ex repletionem singultus oboritur, quomodo in totum frequentissime consistit, uiolente motu opus habet. Vomitus itaque remedio fuerit, & extremarum partium adstrictio, compressio spiritus, uociferatio concinna, cum plurimo clamore, deambulatio longa & concitata, urinatio siue nauigatio atq; adhuc magis equiratio, cucurbitulæ cum plurima flamma pectori, stomacho, & dorso affixæ: sternutatio etiam conuenienter prouocatur, eis qui ob humorum multitudinē singultunt. Singultui autem ex euacuatione oborto maxime contraria sternutatio existit: sanatur autem hi per alimenti conuenientis assumptionem, & per ea quæ defectū explent. Singultus quod præfagiant Singultus in altiore sopore, aut animi deliquio, aut tetanis obortus, mortem non longe abesse præfagit. Cæterum & his aquam multam assidue bibendam exhibere conuenit, aut aquam puram mediocriter feruescentem. Conducit & castorium ex aqua multa potarum pōdere trium obolorum. In his uero qui à malo uicti sunt prædara remedia recusanda sunt. Porro mordacitate singultum producente, primum sufficiens remedium uomitum ipsum reperiemus: deinde etiam assus stupefactionem, & morsum inferentiu alterationem ac discussionem. Stupefiunt itaq; sensus per refrigerantia. Aliter autem mordacitas per exiccantia. Eiusmodi mixtæ facultatis subiectum pharmacum existit, & quæ ei assimilari possunt. Habet autem hoc modo.

Singultus ex mordacitate

Asclepiadæ pharmacum, ad eos qui stomacho exuruntur, & ad uehementes singultus, uoluuolosq; stomachi affectiones.

Costi, spicæ nardi, chrysobalani, croci, rosarum uindium, mastiches, cuiusq; drach. iiii, asari, aloes, cuiusq; drach. ii, opij drach. i. subige cum psyllij cremore, & digere in pastillos, quorum tres pro uice dato. Ego uero chrysobalano reprobata, pastillo qui aster appellatur ad hos uitor, qui paulo mox ad stomachi subuersiones describuntur. Obtudit autem mordacitatem, & ex ea obortum singultum sedat, intubi succus potatus, cucumeris semen decortatum tritumq; bibitum: lactucæ semen eodem modo: item portulacæ succus potatus, ipsaq; portulaca in cibo sumpta: myxarū decoctum in potu acceptum: maxime omnium tamen præstat lac recens multum potatum.

De bulimo, id est ingenti fame.

Cap. vi

Bulimos ex stomachi frigiditate oboritur, indigentiaq; ac uirium imbecillitate, & ab externo frigore sæpe in totum initium capit. Vox ipsa Græca est, & à Latinis magna fames interpretatur. Fames enim in principio multa adest, quæ tamen non usquequaq; perdurat. Nam postea repente animo linquntur, cum extremarum partium refrigeratione, & spiritus defectione. Et sanè quidam in locis desertis, aut in balneo in malū istud collapsi, exin-

stanti

ſtanti perierunt, auxiliij facultate deſtituti. Peregrinationes autem & itinera longa, maxime per niuem facta, affectionem hanc inducunt. Eos itaq; qui in itinere, aut alias, fame magna citra febrem infeſtantur, reſoue bimus aceto aut pulegio, ad odorandum exhibito, aut terra quæcunq; tandem obtigerit aceto conſperſa: item pomis, ac alijs qui inueniri poſſunt fructibus. Auxilia-
tur & panis recens naribus admotus, & caſeus boni odoris, caro ſuilla aſſata aut cocta: & in uniuerſum omne quod ualde nutrit, maxime uero quod ni-
dorofum ac probe conditum habet odorem. His enim ut plurimum multi reſocillantur. Cæterum & extremæ eorum partes ſcicis conſtringendæ ſunt, manuumq; ac pedum ſummitates calidæ aquæ ſeruentiori imponendæ: & ipſi quoq; ſtimulatis eorum maxillis, crinibusq; ac auribus uellicatis excitā-
di. Reuocatis autē ab exolutione panem ex uino diluto offeremus, aut aliud quiddam eorum quæ accuatim uires reparare poſſunt: uelut ſunt, oua ſor-
bilia, halica cum uino. Compendioſiſſimum enim auxilium ex cibo ſperare poſſunt, quem etiam ſi oblatū acceptare non poſſint, ori indere oportet uiolenter, cogereq; ut ipſum tranſglutiāt. Eueſtigio enim & à fame & ab animi deliquio liberantur, & celeriter excitantur. Accedit etiam in febris, raro ta-
men, neq; cito, uerum circa uigorem ac declinationem. Si itaq; circa remiſſio-
nis exacerbationum febrilium tempus, eius acceſſio irruat, aut circa exacer-
bationis declinationem, intrepide eis cibi ſunt offerēdi. Si uero in principio acceſſionis febrilis, aut in uigore apparuerit, per prædicta odoramenta cona-
bimur eos primum reuocare, maxime per ea quæ frumentacei generis exi-
ſtunt: uelut eſt, polenta aqua madefacta, aut poſca, aut panis calidus uapo-
rem adhuc emittens. Fricatio etiam extremarum partium adhibeatur, & ca-
taplaſmata ex palmis, aut malis cotoneis, aut polenta, in uino diluto deco-
ctis: atq; hæc uſq; ad remiſſionem facere oportet, ut oportune cibum offeramus. Quod ſi ex his nihilo melius habeant, audendum eſt per ciborum in-
geſtionem auxilium adferre. farinæ itaque craſſioris cochleare unum ex aqua mulſa, quæ lactis ſpecie in tactu de ſe præbet exhibeto. Buccellas item unam atq; alteram uino madefactas. His enim reſocillati ac reſpicientes, ex improuiſo deinceps uſq; ad remiſſionis tempus perueniunt: in quo tum cor-
poris curationem, tum ſufficientem ordinabimus cibum. Vitabimus autem omnino in his qui hac affectione ſunt apprehenſi, longiorē cibi dilationem ac inediam, & ne alternis tantum diebus cibum offeramus. Verum ſolerti ra-
tiocinatione facta, ſingulis horis ſimpliciſſimum modicumq; cibum dabi-
mus. Aſſidui enim bulimi & exoluunt & in animi deliquio incidunt, quibus ægre auxilium reperitur.

De animi deliquio: ex Philumeno.

Cap. VII

A Nimi deliquium ſiue in febris, ſiue citra febres contingat ex præma-
niſteſta cauſa, uelut eſt, plurima ſanguinis aut uentris excretio, aut aſſi-
dua migræ-

Cibi uires
reparantesCibi alternis
diebus

dua migratio, aut motus, aut dolor, aut timor auxilium fert ex caussarū ablatione, de quibus absolutissime in febriū tractatu à nobis est prædictum, quinto uidelicet sermone. Dicitur autem summam & paucis etiam hoc loco de iisdem. Frequentes igitur migrationes eis prohibendæ sunt, & acuatim facta euacuatio cohibenda, doloresq; mitigandi: eausse etiam quæ timorem inducunt soluendæ, siue forinsecus accedant, siue ex humoribus in corpore oboriantur. Extremæ corporis partes animi deliquijs irruentibus constringantur: cucurbitæ etiam aliquando tum posterioribus, tum anterioribus stomachi partibus affigantur, & in latus etiam apponantur. Caput autem agitatum leui manus impositione cum coarctatione etiam comprimatur. Odoramenta quoq; offerantur, & aperto ori digitus aut penna immittatur, facies uero ac stomachus uehementissime fricetur. Hoc enim modo præoccupati refocillantur, uiresq; recolligunt, neq; in periculum animi deliquij incurrunt. Reuocatis autem siquidem febre careant cyathi iii, aut iiii. frigide aque in potu exhibendi, quam tamē paulatim & per interualla absorbeat, aut cremore palmarum, uuarum passiarum, malorum cotoneorum, rosarum, aut pampinorum, aut alicuius consimilis, aut uuæ acerbæ nondum maturæ succum cum frigida aqua. Aut mentæ ramulos tres tritos cum mali punici dulcis siue acidi succo præbeto absorbendos: aut polentam cum punici succo. Forinsecus autem stomacho ea imponenda sunt quæ supra ad cardiacos & bilem uomentes sunt descripta.

De his qui in balneo animo linquntur.
Caput viii

Qui in balneo animo linquntur, aut magis animo linqui incipiunt, eos celeriter educere oportet, neq; multa aquæ infusioe humectare. Qui autem iam inciderunt, celeriter exportandi sunt: & reliquum quidem corpus leui quopiam uelamine cooperiendum, facies uero spongia frigida imbuta madefiat, aut frigida aspergatur. fricanda etiam facies, stomachusq; & pedes. os quoq; aperiendum pennarū aut digitorum immisione, omniq; modo conandum quo humor ipsius animi deliquij autor euomatur, aqua tepida ori instillata. Et si enim nihil inde euomant, stomachus tamen irritatione firmatur quæ animi deliquium soluit: auxiliatur etiam ad oris apertionem auditoriorū meatuum cōpressio, similiterq; ossium quæ à petraë duritia, lithoidea, hoc est petrosa appellantur. Qui uero perfectiori sunt ætate etiam alapis sunt cædendi, capillorum quoq; facta euulsione. Ex uociferatio quidem unius, utilis est: multorum autem & simul edita, nocet. Ceterum à uehementi animi deliquio conualescentibus, tum in calidam, tum in frigidam aquam demissiones, uelut mortis causse timendæ. Aut enim laxatis corporibus, calore discussio & resolutio pereunt: aut à frigiditate adstrictis, extinguuntur.

Ossa petrosa

De stomachi

De stomachi imbecillitate, & supinitate, ac subuersione:
ex Galeno.

Caput 1x

QUæ supinitas stomachi appellatur, ex intemperie quacunque tandem oboritur, nullis humoribus uitiatis. Oboritur etiã ex multitudine humorum, nulla tamen maligna qualitate accedente. Stomachus enim à largo humore fortiter madefactus, ad similitudinem amplitudinis totius uentris laxatur, adeo ut cibus obuolui, eosque contegere non possit: & propterea circa ipsum humores supernatant, quos ubi uentriculus abrumpere omni impetu anniditur, anxietatis accessiõnem perfert, ac prius quam cibus præbeat, extremã imbecillitatis. Facillime autem hæc affectio curatur, quum reliquæ stomachi affectiones ferè longo tempore perseverent. Opus uero habet pharmacis humorem deficcare ualentibus, cohibereque ac adstringere laxatum corpus. Itaque si in profundum usque humiditas extendatur, & crassa tenaxque existat, pharmacum miscere oportet extenuatorum & ueluti consumptiuum: quale est acetum & acetum mulsum. Si uero eiusmodi humiditas non existat, neque in profundum usque corporum extendatur: adstringentia sola ad curationem sufficiunt. Magnum autem signum ad cognoscendum, frigida ne sit an calida hæc affectio, sensus agni præbet: liquidum aut nullam, aut aliamquam sitim perceptet. Supinitas igitur stomachi ex uitiatis humoribus oboritur: picra curantur, quemadmodum paulo post dicitur, utpote quæ celerissime uitiatum humorem repurgat. Subuersiones uero & nausæ ex imbecillitate stomachi factæ, per intemperiei correctionem sanantur, & per incumbebris humiditatis deficcationem. Siquidem autem calida affectio existat, catapotia ad ipsa & sitim tollentia exhibeantur, quæ ad eos qui stomacho exuruntur sunt descripta, & maxime quod ex rosis, spica nardi, & radice dulci constat. Ad frigidiore uero & humectiores affectiones conueniunt subcripta.

Supinitas
stomachi

Picra, pharmaci
amarum.
Subuersio
stomachi

Catapotia
adipsa

Asclepiadæ, ad stomachi subuersiones.

Succi acinorum mali punici acidi sextarios 111, succi mentæ sextarium 1. conijce in uas fictile, & decoque assidue agitando, & ubi coacti fuerint ablatos recondito, & ante cibum mystum unum aut duo exhibeto. Aliud. Vuam acerbam immatutam arefactam, contusamque & cribratam in promptu habe, & cochlearij mensura ex aquæ frigidæ cyathis duobus præbe.

Aliud, quod calidioribus dispositionibus magis commodum est, sicut etiam præcedens.

Mala punica matura & in uigore perfecta quinque aut sex numero, integra unã cum putaminibus contunde, & infusis aquæ pluuiialis sextarijs tribus usque quo ad tertias omnis liquor redactus fuerit decoque, exprime, ac percola, liquoremque expressum rursus per se decoque, donec ad mellis spissitudinem redigatur: ac inde cochleare unum aut duo exhibe: his qui febre carent cum uino, febricitantibus uero ex aqua. Aliud ualde bonum.

Succo mali punici acidi, ac intrubi, æqualibus portionibus permixtis, mentæ

k licet

siccæ tenuissime tritæ parum quiddam insperge, & cyathi mensura bibendum præbe. Idem facit oxylapathi semen tritum ex aqua potatum: similiter & semen portulacæ. Vtere etiam confidenter ad stomachi subuersiones, amazonum pastillo, & eo qui alter appellatur, quorum compositionē paulo post in nausæa tractatu describo. Vtere quoq; cataplasmatibus & epithematis, quæ mox post sermonem de nausea describentur.

De nausæa: ex Galeno.

Cap. x

*Stomachus p
edensum rei
quis membris
primis affectis,
ægrota*

Nausæa ex uitioso humore tum calido, tum frigido gignuntur. Qui in uentre continetur, aut in concauitate ipsius innatat, aut in tunicalis eius infartus instar uisci adhæret, atq; ægre auelli potest: aut serosior & medicatior existens in ipsis uentriculi tunicalis: uelut aqua in spongia, imbibitur. At qui eiusmodi humores ex uentris intemperie tum calida tum frigida aliquando generantur. Aliquando autem ex alijs partibus prius affectis in ipsum uentrem, uelut excrementa illarum confluunt, utpote ex hepate, aut splene, aut capite, aut ex uniuerso corpore. Quando igitur aliæ partes prius afficiuntur, omni modo uniuscuiusque propriæ accessiones concomitantur: & ipse æger primum affecti membri læsionem sentiat, aut enim caloris sensus iuxta affectum membrum ipsi contingit, aut frigoris, aut grauitatis, aut etiam tactui nostro durum luxumbit. Si uero uniuersum corpus uitiosis humoribus repletum est, id ipsum ex colore, & eruptionibus papularum circa cutem cognoscitur, atq; ex ipsa adeo urina. Quod si nihil horum adsit, certum est uentrem ipsum aliquo modo ægrotare. Si itaq; cibi in uentre nidorosi fiunt, nullo huiusmodi cibo assumpto, uelut sunt pisces, aut oua in sartagine fricta, aut alij consimiles: necesse est rationari causam calidam esse, quæ hoc in uentre operatur.

Cibi nidorosi

Cibi acceſcentes

Si uero accescunt in uentre cibi, nullo huiusmodi cibo sumpto, uelut sunt pisces, aut oua in sartagine fricta, aut alij consimiles: necesse est considerare frigidam causam esse, aut atræ bilis humorem uentrem infestantem. Manifesta autem erit cognitio & sciëntia causæ, quam habes suspectam. frigidis enim pharmacis cibusq; ac potibus statim adiutum hominē uidebis, si quidem calida dispositio extiterit. Si uero frigida, calidis cibus & pharmacis iuuabitur, à frigidis uero lædetur: cæterum & sinus ad calidam affectionem concomitantur: sicut autem ferè in totum earent, qui frigidam intemperiem habent: nisi falsa sit pituita. Atqui ex diligenti uomitus inspectione eiusmodi quoq; cognoscuntur affectiones. Si enim intemperie quadam uenter afficitur, assumptos cibos ad intemperiei naturam permutat: ut appareant uomitus redditi cibi, citra alicuius humoris complexum, in nidorem aut acorē per mutationem suscepisse. Si uero humor quispiam uitiosus amplitudini uentris innatet, & cibum corrumpat ipsi cibi manifeste eiusmodi humore madefacti apparent, & in illius naturam permutati. Quum uero cibi amplitudini uentris innatent, humorem ipsum affligentem producant: qui ubi infartus, aut imbibitus, ut dictum est, in uentris tunicalis fuerit, siquidem calidus sit,

sticulosos

finiculosos facit, & ciborum inapparentiam inducit: si uero frigidus sit, ciborum appetitiam excitat, & sitim extinguit. Nausea autem utriusque accedunt, & inanes uomendi irritationes, quæ lancinant tantum & nullum humorem educunt. Prædictum autem & antea est, quod si tenues humores & ueneni si existant, quos etiam Græci *ιχθυες*, hoc est serofos appellant, per pro- fundum solidorum uentris corpusculorum procedunt: & uelut aqua in sponsa imbibuntur. Si uero tenaces sint, circa internam uentris superficiem uiscerum modo adherent. Serofi itaque humores utpote tenuium partium existentes, non solum ante cibos, sed & post acceptum cibum, uomitum inducunt, perpetuo nimirum motu uersati. Qui uero superficiei uentris infanti adherent, ante cibum magis inanes uomitiones mouent. Diligenter itaque considerare oportet, num uentris tantum affectio hæc sit, aut alicuius alterius membri. Deinde qualis affectio existat, an calida, aut frigida, humida uel sicca. Et si quidem ex alia quadam parte, aut ex uniuerso corpore humores in uentrem confluant, priorem curam membri prius affecti habere oportet: ita tamen ut neque uentrem ipsum negligamus. Qui enim primum affectum particulam curat, uelut fontem omnium in uentrem influxionum excindit. Ventre autem solo affecto, dispositionis in ipso qualitate cognita medebimur. Calidam itaque intemperiem semper refrigerare oportet, in quocumque tandem membro existat: frigidam autem calefacere: eodemque modo humidam desiccare, & siccam humectare. Innatantes autem amplitudini uentris humores euacuare, siue per uomitum, siue inferne per aluum commodius id fiat. Qui uero in tuni- culis uentris infartus adheret, aut imbibitus est uiciosus humor, per repurgantia ipsumque incidentia ac euacuantia pharmaca est curandus. Internaturæ enim in humoribus consistentes pharmaca humores euacuantibus opus habent. Qui uero absque uitio humore, ab intemperie sola quacumque tandem, maxime tamen calida & sicca infestantur, in tabem omnino perueniunt, pharmaco euacuante purgati, etiam si exhibitum pharmacum imbecillius existat: quale est ex aloë pictum appellatum. Quo modo igitur unamquamque intemperiem, siue simplicem, siue mixtam curare oportet: etiam prædictum est in quarto huius tractationis sermone: dicitur tamen oportune & hic de eadem re, sed paucis.

De intemperie frigida.

His itaque qui ex frigida intemperie afficiuntur pharmacum ex tribus piperis generibus commodum existit, aut quod ex calamintha constat, aut aliud quoddam consimile, ex uino tenui aut aqua potatum. Forissecus autem stomacho mastichen chian, unguento nardino dilutam & tritam, purpureaque exceptam lana imponito. Vinum uero exhibendum est rufum, subadstringens & uctustius, & consimiles etiam cibi.

De intemperatura calida.

His uero qui à calida intemperatura afficiuntur cum mediocriter adstringentibus & refrigerantibus forissecus stomacho ac uentri adhibitis, medebis: ita ut quanto magis calor exceleat, eo amplius refrigerantia adaugeas.

k 2 Cibum

Humores serofos Græcis *ιχθυες* appellantur

Curatio uentris prius affecti prior sit quam per cõsensum affecti

Pharmaca euacuantia quando uebementer nocent

Cibum autem exhibebis haliçā ex uino albo & tenui, & ceteros subadstringentes: ex uolucris, macras & non scitidas, ac quæ his cõsimiles existunt. Si uero pituitosi aut uiscosi & crassi humores amplitudini uentris innatent: aceto multo utendum est, in quo ex incidentibus, ac repurgantibus, medicamentis calefacientibus quædam sunt decocta. His uero quibus uitiōsus humor intrinsecus circa superficiem uētris infartus adheret, ut ægre auelli possit: ex aloë picta appellata compositio utilis existit. quæ uiscosum humorem repurgare consuevit, crassumq; extenuare, per uires eorū quæ cum aloë sunt commixta. Quod si serosa humiditas tuniculis uentris sit imbibita, quæ ut prædictum est, non solum ante cibum, sed post acceptū etiam uomitus mouet, primum Amazonū pastillus conuenienter exhibetur, qui pictæ est subscriptus. Mediocriter enim per hunc uomitus prohibitis, deinde ex aloë picta appellata utimur. Cuius compositio hæc est: Aloes drach. ii, xylobalsami, mastiches, croci, spicæ nardi, asari, cinamomi, cuiusq; drach. vi. contere & repone arida, & exhibe perfecto pondere scrupulorum xii, ex aqua frigida aut calida cyathis xii. Andromachus ad prædicta etiam floris iunci odorati drach. vi. adiicit: & aloë lotam coniungere iubet. Verum quod cognoscere opera: precium est: ad uentris subductionem illota aloë conuenientior existit. quæ enim lota est, multum à medicamentaria facultate deponit: quam confidētius etiam exhibere quis possit, eis qui non ualde febricitant, & quibus firmitatem uentri addere uolumus. Quare scire oportet ex uitiatis humoribus affectiones circa stomachum & uētrē, per pharmacum ex aloë utiliter subduci & euacuari posse: quæ in maximā perniciem perueniunt per adstringentium eduliorum, potionum, ac pharmacorum exhibitionē. Asclepiades Themison piades autem pictam eodem quo Themison modo apparare iubet. Habet autem hoc modo: Aloes drach. c, mastiches, croci, spicæ nardi, asari, cinamomi, cuiusq; unc. i, & pro xylobalsamo carpobalsami unc. i, contundito ac per angustissimum cribrum excutito, siccumq; ne in aerem trāspiret adseruato; & drachmam unam tantum ex frigida præbeto, nisi menses ciere uelis, nam tum præstat præbere ex uino. Educit menstrua sceminarum: facit & ad uuluarum affectiones: proprie autem ad stomachi subuersiones: conducit hepaticis, affectionibus renum, atq; omnino admirandam potentiam habet. Ad refrigeratos autem & qui pituitā crassam & uiscosam in uentre habent, subiectum pharmacum commodum existit. Calefacit enim & extenuat ac dissecat crassiciem, uiscositatemq; repurgat. Habet autem hoc modo: Corticis radicis sceniculi uiridis sex uncem, aceti sesquiseptarium, aloes quadrantem. Cortex cum aceto ad tertias decoquitur: deinde percolato aceto mellis attici uncias quindecim adijcimus, & ad mellis crassitudinem coquendo redigimus, & contrite in mortario aloë paulatim hoc ipsum acetum multum coctum affundimus: postea uero simul unita tollimus, ac utimur. Datur ad summum mensura cochleariorum trium.

*Picta ex aloë
compositio*

*Aloë lota
& illota
usue*

*Asclepiades
Themison*

*Pharmacum ad
refrigeratos*

Alia compositio, quæ dulcis appellatur.

Aloes septuncem, iridis sextantem, mastiches selquunciam, nardi celticæ unciam unā, piperis drachmas quatuor, zingiberis drachmas 1111, aceti chœnices septem, cyathos septem, mellis libras tres, sextarium unum, corticis radicis foeniculi libras tres. Corticem foeniculi in aceto præmaceratū ad tertias decoque & percola, residuoq; aceto mel adijce, ac rursus decoque usque quo probe cogatur, deinde sicca in mortario simul ammisce, & cochlearium unum exhibe. Conducit frigidioribus tēperaturis, & aluum pituitosiores mediocriter soluit, & caput leuius reddit.

Amazonum pastillus.

Facit ad uolulofas stomachi subuersio-

nes. Volulofas autem fortes stomachi subuersiones appello. quemadmodum enim in uolulis uomitus cum uehementi contentione fiunt, & sterco-
ra reuomunt: ita etiam alios uomitus concitatos, uolulofos appellare pos-
sumus. Consequuntur autem huiusmodi uomitus ubi magna molestia affe-
ctis membris à fortibus medicamentis est illata: & si sursum aliquo modo
prolatus fuerit uenter, geminatur malum ex mordacitate. Quapropter ita
instruenda curatio est, ut simul odoras qualitates affectis membris offera-
mus: quales sunt aromatum quorundam & seminum in ciborum usum ue-
nientium: uelut est anisum, & apium, & similia. Quemadmodum enim gra-
ueolentia omnia stomachum subuerrere consueuerunt: sic odora corrobora-
rant, maxime quæ nobis sunt familiaria & in cibo accipiuntur. In quibus itaq;
coniectamus serosos humores in uentris tuniculas imbibitos esse, his hoc
pharmacum magis conueniet. Quibus uero circa superficiem uentris tunicu-
larum infarti adherent, eis picra utilius exhibetur. Quod si exhibitam pi-
cram reuomant, coniectare oportet mixtam esse affectionem, & tum tuni-
culis imbibitos, tum superficiem infartos humores, in uentre abundare: quare
utile fuerit pastillum præbibendum exhibere, ut mediocriter uomitum pro-
hibeat: deinde autem pharmaco picro uti. Est autem pastilli compositio hæc:
Seminis apij drach. vj, anisi drach. vj, comæ absinthij drach. 1111, zingibe-
ris drach. 11, piperis drach. 11, opij drach. 11, castorij drach. 11, cinamomi drach.
vj. in pastillos redigito, & ad summum drachmam unam exhibeto. Ego ue-
ro, inquit Galenus, præscriptum pharmacum citra zingiberis admixtionem
apparare consueui, ob medicamentariam eius uim, piperis pro eo coniiciens
drachmas 11, ita ut in uniuersum piperis drachmæ 1111 accipiuntur. Datur sto-
machicis ex uini diluti cyathis 111. Cholericis autem siue bilem effundenti-
bus ex aqua frigida. His autem qui cibum reuomunt, siquidem siticulosi fue-
rint, & caloris sensus eos circa os uentris infestet, & sanitatis tempore frigi-
dam bibere sint adfuerint, similiter ex frigida præbe: si uero non ita habeat, ex
calida. Cœliacis, & ad intestinorū tormina ex decocto myrti, splenicis cum
aceti mulsi cyathis tribus.

Volulosa
stomachi
subuersio

Pastilli
Amazonum
compositio

Asclepiadæ pastillus inexuperabilis, aster appellatus.

Pharmacum quod prospere accommodatur, dolorem leuans, somnium inducens, multæ omnino utilitatis. Etenim morbos circa stomachum mirabiliter sanat, acidus ructus & difficilem concoctionem aufert: intestinorum tormina, & oculorum uertigines, inflationesq; curat. Prodest hic pastillus ad capitis dolores potatus, & aceto dilutus forinsecus fronti illitus. Ad dolores aurium facit perdicij succo liquefactus: facit & ad dētium dolorem tritus & galbano exceptus, aut fici succo, & cauernæ inditus. Ad oculorum affectiones passo diluitur, & lana ex eo irrigata imponitur. In tonsillarum affectionibus tepelactus ac dilutus ex aqua mulsâ præbetur gargariendus. Vtilis est ad omnem sanguinis fluxum uino myrtæ dissolutus. Ad destillationē, inueteratasq; & recentes tulsis affectiones, uino scybelite aut thereo eliquatus. Prodest hypuratis, & phthisicis matribij decocto liquefactus: prodest dysentericis, cholericis, & sanguinem recedantibus sanguinariæ succo dilutus: prodest ad omnium reptilium plagas ex ruta decocto potatus. Soluit per circuitum repetentes febriles accessiones, si duabus horis ante aduentantem febrem ex uini diluti cyathis iiii exhibeatur. Fœminarum menses ciet artemisiæ succo dilutus ac potatus: facit & ad uesciæ affectiones uino mulso solutus: quo modo & ad uulvæ strangulationes prodest potatus: facit ad articularum dolores & podagram gentianæ decocto dissolutus ac potatus. Compositio autem eius hoc modo habet: Castorei, opij, myrtæ, cuiusque drach. iiii, zingiberis drach. iiii, spicæ nardi, calsiæ, terræ lemnæ, corticis mandragoræ, cuiusq; drach. iiii, croci drach. vi, dauci, styracis, anisi, sefeleos, seminis hyoscyami, cuiusq; drac. v iiii. Zingiberim, styracem & opium in uino odorato dissolue: reliqua autem cōtusa & cribrata insperge: ac simul unita in pastillos redige, ciceris magnitudinem æquantibus, quibus in umbra desiccatis utere. Et de pharmacis quidem quæ in potum sumuntur hæc

Decubitus
momentum

nus. Decubitus autem sursum uergens in omnibus quomodocunq; nauſeantibus & uomentibus adometur, in conuenienti & affectioni contraria domo. Quæ frigida quidem sit, affectione existente calida. Contrà uero calida, ubi frigida affectio existat. Extremæ corporis partes fricentur, manibusq; calefactis palpentur, quin & uiolentius adstringantur: deinde pedes & manus in aquam solito calidiorem demittantur. Odoramenta autem admoveantur naribus olfacienda boni odoris: uelut rosæ, mala cotonea, pulegium, menta, sceniculum, spica nardi. Caput uero fomento olei dulcis frequentius irrigetur: in calidioribus uero ex rosaceo. Stomachus absinthij cremore irrigetur, rosaceo in calidioribus ammixto: nardino autem in frigidioribus, apio insuper, aut cumino, aut petroselino adiuncto. Ex quibus si nullum commodum sentiatur ad cataplasmata ex palmis transeundum, quæ paulopost dicentur. Conueniunt etiam ea quæ aloen, absinthium, & mala cotonea accipiunt, & aliquando quoq; alumen. Idem præstant & cerata ex

his

his apparatus. Si uero inflammatio circa præcordia existat, committuntur cata-
plasmata adhibeantur. His qui stomacho exuruntur, frigida etiam aqua
quàm plurimum decocta, deinde rursus refrigerata absorbenda præbeatur,
ita ut cyathi unius mensura, aut duorum, aut etiam trium, paulatim tamen
absorbeat. Colluta etiam & in ore retenta, nauseas tollit, his quibus pro-
pter obstaculum aliquod potus eius negatur. Eodem modo assumitur po-
sca diluta. Portulaca etiam commanducata, & ossa myxarum, & cucumeris
semen cochlearij mensura mirabiliter prodest. Porro affectione diutius per-
manente, & cibus præ morbo non retentis: cucurbita ad os uentris cum pluri-
ma flamma affigatur, donec locus rubescat, atque ipsa adhuc affixa cibus
præbeatur. Ad quotidianas autem nauseas, & acescentem cibum, ac uomi-
tus: Coriandri semen tenuissime tritum, cochlearij mensura, ueluti farinam
aquæ inspersum bibendum præbe: aut mastiches cochleare ex frigida aqua,
aut lactuce albæ semen cochlearij mensura ex aqua, præbe his qui stom-
acho exuruntur.

Cataplasmata & epithemata ad nauseas & uomitum. Cap. xi

Cataplasmata ad eos qui cibum non retinent, quos ueteres proprie sto-
machicos appellauerunt. Farina scæni græci, & maluæ semen aridum *Stomachici
qui proprie
dicantur*
tritum, melli commisceatur. Si uero præ duritie contundi non possit, maluæ
semen, ipsum decoctum & tritum modico oleo adiecto in malagmatis for-
mam reducto, & utitur. Aliud. Lolij & irionis farinam subige cum
melle, & pro oleo liquidam picem ammisce. Ceratrum autem conuenit ex
olei irini fece, ceraq; ac modico castorio. Aliud ceratrum. Cera quæ
dr. antem, olei irini sexuncem, galbani unc. i, opopanax drach. iiii, castorij
drach. iiii. Opopanax aceto teritur. Manifestum est autem talia in frigidis
dispositionibus adhiberi. Cæterum epithemata hæc ad prædictas affectio-
nes per experientiam, ut Galenus inquit, conducunt: non modo eorum qui
ea descriperunt, uerum nostro quoq; iudicio comprobata.

Asclepiadæ epithema ad stomachi subuersiones
& choleas, siue bilis effusiones.

Oenanthes, croci, florum rosarum, sertulæ campanæ, mastiches, singulorum
drach. v. iiii, cum pæsis palmis subige, modico rosaceo affuso, & uelitis detri-
ta: panniculo excipe, stomachoq; ac uentri impone.

Aliud epithema, ad stomachi imbecillitatem, & dolorem, & ad eos qui ci-
bum retinere non possunt. Palmarum passlarum sexuncem, oenanthes unc. i,
thuris unc. i, mastiches unc. i, cera libram i, unguetini nardini aromatis inspis-
sati libras ii. uini quantum sufficit. Palmas in uino ueteri maceratas optime
contere: deinde mastichen & thus unumquodq; per se optime tritum adij-
ce, ac rursus simul tere. Liquefactæ autem cum unguento nardini cera oenan-
then tenuissime trita insperge, simulq; unita & refrigerata ad reliqua in mor-
tarium conijce, & probe remollitis utere.

Aliud epithema, ad stomachi subuersiones, & circa ipsum
uexationes: facit & ad particulares inflammationes.

*Phœnicobala-
num est palmu-
la, id est pal-
mæ fructus*

Oenanthes besselæ, croci, rosarum siccarum, sertulæ campanæ, mastiches, ra-
mentorum electri, singulorum drach. iiii, carnis phœnicobalanorum qua-
drantem, uini myrticæ quantum sufficit. Arida contunde & per angustissi-
mum cribrum excute, & uino myrticæ diluta ad cerati crassitudinem redige:
deinde palmarum carnem adijce, simulq; contunde, & cerato ex oleo rosa-
ceo apparato excipe. Post uero linteolo infartum ad os uentris impone.
Prodest etiam oculorum inflammationi.

De cholera, seu bilis effusione.

Cap. xii

Cholera appellatur quum ob multas cruditates uomitus biliosus & ni-
dorosus & acidus oboritur, ad plures horas continue perseverans, &
uenter inferne eadem excernit: sequiturq; sitis, & exudatio, & impeditus pul-
sus: musculorumq; manuum ac pedum, maxime uero surarum contractio &
tensio. Si quis igitur mox in principio, aut coaceruatim, ea quæ efferuntur co-
hibere aggrediaris maioris mali autor erit. inutilia enim quum sint, euac-
uatione opus habent: quare conuenit si non sponte ferantur, oportune irri-
tare, aquæ cochleari exhibito, ac ægro uomere iussu. Aqua enim multa mor-
daciditatem operatur, torsionesq; auget: aqua uero oleo mixta auget fluxio-
nes. quare aqua tepida potata uomant, quotiescunq; quidem cibus nimium
ferunt expleti, prius quam illi corrumpantur. Adiuuare etiam oportet per
sedem excretionem: alienum enim uelut uenenum insidēs, & uentrem ac in-
testina rodit, & humores ex uniuerso corpore adtrahit. Per uomitus itaque
oportunam prouocationem, uomitus ipse soluitur & cessat. Quum uero hu-
morum excretio quicuerit: colliquamēti autem & tabefactionis signa in ex-
crementis ipsis appareant: ueluti si sint rasuræ similia, strigmentitiaq; & mu-
cosa: & gracilitas per ambitum corporis fiat, & maxime si uenter confidat &
adstringatur, pulsusq; imminuatur ac præter modum condēsetur: tunc sanè
uentrem cooperire & fouere oportet, membraq; ac musculos similiter lor-
cos, oleo multo calido impinguare, & uinculis adstringere extremas corpor-
is partes. cataplasma quoq; uentri imponendū ex palmis & oenanthe, qui-
bus hypocisthis, & acacia, & rhus ruber, & mali corium sint ammixta. In po-
tu uero frigida aqua cyathi mensura præbeatur absorbenda: cauendum ta-
men ne nimium frigida existat. Aceruatim enim exhibita reuomitur: & quæ
ualde frigida est, aliquando innatum calorem stupore suo extreme offen-
dit, aut inflammationem stomachi aut uisceris alicuius efficit. Insuperantur
autem aliquando aquæ sorbendæ pampini uitis, aut mali punici succus mo-
dicus instilletur. Si uero & hoc reuomat, crassa etiam sorbitio ipsa facienda
est, per micarum intritionem, & per cochleare exhibenda. Etenim si acerua-
tim deuoretur, aut reuomitur, aut infra detrahitur. Annitendum est etiam ut
priori sorbitione uomitu reiecta, rursus altera exhibeatur: dandus item ma-
li punici

*Vomitum uom-
itum solui, &
excretionem
excretionem*

*Excrementa,
colliquationis
signa*

*Frigide
uocumēta*

li punici succus cum mentæ succo absorbendus, micis minutissime tritis adie-
ctis. Sit autem acidi mali punici succus, & multa quantitate mentæ succum
excedat. Quod si aciora sint ea quæ excernuntur cucumeris semen macera-
tum, desquamatum & tritum ex aquæ cyathis 111 præbeat: datur etiam
utiliter cum amylo: Post uero somnus procurandus, & quies omni modo.
At uero ubi intolerabilis effusio existat, & pulsus emolliatur, apprehendatq;
frigidas & exudatio, aliquando etiam singultus, ad uinum transcūdum est
mediocriter adstringens, neq; uiribus ualidum, & quod dulce quidē sit, non
autem odorum. Interant autem in ipsum micas, aut halicam iniiciant, si fieri
possit, calidam: si uero non, frigidam: atq; ita paulatim & per interualla co-
chleare absorbent. Sitim uero arcet polenta tenuis sine sale uino diluto in-
spersa & absorpta. Vini multitudo uitanda est, ac omni arte conādum ut ip-
sos sopiamus, ex rosas ac myrto domus pauimento constrato. Odoramen-
ta quoq; naribus admoueātur, mala cotonea, & similia. Reliqua autem om-
nia eo modo adhibeantur, quo supra in æstuantibus febribus est prædi-
ctum. Illitiones etiam soporiferæ circa frontem assumantur. Aluo autem ad
huc egerente, amyllum cum decoctione capitum papaueris per dysterem in-
fundatur: simul enim & cohibet & refrigerat, & somnum inducit. Ad uom-
tus uero coercendos commanducare conuenit, succumq; deuorare, mespilo-
rum, malorum cotoneorum, pyrorum crustuminorū, & uuæ, maxime quæ
uinaceis interpositis seruatur, & pensile quoq; unā cum acinis expedit manu
ducare. Ad contractiones autem in musculis factas, uestis detritæ panniculi
oleo calido madefacti conueniunt, contractis musculis impositi: & cerata
humida aliquando castorium accipientia, & ex sicyonio aut irino oleo fa-
cta. Quibusdam eorum etiam maxillares musculi dolent: quos quum lana
operire non sit facile (Est enim iniucundum, & sudor quoq; inde elicitur) illi-
tionibus leniter factis molliores reddere oportet. In cibo exhibendi sunt pe-
des suilli cocti, pulli columbini & gallinarum, perdices, palumbi, turdi, & cō-
similes his existentes. Asclepiades autem cholericis eiusmodi electum
plane remedium describit, inutilibus tamen omnibus prius sufficienter eua-
cuatis. Baccarum myrti nigrarum exacinarum italicum sextarium unum,
horum rofarum tantundem, carnis palmarum numero uiginti, aquæ pota-
bilis sextarios sex, decoque ad tertias, & expressum ac percolatum liquorem
rursus per se decoque, donec ad sextarium unum redigatur: cui deinde passi
myrtiæ sextarium unum affunder: rursusq; decoque donec ad mellis crassi-
tudinem cogatur, & utere. Datur ante & post cibum cochlearij mensura.
Vtere etiam ad hos potionibus & epihematibus ad stomachi subuersio-
nes præscriptis.

*Polenta ex
uino diluto
sitim sedat*

*Musculis
contractis
remedia*

*Asclepiades
electum
remedium*

De stomachi adstrictione.

Cap. xiiii

O Boritur aliquibus post cibum acceptū, circa cōcoctionis & digestionis
tēpus, stomachi adstrictio itēq; alui. æstuat aut uniuersum corpus, ma-
xime

*Difficultas
digerendi
alimenti*

xime uero manuum ac pedum extremitates: & facies ipsa rubescit: pulsus autem in densitatem permutatur. Hos multi etiam febricitare existimant. Nocuumennum autem omne circa digerendi alimenti difficultatē contingit: consistit enim ut plurimum in aridis & condensatam habentibus carnem, spiritum circa uias concluso & coarctato: utpote qui per uapores ab alimento prodeuntes inspissatur, & ob id quod non effletur immodice concalescit. Curantur autem hi in principio quidem constrictione & colligatione extremarum corporis partium, fricationeque brachiorum, cruriumque ac coxarum: sepe etiam extremitatum compressione, ita ut præcipiamus ipsis ut desideant, & decubitus quoque fortam erectiorem faciant. Quosdam & lestica gestare expedit, donec alimentum omnino subductum digeratur. Ante augmenti tempus diligentiore totius corporis curatione utendum est, studio adhibito ut carnem mollem & humectam reddamus. Vtilis itaque eis tunc ex oleo inunctio existit parum nitri habens admixtum. Inclinate autem morbo & uigore præterito: aquæ infusio ad manus pedesque lauandos commoda est, quo tempore aliquando & calidæ plurimum potum non improbo: nos enim remittente morbo, & paulo longioribus existentibus interuallis, plurimos ante cibum lauimus, & uehementer iuimus. Perfectiore autem declinatione apparente, etiam uinum exhibendum est, quo tota affectio corrigatur. Cibi autem sint facile digestibiles, & quibus concoquendis corpus sufficit: quos diuidere etiam conuenit, maxime si bis cibum sumere sint adfuerint. Quod si in uisceris inflammatione, adstrictionis stomachi accessio contingat, illam ipsam prius curatione aggredi ac demoliri oportet, per fomentorum & cataplasmatum adhibitionem. Cæterum hæc ipsa adstrictionis stomachi accessio frequenter in eis apparet, qui hepar præter naturam dispositum habent.

De humoribus à capite in uentrem destillantibus:
ex Galeno.

Cap. XIII

*Destillatio ad
stomachum*

Capite ex intemperie affecto ut multa generet superuacanea recrementis uidelicet ad ipsa delatis. & præptissima quidē ad os & ad nares delatio existit. deferuntur autem & ad thoracē, aliquibus etiam ad aures. Delationem autem ad os, stomachus excipit atque aspera arteria. De aliorum sanè membrorum nocumēto, iam prædictum est. Quum uero ad stomachum fluxus deferatur, & frigidus existat, ad frigidam intemperiem corpora perducitur, calidus contra in calidam: hic exulcerat quoque temporis progressu: in principio uero appetitui nocet & concoctioni. Si igitur frigidus fuerit defluxus, tardas concoctiones & cruditates efficit: si uero corruptus, in corruptionem adiget cibos: unde nidorosa, aut foetida, aut acida: eructationes producentur, aut etiam alterius cuiusdam quæ nominari non potest, aut etiam nomen habentis qualitatis. Vbi uero altius descendit nocumētum, etiam intestinum ieiunum afficit, & ad colum usque pertingit, atque ad uenarum mesenterij

*Eructationes
varie*

mesenterij uasa, per quæ ad hepar ipsum alimentum distributio contingit. Ex quibusdam quidem deiectione appetitionis accedit: aliquibus uero appetitiones rerum præter naturam, quas appellant caninas, aut etiam ciborum uitioforum concupiscentiæ. Optimum itaque est in his uelut fontem malorum excindere: capitis uidelicet sanitati prospiciendo: aut si hoc impossibile sit facere, ob uehementiam naturalis intemperiei: omnino tamen eius saluti consuleret oportet: indicatione ex figura eius accepta, quomodo ei subueniri possit: non enim quemadmodum aliqui medici, qui ad omnes diurnas capitis affectiones semper ex thapsia & sinapi cataplasma imponunt: sic & te facere uolo. Lauacris itaque multis calidis potabilium & dulcium aquarum consolari eos oportet, discussis simul calidis in capite uaporibus, & omni temperamento in melius permutato. Nocuius autem est eis usus aquarum natura sua calidarum: quæcunque enim ex eis sulphurentæ sunt, ac bituminosæ, nimium calefaciunt: quemadmodum & in octauo prædiximus sermone, capite De destillatione. Exhibendæ autem eis qui frigida intemperie afficiuntur, calefacientes confectiones, uelut est, quæ ex tribus piperis generibus constat, & similiter quæ ex calamintha. Etenim si omni hora etiam his utatur, qui frigida intemperie laborat, nullum amplius nocumentum experietur.

Dieta conueniens his qui stomachum habent dissolutum, aluum autem adstrictam.

Cap. xv

Grauis & ægre tractabilis complexus, huiusmodi corporis apparatus ac dispositio existit, in quo dissolutum & nauseabundum est os uentris, quod stomachi quoque appellatione uenit: alius uero est adstricta: quæcunque enim ipsam ad egerendum impellunt, ea omnia stomachum subuertunt, utque & in eo cibi innatent, & nauseabundus sit efficiunt: ad quæ necessarii conlequitur cibum quoque non probe concoqui. Si uero rursus ea quæ stomacho grata sunt edulia eis exhibueris, ad tres aut quatuor dies alius inde adstringitur. His igitur in tempore diæta constituenda est: ac in principio quidem exhibenda sunt olera ex oleo & garo condita, & alia quæ uentrem emollire consueuerunt. postquam uero sufficiens nutrimentum iugesserint, ad extremum aliquid eorum quæ stomachum corroborant, accipiant: uelut sunt poma & pyra, & aliqua mali punici genera, quæ citra acorem adstringunt. Ipse autem homo affectus, omnibus his partim experimento cognitis, quodcunque tandem minime nocuum & iucundissimum repererit, eo diu utatur: neque tamen multum ex singulis horum generibus acceptandum est, sed quantum imbecillitati stomachi curande suffecerit. Facile enim solubilis alius ita adfectus sit, quando, ut dictum est, à cæteris cibus aliquid eorum quæ stomachum adstringunt comederint. His enim os stomachi corroboratum, ea quæ uentri innatant deorsum propellit.

Stomachus,
os uentris

Ordo ciborum

De stomachi

De stomachi inflammatione.

Cap. xvi

Medici error
lethalis

O S uentris, quemadmodum & ipsum hepar, eorum quæ adstringunt complexu semper quidem opus habent, multo maxime uero ubi fuerint inflammata. Si enim per laxantem dietam ac ductum, citra eorum quæ corroborant admixtionem curentur, periculum uitæ incurrunt. Medici namque qui laxante dieta in eis utuntur, uelut est oleum dulce per se, animi deliqui ipsi autores existunt: neque enim ullum noui stomachicum aut hepaticum, qui in eiusmodi medicum inciderit, seruatum. Oportet itaque siue oleum sit, quo inflammationem patientes fouentur, siue cataplasma ipsis imponatur: semper aliquid ex adstringentibus ammiscere: uelut est unguentum nardinum, aut melinum: aut ipsum malum cotoneum in oleo decoquere, mastiche simul ammixta. Ceratum autem quo assidue in stomachi inflammatione

Ceratum
inflammatis

utor, hoc est. Cera tyrrhenica unciam unam, unguenti nardini tantundem, uel quantum sufficit, aloes drachmam unam, mastiches drachmam unam. Quod si maiori adstrictione indigeant, tanta nimirum imbecillitate & dissolutione existente, ut neque cibos continere possint, omphacii succi sicci drachmam unam, aut succi absinthij tantundem est ammiscendum: aliquando etiam ambos addere oportet, & tertium quod ipsis conuenit, hypocistidis succus existit, & cenanthes, & rhois rubri succus, iuxta eam quæ adest uidelicet dispositionem. Cerati autem amplitudinem augere oportet iuxta proportionem & mensuram reliquorum pharmacorum: ueluti si quatuor drachmæ aliarum rerum congregentur: cerati nardini uncias quatuor esse conuenit, duas quidem cera, duas reliquas unguenti nardini. Quod si durius adhuc pharmacum ipsum appareat, apponendum est unguenti nardini quantum omnino satis erit. Aliud ceratum. Cera trientem, rosacei uici. i. gallarum, aluminis scissi, aloes, florum rosarum, mastiches, singulorum drach. i. Vtere in his qui uehementi adstrictione opus habent. Cataplasma

Cataplasma
inflammatis

ta autem inflammatis conuenientia, sunt ex hordeo & semine lini, melleque & unguento nardino, modicoque uino, adiecta mastiche & absinthij coma. Ad diuturnas autem inflammationes & iam induratas, magis uaria pharmacata adhibere oportet: quæ & emollientium generis & discussoriorum existunt: ueluti est quod fit ex ferula cæpana, seu meliloto. Compositio autem eius multorum modorum est: propterea quod omnibus iuxta præcordia inflammationis conducat: magnaque differentia eius sub alia atque alia forma apparati existat: alius enim apparatus circa stomachum inflammationibus, alius inflammato hepate, aut spleni utilior extat.

Epithema ex
meliloto
uarium

Epithema stomachi, quod Philagrius composuit, & frequenter apparatur.

Cera quadrantem, cenanthis unc. i. aloes sextantem, mastiches sextantem, ammoniaci thymiamatis, bdellij, cuiusque unciam i. adipis anserini trientem, styracis unc. i. hyssopi bellem, olei rosacei libras ii. uini quantum sufficit.

• Stomachicum

Stomachicum contusum: Andreæ Comicijs.

Cypheos, styracis, terebinthinæ, cuiusq; quadrantem, bdellij, aloes, mastiches, cardamomi, cuiusq; sextantem, comæ absinthij unciam 1, propolis trientem, ammoniaci thymiamatis sexuncem, ceræ unc. x, contunde & utere.

Ceratum emolliens & liquefactorium ad induratas inflammationes.

Olei festarium 1, aquæ cochleare 1, adipis suilli recentis sexuncem, ceræ trientem, chamæmeli quadrantem, scillæ quadrantem, anchusæ sesquiunciam.

Epithema ex meliloto: Orbalsij. Meliloti bessem, ammoniaci thymiamatos trientem, bdellij trientem, myrobalanorū sextantem, cenanthes sextantem, cardamomi unc. 1, croci, cyperi, iridis, myrrhæ, zingiberis, aloes, amomi, spicæ celticæ, calsiæ, cuiusq; unc. 1, ceræ libram 1, terebinthinæ unc. xvi, melini, aut nardini, aut rosacei libram 1. Aliquando & succi balsami sextantem, thuris unc. 1. Arida contusa & cribrata cum modico uino in pila conterito: reliqua uero in uino diluio, & liquefactis quæ liquefcere possunt, affusisq; omnia simul unito ac utitor.

Aliud ex meliloto, ad omnem præcordiorū induratum inflammationem, & ad colicos ac dysentericos, quod & in Alexandria apparare cōsueuerunt, quo uti soleo, hoc est: Alexandria officina
Meliloti, cyperorum, myrrhæ, nardi celticæ, cuiusq; unc. 1, croci drach. viii, cardamomi drach. viii, cypheos drach. xvi, ammoniaci thymiamatis drach. xl, terebinthinæ drach. lxxx, ceræ drach. clxx, olei cyprini drach. cxx, uini quantum sufficit. Epithema ex mastiche. Terebinthinæ dodrantem, ceræ unc. xvi, mastiches dodrantem, adipis taurini dodrantem, mellis libras ii, rosacei libras ii.

Epithema aliud, ad induratas stomachi inflammationes, & ad omnem duriciem, ac diuturnam in ipso affectionem: in senibus præsertim & qui uergentis sunt ætatis, experimento clarum.

Colophonix pellucidæ sextantem, ceræ puræ unc. 1, mastiches puræ unc. 1, olei communis, cochleare 1 tantum. Omnia depurata in ollam coniecta super carbonem liquefacito, assidue agitando, donec exploratū habueris quod in frigidam aquam destillata in pastilli modum emollire ac cogere possis. Vtere, non contempta ipsius uilitate.

Epithema stomachicum ualde celebre, ad stomachi inflammationes & duricias, itemq; debilitatem.

Micarum siliginearum quadratē, carnis palmarum pinguium unciam 1, meliloti unciam 1, comæ absinthij drach. iiii, mastiches unc. 1, aloes drach. iiii, adipis asferini recentis sextantem, ceræ quincuncem, lupini amari præ immaturitate acerbi sexuncem, styracis unc. 1, pilularum chamæmeli unc. 1. Palmas, melilouū, chamæmela, ad uesperam in aquam macerāda coniicito, & sequenti die lento igni desequito, exprimito & percolato, atq; in decocto micæ maceratas rursus percoquito ac conterito: styracem uero per se cum paucō oleo liquefacito, atque ita solutum micis tritis ammisceto, & ceratum affundito

affundito: post uero liquefactis quæ liquefieri possunt, aridisq; inspersis simul omnia in mortarium diffundito, ac subactis & simul unitis utitor. Ante pharmaci impositionem stomachum ex oleo & modico uino irrigato, in quibus absinthium sit decoctum.

Emplastrum ex micis emolliens, liquefaciens, ac diffundens: facit ad inflammationes in quocunq; tandem loco induratas, emolliens, & discutiens, ac firmitatem addens.

Radiciſ altheæ lib. ii, phœnicobalanorum lib. ii, sceni græci lib. i, seminis lini lib. i, chamæmelorum, melilotorum, singulorum sexuncem, uini ueteris odorati adstringentis sextarios v iiii, spumæ argenti, cerusæ, colophonix, cuiusq; lib. ii, ceræ lib. i, terebinthinæ lib. i, olei ueteris lib. ii, aquæ lib. ii, panis filiginei aridi contusi & cribrati lib. v. Herbæ uino præmaceratæ, deinde decoctæ exsiccantur, in succo uero panis contusus & cribratus maceratur. Sequenti deinde die spuma argenti & cerusa in aqua teruntur, & adiecto eis oleo, donec non amplius manus inquinat, decoquuntur, eisq; liquefacta insciuntur: atque ab igne ablatis, fermentata panis farina emollita paulatim ammiscetur, alsidue tamen omnibus cum spatula agitatis: & post in mortarium coniectis, ibiq; primum pistillo, post etiam manibus fortiter emollitis utitor.

Epithema Nilei, ad induratas tum stomachi, tum hepatis inflammationes. Cerae lib. i, croci drach. iiii, ammoniaci thymiamatis sextantem, rosacei aut nardini lib. i. Crocum & ammoniacum aceto trita diluito: ceratum autem liquefactum & refrigeratum eis affundito, ac contritis utitor.

De stomacho exulcerato.

Cap. xviij

Mel ulcera repurgat
Vlcere in stomacho aut uentre existente, omnium acrium rerum comestione abstinere oportet: succo autem pisanæ, aut halicæ uni modico ammixto melle, quo per ipsum ulcera repurgentur & extergantur. In cibis enim exhibere oportet, aliquando quidē ea quæ ulcera repurgant, aliquando autem & quæ dolores mitigant, & mordacitatem obtundunt. post repurgationem uero quæ carne explent, deinde quæ ad cicatricem perducunt: uelut sunt ea quæ adstringunt. Forinsecus autem epithemata his conueniunt ex palmis, & malis cotoneis, ac farinis. Ceratum uero imponendum ex melino aut rosaceo, ammoniaco thymiamate, & thure ammixto. Epithema autem eis conuenit Nilei. Et tempore inductionis cicatricis emplastrum ex salicibus, & quod Iccsum appellatur.

De his qui à stomacho, comitialis morbi modo, conuelluntur. Cap. xvij

Ira asidua quid inducat
Quidam homines ubi diutius ieiuni permanserint, præsertim quum tristitia intem affecti, aut ira concitati, aut curis anxie torti fuerint, comitialis morbi accessione comprehenduntur, & concidunt conuulsi. Plures autem eorū qui hoc modo afficiuntur, gracilis habitus sunt, & alsidue irascunt. His sanè stomachus subtiliore sensu præditus existens, & cerebrū per cōsen-

sum

sum affectum, uniuersum corpus conuulsionis modo lancinat. Commune autem consilium omnibus medicinæ quidem ignaris, rationationis autem non inexercitatis subijciam: ne quemadmodum prisce homines rationis expertium animalium more uiuant, eorumque modo se habeant: uerum per experiētiam iudicent: qui cibi ac potus eis noceant: ite quales ac quāti officiāt motus. Similiter autē & circa rei uenereat usum obseruent, num innocus eis existat: an contrā, nocius. multos enim noui, qui ex rei uenereg usu maximum periculum incurrerunt. Oportet itaque hos ipsos bonam & exquisitam concoctionem sibi providere: & tertia aut quarta diei hora panem diligēter apparatus accipere, solum quidem, si non siticulosi existant: isti uero urgente, ex uino diluto mediocriter adstringente & albo. Hæc enim uentrem corroborant, & caput non percellunt, quemadmodum fortia facere consueuerunt. Exhibere etiam eis oportet ex aloe pharmacum, his aut terti anno. A superfluis enim recrementis totum uentrem repurgat, & ad propria munia obeunda efficaciter corroborat. Vidi autem & alios in ore uentris, comitalis morbi modo, conuulsos: quum uehementi cruditate laborassent, aut uino multo meraciore se ingurgitassent, aut intempestiuus re uenereat fuissent usi. Quosdam etiam in febris uidi repente conuulsos: qui bilioso uomitu succedente, euestigio ab omnibus afflictionibus sunt liberati. Quidam autem ex ita affectis fusca uomuerunt: quidā uero porri succo con-

Commune
consilium

Vomitum
nitiosum

Inflatum ac
præcordiale
morbum

Viridis iaspidis usus: Galeni.

Cap. XIX

Viridis iaspis lapis stomacho, qui & os uentris appellatur, utilis existit pro amuleto appensus, cuius rei multum experimentū fecimus. Oportet autem filo innexos ex collo suspendere, eo modo ut lapides os uentris contingant.

De appetitus

De appetitus perditione.

Cap. xx

Venter prom-
ptuarium est

Ventrem natura promptuarium creauit, ueluti terram plantis: dedit & indigentiae sensum, cuius impetu animalia ad cibum ac potum concitata, ipsae se expleant: & uocatur quidem eiusmodi expletionis desyderium, Appetitus. Contingit autem ob indigentiae sensum, quum uenae ex cibis in uentre ad se adtrahunt, uelut emulgentes & exugentes: quam exuccionem quum uenter ferre non possit, sed inde ueluti diuellatur, huius angoris remedium cibum exquirat. Itaque exuccionis sensus, ipsa fames existit, & Appetitus appellatur Naturale opus non animale existens. Huiusmodi autem appetitum Euacuatio praecedat: & contingunt sane quinque accessiones or-

Quinque ac-
cessiones per-
ditū appetitū

dine mutuo seipsas consequentes: Quarum prima, Euacuatio est: secunda, Appetitus naturalis membrorum euacuatorum: deinde, per uenas ex uentre Exuccionis post, Exuccionis sensus: & quinta, Appetitus animalis, qui omnium postremus existit. Itaque appetitus perditio contingit, aut ob sensus exuccionis uenarum perditionem, aut quod exuccio non fiat, aut quod corpus non euacuatur. Contingit autem saepe etiam, ob immoderatam uentris & intestinorum fluxionem: & ob biliosi humoris in uentrem delationem, tenacisque & acris, ac porri speciem habentis: & ob pharmaci potiorum: & ob sanguinis immoderatam detractionem: & in continuis ac uetermentibus febribus, stomachique & uentris inflammatione, item hepatis, uellicae, & uuluae. Contingit etiam in colica & uoluuosa affectione. Maxime

Caliditas caus-
sa non esuriendi

ma autem quod quis non esuriat causa caliditas existit, quae solida corpora laxando exoluit, & ad attractionem imbecilliora reddit: humida autem diffundit, atque amplius extendit. A plurimis etiam alijs causis appetitus perditio contingit. Itaque si iuxta principium morborum accesseris, aut iuxta uigorem, quum uires adhuc sustinere possunt, nihil molestiarum infert: modico enim alimento aegri opus habent. Si uero in declinatione totius morbi appetitus perditio accedat, aut in diuturna imbecillitate, aut uiribus debilitatis, aut ex immodica euacuatione, periculo non uacat. Augetur autem affectio haec & ab aetate. Incommode enim hoc malo pueri afficiuntur, utpote qui natura uoraces sunt, & assiduo fomite opus habent. Quare magnus praeter naturam excessus significatur, si pueri appetitus perditione fuerit affecti. Si quidem igitur ex uiciatorum humorum praesentia, appetitus perditio contingat: antequam aliam curam adhibeamus, delatos in uentrem humores, uomitu reiciendos praordinabimus. Quod si aegre uomant, sorbitiones exhibere oportet, quae eiusmodi humores inferne expellere consueuerunt. Deinde per ea quae ad hanc rem commoda sunt, corpora ad bonum perducemus temperamentum. Si uero ex uirium imbecillitate appetitus perditio accedat, considerare oportet quales intemperies uires exoluit: & per contraria eam ipsam corrigere. Si uero ob inflammationem, aut obturationem alicuius alterius membri, appetitus perditio

perditio concomitetur, tum & illius habere curam conuenit. Conandum est etiam ut per odora mentem appetitum reuocemus: per farinas uidelicet posca madefactas, aut uino odore diluto, aut malorum cotoneorum decocto, aut pyrorum, aut cucumerum uiridium maturorum cremore. Inunctione item leni & non nimium sedula idem conabimur, ac moderata corporis fricatio, ne, atq; etiam pedum ac manuū palpatione accuratiore. In fessis etiam lumbos ac pectinem amplectentes adhibendi sunt, & aquæ affusiones, ac gargarisationes: ab sorbitiones quoq; aquæ frigidae modicae & dulcis. Ab istis enim moliminibus saepe ad accipiendos cibos profecerunt. quin & digitorum in os immisione stomachus lacinatus saepe ad accipiendos cibos est conuersus. quare hoc ipsum tum ante curationem, tum post eam est faciendum. euomunt enim aliquando biliosa aut pituitosa quædam, quæ perditum appetitum in quibusdam sunt causa, atq; ita ab hac accessione eos liberabis. Cibi apparentur plures & uarij ac optimo apparatu, & ultra dulcedinem etiam illicientes & appetitum irritantes: frumentacei in primis generis, ac multi alij mēti: uelut est halica ex decocto palmarum, aut prunorum damascenorum lota, aut ex aqua mulsâ diluta præparata: oua sorbilia: panis ex calida aqua lotus, aut si ita aduersi fuerint, frigida. Diuitibus autem, gallorum testes exhibendi sunt, & ex uolucris non graueolentes, & macra ac montana: pedes suilli in decoctione plurimum eliquati. Eiusmodi enim cibos si gustauerint tantum, sufficiens alimentum deinde corpori offerendum est. Omnia autem quæ exhibentur eiusmodi esse conuenit, ut facile deuorari possint: quæ enim multa cōmanducatione indigent, iniucunditatem quandam afferunt, & appetitum auertunt. In his uero qui iam prompti sunt, cupiditatem cibum accipienda, conicere oportet ne sufficientem mensuram excedamus. Confutrare etiam oportet, num ob naturalem infirmitatem, an consuetorum ciborum cupiditatem, simulent appetitus perditionem: quod si ita contingerit, quantum in nobis est, grauiter obiurgatos admonebimus, ne utilibus negligant obtemperare. Quod si non obtemperet, sed præ alimenti negligentia contabescant, uicissim contemnere ac negligere eos oportet, ac cibum parum deteriorē exhibere: postq; primos affectionis dies, cataplasma ex palmis, malis, cenanthe, absinthio, & aloë stomacho imponere: licebit & ceratis uti ex eadem materia paratis.

Odoramenta
appetitum
reuocantia

Cibi appetitū
irritantes

Simulatio per
diti appetitus

De appetitu canino.

Cap. XXI

Contraria appetitus perditioni affectio est, quæ caninus appetitus appellatur: plures enim cibos appetunt, atq; quum appetitum cohibere nequeant, in ingerendis nimijis cibis modum excedunt: deinde multitudine eorum aggrauati, & assumptos citra nocumētum ferre non potentes, ad uomitum diuertunt: deinde rursus cibo se explentes, rursus ad uomitum reuertuntur, quemadmodum canes: ex hoc autem aliquando & ad uomendi consuetudinem delabuntur. Saepē etiam alijs affectionibus obnoxij sunt, coe-

liacis uidelicet & dysentericis, atq; aquæ inter cutem: propterea quod prius quam priores cibi sint concocti, alios ingerant. Quod si huius accessionis causa humor quispiam uiciatus & acidus existat, qui os uentris mordeat & irriter, appetitumq; excitet: frigidus enim humor uiciatus exuentioni consimilem mordacitatem infert, ciborumq; appetitionem excusat, & affectionibus quæ sic appellantur, modo corpora ipsa uacua reddit, tuniculis eorum coactis & adstrictis: quapropter & egestionem multâ ex ipsorum uentribus procedunt, crudis existentibus nimirum cibis, aut semicoctis. Itaque ubi cognouerimus ab humoribus pituitosis & acidis fieri hanc affectionem, qui in ipsum os uentris impacti, ac uelut aqua in spongiam imbibiti, cogantq; & irriter & ad appetitum excitent, picrum appellatum pharmacum conuenienter exhibebimus, quod non tantum calefacere potest, sed dissecare, ac repurgare, extrahereq; ex profundo oris uentris imbibitum humorem, & per aluum inferne euacuare. quin & robur uentri addit, ut ne facile nocium humorem susceperet. Exhibeatur autem pondere drachmarum duarum ex uino cum aqua calida dilutosi uero puer hac affectione laboret, & ob amaritudinem bibere nequeat, si quidem possibile fuerit, in catapotia drachmas duas huius pharmaci digeremus, melleq; forinsecus obninentes deuoranda dabimus cum ouis forbilibus aut pisanis succo: quod si neque sic tolerare queant, ea quæ dissecare & repurgare calefacereq; possunt in cibis annectamus: ueluti sunt allia, porri, thymus, satureia, origanum, pulegium, & quæ his similia existunt. Potum autem præbebis ante cibum multum ac acetuatim bibendum, calidum sanè aut certe tepidiorem. Sorbitiones item appetitum destruentes, ueluti sunt bulbi ex melle multo & oleo plurimo, aut adipe asserino, gallinaceo aut suillo, ex olenibus conuenit malua: cerebella item & pinguiore uolucrum partes, pisciumq; eodem modo, & omnino quæ appetitum auertunt, ac satietatem inducunt, & quæ magno cumulo accepta, modice alunt. Ammiscere etiam conuenit panibus dum fermentantur aciora & urinam cientia: similiter & uino quod in potu sumunt, uelut est cuminum, anisum, petroselinum, & quæ eius generis existunt: ad uinum etiam pi per & mel & spica nardi ultra ea quæ dicta sunt, coniiciantur. Panis uero non sit recens, neque ualde bene fermentatus. Vinum uero quod bibunt colore fuluum, substantia tenue, odorumq; & non ualde uetustum, quod tum ieiunis, tum sumpto cibo plurimum præbeatur, quantum uidelicet bibere possint. Ventrem enim exalfacit, & humorum destruit acorem, ut sæpe solum suffecerit cum pinguibus & oleosis cibis ad perfectam curationem. Abstine re autem oportet ab omnibus acidis ac adstringentibus cibis ac potibus, maxime uero à fructibus. Bellaria eorum sint pistacia, amygdala, nuces pineæ, colymbades etiam oliuæ exhibendæ ex melle. Conandum est etiam, ut hac ipsis exhibeamus, tum per se, tum cum passo aut melle: ita tamen ut obseruemus ac uideamus in eis, quibus in stomacho aclescere consuevit: in his enim

enim maius nocementū quā utilitas consequetur. Probe uero concoctum non solum appetitum obtundit, sed & aluum obturatam emollit, fluxionesq; eius silit. apparandæ etiam ex ipso lacte poriones & placentæ, ueluti sunt dulciaria & oryza. Viscera uero cataplasmate hordeacæ farinæ contigere utilissimum existit. Lauare autem per interualla oportet, cuticulamq; ipsorum large pinguefacere.

De canino appetitu, qui ex immodica transpiratione, ac cutis exolutione contingit.

Cap. XXII

Est & alia canini appetitus species, quum uniuersum corpus rarius existens, & per obscuram respirationem exhaustum, præter modum in assidua alimenti indigentia constituitur. Contingit autem id, aut ex facultatis retentiæ in toto corpore imbecillitate, quæ cibis dominari non potest: aut ob plurimi caloris fortitudinem, qui instar ignis cibos consumit, & cutem rarefacit, ac exhalationem efficit. His sanè uentris egestionibus longe pauciores procedunt, quā pro eorum quæ ingeruntur modo ac proportionē. Et sterora quæ egerunt, existunt sicciora. Itaque pharmacum ex aloë eis insensissimum existit: item extenuatorij generis & discindentes tum poriones, tum cibi. Cutem enim magis rarefaciunt, exhalationem mouent, ac appetitum augent. Quare eorum qui hoc modo affecti sunt, cutem condensare ac spissiore reddere melius est, cum oleo quoque ex immaturis oliuis expresso, in quo myrtus, aut rosæ, aut eius generis quippiam ad lentum ignem sine decocta, admixto etiam alumine scisso in aceto acerrimo prius trito, intartum ut ad strigmentitiam formam unguentum reduci possit. Abstineant autem à balneis calidis, consimiliq; acre, ac uini potu, & ab omnibus quæ tum extrinsecus, tum intrinsecus calefacere possunt. Ducantur ad lauacra frigida, siquidem nihil id fieri prohibeat: utpote corporis gracilitas, aut membrum aliquod refrigeratum, thorax nimirum, aut aliud quoddam. Cibi eis exhibendi sunt stabiles, & ægre corruptibiles, Eius generis cochleæ existunt, & totum eorum quæ testis integuntur genus, si ex duarum aquarum reiterata decoctione apparentur: & polypi eodem modo. Carnes suillæ in uigore existentes, maxime uero uentres & uulua. Bubulæ quoque pinguiore, & omnia simpliciter pingua, & quæ uentri innatant, tartæq; concoquantur, ac digeruntur. Ex ouis, ea quæ coquendo sunt indurata, aut sartagine fricta. Et similago absque melle ex pinguibus iusculis preparata, similiter & dulciarij panes, & oryza, & panes non fermentati. Iuxta proportionem autem quantum accessio imminuitur, tantum ex crassi humoris cibis est detrahendum, & ex adstringentibus forinsecus admotis imminuendum. Aliquando enim sedata uehementis appetitus accessione, in aliud grauius malum transitio contingit: nimirum quum corpus ex crudis & crassis humoribus repletur.

*Cibi qui ægre
corruptantur*

De uitioso appetitu: ex Galeno.

Cap. xxiiii

Pica mulier/
cularum affe/
ctio

Vitiosas ciborum qualitates concupiscunt, qui in tunicalis uentris superfluum uitiosum recrementū imbibitum habent: id autē maxime mulierculis uitioso humore repletis euenire solet, quum uterum ferunt, & uocatur hæc affectio pica. Concupiscunt autem in ea maxime quidem acida & acetabā, aliquando etiam acrida, quandoq; etiam terram, aut testas, aut extinctos carbonēs, aut alios quosdam absurdos cibos: atq; hoc affectu plures ex ipsis infestantur usq; ad secundum aut tertium mensem completum: in quarto uero quiescere incipit malum, partim quidem uitioso humore per uentrum euacuato, partim uero appetitu concocto & consumpto in breui sanè temporis spatio, muliercula per boni nutrimenti ciborum exhibitionē connutrita. quin & foetus in utero auctus plurimum alimenti ad se trahit, adducto simul cum sanguine & uitiato humore. Porro idē affectus uiros quoq; infestat, quum & ipsis uiniatus humor quispiā ad os uentris fuerit delapsus. Conueniens autem eis remedium, Amazonū pastillus potatus existit: post uero etiam ex aloë confectio pica appellata. Euacuato aut plurimo uitioso humore, exhibendus est eis mali punici dulcis succus, menta sicca inspersa, aut aliud quippiam eius generis, quod est ad stomachi subuersiones ac nau seas præscriptum. Conueniunt etiam muria conditæ oliuæ albæ, & quæ corymbades appellantur. Item amygdalæ amaræ à ieiunis acceptæ, & antidoti ad lethalia pharmaca aptæ. Quomodo uero à pica appellato morbo mulieres infestatas curare oporteat, in muliebribus remedijs dicitur.

De cruditate: Galeni.

Cap. xxiiii

Concoctio qd

cruditas quid

Concoctio
difficilis

Concoctio, est iuxta qualitatem permutatio, quæ nutrire potest. Contingit autem à uentre sibi ipsi cibos assimilare: quapropter manifestum est, quod circa permutationem, offensæ concoctionis accessio continget. si itaq; cibi in totum non permutentur, cruditas ea accessio appellatur, & est perditio & perfecta priuatio actionis. si uero permutentur quidem cibi, uero non ut oportebat, uitiatam significat cōcoctionem, non autem ut antea eius priuationem. aut enim tardat, & nunquam propriam trāsmutationem suscipit, & difficilis cōcoctio appellatur: aut cibos omnino corrūpit, ac transmutat in alienam qualitatem. Atque hæc quidem concoctionis offensiones existunt. Causæ autem ipsarum sunt, intemperies uentris, inflammations, scirrhī, abscessus, & quæcunque eius generis existunt. Aliquando autem uentre nihil male affecto cibi crudi permanent, aut propter immoderatam ciborum ac potuum ingestionem, aut ob uitiosam ipsorum ciborum qualitatem, aut ex intempestiua, aut etiam inordinata sumptione, aut ob recrementum uitiosum, aut ob uigilias. Cæterum ex uitiosis ciborum qualitatibus, & recrementis quæ iuxta uentrem consistunt, cum corruptione cruditas oboritur: aliquando & ex inordinata sumptione, si quidem poma, aut mala punica, aut aliquid aliud tale primum comederint, deinde olera

olera assumant ex oleo & garo, aut etiam alia quæ uentrem emollire con-
sueuerunt. Intempestiuam autem acceptionem appello, si prius quàm prior
probe subicitur cibis, prandcant, aut etiam præter consuetam horam. Cor-
ruptiones autem sunt, nidorose quidem in calidioribus & biliosioribus
acidæ uero in frigidioribus natura & magis pituitosis. Eodem modo & de
excrementis quæ in uentre præexistunt iudicandum erit: quæcumque enim
ex eis pituitosa & frigida sunt, acidas corruptiones efficiunt: quæ uero calida
& amara bile mixta, nidorosas. Ipse quoque uenter aliquo modo affe-
ctus, siquidem frigidus morbus existat, acidas permutationes facit, calidus
uero nidorosas. Tardas autem concoctiones, cibi difficulter corruptibiles fa-
ciunt, & si ultra quàm uires tolerant sumuntur, itemque uigiliæ. Quum uero ci-
tra corruptionem perfecta cruditas oboritur, ut quales accepti sunt cibi, ta-
les permancant iuxta omnem suam qualitatem, ex hoc cognoscere datur ui-
ctum esse uentriculum, aut ab immoderata ciborum multitudine, aut per ue-
hementem refrigerationem insiti caloris. Vt ne quis igitur in cruditatem inci-
dat, cautione in omnibus prædictis est utendum, ut neque in multitudine, ne-
que in qualitate eorum quæ in cibo accipiuntur, neque in acceptionis oportu-
nitate neque in ordine delinquat: & ut quæcumque concoquere ualeat, ea tantum
ingerat, & non quæ appetitus exposulat: mensuræ enim maxime omnium
diligentem respectum habere oportet, appetitumque refrenare, & neque plus
quàm uires tolerant accipere, neque quæ natura difficulter concoquuntur, ue-
luti sunt carnes natura duræ: natura autem dico, uelut carnes bubulæ, & con-
similes: ætate uero, si mactata animalia seniores existant. Cauendum est etiam
à partibus carniū multi nutrimenti existentibus, & pinguibus salisque con-
dimento seruatis, ac uetustis. Ex oleribus, quæ igneæ sunt naturæ, ualdeque
frigida: item quæ inflationem pariunt, incommoda existunt. Ex piscibus,
qui duras carnes habent, & repositione arefacti. Abstineant quoque à cibis
corruptis & foetidis ac graucolentibus. Vitent fructus dulces aut flatu ge-
nerantes & immaturos: bellaria quæ difficulter concoquuntur & oleagino-
sa, & quæ ægre diuidi possunt, uelut est sesamum, quod cōmanducationem
ob paruitatem suam effugit. Non minus autem uitandi cibi peregrini & in-
consueti ac medicamentariam uim habentes, quales frequenter placentis ac
panibus immiscetur. Iuxta tempus autem accipiendi cibi neque impetuose,
neque aceruatim, neque solidis partibus aut absque cōmanducatione eos inge-
rere oportet: neque etiam potus cibum interpellet: id enim unionem cibo-
rum impedit, singulosque uentri innatare facit. Ex condimentis uero oxypor-
on quoddam quod cito penetrat assumere non incommodum neque iniu-
cundum existit: maxime uero huiusmodi. Caroi drachmas xvi, sceni-
culi drachmas sex, seminis apij drachmas octo, ligustici drachmas octo,
ammij drachmas octo, piperis drach. i. aliqui autem & myrrhæ drachmas
ii. in frigidioribus temperaturis omnia melle excipiuntur, & cum carnibus
ac piscibus

*Intempestiua
ciborum ac-
ceptio*

*Corruptiones
ciborum quas
modo fiant*

*Quæ ægre
concoquantur*

ac piscibus exhibeantur. Melius autem est cum cibo & piper, maxime longum exhibere, in his qui magis pituita abundant: uentrosi enim flatus crassitudinem dissoluit: & quæ circa præcordia consistunt, inferne ad aluum propellit. concoctionem etiam omnium maxime piper adiuuat: quod si forte non adsit, albo utendum erit: quod si neque hoc adsit, nigro. Utendum etiam alijs concoctionem iuuantibus pharmacis, quæ ad finem huius capitis sunt subiecta. Post acceptum cibum uexationes inæquales ac conturbantes uitandæ, item æstus & refrigeratio: hæc enim concoctioni ciborum resistunt. Adiuuant autem eandem fricatio pedum, calidius contubernium, & calefactio præcordiorum. Quod si gravitas adsit circa uentrem, & ex ea molestia quædam in uniuersum corpus diffundatur, expansa manu os uentris apprehendendum est, aut puerulus carnosus admouendus. Ex his enim sæpe alimentum corruptioni proximum est conseruatum. Cæterum quum ructus iniuicundus proueniens manifeste corruptionem factam indicat, citra cunctationem ad uomitum ueniendum est, atque aqua tepida ingesta, omnia corrupta ad excretionem cogenda. si enim in uentre permanserint, & torsionum, & dolorum, & grauitatis capitis causa existunt: aliquando autem bilis superne ac inferne effusionem, aut profluium uentris, aut etiam febres inducunt. Quare eos qui difficili concoctione adprehendi solent, longo ante tempore ad suæ faciemus ut facile uomant: commodissimus enim in plurimis periculis existit. Quod si quis natura difficulter uomat, aut ob aliquam aliam incommoditatem uomere impediatur, omni modo conandum est ut cibis subeat, & ex præcordijs deducatur. Ad hæc erectior decubitus appareatur, ut ea quæ capiti subiiciuntur sublimius insternantur, & reclinatio ipsa in sinistrum latus fiat: atque si quis uigilijs infestetur, citra corporis uexationem permancat, eandemque decubitus formam obseruet: frequentes enim agitationes cibos perturbant, intestinaque inflata reddunt: flatus autem cibum sursum uergeret facit. Si uero quis ob nullam causam male dispositus sit ad frigidæ potum, non inconueniens erit cyathum unum aquæ frigidæ puræ absorbere: corroboratus enim inde uenter celerrime quæ in ipso hærent extrudit, & ad subiectas partes demittit. Sequenti deinde die in quiete æger assuetur, fricationeque pedum utatur, & præcordiorum concalefactione, donec murmura & flatus circa intestinum rectum eruperint, cructationesque cum qualitate mansuetiori reuerterint: & tunc sanè exurgere conuenit, primumque aluus ea quæ corrupta sunt egerat: deinde ad deambulationem moderatam æger procedat, atque otium agat, propter commotos uapores ex corruptione in caput delatos. Post hæc autem ad quotidianas actiones mens applicanda est citra perturbationem ac indignationem: deinde rursus uenter cogendus est ad eorum quæ relicta sunt excretionem. postea quiescere iubebimus, atque aqua calidiore pedes perfundere ac fouere: frigida uero pura facie proluta, in lecto quiescere omnibus conatibus somnum illiciendo. post quem modica deambulatione

frigidæ potus

bulatio, deinde balneum suscipiatur, quod calidius solito existat: ceterum re-
fectis prius uiribus lauetur, corporeq; nitro consperso exudet, atq; hoc mo-
do in calidius solum descendat: deinde etiam in frigidum insiliens, largiore
oleo uniuersum corpus pingue faciat. Commodissimum est etiam aqua cali-
da in balneo hausta uomere: uelut abluendo ea quæ in stomacho desident
biliosa aut pituitosa. absint hijs quoq; prælibatio à balneo quod conuenit fa-
cit, & aliena uentri adhaerentia extergit. A lauacro cibum capere conuenit mo-
deratum, & cui concoquendo corpus sufficit. dabimus itaq; herinaceos ma-
rinos recentes, aut canctos fluuiatiles, ita ut ab eorum acceptione, maluam,
aut oua sorbilia, aut pisces in petrosis aquis degentes adsumant, & ex uolu-
cribus non graueolentes & macras. A reliquis autem carnibus abstineant, &
à leguminibus accipis, salsamentisq; & quæ eius generis existunt: A bella-
ris item, & omnis generis placentis, & à fructibus dulcibus ac facile accescen-
tibus in uentre. his enim omnibus concoquendis agere sufficit uenter, ampli-
usq; instantis naturæ ea ipsa existunt. Non solum autem qualitates eorum
quæ in cibo exhibentur permutatas esse cōuenit: sed etiam multitudinis ad-
hibere modum. ea enim quæ facile concoquuntur his quæ non concoquan-
tur paria fiunt, si præter modum ingerantur. Deinde uero fornus impertur
batus, & æqualis procuretur, illito uentre ex unguento nardino.

Pharmacum concoctionem adiuuans, ex malis cotoneis: Galeni.

Pharmacum ex malis cotoneis conueniens est apparando appetitui in his
qui cum perdidit: conuenit & concoctioni, in his qui non probe conco-
quant cibum: & ut summatim dicant, uentrem robustiorem reddite: eisq; qui
debile habent hepar, utile existit. Manifestum autem esse arbitror, quod ie-
iunis exhibere hoc oporteat, mystri mediocris mensura: quāquam nihil of-
fendat, etiam si quis à cibo ipsum acceptet. Recte etiam exhibetur, si ex-
pectanti atque inde bibere uolenti præsumendum detur. Oportune uero dua-
bus ante cibum horis datur. Apparatur autem hoc modo. Ex malis co-
toneis maiora iucundioraq; & minus acerbæ, quæ uidelicet struthia appel-
lantur, eligito, expresseq; eorum succi sextarios Romanos duos accipito, ad
mellis quā optimi parem mensuram ammisceto: aceti uero sesquixeta-
rium affundito: hisq; simul ad prunas ardentes moderate decoctis ac de-
spumatis, zingiberis quadrantem, piperis sextantem adijcito: atque hoc mo-
do rursus ad ardentes prunas, donec ad mellis crassitudinem perueniant,
decoquito. Quod si magis adstringens ipsum facere uelis, ut his qui intem-
perie uentris calida afficiuntur, & qui quomodocunq; tandem bile sunt res-
serti, magis conueniat, zingibere & pipere detractis, succum malorum cum
aceto ac melle solo decoctum præscripta commensuratione exhibeto. qua-
cunq; autem tandem temperatura sit uenter, ut neq; biliosa neq; pituitosa in
eo aggregentur recemeta, dimidiū prædictæ cōmensurationis tum piperis,
tum zingiberis radices inijcere expediet: ita ut piperis qdē uncia i, zingiberis
ucto

Balneo

abstinere a balneo

opponere modum famit

frigidum uideri a c

Malis cotoneis

calida

polsit, si citra zingiberis admixtionem paretur. Alterum autem ex iisdem constat: uerum ad quinquaginta uniuersiusq; trium piperis specierum drachmas, singulorum ex his tribus, aniso uidelicet, cacuminibus thymi, & zingibere drachmas xvi conijcimus.

Pharmacum ex calamintha oxyporon, hoc est cito pernetrans: quod polyetes, id est annosum, appellatur.

Prædictorum quidem igitur pharmacorum caliditas, circa primas uenas extinguitur, minime per uniuersum corpus se diffundens: quemadmodum id quod ex calamintha constat, solet, & ei similia. Neq; enim uolumus ea quæ cum cibo concoctionis gratia exhibemus, in uniuersum corpus diffundi, sed tantum concoctionem ciborum in uentre adiuuare, itemq; humorum crudorum in primis ac magnis uenis contentorum. Quare quemadmodum in dioscoridico pharmaco dictum est, non nimis in puluerem redigere oportet ea quæ ad concoctionem solam adiuuandâ apparantur. Hoc uero pharmacum in uniuersum corpus usq; ad cutem ipsam digeritur ac distribuitur: quare ijs ipsum exhibere conuenit, quibus crudorum humorum multitudo in solidis animalis partibus consistit. In talibus enim, omnium quæ ego nō ui optimum, id quod ex calamintha constat, existit. Attenuat enim crassa & uiscosa: discutitq; ea similiter: urinamq; & menses ciet. Compositio autē eius talis est. Calaminthæ montanæ, seminis petroselini, pulegii, fœelis, cuiusq; drach. xii, seminis apij, cacuminum thymi, singulorum drach. iiii, ligustici drach. xvi, piperis drachm. xl v iiii, mellis despumati quantum suffecerit. Aliqui & zingiberis unciam unam adijciunt. lucundissimū autem est quod plurimum mellis ammixtum habet. His uero qui dulcia auerfantur, & a mellis usu abhorrent, parum in compositione ammisceatur. Quidam tamen mellis libras quatuor & dimidiam ammiscent. Potest & absq; melle siccum adseruari, eodēq; ut reliqua modo salibus cōmisceri, edulsiq; ac liquamentis inspergi. A cibo uero nunquam, neq; hoc, neq; aliud quoddam pharmacum, quod uehementem penetrationem facit, accipiat. Distribuitur enim ac digeritur simul cum ipso aliquid crudorum ciborum, & obturationē operatur. Vius eius conuenit post matutinam fricationem, duabus ante exercitium balneumq; horis.

Aceti multī apparatus ac usus: Galeni. Pituitosis in uentre humoribus etiam acetum multum conuenit, quod hoc modo apparare oportet. Melli optimo ad prunas decocto ac despumato, dimidia eius mensura acetum affunditur, atq; ita rursus ad prunas decoquitur, quo ipsorum qualitates optime permisceantur, & ne appareat gustantibus acetū acor. Ad eos uero qui acetū multitudinem auerlantur, hoc modo apparato. Aceti pars una accipiat, despumati mellis duæ, & aquæ partes quatuor. Quod si fortius facere uelis, tantum acetū, quā tum mellis conijcies, & absq; aqua apparabis. Præstat autem iuxta sensum eorum qui accepturi sunt mixturæ congruentem modum iudicare, non uero secundum quod nō

Quæ ad concoctionem inueniuntur non nimis in puluerem redigenda sunt, sed sicut propinqua.

Quæ ad concoctionem inueniuntur non nimis in puluerem redigenda sunt, sed sicut propinqua.

Quæ ad concoctionem inueniuntur non nimis in puluerem redigenda sunt, sed sicut propinqua.

Quæ ad concoctionem inueniuntur non nimis in puluerem redigenda sunt, sed sicut propinqua.

Quæ ad concoctionem inueniuntur non nimis in puluerem redigenda sunt, sed sicut propinqua.

Oxypora 2 cibo non sunt exhibenda sed in manu per matutinam fricationem et horis

*Ua. iucunda quatuor fimi
per se pauca de offe
mala*

*Iucunda etiam
commoda esse
& contra in-
iucunda nocen-
tia*

stri sensus perceptant. Quod enim naturæ accipientis familiarissimum est, id iucundissimum existit, & ob id etiam utile & accommodatum. Nocentissimum autem contrā est, quod minime iucundum. Cæterum usus tempore aqua calida mixtum, uelut uinum exhibendum est, prout agro iucundias uisum fuerit. Pharmacū ex malo citrio, tarde concoquentibus commodū.

Carnis mali citri lib. i, hyssopi, rutæ, origani, cuiusq; fasciculum exiguum, acetii heminas iij. per quinque dies ac noctes aceto macerata ad tertias decoquito, & expressa rejicito: ad acetum uero mellis sextarium i ammisceto, rutæ sumq; ad mellis crassitudinem decoquito: deinde afari, mei, piperis, cuiusq; sextantem inspergito. Mane & uespere exhibetur.

Pharmacum ex uino scybelite: Archigenis.

Vinum scybelites quod sit

Vini scybelitæ sextarios iij, succi rutæ sextarium i, sisonis, piperis, cuiusque unc. i, zingiberis sextantem, petroselinæ unc. i, mellis sextarium i. Liquida ad compagem crassam decoquito, aridaq; inspergito, ac cochleariū unum aut alterum exhibeto. Efficax est ad tardas concoctiones, ac inflationes, itemq; colicos. Vinum autem scybelites est, quod sua sponte ex palsis uuis destillat, utpote uinum ultro effluentibus uuis.

Sales lamblichi. Salis ammoniaci libram unam, salis cappadocici sexuncem, piperis quadrantem, zingiberis quadratē, seminis cici scrupulos xviij, seminis erucæ scrupulos xvi, ammi scrupulos xvij, hyssopi scrupulos xvij, silphij scrupulū i, cacuminum thymi, phylli, seminis aprij, petroselinæ, cuiusq; scrupulos xvij, origani unc. i. Contundito ac cribrato, indeq; dimidium cochlearium, cum ouis sorbilibus, aut cum pisana ieiunis exhibeto: potes & cum carniū aut piscium liquamento exhibere, aut quomodocunq; tandem uelis. Huius medicamēti auxiliarem facultatem nemo pro dignitate laudare potest. Quare ut breuiter dicam, ad frigidiores temperaturas non reperias aliud pharmacum, quod conuenientius crudos humores concoquat: unde & colicis prodest, uentrem citra molestiam mediocriter mouens.

Sales Pollentis, aluum emollientes, pituitam à capite dissoluentes, per palatum transpirantes, reliquasq; distentiones attenuantes. Salis torrefacti splendidissimi drachmas cxlviij, floris chamæmeli aridi & contusi trientem, conyzæ tenuis trientem, calaminthæ montanæ trientem, radices eryngij montani, origani, cuiusq; trientem, silphij trientem, piperis trientem. Contusis & cribratis utere.

Sal dodecatheos, hoc est duodecumanus, seu duodenarius.

Sal dodecatheos
Hyssopi trientem, pulegij quadrantem, cumini sextantem, ammi unciam unā, salis torrefacti uncias triginta. Contundito & cribrato, proq; quotidiana no sale, utcuq; placet, utitur. Qui enim eo assidue utitur, nullis morbis per omne uite tēpus infestatur. Præcipue tamen caput alleuat, & uisum acuit, pituitamq; in thorace congregari non sinit: concoctionem bonam operatur, & mela,

& mesaraicas maximè uenas ab obturatione liberat, & renes repurgat. Quidam & origani sextantem adijciunt. Ego uero semper spicæ nardi unciam 1 annecto. In hyeme amplius piperis unciam unam addo.

Ad eos quibus alimentū in uentre acefcit, utiliter hoc remediū adhibetur.

Piperis drach. 1111, seminis anethi drach. 1, cumini drach. 1111. contete, ac exhibe cochlearium ante somnum ex uino diluto.

Embamma optimum, concoctionem adiuuans.

Cumini, piperis, foliorum rutæ, mentæ uiridis, anethi uiridis, cuiusq; drach. 1111, pulegij scsquidrachmam, salis unc. 1, gari albi cochleare 1, mellis cochleare 1. Vtere, ualde enim commodum existit.

Fusca, concoctioni ualde commoda: Cyrilli archiepiscopi.

Pulegij, seminis foeniculi, seminis apij, cuiusq; scrupulos sex, caroi scsquiscrupulum, seminis coriandri scsquiscrupulum, baccam lauri unam, cypri, phylli, costi, cuiusq; scrupulum 1, salis sexuncem, aceti sextarium 1. Sicca contundi to & cribrato, acetosq; ammixta ad paucas horas macerato, ac utitor.

De crapula: Philumeni.

Cap. xxv

CRuditates ex uino multo obortas, crapulas appellamus, easq; cōsimili methodo tractamus, quali ad difficultatē concoctionis præscripta uti solemus. Itaq; his qui ad frigida potum adfueuerunt, aliasq; stomachū habent æstuosum ac exustum: aquæ frigida puræ cyathi duo aut tres per interualla ad absorbendum exhibendi sunt. post uero per somnum meridianum turbationibus depulsis, confestim eos in balneum inducemus, prolixioresq; exudatione procurata, ab aquæ tepida haustu ipsos uomitum facere cogemus, aut digitorum tantum immisione eundem lacessimus. Deinde prædictos cibos exhibebimus, dilutiore ac pauciore addito potu, donec caput à gravitate liberetur. Statim uero à principio caput ex olei omphacini fomento irrigetur. Sequenti autem die bonæ concoctioni consulatur. Optimum autem fuerit, si quis uinum absinthites ad plures dies à balneo præbuit, ite mēp post matutinas deambulationes. Prodest & acetum scillinum absorbere 1 mystri mensura: deinde in quiete breui sanè tempore degere, atq; ita ad reliqua facienda procedere, quemadmodum in capite De cruditate est prædictum.

Crapula quid

Somnus meridianus quibus utilis

Quæ cura aluo adstrictæ adhibenda: Galeni.

Cap. xxvi

Recrementorum iuxta uentrem retentio, aut ob ciborum ac potuum accipiendi modum contingit. Ob qualitatem quidem, si acerba & austera comixtione consent, ea quæ accipiuntur. Ob quantitatem uero, si pauciora & citra conuenientem exhibeantur mensuram. Circa ordinem autem retentio excrementorum contingit, si arida & acerba prius, humētia uero pinguiorq; & dulcia postea ingerantur. Circa modum uero utendi, si bis cibum accipere conueniat, & semel omnē assumat. Quæ uero circa uentrem ac intestina con-

Cibus citra istam mensuram exhibitus, aluo adstringit

m 1 sistit

*Octo acquisi-
tione uentris
intemperatura*

sistit recrementorum retentionis causa, ea ex natura ipsorum, & non ob acquisitionem contingit dispositionem. Causae itaque circa naturam ipsorum sunt vitiosae corporum constitutiones. Octo autem existunt uentris acquisitionis intemperaturae. Quatuor quidem simplices, caliditas, frigiditas, humiditas, siccitas: reliquae quatuor commixtae, caliditas simul cum humiditate, caliditas cum siccitate, frigiditas mixta humiditate, frigiditas mixta siccitate.

*Excretina
facultas*

*Febres aluum
adstringunt*

Oportet autem unamquamque intemperiem in eam magnitudinem excedere, ut euidenter excretionem facultatem imbecilliores reddat, aut in uentre solo, aut in gracilibus intestinis, aut etiam crassis, aut simul in omnibus praedictis, quemadmodum in uoluulis fieri consuevit. Ad haec amplius & in febribus aliquatido aluus adstringitur, ob acrimoniam uidelicet resiccantibus & consumentibus humores: aliquando autem materia ad alios locos diuersa, per ipsos ipsos exclusa. Sudoribus enim multis per cutem exclusis aluus coarctatur: & stomacho ex fluxione affecto stercus cohiberi contingit propter inflammationem item intestino recto uicinam, ipsumque deprimentem, uelut est uesicae, aut uuluae: & propter ulcerationem aut dolorem circa eas partes obortam, excrementa recurrunt. In his uero qui a morbo uires recolligunt, uenter cohibetur: propterea quod plurima digestio ciborum in corpus fiat, & ob id exiguum & aridum, & quod difficulter excerni potest, stercus relinquitur. Ad haec etiam uenter adstringitur ob flauae bilis cohibitionem, quae ad intestina delabi consuevit: ea ipsa enim in animali, quod secundum naturam habet, confluens intestina mordet & irritat, & ad excretionem excitat recrementorum. Quapropter etiam semper cibo uacuum ieiunium intestinum reperitur, in quod procedit meatus, qui ex bilis susceptrice uesicae bilem ad intestina deducit: atque ob has sane causas uenter adstringitur. Commune autem in omnibus praecipuum est, ut causae noxam inferenti contrariam curationem opponamus. Proprium uero ut secundum singulas causas cuique quotidie contraria remedia exhibeamus. Et si quidem ex pauciorum ciborum accceptione homo aluum habeat adstrictum, plures simulque humidiores ei offerantur: si uero siccioribus sit usus, humidiores quidem dentur, non autem multi. Si uero austeri & acerbi cibi retentionis fuerint causae, dulces & pingues exhibeantur. Si uero ob permutatum ordinem adstrictio fiat, in eum qui conuenit, reducat. Si uero semel cibum accipiendo, quum bis id facere oportuerit, uenter cohibeatur: non solum bis, sed & saepius conuenientes cibi dentur. Eodem etiam modo recentes intemperaturae per contraria curen: ut exsiccata corpora humectemus, humecta uero resicemus, & calefacta quidem refrigeremus, refrigerata uero calefaciamus: atque in coniugatis siue mixtis qualitatibus eadem iuxta proportionem faciamus. Cohibita autem quae ad intestina defluere consuevit bile, aut ob crassitudinem, aut ob biliosorum meatuum obturationem: extenuatoria diuina utendum est. Similiter autem omni conatu instare & reniti oportet, ad reliquas alui adstrictae causas

*Flaua bilis in
testina ad ex-
cretionem res-
crementorum
excitat*
*Intestinum ie-
iunum cur sem-
per uacuum*

causas tollendas. atque uiscerum quidem inflammationem soluemus, ubi per ipsam cohibitio contingat: materias uero ad intestina conuersas deducemus, si quidem aliò prorepent. Qua autem medicinali materia id fieri possit, in simplicium pharmacorum sermone est prædictum in principio huius tractationis, atq; in eo qui hunc sequitur de purgantibus pharmacis inscripto. Communis autem omnis quomodocūq; euenerit, ad trictionis alui curatio talis est. Ex decubitus figuris erectior eis cōuenit, & ad sinistrum latus reclinatio. Ex silentium quidem ac quies uentrem cohibent: motus autem & deambulatio impellūt. Paucus potus, & non compotare, neq; inter medios cibos potum accipere, uentrem resiccant: cōpotatio uero & multa potio sterco humectant. Somnus concoquit, & recrementa fluida facit: uigilia uero materias distrahunt, & suspensas tenent. Plurimum autem ciborum qualitates possunt, quare eas quæ uentri gratæ sunt exhibere oportet: quanquam omnino melius fuit absinthij succum dare, aut ex aloë catapotia deoranda. Quibus si nihil proficimus, durisq; adhuc sterconibus insidentibus, & lumbis aggrauatis, circumtensoq; & inflato uentre superiore, humectantibus immorari cibus absurdum. Sæpe enim lapidis modo recrementa indurantur, & in intestino recto condensantur: quare accepti cibi stomachū quidem & uentrem humectant & effœminant, ad intestinum uero rectum peruenire non possunt: ut inde alix quædam molestiæ consequantur. Melius igitur in istis fuerit aluo prisanæ succum per clysterem infundere, ammixto oleo & melle, aut malux aut fœni græci uel fursutum decoctū similiter cum oleo & melle. Utendum etiam glandibus ac illicionibus sedis. Alumē autem liquidum melle tritum donec indure scat decoquitur, ex eoq; sedes illinitur, & facile quidem plurima sterco proleat, quanquam inde aliquandiu dolore afficiantur. Optime autem facit & cyclamini succus cum melle illitus, & in tomento quoq; appositus. Mercurialis etiam uiridis contrita, & ad glandis modum redacta, exsiccatur & supponitur, ualdeq; commoda existit.

Primus Actij sermo De simplicibus pharmacis
Secundus De purgantibus pharmacis.

Alum adstringentia & laxantia

Recrementa in intestino recto lapide descere. Ventrem humidis effœminari

Glandium usus

Alia glans, purgatoriam uim habens.

Comæ absinthij contusæ ac cribratæ drach. 11 11, nicti drach. 1111, elaterij drachmam 1. melle cocto excipito, glandesq; informato ac subindito: fomento tamen prius ad locum adhibito. De his autem absolutissime in tertio huius tractationis sermone est prædictum, ubi etiam pharmaca purgantia quæ circa umbilicum illinūtur, descripsimus: eorumq; etiam quæ per os exhibentur ac uentrem emolliunt, tum simplicium, tum mixtorum remedium mentionem fecimus: quare superfluum existimo hic de eis producere sermonem.

Absinthati emollientis utilis apparatus.

Costi unc. 1, spicæ nardi scrupulos 1111, phylli scrupulos 1111, mastiches scrupulos 11, mellis sextarios duos, uini sextarios decem.

Absinthatum bonum, emolliens, & duke.

Sifonos unc. 1, floris iunci odorati scrupulos 11, mastiches scrupulos 1111, phylli

phylli scrupulos 11, spicæ nardi scrupulos 11, mellis sextarium 1, uini sextarius v. Absinthiatum amarum pituitosis magis conueniens. Agarici, phylli, amomi, spicæ nardi, calsiæ, cuiusq; scrupulos 111, costi scrupulos 11, rolarum siccarum scrupulos 11, aloes scrupulos v 11, mastiches scrupulos x 11, mellis sextarium 1, uini sextarios v.

Aliud, atra bile abundantibus, & pituitosis similiter commodum.

Phylli scrupulos v 1, spicæ nardi scrupulos v 1, agarici scrupulos 1111, epithymi scrupulos x 11, mastiches scrupulos x 11, aloes scrupulos v, mellis sextarium 1, uini sextarios v. Aliud optimum.

Phylli, spicæ nardi, calsiæ, amomi, cuiusq; scrupulos 1111, costi scrupulos 1111, agarici scrupulos 1111, mastiches scrupulos 1 x, aloes scrupulos x 11, mellis sextarium 1, uini sextarios v.

De inflatione: Galeni.

Cap. xxviii

Inflationis principium cibus male concoctus existit. Contingit autem flatuum generatio in ventre, ex humoribus in ipso pituitosis, aut ex cibus in uapores per mediocrem caliditatem resolutis. Perfecta enim frigiditas nulum omnino uaporem efficit, propterea quod neq; omnino attenuat, neq; consumit, neq; dissoluit etiam ipsum cibum. Vehemens autem caliditas cibum attenuat, si flatuosa natura existat, & tunc sanè nebulosus flatus generatur, utrum paucus, adeo ut per unum aut alterum ructum euacuetur. Mediocris uero caliditas minoris efficaciz existens, cibos quidem dissoluit, non autem perfecte consumit unde sanè flatus generatio coningit. Vna autem eadèq; ratione quædammodù extrinsecus frigidissimæ & aquilonares in hyeme constitutiones, & calidissimæ æstatis tempore consistentes, purum aerem reddunt: quæ uero inter has mediæ existunt, nebulas gignunt: Sic eodem planè modo, in animalium corporibus, neque in extrema caloris debilitate, neq; quum uehementer calor inualefcit, sed quum inter hos excessus medio

Simile
*Ructus quò
generetur*

modo habet, flatuosum recrementum generatur, atq; hoc ipsum ubi per stomachum excluditur, ructus operatur: per sedem uero aut strepentem, aut absq; strepitu flatum. Quum uero neq; per os, neq; per sedem excernitur, inflationem appellatam producit.

Archigenis.

Accedit affectis stomachi grauitas & distentio, multosq; fallit tanquam in ipsum solum dolor immitatur: etenim malum ipsum aliquando quidem iuxta totum pectus, aliquando uero retro iuxta collū ac dorsum, atq; ipsa uertibula irruit: sæpe autem & utrinq; occupatos tenet aliquando autem & tumorem circa os uentris efficit, ructusq; inanes fiunt modice alluantes, inhi bibioq; flatuum qui per aluum excerni consueuerūt. Succumbit autem & tumor ipse iuxta uentrem, ad manuum impositiones subluxus cedens. Quibusdam eorum & dolores accidunt, & appetitus perditiones, ac capitis dolor. si uero ante perfectam restitutionem cibum accipiant, amplius membra ipsa inflantur, & cum dolore amplius distenduntur, qui sæpe ad clauiculam usq; defertur

defertur ipsasq; scapulas ac uniuersam spinam, ultra hoc quod & ructus cohibentur: ut aliqui iam non dissimile quiddam suffocationi se perpeti existimant. Leuantur autē alimento inferne subeunte, & flatibus siue per ructus siue per intestina exclusis. Eos igitur qui non ita diu ante cibum sumpserunt, primū uomere præcipi: deinde uero fouere oportet cum lana in falciculum conuoluta & leuiter calido oleo madefacta. Glands quoq; confidenter & citra dilationem supponendæ sunt, ex rebus flatus prolestantibus informatæ: uelut est ruta semen & cuminum æquali pōdere cum melle cocto, ac modo dicto nitro coacta. Inedia etiā affectioni necessaria existit, per unam quoq; atq; alteram horam tempore irritationis, irrigationes ex oleo conueniunt, in quo absinthium, ruta, & anethum sint decocta. Lanæ uero conuolutæ cuminum tritum, aut apij semen, aut sisonis magis, inspergatur. Deinde & cucurbitæ adfumantur inanes multæ, & cum multa etiam Hamma admotæ. Perseuerante autē diutius affectione, cataplasmata ex semine lini, ordeacea & loliacea farina imponantur: ex cumino etiam trito, semineq; anethi, aut apij aut foeniculi, aut chamelæ, aut tragorigani, aut centaureæ soma, aut eryngij semine uel radice: ex hydromelite etiam & oleo in quo ruta, baccæ lauri, & melanthium sint decocta. Ammiscendum est & bitumen, oleumq; laurini. Si uero inflammatio unā cum inflatione adest, pro calefacientibus ea quæ relaxant ammiscere oportet, uelut est anethum oleo incoctū ammixto adipe gallinaceo aut asnerino. Cibus uero frumentacei generis sit & paucissimè multum etiam assumpti cibi tempus, potus tandem præbeat. A cibofricationes extremarum corporis partium adhibeātur. Alius uero tum per cibos, tum per aloem subducatur. Ceratā etiam imponantur ex oleo apparatus, in quo cucumeris syluestris radix sit incocta. Ad finem uero mialagmaris utendum, quæ ex seminibus aut lauri baccis constant.

Marciani irrigatio siue fomentum, ad eos qui ex morbo circa septimum transuersum inflationem habent, & murmura circa interiora: aut quibus uiscera inflammata sunt, aut inflantur.

Ruta uiridis trientem, foeni græci sexuncem, foenum græcum in pauca aqua diem unum præmacurato: deinde reliquis ei adiectis, atq; olei sextarijs III affulsis, ad non fumantem ignem decoquito, percolatoq; ac in eo lanam conuolutam quā plurimum madefacio. Si uero dolor intendatur, in solum ex oleo apparatus eos imponemus, si tamē nihil id fieri præpediat. altheæ itaq; radicem, lauri folia, foenum græcum, pulgijum, rutam, in aqua decoquimus, & oleo ad decoctum affuso, eos inscindere facimus. Quod ubi felicius processerit, cibum accipiant: panem ex aqua, & pisces teneras carnes habentes. Qui uero se iam recolligunt, diætā restituendis uiribus apta utantur: sinapismisq; & cucurbitulis cum multa flamma post exercitia admotis, uomant. Si uero fixa perseverauerit accessio ipsa, tempore exacerbationis cataplasma ex sinapi imponendum est, & paulo post aloes drachma una

propinanda, aut smymij semen ex uino. Aristolochia autem longa siue rotunda drachmæ pondere potata statim dissoluit, & tarde concoquentes suuat: quod & calaminthæ decoctum, aut etiam polium decoctum cum melle modico & paucissimo pipere tenuissime trito, facit. Ouillus autem talis ustus & potatus torminibus ac inflationibus medetur. Aut rhamni folia uiridia trita in pastillos redige, eosq; in umbra exsiccatos drachmæ pondere exhibenon febrientibus, cum uino diluto: febrientibus uero, cum hydromelite. Facit & ad uoluuolosas affectiones, omnesq; inflatuos dolores miro modo. Per ructus enim ac flatus inferne prodeuntes discusso & resolato malo sani fiunt, inquit Dioscorides. Vtile etiam eis castorium ex posca bibitum existit, drachmæ pondere acceptum. Idem quoq; forinsecus cum oleo sicyonio impositum, etiam si cum torminibus & inflationibus prædictæ affectiones contigerint, eas sanat. Acetum uero scillinum tum ante, tum post cibum absorbeant, aut ante somnum. Apparatur autem simplicissime hoc modo. Scillæ repurgatæ & dissolutæ libras v, acetii sextarios xlviij, sub caniculas ardoribus ad dies quadraginta insolato, ac utitor. Oxyporion etiam quod cito penetrat eis conueniens est huiusmodi. Foliorum rutæ drac. xxxij, cumini drach. xiiij, ligustici, caroi, seminis apij, pipæris, zingiberis, helenij, nitri, cuiusq; drach. viij. exhibe cochlearium quomodocunq; uelis congruenter. Exhiberi etiam potest ad noctem ex tribus pipæris generibus pharma cum, erui magnitudinem robustioribus uero, ægyptiæ fabæ. Aluo autem adstricta circa dilationem clyster infundendus: balneo uero ex interuallis utendum est tempore remissionis. Præfricent autem istis tum dorsum, tum stomachum, conspergantq; nitro assato: solijs etiam calidioribus utantur: & à balneo cibis detur minime inflans, & post omnem cibum uinum meracius exhibendum. Cibus autem ipsorum diuidatur, ita ut in prandio tertiam, in cœna uero reliquas duas accipiant partes. Fructuum uero atque olerum humidorum esum semper habeant suspectum. Multum autem potum tanquam infestissimum hostem deuient.

Acetum scilli
num quomodo
paretur.
Oxyporion

Cena amplior
prandio

De uoluuolo: Archigenis.

Cap. xxviii

Voluuulus, adfectio est intestinorum, letalem dolorem inferens, Causa adfectionis, continua ciborum corruptio existit, præsertim si multi accipiantur, uarijque, & ad quos non adueuimus, & maxime ex pinguibus carnibus. Oboritur etiam ex plagis quibusdam, & frigore uehementi, & ex acerrata frigida potione, maxime si ab exudantibus accipiantur. Contingit & his quibus intestinum in scortum unâ cum stercore delapsum est: indeq; uio lenter retrusum, ex eoq; inflammatum existit. Fit etiam ob ueneni potionem, & ob induratum stercus circa tenuia intestina impactû, in uno loco dolore innitente circa tenuia uidelicet intestina, ut admota manu duricies tactui succumbat, quam adfectionem chordapsum ueteres uocant, hoc est intestinorum emollitio. Ex multi sanè ex dolore statim intereunt. Alijs uero inflam-

Chordapsus,
intestinorum
emollitio

matio

matio suppuratur, rursumq; intestinum ipsum denigratum ac putrefactum excidit, eoque modo deficiunt. Familiaris autem hæc adfectio ætati puerili est, euadunt tamen naturalis beneficio humiditatis. Senibus uero non ualde familiaris est: si tamen ipsi hanc adfectionem incidant, ferè nūquam conualescunt. Accedit ægris dolor circumuolutus, stomachi nimia humectatio, exolutio, reclusus inanes nihil alleuantes, murmura intestinorum, cohibitio perfecta stercoreis & flauum. Si uero intendatur adfectio, omnia sursum feruntur: ob idq; & uomitus pinuite ac bilis accedunt, frigiditas totius corporis, dolorq; plurimis etiam spirandi difficultas. Morituris autem amplius sudor frigidus, urinæ difficultas, podex ita adstrictus, ut neq; specilli extermum suscipere possit: aliquando & sterces uomitu reijciuntur. Siquidem igitur abus crudus uentri insidere uideatur, aqua multa cum nitro exhibita uomere cogemus: deinde rursum aquam calidam puram bibimus, ut mordacitas obtundatur. Si uero nihil crudorum ciborum in uentre contineatur, omni conatu nitendum est, quo cum flatus tum stercorea infra trahantur: idq; per glandes, illitionesq; & clysters, magna diligetia in singulis adhibenda perficiendum. Glandes itaque conueniunt ex semine rutæ & nitro, cuminoq; ac melle. Valent etiam quæ ex brasiæ cauliculis apparantur cum melle cocto, ex profundo enim attrahunt. Caterum glandulas longiufculas facere oportet, quæ ad strictiorem internam anipartem sphincterem Græcis appellatam, transire queant: quibus apposis, podex per spongias calidas foueatur, quibus sanè cydamini succus utilissime excipitur: quanquam cum melle etiam ac nitro idem illitus efficaciter opitulatur. Idem facit centaurea cum melle & nitro: uerum in his conandum ut quàm penitissime illinantur. Per clysterem autem oleum infundatur, in quo cuminum, ruta, alehæ radix aut folia, scænum græcum, centaurea, cucumeris syluestris radix, sint decocta. adijciatur autem & butyrum, & resina terebinthina, ut inde crassitudo infuso ipsi accedat: per ampliorem etiam fistulam largius infundatur, iuxta corporum rationem aliquando usque ad duarum heminarum mensuram. Quin & clysteres ex prædictis apparentur. Probe facit & syluestris cucumeris radix contusa, & in aqua satis diu decocta absinthio adiecto: siquidem ad decoctum ipsum mel & nitrum, oleumq; amisceantur. Si uero sterces durius intestinis insidere coniectamus, aut inflammationis obstructio adsit, altheam ac scænum græcum cum caricis decoquimus, buryroq; & anchino oleo plurimo ad decoctum adiecto, per clysterem iniiciemus, & quæ diu quidem queant, retinere præcipientus. Optimum autem infusum hocce est. Bituminis drach. 111, nitri drach. 1, aloes unc. 1, olei rutacei dodrantem. Commodum est etiam cuminum, rutam aut absinthium cum oleo coquere, deinde percolato modicum salis iniicere, aut opopanax drach. 1, aut galbani drach. quatuor. Pro sunt & carice ac ruta in oleo decocta. Eiusmodi autem infusa ante cibum infundere oportet, & maxime quod ex asphaltum ap-

Glandium
materia

sphincter

Infusum men-
sura duarum
heminarum

Fomentorum
seria genera
Pyriateria,
uaporaria
lenticulata

to apparatus:urgente uero malo etiam à cibo. In solum etiam aqua & oleo refertum desiderare eos conuenit: in aqua uero althea, ruta, & conyza decoquantur. Fomenta quoq; adhibenda sunt ex furfuribus, & per pyriateria, id est uaporaria lenticulata, & per uesticas bubulas ex oleo semiplenas. Conueniunt etiam fomenta ex lanis oleo madefactis, in quo cuminum, anethum, ruta, conyza maxime parua & nasturtium sint decocta. cuminum quoque per se tritum uentri inspergendum est, deinde lana imponenda. Conuenit enim ab irrigationibus incipere, ipsisc; etiam inter cataplasmata uti. Cataplasmata uero ex melle sint apparatus, aut hydromelite meraciore: assumant autem semen lini, scenum graecum, pollinem hordeaccu, loliaceam farinam, & fabarum. Infarciendum est etiam, ipsis plurimum rutę & cumini, anethic; semen aut apij, aut rutę semen siccum: inspergatur autem hæc crassa, & post impositionem calefiant, posteaq; absidue permulentur. Post hæc cucurbitæ affigatur, primum quidem ad remotos locos, inanes: deinde ad ipsos etiam dolore affectos, scarificationesq; profundiores fiant, saleq; impacta uulnuscula conspergantur: quibus postquam cicatrix fuerit obducta, malagmate ex seminibus utendum, aut eo quod ex lauri baccis constat. Potus eis conueniens est anethi decoctum. Et enim usitatum & accommodum. A potu panem in aquam feruentem coniice, eiusq; frusta calida confestim edenda præbe. Hoc enim modo seruabitur, etiam si iam instet ei suffocationis periculum. Oribasius autem inquit, Anethum in aqua & oleo decoquatur, atq; ita bibatur, deinde frusta panis ex aqua feruenti præbeantur. Mirum in modum enim inde iuuantur, inquit, etiam si iam steruus uomant. Ruta etiam ac cuminum rigata & loco admota commoda existunt: & sinapis arida trita inspersa. Commodum est etiam maluæ semen tritum ac loco inspersum. Balsamum quoq; non adulteratum, in potu utile existit.

Alius potus. Bituminis drach. iiii, cum modico nitri contere, & ex aqua bibenda confidenter præbe. Alius. Radicis panacis drach. ii, nitri drach. i, cumini drach. ii, excipe melle, & nucis ponticę magnitudine ex aqua calida præbe. Alius. Castorij, anisi, piperis, cuiusq; æquales partes commisce, atq; inde scsquidrachmam ex aceto mulso præbe.

Asclepiadæ potus, qui & recrementa multa soluit.

Elaterium sufficienti terebinthina exceptum, in catapotiaq; redactum, deglutendum præbe, aquamq; insuper bibendam.

Aliud ad uoluum remedium, quod uentrem soluit: cõfert etiam anhelosis, splenicis, aquæ inter cutem, ex lapide laborantibus, urinæ difficultati, paralyticis, tremoribus, comitialibus, uulnæ strangulationi, mensesq; ducit.

Medulle scillæ crudæ, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusque drachmas quinquaginta, galbani drachmas uiginti quinque, opopanacis drachmas duodecim. Scillam seorsim contere: deinde ammoniacum cum acerrimo aceto

to tere

Aqua qd kethui
de Marcellino similis
qd fauulatur.

to tere: postea etiam galbanum & opopanaca, simulq; mixta omnia in catapotia redige: ex quibus drachmam unam deuorandam præbe, & uinum dilutum insuper bibendum, aut aquam mulsum, aut acetum mulsum. Sic autem liquoris mensura cyathorum quatuor. Concoctionem adiuuat, si ante cibum deuoretur, ultra hoc quod alium facillime soluit. Feliciter uisum, inquit Archigenes, ad uoluulos absque inflammatione, hiera nostra ex colocynthide pondere drachmarum duarum, aliquando etiam trium in catapotia redacta. Aut enim uomitu rejicitur ipsum pharmacum cum multa bile ac pituita, aut infra ad intestinum progressum, omnes causas adfectionem operantes secum subducit. Doloribus uero perseverantibus, & maxime quibus infusi clysteres non infra rursus prodeunt, etiam ea quæ dolo-rem leuant exhibenda, itemq; conuenientes antidoti ante somnum. Communissima igitur & optima, ea quæ ex pipenbus constat, & Andromachi ex uiperis theriaca existit, post eam uero quæ Mithridati nomen debet. Proprie autem in his colicæ antidoti faciunt, qualis est uel in primis quæ zopyrios, & quæ pæonia appellatur, quarum descriptiones in XIII sermone continentur. Si uero à uenenoſo pharmaco quis in uoluulum incidat, aquam tepidâ multam bibendam dabimus uomereq; cogemus: deinde oleum calidum in potu dandum, aut pingua iuscula, ut rursus uomant ex moderato eorum potu, deinde ita parumper quiescant, & statim postea theriacen accipiant cum uino dissoluta. Cibi eis exhibeantur boni succi: alius uero lacte scisso euacuanda. In eo autem uoluuli genere, quod chordapsum appellari diximus, in quo in uno loco dolor innititur, ut à mota manu ducit & tumor tactui succubat, circa tenuia uidelicet intestina, subitum periculum instat, ut plurimû tertium aut quartam horam nō excedens: quando uero ad suppurationē inflammatio uergit, aut longior remoratio contingit neq; ea ferè citra periculū existit, quanquā sint qui ex eis sunt seruari. Venē igitur sectio ante localia remedia assumenda est, deinde cucurbita, & reliqua cura quemadmodū in inflammatione fiat. Danda uero & his assidue ex uiperis theriaca ciceris parui magnitudine ex aqua calida: infusum etiam immittendū ex his quæ in inflammationibus conducūt, uelut est fecni græci & maluæ decoctū, cum oleo & butyro. In potu exhibeatur rosmarini decoctū, florisq; iunci odorati, mei, fœniculi, & maxime omniū anethi. Probe etiam ad eos facit, foliorum rhamni uiridū tritorum, & in pastillos redactorum, exicatorumq; drachma una ex calida aqua exhibita. Porro ex conuulsione aut ruptura obortos uoluulos uenæ sectione curare oportet: locosq; ubi dolor insignitur profundiorib; fissuris impactis scarificare & diducere, lanisq; succidis irrigare: antidotos etiam dolo-rem leuantes bibendos præbere: uerum clysteres omnino deuitare. Si uero uoluulus propter intestini in seortum delapsionem contingit, confestim tendendum est, ut decubitu sursum uersus uergente adornato, delapsum intestinum ad inguinum partes retrudatur, atque post leniter citra uolentiam

ac com

uoluulus ablin. K. 2m.

si tumor dignum
exanaparrusVene sectio
ante localia
remedia

Inedia com/
moditas

ac compressionem, ligamento adhibito contineatur. Si uero iam ex compressione inflammatio oborta sit, torminaq; ac inflationes accedant, etiam hos ipsos uenæ sectione curandos censeo, in inediaq; ad tertium usq; diem seruandos. In principio uero lanis succidis ex uino & oleo madefactis irrigandos: adhibito postea etiam cataplasmate crudæ hordeaceæ farinæ. Aliquando autem & inflammate partes commode per ambitum scarificantur, per althææ quoq; ac scæni græci decoctum & oleum utiliter irroratur ac adsparguntur.

De his qui ab acri humore coli dolore infestantur: Galeni. Cap. xxx

Inedia non
conueniens

Q Vibis in colo & intestinis acris & mordax insidet humor, hi à calidis cibis ac pharmacis itemq; infusis læduntur, & à cibis abstinentes magis intantur. Melius autem habent ex temperaturum & mordacitate carentium usu. Tenuis enim & acres humores uehementissimum inferunt dolorem, aliquando uero & conuulsiones, maxime ubi circa os uentris fuerint aggregati. Accedunt quandoq; & animi deliquia, & humiditates frigidae. Hoc itaq; modo affecti, calida potata ac uomitu reiecta, biliosum humorem excernunt, quiq; etiam ærugini aliquando in colore similis existit, hic quidem igitur humor ubi in uentre constiterit, mordens, & animi deliquia inferens, per uomitum expurgare ipsum oportet. Vbi uero in intestinis aggregetur, per sedem infundere conuenit ea quæ humores eluere atq; citra mordacitatem repurgare possunt, cuiusmodi est pisanæ succus. Cibi uero boni succi & qui non facile corrumpantur eis exhibendi, attenuantibus & calefacientibus uitatis. Oportet enim infestantem humorem aut euacuare, aut temperare. Exempli uero gratia mentionem faciam quorundam à nobis curatorum.

Bilis crui-
ginosa

Exempla
curatorum

Quidam etenim quadraginta annorum, qui colicus esse putabatur, à perfusionibus & fomentis, cataplasinatisq; & acrioribus infusis non modo non iuuabatur, uerum & magis exacerbabatur: & ubi mel cum pipere accepisset, extremum dolorem incurrit: & ubi scæni græci succum cum melle sumpisset, plurimum fuit irritatus. Coniectationem igitur feci, mordaces in ipsis intestinorum tunicis imbibitos esse humores: non facile corruptibiles ei exhibui cibos: deinde ubi uidissem eum minus à dolore infestari, uitiati humoris purgatione ei opus esse cognoui: ceterum pharmaco ex aloë amaro hominem aceruatim purgare minime ausus fui: nimirum ob dolorem ac indigentiam, temporisq; diuturnitatem uiribus attenuatis. per interualla itaq; mediocriter paulatim purgatione per picram ex aloë facta, in paucis horis ipsum perfecte sanauimus, nullo altero remedio admoto. Alter quidam adolescens non paululum antea à colicis doloribus uexatus, accepta scamonia purgatus est: quumq; pro ratione accepti satis multum fuisset euacuatus, illa maxime membra quæ prius habuit imbecillia, morsu infestata sensit, ut inde quasi fluidam quandam & dolorosam circa intestina haberet affectionem. Itaq; & hunc curauimus, colicæ remedia rejicere iussimus, & ex halica cum aqua calida decocta nutrir

nutriti, granis, mali punici simul incoctis. Quumq; totam noctem absq; dolore dormisset, mane exhibuimus ei rhois succum dilutiorem bibendum: ut si qua ulcerosa adfectio circa intestinum esset oborta, eam adstringeret, siue quippiam ex superioribus partibus ad affectam influeret, id ipsum repelleret. In prandio etiam halica similiter cum mali punici acinis & aqua decocta uti iussimus. In uesperam uero panem ex uino quopiam austero ac ueteri madefactum dedimus. Concessimus etiam ut ex austeris fructibus pro libitu, modice tamen, caperet. Tertia autem die quum eodem modo fuisset refectus, in quanta hausta theriaca perfecte sanus euasit.

Alium autem quendam similiter affectum, æstatis tempore quum plurimum sitiret, eodem uictu curauimus, ampliusq; frigidum potum ei indulsimus. Caterum euacuato humore, & remanente adhuc dolore, ad stupefacientium usum confugere oportet. In huiusmodi enim affectionibus non solum quod sensum stupefacit, sed & quæ humores tenues inspissant caloremq; refrigerant maxime opitulantur.

De his qui à frigidis & pituitosis humoribus coli dolore infestantur.

Cap. xxx

QUum uero crassi & lenti fuerint humores, qui doloris causa existunt, nequaquam stupefacientia erunt offerenda. Etenim alleuantur quidem ex eorum usu, ob sensus uidelicet stupefactionem: uerum rursus peius inde habent, quod amplius per ipsa humores inspissentur, & difficulter omnino excerni possint. Atqui nausæa unà cū uomitibus magnæq; & frequentiores illis oboriuntur. Vomuntur autem pituitosa & corrupta: retinetur excrementa adeo ut ne flatu quidem excernatur, neque ructus etiam procedat. Saepè enim ueluti sursum reuoluitur dolor, ac plurimū occupat locum: aliquando uero ex loco ad locum digestus uehementius augetur. Manifesta uero cognitio coli affecti est, quando aliquando quidem altius dolor infestat, quàm pro renum situ, aliquando autem longe inferius. Si enim iuxta renum situm dolor innitatur, atq; id in uno loco cum dolore ac grauitate, renum affectionem eam esse censendum est. Considerandæ autem ad hæc urinæ: aquosæ enim & puræ in principio à nephriticis minguntur: quemadmodum in sequenti tempore subsidentiā habentes asperam, deinde exquiritæ arenosam. In colicis uero etiam si egerat aliquando uenter, tamen flatuosiora excernit: saepèq; stercora aquæ inuehantur bouum stercorebus compare non absimilia. Contingit etiam quandoq; humorem aliquem frigidū cum ipsis excerni, quo facto confestim melius habent. Per fomenta autem & cataplasmata nephritici quidem doloris mitigationem accipiunt, laxatis uidelicet iuxta obstructum lapidem corporibus. Colici uero parumper quidem uidentur mitiores redditi: paulo post uero uehementius intenduntur eis dolores, diffusi uidelicet per adhibitarum fomentationum calorem humoribus, generatisq; flatibus, qui plurimam mali productionem operantur.

Stupefacientia utilia

Stupefacientia nocua

Coli & renum affectus dinotio

Urine nephriticorum

Stercora colicorum

n Quo,

*Calefacientia
quæ nocent*

Quomodo igitur oportet dolores ex frigidis in intestinis humoribus obortos curare, ita ut neque uehementibus irrigationibus, neque cataplasmatis calefiant? A calefacientibus enim diffunduntur & inflantur omnes frigidi ac crassi humores, qui intestina distendendo augent dolores. Conuenit itaque ipsos difficere & concoquere citra uehementem calorem, & per minime inflantium usum. In exacerbationibus igitur consimilis colicorum cura fieri debet, qualis ad uoluulos est prædicta, irrigationes uidelicet ex oleo rutaceo & sicyonio & anethino: inediaeque & fomenta ac cataplasmata, infusa item & glandium admotiones, illitionesque sedis. Vomitus uero ante coenam, si quis facile uomat, præ omnibus auxiliatur. Vbi uero malum ipsum producit ad plures horas, infusio in solum ex oleo repletum adsumenda est: aut si hoc fieri non potest, ex aqua & oleo repleatur, in quibus althea, pulegium, ac lauri folia, similiaque sint decocta. Fomentum uero siue uaporarium adhibeatur ex fursibus & milio, & cataplasmata quoque ad uoluulos prædicta. Post horas uero septem purgatio ex hiera Archigenis suscipiatur. Licet tamen & non purgare, uerum ab acrium ciborum esu inchoare. Quando uero allium ipsum omnium minime inflat, nisi febris adsit, confidenter ipsum asseremus. Sitis autem sequitur acrium rerum comestitionem. Præalleuetur itaque præcedente uictu æger, ubi ad acrium rerum esum procedere uolet: aquaeque potu utatur. Flatu autem uentoso infestante, egrægium remedium cucurbita sæpius affixa, cum largiore flamina existit: ut incantationi similem effectum præstare uideatur, & in quacunque corporis parte apponatur, confestim à dolore liberare, ac perfecte sanare cognoscatur. Quod si humor quoque unà cum flatu adfuerit, euestigio quidem à dolore leuantur: mox uero rursus redeunt dolores, maxime ubi quippiam peccati circa dietam fuerit admissum: aut si plus quam oportuit, calefecerint ipsa membra. Maximum autem signum & hoc tibi fuerit ad affectionis cognitionem. Ne calefacito itaque manifeste, sed dieta attenuatoria utaris. Oportet autem & ante infusorum usum, cucurbitam dolentibus locis adhibere: indeque oleo rutaceo, & huiusmodi cunctis infusis uti.

Uitrem colicorum humor

*Lapides
in colo*

Multi uero accepto dysistere uehementer dolent, & uitreo humore excreto statim liberantur. Febre autem ut plurimum carent, sitiisque in totum non infestantur. Nascuntur & in colo lapides, sed raro: quare oportet eos urinam cientibus, & stomacho gratis uti, sanitatisque tempore etiam uenam secare, & catapotijs ex aloë gratia præseruandi uti. Quandoquidem autem colum ipsum in quibuldam, debilitatum ex leui occasione, & per interualla quadam dolores inferre consuevit: melius utique fuerit exquisitiore dieta uti, & curam quoque ad affectionem conuenientem subornare. Qua de causa ubi à somno surrexerit æger, uentrem exonerare tenet: deinde ad deambulationem procedat. Deambulet autem & hyemis tempore, nisi frigidior sit aer, aut ipsius debilitas hoc non permittat.

idque

idēq; faciat in loco sub dio, aeri exposito, & patenti: primum quidem lentius, post uero concitatus. Quiescatq; ubi crura incaluerint fuerintq; declassata. Deinde domum reuersus bibat aliquod pharmacum affectioni cōueniens, modicēq; quiescat: & ubi quotidianæ alicui ac consuetæ actioni uacauerit, per horam equo uehatur, assidue ei insidendo: quod si facere non possit, in curru: si aut imbecillior sit, per nauigium. Iacens enim uectari poterit, quum omne corpus unā cum nauigio commoueatur. Post uero ubi molestiam ex uectatione obortam modica deambulatione exduferit, leniter exclamet, aut concinne cū uociferatione procedendo legat: deinde rursus modice quiescens ad inunctionem ac fricationem exuatur. Exercitatione itaq; facta, & cura ad mota cibum accipiat circa sextam horam, ut & ad cœnam sufficiens interstitium fiat. partiat^{ur} autem cibos, maioremq; eorum partem in cœna assumat. Utillissima enim colicis ciborum partitio existit: præpotato igitur absinthite uino, panem in dibano coctum recentem probe apparatus accipiat cum oliuis colymbadibus muria cōditis, aut paucis uuæ pensilis acinis, aut ficis uirgidibus tribus aut quatuor: deinde à potu, nisi ualde urgeatur, abstin^{eat}. Si uero sticulusus sit, modico potu uehementē sitis medeatur: otioq; & iucunda animi uoluptate fruatur. Deinde per circuitum affectione repente, deambulet: cibosq; probe disposito, ad cœnam accedat. In cœna si sticulusus sit, modicum præbibat, & post paruū interstitium cœnet: ex uarijs quidem pauca, & cōmoditatibus abunde referta. Potus medium cibum non dirimat, sed post ipsum restructur. qui sufficit etiam potus exhibeatur. multa enim potatio incōueniens affectioni existit. Non longo deinde à cœna intervallo facto, ad somnum diuertat: & si quidem noctu sitis urgeat, ei parce medeatur, aqua paulatim absorpta. Atq; de quotidiana quidem diætæ ordinatione hætenus. Cæterum paucis subnectam etiam commodos adfectioni cibos, potionesq; & pharmaca. In uniuersum igitur omnia quæ colicis exhibentur attenuatoriæ sint diætæ. Panis itaque neq; sit aridus neq; calidus, in dibano coctus, aut si is nō adsit, in fumo. Olera autem cruda quidem non sunt danda, cocta uero conueniunt cichorium, intubum, rarius autem cauliculi lactuæ, cucurbita in calido cinere assata, cocta enim stomachum lædit, malua cocta: uerum nihil horum absq; pane exhibendum. Dan^{di} etiam colymbades oliuæ cum aceto mulso ac ruta præparatæ. Ab alijs uero abstinendum. Legumina omnia per se quidem affectioni incommoda sunt. Verum uarietatis gratia aliquantum adsumatur lenticula cum beta colliquata, optimeq; contrita, aut cum pisana: aut faba cum pisana diligenter subacta. Cæterum rarum leguminum usum probō, pisana excepta: comoda enim hæc est, lapathum cum ea colliquato. Conuenit etiam falfamentum piscium petrosi locis degentium: itemq; limaria non inueterata, muria condita. Piper etiam & ruta cum aceto mulso exhibeantur. Ex carnibus conueniunt in primis uolucrum, secundo loco piscium numerantur, tertium or-

*Diætā colicis
apta*

dinem terrestrium carnes habent. In unoquoque genere omnia inconsumpta reprobanda. Inter ea uero quæ pro consuetudine in cibum nostrum accipiuntur, uitanda sunt dura, siue natura, siue ætate talia existantem quæ neruosa ac fibris referta habent carnem, graueolentiaque ac foetida, & quæ aliàs mali sunt succi, aut grauioris qualitatis, & pingua, atque ea etiam quæ omnino macta sunt & infirma, & quæcumque præ humiditatis multitudine dissoluantur. Quapropter ex piscibus, hi qui in fluminibus & stagnis degunt uitandi sunt. Ex marinis autem, qui in petris degunt, his qui intra pelagi profundum uersantur sunt præferendi. Qui tamen in profundo maris degunt, littoreis præstant: & littorei rursum, potiores sunt his qui in marinis paludibus nutriuntur, etiamque his qui in magnarum urbium stagnis uictum quaerunt. Eligendi autem sunt maxime lupi & aselli mediocri magnitudine: scari autem & turdi ac gobij tenerrimi quidem sunt, & facillime secedunt alimentum aut plurimum, roburque corpori addunt. Scaros autem hic non magnos aut telligere oportet. Mulli autem & scorpij & passerres, nutrimenti quidem ac roboris gratia omnium gratissimi existunt: grauiorem autem omnem habitum reddunt, ut ob eam causam frequentiore eorum usum uitare oporteat. Murenas autem & loligines, sepiasque & polypodas, omniaque simpliciter mollia, ut quæ difficulter concoquantur, inflationes pariant, noxios humores generent, censeo reprobanda. Ex his uero quæ testa integuntur, squilla omnium minime noxia existit: cæter turbationem inducunt gammaro autem siue astaco pro uoluptate fruatur. Ex ostrearum porro genere, purpura, & buccina reliquis præferenda: deinde pelorides præstant: postea herinacæ recentes: deinde quæ proprie ostrea appellantur: reliqua uero relinquenda.

Carnium item Ex uolucrum genere, gallinæ omnibus præstantiores. sint autem alules, deinde perdices, & palumbi, debilis nutrimenti gratia exhibendi, turturesque altilis & columbæ. Fugienda omnia uolucrum genera, quæ in aquis degunt, tanquam graueolentia, & quæ superfuitatibus multis abundant. Ex quadrupedum animantium genere præstant carnes suillæ, tum concoctionis & alimenti roborisque, quod inde corpori accedit, gratia, tum quod facile secerantur. secundo loco hœdinæ habendæ: reliquæ uero domesticæ fugiendæ. Ex syluestribus & feris pauca, uarietatis tantum gratia dentur. Omnes autem carnes quas exhibere uelis, ad duas horas promptas & paratas habere oportet, in hyeme præsertim, ut friabiles reddantur: ex aqua etiam omnes coquantur. quæ enim in sartagine fricta sunt, prout sunt uires uitentur. Cauendum etiam à uisceribus omnibus. sunt enim frigida, & turbationem mouent: difficulter concoquuntur: grauiasque sunt, & laniosa, ac foetida: nimiasque humectationes ac nauseas produciunt: maxime tamen omnium cerebrum. Pulmo sanè hœdinus bis assatus, ac in cibo acceptus superabundans alimentum subtrahere uidetur. Qui uero eum lacte replent, deindeque coquunt, aut assant, uoluptatis gratia non utilitatis respectu id faciunt: multoque magis qui

piscium quorundam utilitas & inutilitas

uictur me

qui eum frustatim concisum in sartagine torrent. Sale conditi arietis pulmo maxime uetusti, difficulter & grauiter à uentre exuperatur. Cochleæ autem terrestres succulentæ in cibo sumptæ, oblucri & sese opponere colicæ affectioni uidentur. In liquamentis & condimentis conueniunt cuminum, mēta, ruta, sison, fœniculum, origanum, ammium, thymum, piper, zingiber, daucus, succus silphij, acetū, mel, garum, uinum. Pyretum uero & ligusticū, ac helenium, similiaq; magis medicamentaria ui prædita sunt: & ob id in quotidiano usu ac diæta uitanda. In uniuersum autem, ut summatim dicam, unius coniectionem facere oportet, ut scilicet accepti cibi optime concoquantur. Particulatim uero, ut ne siccitas excrementa apprehendat, neq; fatigetur uenter in multis cibis conficiendis: ne uenter ciborum qualitatibus oblucretur, ueluti si ægre eas conficiat, & nimiam humectationem ei inferant. ne noxij humores generentur, neq; in uentre, neq; in uniuerso corpore. Omnia enim inutilia recrementa ex leui occasione ad affectum ac infirmū membrum detruduntur. Quare uitare conuenit omnia dulciana & placentas: plurima etiam ex bellarijs ac fructibus iucunditatis tamen & gratificadi stomacho gratia, uua alba dulcis præ ariditate corrugata cum pane præbeatur: si uisq; maturæ cuticula auulsa: uua etiam acinis exemptis. Reliqua uero omnino sunt fugienda. Vinum sit subadstringens, album, tenue, pellucidū, mediocritate, temperatura dilutiore, modiceq; bibatur. Quod si sitis à cibo accedat, aqua calida præbeatur. Insensissima enim ipsis frigida existit. Dulces autem prælibationes ex uino & melle apparatus, propomata Græcis appellatæ, omnes deuitandæ. Atq; hoc sanè modo ea quæ ad colicorum diætam pertineant, diiudicantur.

*Liquamenta
& cōdimenta*

*Affectū uentris
omnibus
recrementis
expositum*

uua 12 puer acida

Propomata

Colicum remedium ex stœchade, nephriticis commodum.

Hoc omnes ueteres interiorum membrorum affectiones curauimus. Datur autem ex ordine diebus xxx, & perfecte ab omnibus affectionibus liberat. Stœchadis drach. xviij, radicis panacis drach. v, agarici drach. ii, cinamomi, myrrhæ, seminis brassicæ syluestris, iridis, mandragoræ, hyoscyami albi seminis, costi, nardi cretici quod phu appellant, spice nardi, piperis, opij, cuiusq; drach. xii. (Accipio autem piper longum) mei drach. xviij, seminis cicutæ drach. xxiiij, dauci drach. viij. Contusa excipe melle despumato, ac exhibe tobuftis scrupulos ii. reliquis, obolos ii. febre carentibus, ex uino mulso: febricitantibus, ex aqua. Infusum quoq; nucis ponticæ magnitudine cum oleo in quo fœnum græcum & ruta cocta sunt, colicorum dolores sedat.

Pharmaca ad colicos.

Caput xxxi

Conuenientissimum ad colicos pharmacum uinum abstinentes existit, si prælibatione à balneo aut exercitio opus habent: estq; etiam non sitientibus ualde commodum, si laxiore apprehendente aluo, cyathi temperati mensura ante aridorum ciborum comestionem accipiat. Apparatur

n 3 autem

autem uinum absinthites, & pro occasione, uirgis recentis & pleni absinthij, ad quindecim dies ac noctes, in amphora una uini tenuis & adstringentis mediocriter uetusti maceratis: mensura autem uirgarum sit sextariorum trium. Decoctum etiam herbae ipsius, ubi semel tantum ebullierit, pari modo ad uinum quod aliàs pro consuetudine bibunt, admixtum, utiliter à balneo ac exercitio præbetur. Melius autem est quod ubi orium sit sic præparatur. Selibra absinthij in amphoram uini optimi recentis, quod mustum appella-

*Amphora
sextarios
XLVIII
habet* mus, conijcitur, oblinitur, in cacys permittitur, donec mustum cessauerit ferre: deinde absinthium quidem abijcitur, uinum uero reponitur ac inueterascit. Habet autem omnino amphora sextarios octo & quadraginta. Vinum absinthites aluum corroborat poteter, & quicquid lubricum inferne in aluo ac intestinis hæret, citra animaduersionem detergit: bilis generationem præpedit: flatu scilicet, alios quidem depellit, alios uero auertit: quodamque modo spiritum dispensationi præfectum defecat. Aloe etiam optima trium drachmarum pondere deuorata aptissima est, ubi non pro ratione ciborum egestio excrementorum fiat. Quemadmodum autem optima aloe etiam sola sanitati restituere potest: ita uinosa medicamentaria superfluitate uentrè replet. Intercidetes uero obiter inflationes syluestre cuminum, quod & æthiopium appellant: cochlearij mensura ex aqua calida: cyathis duobus aut tribus potatum dissoluitur aut sison simili modo: aut rutæ ramuli in aqua ipsa feruefacti. Castorium etiam assidue potatum totius affectionis apparatus demolitur, omnibusque medicamentis præstare repertum est: datur eius drachma una in tribus cyathis optimæ aquæ mulsæ. Lupi autem sterces maxime album ex aqua, aut uino albo & tenui summe colicis auxiliatur, inquit Galenus: non solum in accessionibus & irritationibus, sed tempore etiam interualli. Aut enim perfecte morbum sedat, aut ita præparat, ut ad tempus aliquanto mitius adfligat. Melius autem sterces censetur, quod non in terram delapsum reperimus, uerum in fruticem aut herbam excreta. Ossa quoque in ipso stercore inueniuntur, quæ ipsius animalis concoctionem effugerunt, quæ si trita bibantur, magnopere colicis auxiliantur: quare repurgatoria exhibenda sunt cum sale ac modico pipere mixta, aut alio quopiam ad commendationem odoris. Mirum in modum etiam manifeste colicos iuuat, instar amuleti alligatum illis ægroti idem lupi sterces: oportet autem filum quo amuletum colligatur ex oue à lupo discerpta sumere, cum stercoreque ipso in pelle ceruina excepto, ac filo colligato, illa præcingere. Si uero non suppetet lana ex ouicula à lupo discerpta, ligamentum ex ceruina itidem pelle accipere oportet. Corydus item passerulus, qui & corydalis, hoc est galerita, ap-

*Corydi siue
galerite usur*

*Passeris, pyr
gitæ, & tro-
glitæ*

pellatur, simplici iure coctus, assidueque una cum iure acceptus, summopere colicis prodest. Vilitatem enim ex eo expertus sum, inquit Galenus. Carterum passerulis, quos pyrgitas à turribus, & troglitas ab antris & cauernis appellant, similis est, qui sanè circa urbium muros uersantur ac degunt: u-

rum

rum his maior est corydalis ipse: habetq; in capite ueluti tristam siue gruleam ex pennis sponte naturæ enatam, & circa uias reperitur hyemis præsertim tempore. Aliud. Talum suillum ustum & tritum, totum ex aqua bibendum præbe. Aliud. Thymi cacumina in aqua ad tertias decoquito, & ad percolatum decoctum mel despumatum adiecto, bibendumq; præbeto. Aliud. Radices uerbenacæ rectæ tenuiter concisas in aqua ad tertias decoquito, ieiunisq; per quinque horas bibendum decoctum hoc præbeto: & colicis medeberis. Vtere, est enim experimento cognitum.

Aliud. Hoc itidem experimento constat, eoq; ipse liberatus sum.

Mentam uiridem aliquandiu decoquito, decoctumq; bibendum ad dies tres exhibeto, & nunquam dolore adficietur. Cauendum autem ne olla in qua mentam decoquis per tres dies terram contingat. Remedium uero hoc eiusmodi est, ut præsentem opem ferat, testisq; multo usu cognitum. Lauri etiam teneriora uirgulta arefacta comedenda præbe per tres dies, quibus mentæ decoctum potant. Aliud mirabile. Marrubium in uino mulso decoctum bibendum præbe. Liberabiturq; æger à dolore, neque unquam postea incidet in affectionem. Aliud. Rhamni folia uiridia trita in

Suppositum

pastillos informa, & exsicca: drachmamq; unam inde exhibe febre carentibus, cum uino: febrientibus uero cum hydromelite. Facit & ad uoluulos, omnemq; dolorem flatuosum miro modo. Per ructus enim ac flatus exoluti à malo, sani fiunt. Aliud. Rhamni succum poëuli mediocri mensura, tantundemq; pasci cretici misceto: dumq; in solium in balneo descendit bibendum præbeto: plurimumq; tolerare id iubeto. In frigida autem aquæ solium nequaquam conscendat. Experimento cognitum est. Ex apparatus uero pharmacis hocce nobis familiare est, inquit Archigenes. Castorium & ammiu tenuissime trita duorum cochlearium mensura præbe ex aqua mulsâ. Secundum uero locum hoc habet. Castorei drachmas tres, annij, seminis apij, fœniculi, cuiusque drachmam unam, exhibe eo modo quo præcedens. Aliquando autem pro apio panacis radicem adiciens præbeo, assequorq; rite quod uolo. Præstabile est & hoc.

Anisi, castorij, æquales partes misceto, indeq; drachmam unam ex uino mulso exhibeto. Aliud. Gladiolum una cum radice exsiccata, contusâ, & cribratâ cum piperis granis undecim bibendam præbe, diuturno malo hoc medetur. Cæterum duo efficacissima ex multis omnino

Uno præstantissima ad colicos remedia

coli pharmacis usus approbatione præstantia, inquit Archigenes, unicuique communicabo. Sagapeni, piperis, galbani, pyretri, croci, spondylii, myrrhæ, cuiusque drachmam unam, radice panacis drachmas octo, excipe melle, & ad cerati crassitudinem redige. Vbi uero usus expetatur, manipulum unum chamæleuces aut chamæpityos in uino optimo, leui, anniculo heminarum quindecim mensura, usque ad tertias decoque. In hemina deinde decocti una, ex pharmaco ad fabæ magnitudinem dissolue: idq; semel

primo mense bibendum præbe: secundo deinde mense bis: & tertio tertatq; hoc modo usquequo quinquies exhibueris, secundum menses auctione facta procedes: nisi alui ramenta inde succedant. ea enim leniter detrahare hoc pharmacum consuevit.

Alterum uero ad dissoluendas accessiones, ualde efficax existit.

Myrrhæ stactæ, opopanax, succi cyrenaici, croci, pyretri, galbani, sagapeni, cuiusq; drach. v. iiii, olei picini drach. i, mellis despumati quantum suffecerit, ut ad cerati spissitudinem redigatur. Ex hoc pharmaco drachma una, in tribus cyathis passii cretici diluti calidi liquefacta exhibetur. Neque uereor hæc etiam in accessionibus, nisi ex cruditate laboret æger, præbere, atque etiam in interstitijs per aliquas horas ex his affectione expugnare, ualdeq; mihi ex sententia res procedit. Theriace porro Andromachi ex uiperis constans interualli tempore assidue accepta, prohibuit ne facile ab accessionis irritatione rursus impeterentur.

Antidotus zopyrios appellata, præsens auxilium in debilibus doloribus existit: facit ad colicos & alui inflationes, & incipientes aquæ intercutem suffusiones, maxime eam quæ tympanites appellatur: ualeat etiam ad iocineris affectiones: prodestq; his qui uenenum hauserunt.

Myrrhæ troglodyticæ drach. v, spicæ nardi drach. v, croci drach. iiii, floris iunci odorati drach. quatuor & dimidiam, cassiæ drach. iiii, cinamomi drachmas iiii, thuris drach. i, piperis albi sesquidrachmam, costi drach. i. Excipe melle despumato, ac nucis ponticæ magnitudine præbe ex uini multo, aut passii ueteris cyathis duobus, aut ex aqua. Exhibeatur etiam in colica diuturna, habita tamen prius corporis cura, paululum ante horam cibi sumendi, ad dies ex ordine quindecim: deinde ubi ab eius exhibitione per quinque dies quieueris, rursus exhibe ad dies decem: iterumq; post multorum dierum interapedinem, parum præbe, donec ea amplius opus non habeat æger. At qui propria sua efficacia corpus se melius representaturum promittit, tum carne, tum colore, tum sensu, tum firmitate. Cæterum præter opinionem colicis conueniens antidotus est, quæ prœonia appellatur. In ipsis enim uetermentibus accessionum irritationibus ante somnum exhibita compescuit dolores, somnumq; dukem simul produxit, ac morbum dissoluit. Quidam etiam ipsam cum oleo infundentes scopum attigerunt. Descripta autem habetur in tertio decimo de theriacis sermone huius uidelicet tractatus: quare ea ipsa censeo confidenter esse utendum.

Aliud ualde bonum oxyporium, cito penetrans, tum colicis, tum inflatis commodum.

Cumini trientem, piperis albi, cacuminum thymi, foliorum rutæ, nitri, singulorum unc. i. contere cum aceto, ac redige in pastillos pondere unius aut duarum drachmarum. Exhibe iuxta cuiusq; uires cum aqua calida.

Aliud. Sifonis, cassiæ, foliorum lauri in umbra exicatorum, singulorum

Antidoti præonia uisus

lorum drach. viii. petroselinī drach. iiii. spumæ nitrī albæ drach. v. excipe melle, ac utere. Aut cochleare eius sicci ex aqua mulsā, in qua ruta decocta est, præbe. Aliud. Cumini sylvestris cochlearia iij, seminis coriandri, feniculi, anisi, apij, seminis rutæ, cuiusq; cochleare i, piperis grana i x, uini sextarium i. Hæc tenuissime contrita uino permisce, & quotidie cyathum unum bibendum cum aquæ cyathis tribus præbe. A potu autem æger deambulet, & probe concoctionem iuuabit. Poteris & ipsum uinum calefactum præbere.

Aliud Asclepiadæ, quod ab omni affectione penitus liberat.

Corticis salicis uiridis drach. v, zingiberis drach. iiii, piperis drach. ii, palmas passas tres, rutæ uiridis ramulos v, aquæ pluuialis sextarios iij. Omnia simul ad tertias decoquito, atq; ad horas siue dies tres pto qualibet uice cyathos duos exhibeto: & post triginta dierum spatium idem rursus facito, quo per anni spatium unius, triginta & sex potiones contingant. Hoc enim pharmacum potatulum hoc modo totam affectionem aufert. Aliud.

Cornu cerui recens enati adhuc capillis obstiti, & nettimicq; ac usti, cochlearia maioris modi iij, piperis albi grana i x, myrrhæ parum quid, ad commendandum odorem. Contere omnia, eisq; cochlearum terrestrium magnarum unā cum testis suis, quantum uisum fuerit adijce: omniaq; simul trita, & uino falerno mari mixto trium cyathorum mēsurā permixta, & ad mites prunas in uase fictili calefacta, ac sedulo ne quid in fundo resideat, agitata, præbe bibenda, ita ut nihil reliqui maneatiq; id maxime tempore accessionis, & ieiuno adhuc ægro fiat. Deinde uero cibum qui facile conficitur præbe, atque hoc ex ordine ad dies tres exhibe. His uero qui cochleas sumere non possunt, reliqua præbe sicca cum uino.

Potio ad colicos, quæ etiam inflatis, & difficulter concoquentibus, uoluuolisq; est accommodata.

Abinthij, pulegij, piperis albi, cumini sylvestris, baccarum lauri decorticatarum, omnium æquales partes exiccatas ac tritas, cochlearij mensura præbe ex aqua calida. Vtereq; eo confidenter.

Aliud colicum remedium per experientiam receptum.

Baccas lauri x, piperis grana vii, opopanaca magnitudine cicetis confice in aquæ cyathos iij. totumq; simul seructum bibendum præbe, quiescatq; inde æger, & perfecte sanitati restituetur. Oportet autem, inquit Galeus, ad uiros masculi, ad fœminas muliebris sexus herinacci internam membranā accipere, exicareq; ac contundere: eiusq; partes tres prædictis ammiscere.

Herinacci membranæ seu li cr fœminæ usus

Aliud, ad colicos præclarum.

Colocynthida maximā non solum ferro perforatā, sed & semine eiecto euacuata, ita tamen ut id quod instar tomēti in ea est relinquant, uino ueteri dulci quantū eius capere potest exple, eamq; per noctem integram tepone: mane uero uinum per panniculum diligenter exprime, ac percola, ut

nihil

nihil ex medulla eius in ipso potu residuum maneat: uinumq; ipsum calefactum bibendum præbe, quo facto æger decumbet & liberabitur.

De antidotis dolorem leuantibus, infusisq; co-
licis accommodatis: Galeni. Cap. xxxii

Pharmacis dolorem leuantibus, medici uti consueuerunt, ubi magnus ad-
est dolor, aut uigilia, aut ne ob uiolentam tussim lancinentur ægri, ue-
lut in sanguinis reiectione, & destillationibus à capite contingere solet. Ve-
rum in illis mediocria exhibere solemus: quales sunt ex seminibus constan-
tes tussi accommodatae facultates, quæ & ipse omnino aliquid ex soporem
inducentibus pharmacis admixtū habent: uerum modicum id est inter mul-
ta adeo semina, quæ & boni odoris sunt, tenuiumq; partiū, & urinam ciene
cuminum dico, daucumq; & anisum, & quæ his similia existunt. Cæterum
quæ ad colicos apparatur pharmaca dolorem leuantia eiusdem quidem ge-
neris cum illis sunt, uerum longe maiori facultate prædita, atque id ob ma-
Opij facultas gnitudinem in eis doloris. Opium igitur fortissimum est stupefactiuū: am-
miscere autem ei oportet, ea quæ aut dolorosam affectionem concoquerē
possunt, aut humores ab ipso factos discutere, aut secare & attenuare, aut se-
cundum totā ipsorum substantiam permutare. Scopus enim nobis in his
est, primum quidem ut sensum stupidum reddamus, deinde ut nihil in po-
sterum ex stupefactiuo pharmaco relinquamus, quod membro nocumen-
tum inferre possit. Amplius autem ut, quod maximum est, affectioni opitu-
lemur. Ad hæc itaq; respectu habito, uidetur mihi debito modo & iuxta ra-
tionem, propositum componere pharmacū: ex hyoscyami quidem & opij
permixtione, quicumq; altiore somnum ac soporem, sensitiuæq; facultatis
stuporem inducere uelis: quo uero citius digeratur, omneq; profunditatem
affectorū corporū penetret, calefacientia ammiscere oportet, pipet uidelicet
ac euphorbiū & pyretrū, quæ nociuos humores discutere possunt, & repur-
gare uiscosos, secareq; crassos: & flatus uentosos attenuare, concoquereq; &
euacuare. Neq; uero parum concoctoriæ facultatis frigidorū præsertim hu-
morum in indica nardo existit: quemadmodū autem ex atomaticis nardum
Crocifur coniecit Philo: sic & hi qui ei successerunt, alij aliud adiecerunt, florem iunci
odorati, cassiam, amomum, ac costum. Quemadmodum autem rursus cro-
cum coniicit Philo concoctorium pharmacum ad humorem & affectionem
cruda: ita alij myrrhamq; & castoriū ammiscuerunt: plurimiq; ex ipsis, neq;
id male, etiā familiaria nobis semina, apij uidelicet & cumini, anisiq; ac dau-
ci & petroselini, & quæcunq; eius generis existunt, adiecerunt. quo uidelicet
amarorum pharmacorum iniucunditatem lenirent, ad digestionemq; & uri-
næ expulsionem totum pharmacum impellerent atq; inhortarentur. Si ue-
ro uaporum aut humorum crassitudinem attenuare oporteat, & hoc ipsū
per ea contingit. Prima itaq; ut apparet, ex omnibus uctustioribus prædara
Philonis antidotus existit, de qua ipse hæc scribit.

Philonis

Philonis antidotus. Philonis Tarsensis medici magnum mortalibus inuentum ad multarum affectionum dolores, siue cū quis doleat se mel datum, siue iccur, siue etiam urinae difficultas, aut calcularis morbus, aut orthopnea, aut tabes infestet. Sanat & cōuulsionem & pleuritidem, ac sanguinis reiectionem, aduersusq; mortem se opponit, omnes uiscerum dolores sedat, tussimq; & suffocationem, singultumq; & destillationem. Hanc etiam Andromachus in suis cōmentariis retulit, hoc modo de ea scribens. Colica antidotus admirabilis, qua utor & ad uolulosos, & ad eos qui stercora per uomitum reiiciunt in maximis doloribus: datur magnitudine fabae ex cyathis tribus aut quatuor aquae frigidae. Compositio autem hoc modo habet. Piperis albi drach. x. l., opij drach. x. x., croci drach. x., seminis hyoscyami albi drach. x. l., spicae nardi, euphorbij, pyretri, cuiusq; drach. ii. excipe melle cocto, ac utere.

*Commentarij
Andromachi*

Alia antidotus colica, Nicostri ifotheos appellata, duobus talentis empta, faciens ad stomachicos qui cibum continere non possunt, oculorum affectiones, totoq; corpore uexatos, & dolores uuluae, ex hydromelite in quo ruta sit incocta. Croci sesquidrachmam, myrrhæ drach. ii., spicae nardi drach. ii., costi, piperis albi, piperis longi, galbani, cuiusq; drach. i., cinamomi, succi mandragoræ, castorij, cuiusq; drach. ii., seminis dauci sesquidrachmam, alij drachmas tres & dimidiam eius coniungunt, opobalsami drachmas ii. ii., sagapeni drach. iii., cassiae drach. ii. ii. excipe melle despumato, & fabae magnitudine præbe.

Quæ colicis infundantur, & per anum subdantur. Cap. xxxxiij

Huius generis sunt etiam, quæ sedi applicantur, quæq; ad leuandum dolorem per anum, tum subduntur, tum infunduntur. Opium itaq; ex genere eorum est, quæ fortiter sensum stupidum reddunt, ac somnum soporiferum inducūt. Atq; hæc facit tum per se solum, tum cum pari castorio in sapia aut oleo rutaceo imbutum, tomētoq; exceptum, & ano inditum. Miscere enim hæc pharmaca oportet quopiam uires ipsius opij mitigāte, nocuentumq; quod inde membris inferitur impediēte, ampliusq; affectionem iuuante.

Glandes dolorem leuantes

Aliud, quod subditur colicis, ad dolorem leuandum.

Castorij, croci, opij, myrrhæ, styracis, æquales partes in collyria longa redige cum aqua, & utere.

Collyria enim, quæ & glans des

Infusum ad colicos mirabile. Cedrix quadrante, picis liquidae semissem, castorij sesquiunciam, opij sesquiunciam, piperis grana l. x. unito cum digito medio, uel eo qui index appellatur, usq; ad primam flexuram uncto, & simul cum olei rutacei cyatho i inquinato, ammixtaq; butyri unc. i., terebinthinæ sesquiuncia, repsectū per fistulam ampliorem infundito: subsidet enim & dehiscit, ac ab unione discēdit.

Aliud infusum, quod ante somnum acceptum, somnum conciliat, dolorem lenit, concoctionemq; probe iuuat.

Succi absinthij drachmas ii. ii., opij drach. ii. ii., aloes drach. x. ii., picis liquidae unc. i., cedrix unc. i.,

myrrhæ

myrrhae unc. i, centaureæ drach. ii, castorij drach. x, costi drach. vi, mastiches unc. i, foliorum rutæ unc. i, Ryracis unc. i, mellis & terebinthinæ liquidi quantum ad coactionem sufficit, quo ad mellis crassitudinem redigatur. Vsu uero expetente ex pharmaco hoc drachmas plus minus quatuor, iuxta ægri uires ac ætatem, in diplomate cum oleo cyprino, gleucino, anethino, te-
lino, in quibus cuminum contusum coctum est dissolue, modicumq; buty-
rum ammisce. Et ubi aluum per clysterem sterconis eductiuum prius euacua-
ueris: deinceps laueris, & cibū exhibueris: ac caput ex anethino aut ompha-
cino illeueris, ante somnum infunde. Vtere. experimento enim constat.

Aliud, quod inferne infunditur, quo ego usus
magnum nomen assequurus sum.

Castorij drac. iiii, croci sextantem, alij tamen drach. ii tantum habent, opij
trientem, myrrhae drach. iiii, succi rutæ drach. ii, niri rubri drac. ii, quidam
uero pro nitro spicam nardi scribunt. excipe melle despumato cocto. Vsus
uero tempore nucis auellanae parua magnitudine, aut fabæ tantum accipe,
ac in uini mensura una dissolue, affusaq; olei rutacei mensura una, ut uidebi-
cet duæ mensuræ sint in totum: permisce, ac praeloto ægro, ante somnum in-
funde. Cæterum præscriptas ad dolorem leuandum antidotos & infusio-
nes uitare oportet, ne in nimis assiduū usum conuertamus: sedant enim con-
festim dolores, causas uero intus reseruāt: & aut paulo post animi deliquiū
inferunt, & mortem, aut diuturnas & indissolubiles affectiones reddunt.

*Antidoti do-
lorem lenātes
itemq; infusio-
nes, nocine*

Aliud infusum mirabile. Butyri quincuncem, adipis anserini, adi-
pis gallinacii, medullæ cernuinae, terebinthinæ, cuiusq; sextantem, adipis ursi
ni unc. i, cumini, foliorum rutæ, castorij, cuiusq; quadrantem, euphorbij re-
centis drach. vi, opobalsami septuncem, nardi celticæ trientem, unguenti nar-
dini libras i, olei rutacei sextarios iiii. Vtere hoc ipso in uehementibus do-
loribus: euacuatione tamen prius per clysterem facta, & post horæ spatium
mensuram unā mediocris poculi tepefactam infunde, quiescereq; iube, ac
aliquandiu pharmacum retinere: atq; ita diuinam eius uidebis facultatem.

Aliud infusum, quod etiam causas euacuat, ac dolorem
leuat: facit & ad diuturnam renum affectionem, & ad cal-
culosos, eosq; qui inuoluntarie urinam eijciunt.

Allij capita magna tria, rutæ uiridis manipulares fasciculos duos, olei dulcis
libras iiii. Allia decorticata, & cum ruta ac oleo donec torrefiant coquito,
atq; id ad prunas fumum non emittentes facito, ac deinde percolato, ad ole-
umq; butyri librā i affundito, picis liquidæ sextarii italici quartam partem,
cedriæ tantundem: unito, ac in uitreo uase recondito. Vsu autem expetente,
sextantem inde, aut minus iuxta ægri uires accipito, oleoq; & uino pari men-
sura acceptis, ita ut totum hemina una fiat, commisceto, tepesactumq; infun-
dito. Aliud infusum. Olei cyprini lib. v, castorij sexuncem, antido-
ti regiae quæ etiam tetrapharmacū appellatur, sexuncem: emplastri ex succis
sexuncem

sexuncem, terebinthinæ sexuncem, butyri sexuncem, baccas lauri centum & unam, baccas alij magnas quinquaginta unam, cumini lati unciam unam, rutæ manipulum unum. Baccas lauri & alia unũ dato: latum uero cuminum & rutam in pila tundito, & in hemina una uini ueteris dulcis macerato. Sequenti uero die affuso oleo & butyro, in diplomate decoquito, percolato, ac reliqua ammisceto, pariterq; castorium cum oleo tritum. Vtitor. Vbi uero usus postulauerit, pharmaci huius sextantem accipito, & adapis anserini liquesfacti itidem sextantem ammisceto, tepefactumq; inijsito.

Infusum colicum admirandum.

Fœni græci ac lini feminis æquales partes, quantum satis uidebitur accipito, & in aqua præmacerata decoquito, atq; ubi succus inde prodierit, quantum ad usum satis uidebitur percolato, ac in eo ipso quod percolaueris lanas succidas eluito, expressisq; lanis, ad aquam saleam & oleum moderate adijcito, simulq; unito, ac tepefacta infundito.

Cataplasmata colicum: ex libris Seueri.

Cap. xxxiiii

Seuerus
medicus

Farinæ cicærum nigrorum, feminis brasicæ, farinæ fœni græci, singulorum æquales partes decoque cum melle, oleoq; cyprino, modico uino affuso.

Est & alterum admirabile remedium, cuius efficaciam experimentum ipsum approbauit. Accipit autem fœni græci partes ii, baccarum lauri contusarum, mastiches chiæ, & terebinthinæ, singulorum partem unam. Coquitur cum uino & melle.

Epithema colicis, inflatis.

Silphium plurimum cerato cyprino excipe, & impone. Ego uero, inquit Archigenes, etiam castorij paululum admisceo, efficaciusq; redditur ad stomachi præsertim inflationes.

Aliud epithema ad colicos, inflatos, coxendicum dolores, pleuriticos, ac stomachicos, & diuturnum uomitum cibi: attrahit etiam, ac duritias emollit.

Ceræ, picis, resine pinus, adipis taurini, baccarum lauri, singulorum quincuncem, ammoniaci thymiamatis trientem, galbani quadrantem, piperis sesqui unciam. Aliqui etiam canchryos quadrantem, ammiq; tantundem coniungunt. Aliud. Ceræ libras ii, celtici nardi, floris iunci odorati, casisæ, cyperi, cuiusq; sextantem, colophonis libras ii, terebinthinæ sesquilibram, thuris, pyretri, cuiusque sesquilibram, euphorbij unciam unam, costi drachmas xxx, unguenti irini quantum suffecerit. Arida in uino rigata ac excicata contundito & cribrato, atq; ita liquefactis inspergito. Ad finem etiam opobalsami sextantem aut quadrantem ammisceto. Facit quæcunq; etiam polyarchion: maxime tamen inflatis conducit. Utendum quoq; ad colicos paulo mox subscripto polyarchio appellato, atque eo quod ex baccis lauri constat, quod ad hydropicos describetur, & si qua his similia existunt. Proprie autem colicis conuenit, inflammatisq; & inflatis, quod in epistolis Archigenis refertur, ex feminibus constans.

Epistola
Archigenis

• binthinæ

binthine drach. l. ammoniaci thymiamatis drach. l. opopanax, iridis illyricæ, anisi, meliloti, nitri, adipis taurini, sceni græci, seminis apij, cuiusq; drachmas xxv. mellis sexuncem, aceti cyathos duos. Arida contundito & cribrato, ammoniacum autem in aceto per noctem unam maceratum reposito, postera die liquefabilia feruefacito, in mortarioq; cum pistillo tusa commisceto. Hoc epithema hoc modo purum citra aliarum rerum admixtionē impositum, cutem exasperat, eisq; qui uitiolis humoribus amplius abundant serpiginosum pruritus excitat: quare in his qui teneriores carnes habent, ex cerato rosaceo quantum tibi satis uidebitur pro cutiadi corporis ratione, ammisceto. Dropax etiam assidue super omnem uentris amplitudinem injicitur, atq; etiam super dorsum. Componatur autem is ex pice & resina, modica cera, sulphure, bitumine, manna, nitro, adarce. Intenditur autem usus eius si calidiori & non pinguefactæ cuticulæ admoueat, atq; etiam inter exercitia incumbere sinatur. Aliquando etiam balneum suscipiatur, ex nitro assaeto toto corpore largite conserpo. Huiusmodi enim dropacis usus uiolentius adfectionē destruit, sicut & sinapismus & thapsiæ usus multis qui antea exquisita dicta sunt usi, & per aluum, siquidem adstricta fuerit, sunt euacuati, affectionem omnem excidit. Porro dropacum & sinapismorum apparatus in tertio sermone sunt descripti.

Dropax ad
colicos

Aliud, Archigenis, uile quidem, uerum ob efficacem ipsius lenitatem in pretio habendum.

Picis liquidæ libras ii, ceræ sexuncem, sulphuris uiui, nitri, aluminis scissilis, cuiusq; quadrantem. Ad picem liquidam præcoctā usquequō non amplius inquinat manus, cerā injcito, qua liquefacta ab igne tollito, aridaq; tenuissimetrica inspergito, unito, emollito, ac utitor. Flatus inferne educit, cutē uellendo iucunde afficit, ac per omnia colicis auxiliatur. Prodest etiam coxendicum doloribus, & articulis refrigeratis, lieniq; indurato.

Epithema ex baccis lauri, ad colicos.

Ceræ, colophonix, picis siccæ, spumæ nitri albi, ammoniaci, cuiusque sextantem, baccarum lauri decorticatarum sesquilibram, piperis sextantem & uncia dimidium, ammi, canchryos, iridis, cuiusque sesquiunciam, galbani sesquiunciam, unguenti irini libram unam. Quod si canchrys non adsit, pyretrum conijce, & liquefacta cum siccis permisce. Hoc etiam approbat Onbasius.

Polyarchion, quod in Alexandria præparatur.

Polyarchion
primum

Cassia, amomi, rosarum, cyperi, cardamomi, spicæ nardi, nardi celticæ, phylli, iridis, cenanthes, compositionis hedychoi, mastiches, croci, meliloti, succi absinthij, ammoniaci thymiamatis, aloes, bdellij, myrrhæ, cuiusque unciam unam, xylocinamomi, piperis communis, helenij, styracis, cyphæos, thuris, cuiusque sesquiunciam. Succos cum aridis committito, ammiscetoq; xylobalsami scrupulos xii, floris iūci odorati scrupulos duodecim, terebinthinæ sexuncem

sexuncem

sexuncem, unguenti nardini bessem, tofaci libram unam, hederæ uncias sexdecim, opobalsami sextantem. Succulenta uino diluta terito.

Polyarchion, quod dialemma, id est perunctio uel circunlitio, appellatur: quod ipsum & in Alexandria præparatur.

Castorij unc. i, piperis longi sesquiunciam, zingiberis, opobalsami, hedy/ chroi, phylli, calsiæ, radices panacis, spicæ nardi, cuiusq; quadrantem, costi sextantem, amomi sextantem, cinamomi sesquiunciam, aut pro eo calsiæ quadrantem, floris iunci odorati trientem, croci sextantem, cyperi, cardamo mi, iridis, aristolochiæ longæ, aristolochiæ rotundæ cuiusq; sextantem, py/ retri trientem, ammoniaci thymiamatis quadrantem, aloes quadrantem, ce/ ræ libras iiii, terebinthinæ lib. iiii, resinæ trientem, unguenti nardini lib. iiii. quidam etiam styracis sextantem addunt. uini uero quantum omnino sufficit.

Polyarchion
secundum

Polyarchion multo experimento cognitum, quo confidenter ad omnes diuturnos frigidiores, præsertim circa uiscera morbos uta/ ris: ego sanè eius usu semper clarus euasi.

Syracis pinguis dextantem, phyllorum sextantem unciamq; dimidiam, malorum cotoneorum repurgatorum uncias xv, masuaphij uncias duas & dimidiam, spicæ nardi, croci, cuiusq; sextantem dimidiamq; unciam, mica rum purarum dextantem, cyphæos dextantem, cenanthes quincuncem, car/ opobalsami sesquiunciam, comæ absinthij uncias duas & dimidiam, masti/ ches uncias duas & dimidiam, careophylli unc. i, scrupulos vi, ammoniaci thymiamatis uncias xx, colophonis unc. xv, opobalsami unc. xi, & di midiam, olei gleucini deuncem, nardini dextantem, melini unc. xx, propo/ lis dextantem, tofaci sextantem unciamq; dimidiam, mellis cochlearia uir ginti, terebinthinæ chiæ unc. xx, ceræ unc. xv. uini spathitæ quantum suffi cit ad reliqua cum eo conterenda, & ad rigandas micæ. Arida quidem om/ nia contundito & cribrato, mala uero cotonea concisa cum uino spathite co/ quito, ac per se terito, deinde ammoniacum & mastichen cum uino conterito. Syracem uero cum opobalsamo in altero mortario dissoluit, atq; om/ nia trita ac dissoluta simul unito, liquefactisq; quæ liquefieri possunt, & ab igne ablatis arida infarcito, ac donec refrigerentur agitato: deinceps ad ea quæ in mortario trita sunt adijcito, ac unito, adiecto etiam simul melle. post uero emollito ac optime subacto, tanquam ualde probato uitior.

Polyarchion
tertiū

Aliud epithema præter opinionem efficax ad omnes præcordiorum uetustissimas etiam affectiones, præsertim in stomacho ac uentre. Quibus/ dam etiam quibus aqua inter cutem iam suffundi incepit, profuit. Durities enim in stomacho unice dissoluit, supra hoc quod uisceribus robur & firmi/ tatem addit. Compositio hoc modo habet. Resinæ pinus libras xx, ceræ libras quinque, terebinthinæ deunces duas, olei lentiscini uncias xvi, gleucini uncias xvi, thuris quincuncem, ladani quadrantem, ammoniaci thymiamatis, nardi celticæ, succi absinthij, mastiches, bdellij, calsiæ, cuiusq;

o 2 quin

*Suffimentum
in pastillos
reductum*

quincuncem, cardamomi, floris iunci odorati, iridis, balauftiorum, fingulorum trientem, carpobalsami quadrantem, careophylli quadrantem, herbae fabinae quadrantem, stactae albae quadrantem, piperis sextantem, suffimentorum subscriprorum libras 1111. oenantharii quantum sufficit. Suffimentorum uero quae ad huius epithematis compositionem coniiciuntur, apparatus hic est. Liliorum alborum depuratorum lib. 11, styracis pinguis libras duas & dimidiam, phylli libr. 1, careophylli trientem, costi trientem, spice nardi trientem, mastiches quincuncem, amomi sexuncem, onychum aromaticorum ustorum & extinctorum, opobalsami, singulorum bessem, carpobalsami sexuncem. Apparato ac redigito in pastillos, eisq; ad praescriptam compositionem utaris.

Quomodo aluum fluxione laborantem curare oporteat: ex libris Philumeni. Cap. xxxv

Natura motus inuand

Fluxiones alui quando imbibenda

Bilis in uentre retenta quid faciat

Aluum tum in febribus, tum citra febres, fluxione laborat, maiori uero difficultate eorum qui febricitant cura perficitur, stomachoq; exquisitiore opus habet. In principio enim aliena à natura salubriter euacuare consuevit, ipsa uidelicet natura undiquaq; ad superfluum & incommodum reijciendum cogente, quae admodum in febrilibus morbis frequenter fieri uidemus. Conuenit itaq; rebus sic stantibus, aut usquequo natura omnem curam suam impenderit expectare, aut ipsius etiam motus adiuuare. Etenim obluetari & excretionis cohibitionem moliri, maiorem morbum facit: siquidem quae cohibentur sursum perlata dolores capitis, aut phrenitidas, aut lethargos, aut parotidas inferunt planè perniciosos. Quare in principio ea quae in corporis commoditatem utiliter excernuntur, minime inhibere oportet. Postquam uero iam diutius perseuerauerint fluxiones, non solum superflua euacuantes, uerum habitum ueluti colliquantes, uiresq; consumetes: tunc sane resistere eis oportet, tum per ea quae per os sumuntur, tum quae per anum infunduntur, atq; ea quae forinsecus imponuntur. Si itaq; biliosa pura recementa prodierint, in magis salubria permutare ipsa oportet, non ramen per cohibitionem eos curare. Biliosum enim tum in uentre, tum in ieiuno intestino aggregatum, atq; post coacervationem rerentū maximopere laedit: nam & stomachum subuertit, & uisceribus inflammationes infert, & sitim accendit, & febres instaurat, omnesq; praedictas affectiones in capite efficit, atq; in totum grauiorem affectionem reddit. Lac igitur in tali incommoditate bubulum aur caprinum tepidum, recens mulctum ac potatum auxiliatur, aut ad ignem decoctum, alsidueq; agitatum, donec ad tertias sive reductum: quod ipsum & per fluuiales silices, ferriq; laminas igni cādefactas ac in lacte extinguitas fieri potest. Cæterum in decoquendo superstantem concretionem siue spumam mystro aut pinna auferre oportet. Hoc enim nullum compendiosius remedium ad fluxiones biliosas reperire possis. Quandoquidem autem febricitantibus lac ipsum in nidore aut etiam acorem conuerti consuevit, maiusq; nocumentum quam commoditatē inferret: tunc sanè in praesens, ipsum exhibere

exhibere uitabimus : aqua: uero quarta parte ad lac ipsum affusa, decoctio-
nem faciemus donec dimidium eius consumatur, atq; hoc modo exhibebi-
mus. Et hæc quidem ad biliosas fluxiones sufficiant : ad alias uero ubi suffi-
ciens iam euacuatio sit facta, fluxioq; ipsa adhuc perseveret, irrigationes ad-
hibeantur ex oleo omphacino, aut rosacco, aut melino cum uino : efficacius
autem his myrteum est, si uehementiori indigeat adstrictione, tertia aut quar-
ta uini parte ei admixta. Quod si robustiora corpora contingant, gallæ, ma-
licorium, cupressi pilulæ, in ipsa irrigatione incoquantur. Cuminum etiam
tritum lanæ conuolutæ infarciatur, & apij similiter semen pari ponderis:uri-
nam enim irritat, fluxionesq; ad intestina eò diuertit. Cæterum & sedes ipsa
ex decocto quopiam prædictorum adstringentium foueatur. Perseuerante
autem adhuc fluxione, etiã cataplasmatibus ex palmis & acacia & alumine erit
utendum: ceratis item ex oleo myrteo apparatus. Conueniunt quoq; empla-
stra ex eadem materia apparatus. Parabile uero & efficax hocce est. Mora
præ immaturitate adhuc acerbiora, & albicantia, septem accipe, probeq; con-
tere: deinde ceratum ex oleo omphacino apparatus, ita ut ceræ in eo uncia
sit, olei uero sextans adijce, uni, & utere. Idem faciunt cruda mora exsiccata
cum ouo trita ac illita. Porro inueteratæ iam affectioni epithema ex cenan-
the cohuenit: & ex micis emplastrum in stomachicis descriptum, quod spu-
mam argenti & cerusam admixtam habet: item reliqua quæ in sermone de
coeliaca affectione describentur. In potu uero accepta uentris fluxus, post
sufficiẽtem inutilium euacuationem, sanant: capilli ueneris decoctum, thois
antiqui folia, acini uuæ triti, spica nardi, spinæ albæ radice: quin & coeliacis &
stomachicis eadem opitulantur. Mora etiam immatura & adhuc acerba ad
solem pluribus diebus desiccata, deinde trita & reposita, usucq; expetente bi-
bita, magnum pharmacum alui restrictiuũ sunt, ut ad diuturnas etiam coe-
liacas affectiones commodè exhibeantur, aliasq; omnes quæ fluidæ exi-
stunt, atq; etiam dysenterias. Contunduntur quoq; & obsonijs ammiscen-
tur, quemadmodũ rhus culinarijs consueuit. Magis tamen aluum cohibent
rubi mora immatura & acerba eodem modo exsiccata, & in potu exhibita.
Illitione autem optima ad fluidam aluum eiusmodi utaris. Acaciæ, masti-
ches, cenanthes, cuiusq; æquales partes accipe, ac unumquodq; per se conte-
re, deindeq; permisce, ac sicca adserua. Necessitate uero exigente ouo suba-
cta alio illinito, fasciculumq; lanæ purpureæ imposito & obligato. Malo
uero adhuc perdurante, etiam dorsum inde illinito.

Cura eorum qui ex debilitate alui fluxione laborant:
ex libris Galeni.

Cap. xxxvi

VNumquodq; membrum propria actione perfungitur, quum tempe-
ramentum suum iuxta naturam adseruat. Seruabitur autem tempera-
mentum, si refrigeremus ubi ad caliditatem fuerit diuersum; contraq; calefa-
ciamus refrigeratũ: humectemus uero exsiccatum, & rursus desicemus hu-
mectum

Cataplasma
parabile ad
fluxũ uentris

mectum. Iuxtaq; eandem proportionem etiam tractemus eos, qui ex harum intemperierum complexu & coniugatione afficiuntur. Oportet enim semper excessui contrarium opponere, usquequo ad moderationē, & in id quod iuxta naturam habet, membrū ipsum reducat. Ratione igitur edoctus sum etiam octo differentias curationis imbecilli ventris esse.

Calidae intemperiei cura.

Vidisti namq; & tu ipse aliquos quidem per diem unam, quosdam autem ampliori spatio, frigidae potu curatos: quorum aliquibus non solum recentem frigidam fontanam exhibui, sed etiam coctam & postea niue adobrutam & refrigeratam. Edulia etiam hoc modo refrigerata eos accipere, iudisti me concedentem: maxime si à plurima caliditate uexarentur. Dedi autem & lactis spumam similiter refrigeratam, & frigida iuxta ipsorum vires poma eodem modo refrigerata: prisanam quoq; citra salis aut alterius rei admixtionem probe coctam, aliaq; eius generis infinita: unicum scopum refrigerandi propositum habens. Prohibui autem ne absinthiū aut aliqua adstringentia contingerent.

Frigidae intemperiei cura.

Alios autem ex frigida intemperie laborantes, similiter ab adstringentium usu prohibui, omnibus uero modis calefeci: uino uteri facultatis plurimū calidae exhibitio: itemq; cibis calefacientibus cum pipere.

Humidae intemperiei curatio.

Quibusdam uero humidam ventris intemperiem habentibus, medicationis scopum in exsiccatō feci. dedi q; eis edulia ex natura sicca: carnes probe assatas, & paucum potum: omniumq; adstringentiū usus his convenientissimus exiit. in quibus enim humiditas multa ac ueluti mador circa affectū membrum adest, citra tamen humorum uitiationem, ita ut quantitatis tantum excessu adfligant, ac ueluti perstillatē ipsum uentrem reddant: in his commodissimus existit ciborum ac potuum itemq; pharmacorum adstringentium usus: exoluto nimirum ac languido tunc facto aegroti membro.

Cura ventris ob siccitatem immodice fluidi.

Aluum autem siccissimum iam factum, ut tabidis similimā figuram haberet, in contrarium omnino habitum deductum curavi. Huic quum in principio exigua intemperie uexaretur, à siccitate uidelicet humectatione indigente, medici qui eum curandum susceperant, absinthium bibendum deriderunt: malaq; cotonea, ac similia in cibo, extrinsecusq; similiter adstringentia adhibuerunt, atq; hoc modo totum aridum hominē reddiderūt. Hunc ipsum nos curauimus uniuerso corpore eius omnibus modis humectato. Qualis autē est senectus in sanis, talis est sicca intemperies in aëgris: ut etiam incurabilis existat, ubi perfecte compleatur. Perfectum autem complementum in hoc est, si solida substantia similiarum corporum aridior fiat. Est autem & altera quaedam siccitas eorum corporū, quæ ex substantia humore compacta consistat, uelut est caro & pinguedo. Alia etiam tertia siccitas est, quum

*Adstringentia
quib. conueniūt*

*Senectus in sanis,
sicca intemperies in aëgris*

quam humiditas ex qua membra connutrientur est deperdita. Circunfun-
ditur autem ea ipsa humiditas circa omnes animantis partes, instar roris in
ipsis dispersa, quam impossibile est ipsis membris apponere citra nutritum:
quare difficilima omnium huius affectionis cura existit. Alia autem sic-
citas est, quæ circa paruas arterias ac uenas cuique membro proprias consis-
tit: hæc ipsa ob sanguinis penuriam contingit. Omnes uero has siccitatis spe-
cies extreme offendunt austerorum ciborum ac potuum pharmacorumque
exhibitiones. Consumunt enim etiam si quid in ipsis innati ac insiti humo-
ris relinquatur, partim quidem exhaustes, partim uero exprimētes per
meatus in interiorē latitudinē alui, partim etiam ad alia membra depel-
lentes. Curare igitur has siccitates conuenit, tum cōclusos meatus laxando,
tum quod ad circūiacentes partes depulsum est attrahēdo, per humectan-
temque cibum unumquodque simile membrum propria humiditate replē-
do: quemadmodum nos arefactum penitus à medicis hominē curauimus.
Balneum itaque temperatissimum his conuenit: ita ut æger aliquandiu in tem-

*Balnea siccis
commodum*

perata aqua moretur. Præstat autem propè exteriores balnei fores calidæ
solum locari: neque enim aere omnino ad ipsos indigemus. Oportet etiam
gestando ipsum in balnē inducere, atque inde educere. Deinde ex oleo an-
tequam induatur inungere. A balneo uero statim lac asininum laxans mul-
tum exhibendum, alina in domum in qua decumbit æger deducta: pau-
cissimo enim tempore in ambiente aere lac ipsum morari oportet. Parum
etiam mellis optimi tepidi lacti ammiscendū, atque ita usque ad secundū bal-
neum quiescendū. Postea uero mediocriter & accurate fricatū, secūdo laua-
bimus diligenti coniectura, tum ex ructibus, tum ex uentris tumore facta, an
exhibitus cibus sit rite cōfectus: modicū uero tempus à primo balneo usque
ad secundū intercedat, horarū 1111 aut v puto, maxime si tertio etiā ipsum
lauare uelis: id si non uelis, non refert etiā pluriū. Lauabis autē tertio si ad sue-
tus sit balneis plurimis uti: & hoc sanè minime negligamus, quo à singulis
balneis priusque induatur, oleo eū inungamus. Cæterū si lactis usu delectet,
etiā à secūdo balneo ipsum propinabimus: si uero non, potissimā probe deco-
ctam, aut haliçā instar potissimā decoctā dabimus: indeque statim rursus quie-
scere iussim, postea ad tertium balnē ducemus: aut contrā, ad cœnā si lauare
non uelit. Panis ci præparet clybanites, purus, recens, probe assatus, fermentum
& sale mediocriter admixta habens. Pro obsonio sit piscium quispiam
petrosus aquis degentiū, aut asellus ex iure albo. Atque & alæ & testiculi gal-
linaceorum lacte nutritorū conueniunt: perdicæ item ac passeret montani
ac molles carnes habentes. Verum quæ in palustribus ac fluminibus degunt
uitanda: omniaque duras habentia carnes, & graueolentia, pinguiasque & fibris
referta: & ut summatim dicam, caput cibi sit ut bene nutriat, & facile conco-
quatur, minimeque uiscosus sit, neque superfluitatibus abundet. In potu sumat
pinum albū colore, albumque substantiā, & modice omnino adstringens, pu-

rumq; & parum aquæ ferens: quo nomine accipi uolo, id quod quum tem-
peratur modicam omnino aquæ admixtionem perferre potest. Scopus au-
tem quantitatis potus in hoc sit propositus, ut nunquam uentriculo innatet,
neq; fluctuationis aliquem sensum faciat. In cibis uero spectetur, ut quatum
possibile sit, uentrem non grauent, celeriter concoquantur, & inflatione non
pariant. Argq; hoc sanè modo maxima corporis siccitas curatur. Quum uero
mediocris siccitas existit, utpote quum uires non extreme sunt collapsæ, ple-
norem diætam sufficere expedit. Proponatur autem siccitas similis quidem
prædictæ, cum qua tamen frigiditas sit coniugata. inrantum igitur prædictis
ex calefacientium sylua miscbimus, quantum membra fuerint refrigerata.
Ponatur autem primum mediocriter ipsa esse refrigerata. apponemus itaq;
paulo ante dictis, in lactis quidem usu plus mellis: in uini uero usu, idem qui
dem genere dabimus, minus aut priore aquosum, & quam pleraq; existit.
Cæterum & edulia omnia calidiora exhibenda, non solum ex naturali tem-
peratura, sed à recenti etiam qualitate. Ex unguento etiam nardino assidue
uentrem inungemus, ut nunquam aridus fiat: si uero nardinum non adsit, mas-
tichino erit utendum. Sed & ipsam mastichen cum nardino unguento tere-
re licet, lanamq; purpuream ex eis imbutam uentri adhibere. Si uero frigi-
ditas multa intemperiei sicæ copuletur, ut coget ferè ad uberius calefacien-
dum, primum quidem affectionem grauissimam esse scito, & quæ difficul-
ter corrigi potest, multaq; diligentia opus habet. Vbi uero ipsidem usi fueri-
mus, quæ ad medietatem frigiditatem sunt descripta, speramus sanè quan-
quam longiori temporis tractu nos affectione sanaturos: ita tamen ut à ue-
hementer calefacièibus abstineamus. Demus autem amplius quiddam ex
melle despumato unà cum lacte, atque etiam ipsum per se ampliori modo
itemq; decoctum ac in pastillos redactum, Vinum uero uetustius eis eligen-
dum. Optimum autem pharmacum in omnibus his quo frequenter picato-
res utuntur, existit. Eo itaq; uniuersum uentrè illinire oportet, atq; mox prius
quam refrigescat auellere: uerum hoc non sæpe in hora, quorundā more, fa-
cere oportet. Discutit enim hoc modo, non uero bono sanguine membrū ip-
sum replet: nos autem non discutiendi gratia, sed ob sanguinē bonum ex ui-
cinis partibus attrahēdum, eius usum approbamus. Auxiliatur etiam omni-
bus his puellis carnosus dormiētibus acclinatus, ita ut superiorem uentrem
semper cōtingat. Quod si ex ordine multæ siccitati caliditas non ualde mul-
ta misceatur: in hac primam uictus rationem seruabimus: ita ut mel prorsum
non gustent: uinum uero minime uetus accipiant, quod sit album & tenue,
& ætate annum non excedat. Edulia etiam tepida exhibebimus, maxime
quæ lacticiuia appellantur, si hyems adsit: in æstate uero, aquæ fontanæ
conueniunt non summe frigida. Ventrem quoque omphaciū aut melino
oleo illinemus. Si uero maior caliditas adsit, etiam diluitorē uini temperatu-
ram faciemus, frigidamq; dabimus quemadmodū fontana aqua in medio

uere

*Pharmacum
picatorum*

here esse solet. Nosse tamen operæpretium est febrium similem hanc affectionem esse, atq; si quis contentiosius eos refrigeret periculo non uacare.

De coeliaci affectione: Archigenis. Cap. xxxvii

NON omnis uentris fluxus coeliaci affectio proprie appellatur: neq; enim si cibi crudi & incocti inferne prodeunt, neq; si corrupti ac in peregrinū habitū mutati sunt, coeliaci affectio uocatur: uerum tunc solum quum leuia & humecta excrementa egeruntur: uentre præ imbecillitate ea digerere nequeunt. Sequitur autem ipsos assidua egestio, aliquādo foetida cum animi deliquij sensu, aliquando uero etiā sanguis flauus ac tenuis unā cum his quæ egeruntur destillat: & ob eam causam malum & uitiatum cibum affectant, decoloresq; & uehementer graciles fiunt, corrūgata insuper eorum uniuerſa cute: & uenæ sanæ quæ in uentrem deferuntur, liuescunt: & ad magnā omnino desperationē res deuenit, si morbus diutius duret, ægris ad conuenientem dietam pigrescētibus. Si itaq; morbus autumnō incipiens ad hyemem usq; se extendat, difficilius omnino curatur. Causæ autem affectionis sunt, assidua cibi corruptiones, & peregrinorum eduliorum ingestiones: amplius autem si frigiditas aut uehemens ardor insistat, similiter etiā plagæ uentrem lædunt: & in morbis quoq; longis, uenter male affectus adfectioni huic obnoxius fit. A medicinæ quoq; purgātis potione quidam coeliacam affectionem inciderunt. Nosse tamen oportet, quod aliquādo quidem per circuitus malum hoc adfligit, temporibus quibusdam alio restitante, quibusdā uero ordinate per certas horas fluente: aliquādo uero incessanter apparet. Quin & hoc nosse oportet, quod sæpe non solum permanet appetitus, uerū etiam amplius augetur: & ob id corruptionib; aceruatim percipi uices factis, omnia mala augetur. Recente igitur morbo, diligenter inuestigandæ sunt ipsius causæ, ut ab eis maxime nos adseruamus. siue igitur corruptiones præcesserint, cauendum ne amplius fiant, simulq; uitioli humores ex eis generati euacuandi: siue peregrinorum eduliorum ingestio causā existat, ea ipsa auferre oportet: siue labor, aut aliud quippiam ex prædictis, ab eis similiter abstinendum est, ægriq; in quiete adseruandi, atque si ferre queant in inedia, aut certe omnino modico cibi usu. Aliquando autem etiam largā potione utendum, ægerq; ad reuocandum cogendus, maxime si humores in uentre collectos percepimus. Deinde attente exquisitæ diætæ insistendum, donec affectio in totum tollatur. Consistit autem exquisita diætā in electione qualicatis ciborum. Quod si tamen in principio difficilis appareat morbus, etiam reliquis prædijis utendum. Primum igitur mediā inspicienda sunt, atque si inflammatio, aut similis inflammationi dispositio circa uentrem reperiatur, cataplasmatibus utendum est, quæ ex professo inflammationem soluunt, ac fluxus retrahunt: quæ in re, palmæ commode sermini lini ammiscuntur. Cæterum cataplasmata ipsa minime calida apponere oportet, sed tepida saltem: atque si intendere eorum uim uelis, acaciæ quippiam

Inedia coeliaci
cibi utilis

Diætā
exquisita

quippiam & hypocisthidis, aut malorum cotoneorum, aut aluminis recte ammiscueris. Magnifice autem profunt lentiscus & rubus simul cocti: acetum quoque mullum apposite in cataplasmatum cocturam assumitur. Summe uero commodam utrique affectioni nouimus loliaceam farinam simul cum eis incoctam. Inflatione autem plurima infestante, cumini aceto mulso inspergimus, rutamque & anethum. Manifestum est autem quod ad cataplasmatum retentionem, quo contentius inhaereat, etiam rosaceum adhibemus, ac parum uini: ampliusque lentiscinum, aut cenanthinum, aut myrsininum. Oportet autem lana excepta ipsa imponere. Ceterum optimum ad ipsos tale cataplasma existit: Malis maxime cotoneis & palmis, absinthijque coma in uino decoctis, uinum ipsum percolatur, ac sapae creticae tertia pars ei affunditur: deinde simul calefactis farina tenuis inspergitur, & absque oleo decoquitur. Oleum uero quo uenter illinitur sit melinum. Post cataplasmata conuenient cerata ex myrsinino aut lentiscino oleo apparatus: quae tamen ex adstrictibus quaedam habeant admixta, ex acacia dico, & quae eius generis existunt. Aptissimum etiam his ceratum est ex oleo myrsinino apparatus, quod mora immatura ac acerba trita, parumque sanguinariæ habet admixta. Porro ubi diuturnum fuerit malum etiam ad malagmata transendum est: summopere uero concinnum eis uidetur, quod ex seminibus constat, & ad colicos est praescriptum: itemque quod ex lauri baccis, quod ad aquam inter cetera describitur. Postea etiam adhibenda ea quae uolenter rubefaciunt cutem. Quod si adfectio adhuc intendatur, etiam dropaces adhibendi medicamentaria uel praecellentes, bitumenque habentes & adarcen: post dropacem uero morsum balneo secundum caliditatem mordaciore curare oportet: duabusque post dropacis amotionem horis sinapismi adhibendi ex sinapi & caricis ita ut modico tempore impositos sinamus, oleoque inde ad locum circumfuso, ad balneum ducamus: atque id semel facere non sufficit, sed bis ac tertumque enim hoc ipso aliud efficacius remedium in praedicta corporis constitutione apparari potest: & ob hoc non multo tempore inhaerere id oportet, ne loco nimium exusto, secunda & tertia huius praesidij admotio prohibeatur. Mirabiliter etiam uomitus efficaces sunt, tum a coena, tum ieiunio facti: nimium quae corrupta sunt euacuantes, & quae ad intestina dilapsa sunt attrahentes & conuerrentes, ac proprias uentris actiones reuocantes. Si uero liceret ab his ad eos qui a raphanis sunt transire, maiore compendio affectio ipsa expugnaretur. Quidam etiam ueratri albi purgatione usi sunt: & si subiectae uires eius auxilij sint capaces, praeter omnibus huius usus eligatur. Ego uero ad coliacos prius quam uires extreme deficiant, purgatione humori conuenienti utor. Aliquando autem medicati quidam & acres aut etiam serosi humores tunicalis uentris aut magis intestinorum infarti aut imbibiti rodunt & irritant, atque ex omni corpore humores ad locos circa uentrem & intestina aduocant, diuturnaque fluxionum causa fiunt. Ceterum ex egestis recrementis & ex

Vomitus à
raphanis

Humores
medicati
serosi

confe

consequentibus accēssionibus, affligentis humoris speciem cōiectare oportet, atq; ita conuenientem exhibere purgationem. Præstabilius tamen est præ ex aloë compositioni scammoniz scrupulum 1, aut amplius si uires tolerant, ammiscere, & cum aqua mulsæ præbere. Quod si ex atra bile sit humor infestans, epithymum adijcere oportet, & post affligentis humoris euacuationem, eis uti, quæ affectis membris firmitatē addere possunt: cuius generis sunt ex malo punico edegmata, ad stomachi subuersiones descripta. Illud etiam notatu dignum, quod aliquib. fluxiones ex adstringentiũ usu oboriuntur: uentre nimirum ab ipsis læso propter imbecillitatem aut mollitiē sensus. Vtimur autem, inquit Archigenes, adalui fluxiones hiera mea, drachmis 11 ex ea exhibitis, ad eorum quæ in uentre ac intestinis insidēt deterisionem. ut nullum enim aliud hæc ipsa quàm rectissime emēdat & corrigir. deinde theriaca utor. Vtor etiam, inquit, zopyrio mea ad colicos descripta, ad sabæ magnitudinem ex ea præbēs cum duob. cyathis paksi ueteris, aut acci mulsæ boni paulo ante horam tibi sumendi, ad dies ex ordine x. v. deinde ubi ab eius exhibitione per v dies quicueuo, rursus exhibeo ad dies x, atq; hoc tamdiu facio donec non amplius opus habeat æger. Præstat etiam exhibere quæ ex duob. piperis generib. constat cōpositionem. Omnino igitur simplicia pharmaca & facile digestibiles cibos exhibere oportet debili existēte aluo. Si uero febricitent etiam, eo magis adstringentiũ sylua erit uitāda. Quod si tamē prædicta remedia circa affectionis solutionē nihil efficiāt, uisio adsumatur. Perurere autē superiorē uentrē oportet, interuallis duorum digitorū mensu aut ampliorib. etiā factis, ulcerationes q̄ seruare ad multū tempus ad fluxionem in uentre transitū ac deriationē. Licet autē & per pharmacū crustas infligere, si quis ignis ad motionē formidet. Postremū quidem igitur locum inter prædicta remedia uisio habet, propter nimiam seueritatē: si quis tamen uirili animo præditus sit, prius quàm concidāt uires, post præsidiorū firmitatē addentiũ usum, quodā modo uisione uti potest, quæ sola se affectionis disti cultati opponere consueuit. Atq; huiusmodi quidē est quæ forinsecus coeliacis adhibetur cura. Operæ precii est autē & per adstringētes potus auxiliū ferre, ubi humiditas imbecillitatis caussa existat ac fluxionū. Plātaginis itaq; semen siccū tritū ac potatū præclare facit, tum per se tum alijs etiā admixtis. Quidam etiam gallinarū uentriculis utitur exiccatis ac tritis potui insperis. Eandem efficaciam & struthocamelorū uentriculi habere creduntur. Proderit & lapathi semen tritum, maxime uero oxylapathi. Cornu item cerui tenerri mum ustū cum modica galla præbe bibendū: aut nuçū iuglandiũ corticē quo tinētores utitur, siccū tritū cochlearij mēsurā ex aqua præbe: aut quercinam glandem cōtusam ac cribratā cochlearij mēsurā instar farinæ uino austero insperge, ac exhibe: aut cancri marini uel fluuiatilis testam ustam cochlearij mēsurā præbe cum aqua: aut rhuris granum sabæ magnitudine in uini nigri cyatho uno dissolutū, sanguinariæ succo pari mēsurā ammixto præbet

Adstringētia
quibus fluxio
nes mouant

Visio

aut

aut gummis albi uermiculati unciam unam tritam ex uini nigri cyathis tribus præbe: aut uuarum passerum acinos, siue etiam uuarum torrefactos, exhibe cum farina: aut canis sterces siccum, cum quodam odorato: aut plantaginem siccam contusam & cribratam dato: aut bituminis quantum satis esse existimas deglutendum præbeto. Bonum est etiam corticis quercinæ glandis decoctum: itemque pelliculæ decoctum, quæ sub cortice quercus reperitur. Castaneæ corticis decoctum, aspalathi decoctum, radicis pæoniæ decoctum, atque ipsa etiam radix sicca, trita, potui inspersa. Corticis loti arboris decoctum. Calicum item papaueris torrefactorum drachma una ante somnum cum uino diluto potata, quin & semen capitum papaueris tritum exhibitum egregie auxiliatur. Mirabiliter autem acerba & immatura mora profunt sicca trita in potu exhibita: quemadmodum de alui fluxione est prædictum: eodem modo & rubi mora immatura & acerba exhibenda. Utendum & simplicioribus ad dysentericos descriptis medicamentis, maxime his quæ ex pomis sunt adparata. Commoda sunt quoque ea quæ urinam cient, fluxionem sæpe transferentia: uelut est, apium, fœniculum, anisum, adiantum, acorus, damafonii foliorum drach. i. & quæ his potestate assimulantur. Ex cõpositis prodest pastillus Thrasandri, & qui ex seminibus constat, ad dysentericos scripti. Pastillus item ex spina, & ex electro, ad sanguinẽ per sputum resicientes descripti. Omnium uero maxime antidotus theriacæ ex uiperis constans prodest: multoque adhuc magis quæ Elstræ inscribitur, efficaciter enim auxiliatur. Mirifice quoque celiacis conducit antidotus desposynos appellata: cuius compositio hæc est. Spicæ nardi, cinamomi, piperis, costi, hyoscyami, croci, seminis papaueris, opij, omnia æquali pondere accipito, contundito & cribrato, ac cum melle unito. Datur ex ea duorum statærum pondus ex uino.

*Antidotus
desposynos*

Oribasij, ad celiacos.

Baccarum myrti nigrarum cochleare unum & dimidiũ, rosarum siccarum, cenanthes, singulorum cochlearium dimidium, palmarum carne sufficienti excipe, & pastillos informa, ac exhibe drach. i., cum aqua, aut uino dilutus temperato his qui febris carent.

Aliud, ad celiacos.

Lauri uirgulta iii, piperis grana x xii i i, cumini grana quinquaginta unum contere, ac præbe febre carentibus cum uino, febricitantibus cum aqua. pro una autem uice hæc in potu sumuntur. Cæterum simplicia & antidoti oportune ante cibum exhibentur: pastillus autem dolorem leuans, ante somnum.

*Malagma
concoctorium*

Malagmate uero concoctorio in alui fluore per omnia, huiusmodi utaris. Bdellij, amomi, thymiamatis, canchryos, cuiusque sesquiunciam, opopanax drach. vi, styracis drach. vi, myrrhæ sesquidrachmam, piperis grana centum & triginta, galbani drach. vii, terebinthinæ drach. vii, ceræ drachmas tredecim & dimidiam, adipis suilli drachmas xvi. Siccissima conterito & cribrato: molliora uero in pila tundito, ac sicca inspergito: pila itaque pistillo ex unguento irino illitis, ut molle ad tactum & glutinosum reddatur. Vermes

autem

autem terreni in testa ad cinerem exusti, & ieiunis cum uino exhibiti, uetris fluxiones sistunt: eorum itaq; tres aut quinque exhibeto. Porro cognitu dignissimum & hoc est: infinita scilicet remedia hoc nomine predicata esse, quod aluum sistere possint: uerum scri profectus est omnium meminisse: & cauendum etiam ne nimium largus fiat eorum usus: quanquam plurimi omnino morbi ab accruata pharmacorum uicissitudine delentur, qui alias non facile hominem relinquant, si diæta solum exquisita utatur. Vna autem tutissima & compediosissima uia ad affectionis extirpationem diæta existit.

*Pharmacorum
efficacia*

*Diæte se-
curitas*

Diæta celiacorum.

Celiacum oportet mox ubi à somno surrexerit, faciemq; proluerit, ad deambulationem prodire, ita ut pro uiribus progrediatur. Deinde frictionem simpliciore adhibere, parte uidelicet & contente fricando maxime uentrem. oleo uero quo cõfricatur, canchry & pyretrũ incoquantur. quo postea deterso, corpus ex oleo dulci impinguetur. Balneo autem ut plurimum renunciamus, aliquando tamen ad lassitudinis uel alicuius alterius rei medellam ipso utimur. In balneo uero smegmare quoq; utatur, quod cutem lãcinare ac pertundere potest, uelut est nirtum assatum, sex uini, & quæ eius generis existunt. Ab inunctionibus & balneo prandendum est: perspicendum uero si quicquam aliud ut cibum diuidamus. Duas itaque tertias partes cibi in cenam referuet, atq; ipsum etiam qui in prandio exhibetur partem diuidiatum per se sumat: reliquũ uero cum obolionis simplici. Frumentaceum enim alimentum naturæ homini maxime conuenientis existit. Oleis autem raro uelcatur: inflationes enim pariũt. minime apti sunt etiam omnes arborum fructus, insuauius humoribus uentrem & stomachũ replentes. Caterum à prandio deambulationibus indulgendum, & animi aliqua laxamenta adhibenda. somni enim diurni nocentissimi sunt, nisi lassationis sensus adsit, aut nox uigilata præcessit: uesperti autẽ à cœna dormiat. Ex frumentaceis igitur conueniũt panis dibanites, halica, oryza: uerum sorbitiones ex milio non probo, quum cõcoctu difficiles & uitiosos humores miliũ producat. Ex leguminibus nõ inepta est lenticula assata, & cum plantagine cocta: utile est & palmas sorbitionibus incoquere, malaq; cotonea, eisq; simili ui prædita. Ex oleribus brassica eligatur duabus aquis decocta, cum oleo ac modico garo, paucissimoq; aceto: intubus item coctus & cichorium, pastinacaq; ualde excocta cum simplici liquamẽto. Varietatis autem gratia eis etiam carnes exhibendæ, ex gallinis, columbis, aut passerculis montanis. ex pedestribus etiã tenerrimæ coctæ: omnes, concoctis simul quibusdam fructibus, aut pomis, aut myrti bacis. Bellaria modice præbenda, uelut sunt amygdalæ, palmæ, nuces, atq; ea uoluptatis gratia tantum ac dulcoris degustanda. Fructus sint minime inflantes: uua modica pensilis: in pomis ac piris similibusq; mediocritas seriãda, atq; hi ipsi cum pane exhibendi. Vinum conuenit subadstringens. Omnis autem liquor qui in potu exhi-

*Balnei com-
moditas*

*Somnus diu-
nus quibus
miliis*

*Milium im-
probatur*

betur paucus sit, & post omnem cibum præbeatur. Multus enim potus uer-
tris fluxionibus intensissimus existit. Nosse tamen oportet quod in his qui
cum mordacitate fluxionibus infestantur, optime facit lactis potusita ut in
principio calidum ac recens multum detur: postea uero ad medietatem de-
coctum, aut etiam ad tertias quemadmodum in alui profluvio est prædictum.
Hoc enim modo exhibitum simul sistit ac temperat fluxiones. Cæterum

*Lac fluxiones
sistit & tem-
perat* in quibus lac ipsum in nidorofam aut acidam qualitatem permutatur, quar-
tam partem aquæ affundito, prædictoq; modo decoquito, ac exhibeto.

De colliquate.

Cap. xxxviii

*Colliquatio,
syntexis* **Q**Uum uero per uentrem quiddam excernitur, quod non ab accepto
cibo aut poru prodit, sed ab humoribus ex corpore in uentrem de-
fluentibus, assimilaturq; ei quæ tum per uomitum reijcitur, tum inferre
procedit, flauæ bili: differt autem ab ea tum graueolentia, tum quod flauius
quodam modo excrementum apparet, strigementumq; trassitudinem ha-
bet, aliquando uero & oleosum aut adiposum existit: Colliquatio morbus
is & syntexis uocatur. Recens enim compacta substantia pinguedinis ac car-
nis ab ardenti febre resoluitur & colliquatur. Diutius uero perseverante ma-
lo, ex ipsis etiam solidis partibus aliquid colliquefcit. In qua pessima febris
cuius frigida purissima frequens potus remedio existit: eiusdem etiam qua-
litis cataplasmata & epithemata ad pectus & præcordia adhibere oportet:
cibi quoq; refrigerantes exhibendi: reliquaq; quemadmodum in æstu-
ribus, ac in habitu conuersis febribus dictum est, facienda. Quod si in
uiscerum inflammatione hoc contingat, ualde periculosa adfectio est, & cum
prædictione remedijs prædictis uti oportet. Porro si acce sit ac mordax
quod excernitur, intestinaq; inde igneant, mordacitatem lenire oportet
per infusiones, ubi urgeat malum, nullo exacerbationum respectu habito,
præterquam circa initium accessionis. Infundatur autem succus oryzae ad ta-
ctum tepidioris, itemq; lac tepens. Si uero mordacitas cum tormine contin-
gat, pituitæ succus infundendus est cum ouis crudis ac conqualatis: admi-
xto rosaceo, aliquando uero bituminis etiam drachma una ammiscenda.
Quod si dolor adhuc perseveret, bis ac ter etiã prædicta infundantur. Con-
uenit quoq; his lac potatum, ad quod quarta aquæ pars est affusa, quem
admodum dictum est, decoctione ad tertias facta.

De lumbricis: ex Herodoto.

Cap. xxxix

LUMBRICI & in febribus, & citra febres nascuntur, tum multitudine, tum
magnitudine, tum colore, tum temporibus etiã differentes. Circa initia
enim morborum generati, substantiam suam ex subiacente corruptione ca-
piunt: circa uigorem uero ex malicia morbi: circa dedinationem autem ex per-
mutatione omnium in melius, qui sanè citius separantur: natura enim ipsos,
reliquorum excrementorum instar, foras propellit. Censent autem peiores ex ipsis
maiores minorib; paucis multi, & albis rubri. Viuentes etiam mortuis dete-

riores

niores. In infantibus autem & pueris, atq; his qui ad pubertatem accedūt maxime abundant. Cæterum hoc malo affectos incredibilis morbus stomachi ac uentris concomitatur, tussiculaq; tenuissima ac frequenter irritantes, quā tamen nihil rejiciatur. In somno tremunt, & præter rationem exurgunt. Quidam uero & linguam foras protrudunt, oculosq; claudunt, ac taciturni sunt, excitantesq; moleste ferunt, ob imbecillitatem uigilare nequeūtes. Quidam autem oculos sanguine suffusos habent, & pullum inæqualem, obscuri, deficientem & recurrentem. Quibusdam etiam appetitus perditio accedit. Pueris insuper dum dormiunt manducatio linguæ, cui accedit conformatio oris in modum lactentium aut accipientium cibum: uerum hæc pauco tempore & per interualla fiunt. Aliqui uero infantes cum clamore præter rationē exurgunt, citoq; rursus collabuntur. Aliqui etiam dentibus frendent: quod contingere uerisimile est, animalculis attrahentibus cibum, mordentibusq; uentrem ac intestina. Iam uero & ad stomachum quosdam processisse constat, nausearumq; & morbum fuisse causas. Sæpe etiam per se sursum reiectantur: aliquando uero cum pituitoso quopiam humore. Quidam etiam infantes neglecti motu destituuntur, ac refrigerantur, atq; eorum instar qui animo linquantur, tenuem quendam ac frigidum sudorem exudant, & ut plurimum liuescunt. Contingit autem aliquando faciem fieri rubicundam, maxime circa malas: uerum color hic rursus in pallorem solito maiorem transit. Alij autem instar delirantium peregrina in somnis loquuntur. Alij decubitu mutant continue dormientes, angoreq; uexantur, ex locoq; ad locum sese uicissim proiectant. Verum paucos omnino ex ipsis plorare constat. Plerique enim in mentis inopia ac taciturnitate degunt. Porro qui à rotundis lumbricis infestantur, etiam cibum auersantur, & si quid acceperint reuomunt, aut nauseabundi uix deglutire possunt: febres in eos cum uehementi extremarum partium refrigeratione irruunt. Quibusdam autem uenter ad tympani modum inflatur. Ex Hippocrate. Lumbrici circa aluum his signis deprehenduntur: si somnolenti sint non permittēte morbo, & extremæ partes frigidae, & cordis siue oris uentriculi dolor, urina: conturbata, & lingua humectatur. Item qui animalculis in uentriculo abundant, sputo replentur: & si tenuis quispiam prodierit lūbriculus, amplius non spuunt. Qui cunctiq; igitur in ore uentriculi lumbricos habent, fere in totum ipsos uomitu reiectant. Quibus uero in intestinis insunt, ipsos inferne excernunt. Omnes autem nauseabundi sunt, uomuntq; quacūq; acceperunt. His qui punguntur similes sunt, totoq; corpore contrahuntur, & repente acruatimq; mouentur, ac tormina accusant, interaneorumq; dolores. Euaporationes quoq; ad caput delata, uertigines inducunt. Quin & diæta quæ præcessit, ostēdet tibi lumbricorum generationem: ex crassioribus nimirum & quæ difficulter conficiuntur, & largius ingestis, & maxime frumentaceis, contingentem: quos item balneis a cibo uilos fuisse comperies. Cæterum cura ipsorum, alia communis,

qui pulsus & lumbi

paucos propter lumbricos plorare

signa lumbricorum

Lumbrici ex qua diæta generantur

munis est, & cum ea quæ febriçantibus conuenit coincidens. Alia uero eis proprie conducit. Quum igitur ambigua adhuc affectio existit, & rationalis quidem suspicio adest, incerta tamen, neq; planè comperta: mitioribus sanè remedijs uni oportet. Ab acrioribus enim febres magis exacuuntur, si adfectionem falsò habuerimus suspectam: ubi uero còstans ac euidentis cognitio còtingerit, ad tempora morbi animum intèdere oportet. Ad eos enim qui circa primas horas nascuntur, acrioribus remedijs est utèdum: & magis utique si iuxta uigorem totius morbi adparuerint: eos uero qui declinante morbo apparent, mitius curabimus: atq; id eo magis, si inflammationes & tensiones uiscerum concomitentur. His igitur cataplasmata adhibeàtur ex semine lini, crassiore lupini farina, pari mensura admixta. In potu pueris ante cibum myxarum decoctum ammixta menta præbeatur. Eis autè qui ad integram ætatem peruenierunt, absinthij aut abrotoni tremor. Virisq; uero etiam si febriçant, etsi trimestres tantum infantes existant: uermes terreni cum sapa confidenter exhibeantur: si uero sapam non admittant, cum hydromelite, aut ut libet, præbeto, nihil ueritus, neq; uilitate còtempta sex numero dato. Quod si non nuda sit suspicio, sed certa deprehensio lumbricorum, cataplasma ex lupinorum farina, in hydromelite decocta imponendum, cui aliquando etiam bryoniæ radix adiiciatur. Umbilicus autem felle taurino expleatur, aut melathio cum lacte muliebri trito, aut absinthio, aut abrotono, aut bryonia pinguibus ficibus admixtis. Spina uero uniuersa ex medulla ceruina inungatur. In potu etià his uermes terreni sex cocti ac triti cum sapa præbeantur, aut ut libet alias tenuissime triti. Efficax est & abrotonum, & santonicum, & absinthium decoctum, unumquodq; aut cum ficibus aut palmis exhibitum. Aliquando autem hæc confusa & cribrata, & cum melle in catapotia redacta, deglutienda præbemus. Dari potest etiam chamæmelorum decoctum cum modico rosaceo, uehementer enim efficax existit. Egrege quoq; facit cretica sapa cum rosaceo potata. Aliud. Nuces pineas in aqua calida macerato, teritoq;, ac rosacei cyathum unum affundito, & cum uino optime temperato tribus horis bibendas præbeto. Inde enim enecant, tum uomitu, tum secessu eriguntur. Commode quoq; in cibo sumitur fenetio uiridis, ac barba hircina. Eosdem etiam auriculæ muris succus, & calaminthæ ac mentæ decoctum, citra molestiam educit, quod & brassicæ semen ac petroselinum facere perhibentur. Superior autem uenter ce rato integatur ex absinthio oleoq; cyprino adparato: aluo autem adstrictæ glans inmittenda præsertim pueris, quæ si nihil profecerit, dyster adhibendus morbi uigore remittente, ex absinthij, aut abrotoni, aut centaureæ decocto, cum melle ac nitro. Cæterum lumbricos, qui circa uigores febriles nascuntur, quosq; malignos appellamus, per simpliciora remedia subducere conabimur. In cataplasmata igitur absinthium, abrotonum, ac santonicum miscbimus, aliquando etiam lupinum. Olei autem omphacini propinabi-

mus

Santonicum
absinthij
species

Lumbrici
maligni

mus eis, qui facile id ferunt, cyathum unum. In sorbitiones uero mellis plurimum coniiciendum; & pisanæ quoque oleum plurimum omphacinum incoquendū. halicam item in myxarum decocto præbebimus tum per se, tum cum aqua mulla: præbitiones uero ex oleo semper augebimus: multa enim comoditates existunt. In uniuersum enim omnia quæ lumbricos educūt aut per acredinem occidēdo, aut per amaritatem subducēdo, aut ad excretionem irritando, aut per consequentē ad ea quæ exhibentur lubricitatem, efficacia cognoscuntur. Extrahuntur autem simul, ut uerisimile est, per sorbitiones lubricas uias reddentes, aut etiam per innominatam aliquam efficacem qualitatem. Viuentes equidem uicinas partes adprehendunt: mortuæ uero unā cum stercore euacuantur. Prodeunt autem quædam adhuc uiuæ, uerum uertigine affectæ, & si ita dicere libeat, semineatæ. Profunt autem & his uermes terreni. Porro per pharmacorum poriones enecatos lumbricos, citra dilationem per glandulas extrahere oportet: uiciosa enim ex ipsis exhalatio pro cedit, quæ & appetitum & digestionem lædit. Atqui ad nauſeas ex lumbricis obortas, lancinationesque stomachi, salis granum in ore detineant, deglutiantque liquefactum. Acredo enim ut apparet, eos statim infra subsidere cogit. Oboriuntur autem & in alui fluxione lumbrici: eos fluorem inspissando, & concoctionem tum per cibos, tum per cataplasmata, in melius permutando, curare oportet. In quantum enim fluxiones inualeſcunt, tantū etiam lumbricorum generatio augetur: uicissimque fluxu cessante, lumbrici interquiescunt: quare diligenter conabimur ut aluum adstringamus, firmitatemque ei adiciamus. Coniicienda itaque in cataplasmata aliās ad fluxiones sistendas concinnata, ea quæ ad lumbricos sunt prædicta, & quæ fluores non exacerbant: uelut est absinthium, abrotonum, santonicum: iamque etiam malicorium, acacia, & balaustia, eisque similia, cum crudā hordeacea farina. Cerata quoque imponenda ex his apparatus. Utendum & præpotationibus, inter quas reliquis omnibus plantaginis succus est præferendus. Ad utramque enim affectionem, ueluti dixi, efficax existit. Licebit autē & in hoc casu uermibus terrenis, quemadmodum antea dictum est, uti. Ceratum ad lumbricos.

Quibus oribus
lumbrici
educantur

Succus plantaginis & alium sinit
& lumbricos expellit

Farinæ lupinorum, absinthij, farinæ hordeaceæ tenuissimæ, cuiusque drachmas vii, fellis taurini unc. i, scobis cornu ceruini drach. iiii, ceræ quadrantem uncieque dimidium, olei secundarij sexuncem.

De lato lumbrico.

Cap. xli

Lumbricus qui latus appellatur, in his qui febre carent abundat, & in longis ac diuturnis enascitur morbis. Est autem latus lumbricus, si ita dicere libeat, permutatio pelliculæ intrinsecus tenuia intestina ambientis, in corpus quoddam uiuum, quod cōtinuos stomachi morsus infert, & ad cibos incorrigibilem appetitum: ceterū ea quæ accipiuntur non succenturiata digeruntur, sed cito excernuntur. Consequitur affectos corporis gracilitas, & imbecillitas cum tarditate, assiduusque famis sensus. Quod enim uiuificatum est

in intestinis, ubi recens exhibitum cibum cōsumpsit, postea ipsa solida corpora artodit. Minime uero fallax signum erit, si cum recrementis quædam cucurbitæ semini similia excernantur. Porro cura penitus cum præcedenti concordat: præpotationes enim conueniunt amaræ & acres: alij item comestiones. Aut enim integræ excernuntur, ut incredibilem magnitudinis de se præbeant adpectum: aut etiam prodeunt in partes concisæ. Et semel sanè exolutæ non amplius secundo congregantur. In potu igitur etiâ his uermes terrenes, ut dictum est, exhibebimus. Proprie autem ad ipsas auriculæ muris succus facit, duorum cyathorum rænlura, cum uno zythi cyatho potatus: celerime namque ipsos educit.

*Lumbrici cor-
rie, id est in-
stite*

Aliud, ad latos lumbricos, quos corias, hoc est institas, uernaculâ uoce appellant.

Nitri, cardamomi seminis, piperis, singulorum æquales partes commisce-
to, & cochlearij mensuram inde præbero: confestim enim educit.

Aliud. Corticis radicis mali punice in suprema parte delibrari, pi-
peris, cuiusque drachmas quatuor, cardamomi drachmas sex, marrubij
drachmas duas, mellis despumati quantum sufficit, præbe ex eo cochlea-
rium post alij comestionem.

De ascaridibus.

Caput xli

Sphincter **A** Scarides etiam lumbricorum species sunt, circa extremas intestini re-
cti, ac primam internam adstrictiore ani partem, sphincterem Græ-
cis appellatam, consistentes, uehementemque pruritus his locis inferentes.
Et pueri quidem assidue ad egerendum irritantur, à contraria uero instan-
tia, & aduersus eas contentione, ac ut plurimum ab excretionem melius ha-
bent. Qui uero ad integram ætatem peruenerunt causarum molestiam in-
ferentium animaduersionem habentes, digitos in anum immittunt, ac pro-
cidentes educunt: quin & ignitis lapidibus, aut lixoreis calculis à sole peru-
stis fouendo, mordaces pruritus leniunt. Cæterum quum quidam præ pu-
sillanimitate nihil horum auxiliorum admittant, minime malum ipsum ne-
gligere oportet, sed citra dilationem curare, atque his qui falsi diuersum scru-
tunt causas indicare, ac curandi uiam demonstrare. Porro causæ huius ac-
cessorij mali, cibi sunt, & frigiditates, alimenticę corruptiones, quas præstat
prius uitare. Huius uero signa potissimum ex recrementorum graucolentia
sumuntur. Postea pueri quidem acrimuria sunt euacuandi, aut absinthij de-
cocto oleo ammixto. Calidiorem quoque sublutionem esse conuenit, à qua
ubi prodierint recrementa, affecti loci illinendi, ex simplicibus quidem aca-
cia & hypocisthidis succo, rhoisq; succo cum alumine liquido: Compositis
uero Andronij pastillo, & sphragide polyidæ inscripta, & lanæ succidæ pa-
stillo, ac quæ his similia existunt. Coacta enim ab adstringentibus caro cor-
roboratur, aptitudinemque ad animalculorum generationem amittit, atque
ascaridas ipsas excludit. Perfectiores etiam ætate similiter euacuandi acro-
ribus

fibris ac calidioribus infusis, uelut est muria & centaureę decoctum: deinde cedria eis infundenda: ad quam rem corneam fistulam undiquaq; perforatam apparare oportet, circa fundum amplam, ac magnitudine locis conuenientem, quam ultra adstrictiorem ani partem inditam cedria explemus, ita ut cedrię immisio palam tum per amplitudinem, tum per transuersa, undiquaq; contingat: post uero quiescere iubemus, sæpe eundem curationis modum repetentes.

*Instrumētum
cylindricis
corneum*

Aliud, quod & pueris & qui perfectę sunt ætatis conuenientissimum & efficacissimum existit. Carnem ueterem salitam, pinguedine derafa, sublongam & rotundam formabimus, atq; ita adaptatam podici atq; adstrictiori ani parti intrudemus, ligamentoq; adhibito, quam diu sustinere possint, inditam sinemus: deinde soluemus, prædictaq; infundemus atq; illincemus: idem etiam remediū sæpe repetemus. Cibi uero frumentacci generis, boni succi, ac qui facile concoquuntur, præbeantur.

*Caro salita
pro glande*

De abscessu in intestinis.

Cap. XLII

Oboritur aliquando abscessus in intestinis, ad cuius eruptionem eliquationes aquosi puris consequuntur: quare ignari ac inexperti hoc uiso decipiuntur, dysenteriam hanc affectionem esse putantes: & sanè ut uerum fatear, si post eruptionem diuturna sit exulceratio & perseueret, eo modo quo dysenteria curatur uerum in principio neutiquam consimili curatione subducitur. Vnde etiam quosdam agros periclitatos esse constat, male ab indoctis medicis tractatos, qui statim in principio dysentericas infusiones adhibuerunt. Pro uiribus itaq; affectiones hæc inter se distinguantur. Iudicatu enim faciles existunt. In abscessu enim semper dolor pulsatilis præcedit iuxta affectum locum innitēs, neq; morlus, neq; decursus adsunt, quales in dysentericis præcedere consueuerūt. Deinde mutatione in suppurationē incipiente, rigores inæquales consequuntur, febresq; circa uesperam maxime irruētes: postea ubi perfectæ humidæ mutatio fuerit facta, omnes molestiæ minores fiunt, uehementēsq; dolores remittunt: deinceps eruptionis tempore accedente, rursus dolores intenduntur. aliquando aut perfectæ uentris adstrictio adest. Post eruptionē uero humor, qualē prædiximus, excernitur, quū nihil tale in dysentericis oboriatur. Cataplasmatibus igitur ad eos uti oportet ex semine lini, adstringentibus aliquot simul ammixtis: ueluti sunt palmæ, mala cotonea, & similia. Atq; ne fluxus augeat infusis utēdum erit, ex pti sanæ succo aut haliçæ cum quodam mediocriter adstringente. Vehementer enim adstrictionē in his facere ueremur. A cataplasmatibus uero ac prædictis infusis inflammationem mitigamus. Et si quidem eruptionem suspectam habeamus, epithematis utimur quæ eam adiuuant, althæam nimirum ac caricæ, simumq; columbinum admiscētes: si uero discuti posse ac euanescere inflammationem speramus, ea quæ discutere ac digerere prædicantur epithemata adhibemus. Quæ in re egregie facit emplastrum aniæretum, hoc est insuperabile appellatum. Si uero eruptio obuiam ueniat,

*Dolor
pulsatilis*

*Abscessus
que rumpunt
& que discutiunt*

totum, & cum ipso etiam superiora. Si quidem igitur circa colum, hoc est cir- Colū, inter
stium crassa
ca intestina crassa, ulceratio contingat: stercora quæ egeruntur multa sunt,
& coaceruata, & cum flatibus prodeunt, aliquando etiam spumosa. Pinguia
quoque & cruenta recrementis ammixta adparent in explebilis edendi ap-
petitus oboritur. Tenuibus autem intestinis exulceratis, dolores circa umbi-
licum consistunt, biliosa quoque & porri colorem habentia, atque omnino uariega-
ta, stercore commixta plurimum excernuntur, citra tamen ramentorum com-
plexum, cum torminibus & mordacitate, desperatione quoque ac exolutione, ut
non procul ab animi deliquio ægri absint: à siti quoque infestantur, & febricitant:
stercus quoque crudius ab eis prodit. Exulceratur autem, uerum raro, & icui- Ieiunum
intestinum
num intestinum. quod si contingat, egestionis crudiores apparent, sangui-
nem nigriorem uehementer implicatum habentes, bilem quoque abunde flauam,
sitis multa item quoque nausæ affligunt uo- Antylus
munt etiam aliquando, ac cibos auer-
santur: dolor quoque uehemens supra umbilicum confidit: quandoque & fe-
bres malignæ oboriuntur. Atque ita adfecti decolores sunt, & ad animi deli-
quium usque exudant: uires etiam ipsorum cito deficiunt, neque procul ab in-
teritu absunt. Antylus autem scribit. Tunc equidem ieiunum intestinum
exulceratum esse putamus, quum sanguis qui cum recrementis egeritur, niger
ac uetustus apparet: necesse est enim huiusmodi, in omnibus infra ieiunum
sitis intestinis decoctum, excerni. Pituitosa etiam ac subpinguia simul exer-
nuntur: pituita enim, inquit, in ieiuno abundat, ipsum quoque etiam adiposum exi-
sit: biliosa item abundanter in his excernuntur: sitis quoque infestat, utpote uentri-
culo ob uiciniam ex affectione intestini ieiuni conualescente: quapropter
& febriunt & dolent. Cæterum tenui intestino exulcerato, egestionis minus
quidem biliosæ ac pituitosæ sunt: neque enim pituita, nec pinguedo in hoc ue-
lut in ieiuno abundat: subcruenta autem magis & rasuræ similia excernunt. Quæ
enim deferuntur, pelliculas intestini in superficie radunt, quæ ob rem sanguis
etiam in eis minus niger adparet. Si uero circa colū exulceratio fiat, recrementa
multa erunt, & flatu comitate coaceruata, & aliquando spumosa: quod uero
cruentum in ipsis prodit, flauum erit: cibum plurimum expectent, crudiora quoque
egerent: minus etiam à siti infestabuntur, & non multum febriunt, nisi magnum
sit ulcus, aut malignum: & si febricitare eos cōtingat, difficilius alijs febre sumi-
motuent & excludunt. Quod si rectū intestinū sit exulceratum, concocta erunt
recrementa, & sanguis floridus, & sordes plurimæ excrementis ammixtæ: te-
nefina etiam aderunt uiolenti: apius quoque ad excretionem incitatur, quum tamen
nihil excernant: neque ualde esuriunt, neque sitiunt, neque februnt, nisi ulcus sit
cancerosum. Porro primum periculum ex ulcere serpente ac depascente dy-
sentericis impendit: secundum uero ex sanguinis eruptione: tertium autem ex
fluxu à locis ab imbecillitate affectis consequenti. Cæterum ab ulcere serpente
ac depascente pueros magis opprimi adparet, usque ad ætatis uigorem: cali-
dum namque & humidum huic ætati corpus est, quare ad putrescentes morbos
perferen

Tenuia Infestant.

*Colū, inter
stium crassa*

*Ieiunum
intestinum*

Antylus

*Colū, inter
stium crassa*

*Ieiunum
intestinum*

Antylus

*Colū, inter
stium crassa*

*Ieiunum
intestinum*

Antylus

perferendos magis sunt parati. A sanguinis autem eruptione, magis hi qui in ætatis uigore consistunt, insistantur: & qui à natura multo sanguine abundant. A fluxionibus autem seniores amplius læduntur, & qui malo corporis habitu sunt præditi. At uero ubi ulcus proserpturum est, dolor concomitatur. Acris enim & liquida cum torminibus recrementa egeruntur: deinde & odoribus & coloribus uariata unà cum mordacitate. Febres uero quoque prauæ accedunt, ine diacæp ac corporis iactationes consequuntur: ætus item continuus ac sitis. Iam uero ulcere serpendo ac depascendo in peius procedente, ramenta excernuntur: feculentaque multa ac nigra effertur, & sordes magnæ intestina ambiendum pellicularum, si in crasis intestinis exulceratio consistat. Quum autem sanguinis eruptio futura est, exolutio totius corporis, animi deliquio similis præcedit, ac grauitas loci. Ea uero quæ egeruntur lenta sunt ac uiscosa, deinde cruenta. Postremum etiam grumi multi excernuntur, primum quidem flauis, ad finem uero nigri & graucolentes. Manifestum autem est quod uires quoque eorum subuertentur, sudoresque effundentur: aliquando autem & conuulsiones ad plurimam euacuationem consequuntur. Atqui fluxione laborantes, curationis tempore compacta stercora excernunt, deinde non longe post ulceris rectorium splendidum unà cum stercore effertur. Modice namque ab infusus fluxus sistitur, deinde paulo post ulceratio excoriatur. Caterum si alicubi certe in intestino recto ac colo consistens dysenteria incurabilis existit. Quæ uero in tenuibus intestinis hæret, difficulter curatur, maxime uero in ieiuno. Iam uero & hæc quæ post abscessum eruptiones sunt dysenteria, graues sunt, propterea quod uires deiecit: iam sunt per coincidentes inflammationibus febres ac dolores. Graues sunt quoque quæ cum uehementi inflammatione oboriuntur, quæque cum febris ac perditione appetitus. Pessimæ uero dysenteria sunt, in quibus quæ excernuntur potius ad spectum habent, suntque nigra, plurima, uaria, graueolentia, & quæ unà cum excrementis sordes pelliculis magnis commixtis excernunt. Verum tamen & mulieres, quam uiri, senes & pueri, quam iuuenes & in ætatis uigore consistentes, difficiliter curam accipiunt. His prædefinitis à tenesmi affectione curam dysenteria incipimus, quum plerisque inde dysenteria initium sumat.

De tenesmi cura.

Cap. XLIII

Quemadmodum iam prædictum est, in plerisque dysentericis tenesmus præcedit. Est autem adfectio hæc ad excernendum promptitudo, quæ differti ac deuitari non potest, nihil tamen præter quam pauca cruentum ad spectum habentia propellens, & post ea quædam mucosa. Vbi uero stercus fuerit excretum, ægri alleuantur. Iam uero & inflammationem cum laxo tumore, ex continuis distentionibus circa locum obortam esse constat, quæ stercoris insidentis suspicionem præbet, quod exitum querat. Caterum recementa in ipsis concocta & compacta ferè in totum excernuntur, pauco sanguine post recrementa destillante, stercore minime admixto. In principio igitur

Dysenteria incurabilis

ma hic mē dū
in hys
grauis dysenteria post
abscessum ex inflammatione
hæreticæ eruptionis.

tur si grauis distentionis sensus circa anum uentrem fiat, & maxime circa dextram partem, coniectare oportet stercoreum multitudinem in cæco intestino insitam esse, quam fursurum ac fœni græci decocto infuso eluere oportet, melle oleoq; ac modico nitro ammixto. Quod si huiusmodi nihil apparuerit, statim in principio ex oleo myrsinino aut rosaceo, cum uino & cumino, pectinem, inguinacq; ac inter anum & scrotum intercapedinē, perineon Græcis appellatam fouere ac irrigare oportet. Deinde lac caprinum recens multum hemina mensura, & nequaquam minus præbendum: uerum non accruatim, sed sigillatim partitum. Sequenti deinde die lac ipsum ad dimidium decoquatur, ablato eo quod in decoctione concretum superstat, atq; ita exhibeatur. Si uero pituita sit quæ agrū infestet, aut præcesserit frigus, rutam in uino albo decoquito, atq; uinum ipsum calidum meracum bibendum dato, ac assidue bitumen, picem siccam, coriandri semen & cyperū suffito: undiquaq; autem agro coniecto suffimentū supponatur. Est autem & pastillus suffumigabilis ad tenesmos ac intestinorū dolores approbatus: hic. Picis siccæ sextantē, bituminis unc. 1, sulphuris uiui uncā, bitumen ac picem cum modico aceto liquato, sulphur autē uiuum tenuissime tritum adijcito, hisq; simul unitis pastillos informato. Vbi uero expetente in calidum cinerem coniectos suffito. Bitumen autem in refrigeratis, etiā cum psianæ succo infundito. Glande quoq; supposititia in eis huiuscemodi utendū est. Oleo raphanino si adsit, aut communi, si non illud haberi queat, alia decoquito ac conformato: deinde ladanum & ceram paulatim adijcito, quibus liquefactis & ab igne ablati, modicum lycij addito, unito, ac tomento excipito, sedicq; quā penitissime indito. Ad anum uero uentrē ac lumbos hoc adhibeto. Ladanum & styracē unguento nardino, oleoq; suffumigabili apellato dissoluito, ac lana exceptū imponito, ac colligato. Efficacissima autē sunt in tenesmi affectione fomenta sedi admota. Gallas igitur in aceto decoctas cum spongia adhibeto: aut glomis texturæ gynæcorum per successionem foueto. Efficax est & malicorium similiter decoctū, myrticq; bacce, ac rubus, quacq; his similia existunt. Furfures quoq; in aceto decocti, ac feruenti ligamento excepti, commode sedi adhibentur. Infectiones etiam ex prædictis utiliter suscipiuntur. Verum cui per nostram experientiam cognito testimonium merito præberemus tale est. Later perquā uetustus & a fumo denigratus unā cum complexis in eo paleis tunditur: deinde seruēt ace to subactus, linteo oleoq; illigatus sedi subditur. Hæc autē statim ab excretionē admoueantur, & maxime si dolor infestet. Iuuantur etiam per spongitem herbam sede extersa. Si uero exulcerationis principium oboriatur, inflammationeq; adsit, psianæ succus infundatur, paucis rosis simul cum eo decoctis. Quod si acria sint quæ efferuntur, lac tepidū infundatur. Vehementiori autē inflammatione infestante, oleum rosaceum leniter calidum infusum ac pluribus horis detentum, doloris uexationem dissoluit. Si uero tepidius intestinum

*Intercapedo
inter anum
& scrotum
respirauay
Græcis*

*Pastillus
suffumigabilis*

*Glands
supposititia*

*Lateris
fomentum*

*Spongitem
herba*

intestinum rectum fiat, lentium ac malicorij decoctum infundatur. Similiter autem & si exulcerationis principium adsit. Si uero uigilia una cum dolore consequantur, sedi collyrium soporiferum subdetur, quod ad dysenterias est descriptum. In eis autem quibus iam ulcus serpendo depascitur, subiecta ad dysentericos cura utemur.

Epithema dysentericis.

Croci, zingiberis troglodyticæ, cyphij, mastiches, succi absinthij, aloes, palmarum, acacia, masucha, ladani, malorum cotoneorum, cumini torrefacti, candidi ouorū assati, panis usti & in uino macerati, olei melini aut rosacci.

Cura dysentericorum.

Cap. XLV

Cataplasma
tum commoditas

Pincipium curationis dysentericorum à quiete & modico cibo fiat, unde cuncti tandem fluor procedat, & mediæ corporis partes lana oleo modico dulci imbuta contegantur. Vehementi autem mordacitate infestante, rutaecum sit oleum, & cuminum tritum lanæ conuolutæ inspergatur, maxime ubi inflationes & tormina affligant. Quod si hæc auferant & intendantur, ad cataplasmata confugiendum erit, & hoc maxime si inflammationis sensus percipiatur. Multis enim non dolorum tantum, uerum etiam totius mali obliterationem cataplasmatum commoditas induxit. Adparentur autem hæc ex polline in posca usquequo cogatur decocto, quem deinde lin-teolo complicato illigatum totis illis impones: fluorem enim ipsum concoquit: quoad opus autem & palmas, malaque cotonea, ac malicorium cum aceto cocta ammiscemus: quod si ardor adsit, symphyti radicem tritam, aut solanum, aut perdicium, aut plantaginem adijcimus. Stomacho uero imbecilli & exoluto, polentam cum cenanthe, aloesque & omphacio annectemus: inflatione autem simul infestante, anisi, sceniculi, apij, ac irionis semen addimus: & si lumbrici simul cum recrementis excernantur, melanthium, aut cornu ceruini ramenta, aut adeps ceruinus, aut coriandri semen non incommode admiscetur. Quod si dolor uehementis adsit, prædicta cum lini semine commisceantur, & aceto mulso decoquantur. Si uero sanguis multus efferatur, acacia, hypocisthis, & alumen cum palmis ac malicorio decoctis & tritis apte concinnantur: si autem liquida & cruda prodeant, quod eis qui uires debilitatas habent euenire solet, mel coctum per se, aut polenta ammixta, pelle exceptum imponitur. Aliquando autem & opij parum, aut hyoscyami semen, hypocisthidemque & acaciam ac myrrham, apijque semine satis largum, itemque sceniculi & anisi inspergitur. Quod si frigoris sensus adsit, pellem agninam leuem liquida pice imbuta, calefactamque aluo imposito. Ego uero, inquit Archigenes, superioribus quidem intestinis adfectis, pastillum aliquem eorum genere qui superne per os exhibetur dissoluo, ac melle probe cocto aut palmarum pinguium carne exceptum impono. Neque enim impensæ parcendum est in his qui de uita periclitantur. Inferioribus autem intestinis adfectis, ac mucosis multis inferne prodeuntibus, & eiusmodi etiam occupante dolore: ex pastillis qui inferne per anum infunduntur, tres aut quatuor palmarum

palmarū carne exceptos impono, ſemperq; mihi iuxta uotum res acta ſuc-
cedit. Mirifice etiam emplaſtra quæ cruentis uulneribus adaptata ſunt, con-
ducunt, poſtquàm quieuerint inflammationes, uentri ac lumbis totis uſque
ad dorſum impoſita: qualia ſunt Barbara appellata: & quæ ad fracturas ap-
parantur, uelut eſt quod Iſis uocatur. Atque de his quidem quæ forinſecus
imponuntur hæcenus. Dicendum autem deinceps de his quæ intra corpus
aſſumuntur. In principio igitur poſt tertiam diem permittētib; febribus,
lacte recens multo adhuc calido utendum eſt, melle tepido ci ammixto,
atq; in eius uſu ad tres dies perſeuerandū, quantū nutriendo corpori ſuffe-
cerit exhibendo: ſequentib; deinde diebus melle adempto, & modica aqua
(quartæ nimirū lactis partis menſura) affuſa, paulum decoquimus ac exhi-
bemus. Deinde poſt alias tres dies ad dimidiū decoquimus: & poſt alias tres,
ad tertias, ſimiliter per tres dies, atq; ita eis præbemus. Primum enim lac de
purgat, ſimul ea quæ in corpore ſunt contemperando: poſtremum uero al-
uum ſiſtit. Non ſcio enim an aliunde grauior moleſtia dyſentericis oboria-
tur, quàm ex eorum quæ egeruntur acredine contingit. Oportet autem in-
ſuper & panem madefactum à lactis acceptione offerre. Pulſes etiam ex la-
cte apparatæ, tum pharmacum, tum nutrimentum, optimum præbent: ue-
lut eſt oryza cum lacte, dulciarij panes, amyllum, & oua lacti commiſta.
Quod ſi adhuc fluxus perſeuerat: inde ad eorū quæ aluum ſiſtunt ſyluam
tranſeundum eſt. Ex quorum genere, alia quidem influentes humores ob-
ducūt & inſpiſſant: alia uero, corpora plus iuſto rarefacta & laxata adſtrin-
gunt: alia autē reſiccant. Pulſes igitur ex halica apparentur: nam hæ & pro-
be nutriunt, & aliquo modo obducunt. Condiantur autem pauciſſimo ſa-
le, ac modico oleo & anetho, aut pro oleo magis adipe gallinaceo, aut an-
ſerino recenti. Quæ uero ex oryza eodem planè modo parantur, præceden-
tibus magis reſiccant. His autem adhuc amplius quæ ex milio fiunt. Quæ
autem ex rhoe apparantur pulſes magis adſtringunt. Ego uero, inquit Archi-
genes, eas hoc modo adorno. Rhoem culinarium in aqua pluuiæ per no-
ctem macero, deinde diligenter expreſſum aquæ committo.

Farris apparatus: ex Archigene.

Quod uero Latine in regionibus Romæ uicinis far appellant, hoc modo
apparatur. Frumentum modico tempore aqua madefacto, indeq; extra-
ctum ac in pilam coniectum, ueluti pulſanam à cortice repurgato. Vbi uero
corticem exuerit, tollito atque in ſole ſiccato: deinde manibus tritum donec
penitus à cortice fuerit mundatum, craſſiſſime molito, ita ut granum unum
in quatuor aut quinque partes redigatur, & ſiccum adſeruato. Vſus autē tem-
pore halicæ modo coquitur & à ſanis in cibo ſumitur. Pro ægris uero uarie
apparatur, & epithematis quoq; ammiſcetur. Quidam ſpicæ frumenti ad-
huc uirides tollunt, ex ipſiſq; far concinnant, quo modo & ſuauius & iucun-
dius redditur.

*purum lac de purgat
poſtremum alui ſiſtit.*

Pulſes varia

Far quod dufinum appellatur.

Porro frumentum ipsum rursus madefactū manibus sedulo confrico, atq; ita percolatum ipsius succum coquo, anethi ramulis assidue agitando: coit autem celerrime uelut glutinum quo ad librorum compactionem utimur: quo facto ipsum sale, ac paucissimo oleo siue adipe cōdicio: fitq; hoc modo non solum commodū, sed etiam iucundum. Apparatur autem puls ex siccis irem panibus, quos aliquando quidem posca, aliquando uero palmarū, aut malorum cotoneorū, aut pirorum, aut siliquarum, aut rhois, ut dixi, cremore contusos adferuo, eisq; aliquādo ex fauo albo ac optimi mellis pleno aliquid admisceo. Ex adstringentium numero lenticula quoq; proditur, quæ probe assata cum plātagine aut malis punicis contusis decoquatur, acetoq; ac modico oleo cōdiatur. Vtiliter etiam lenticulæ far dufinum ammiscetur.

Olera quidem non ualde probo, decentem tamē eorum degustationē non prohibeo, uelut seridis coctæ, plātaginis, brassicæ bis coctæ, ad quam post primam atq; item secundam decoctionem aqua diffusa, poscam feruentem affundimus, rursusq; donec liquefeat decoquimus. Intubum quoq; ac sifarum cum liquamēto simplici exhibemus. Damus & ouorum assatorū lutea tantum cum modico aceto ac rhoe, paucissimo oleo ammixto. Carnes aut dyfentericis non ualde commodæ existunt, dandæ tamen eis qui diurno malo uexantur. Ex his uolucrum eligendæ, deinde syluestriū ferarum: uerum ex his omnibus facile solubiles & non graueolentes, teneramq; carnem habentes ac adstringentē, reliquis præferendæ: uelut est inter uolucres perdix, palumbes, & similes. Ex pedestrib. uero carnes dorcadis, capræ ac leporis. Ex marinis, aselli, perçæ, loliginis ac nulli: singulæ uero in posca ebulliant, myrti baccis cum eis incoctis, deinde assatæ cum familiarib. edulijis præbeantur. Fructibus quoq; parce utantur: si tamē stomachus langueat, pirum cor-

*Vna in cado,
& interpositis
uis uinaceis
seruata*

Etum, aut cotoneum malum concedemus, aut uiam quæ in cado, siue olla, aut etiam interpositis uinaceis adferuatur: mespila item ac punicū malum. In potu à principio quidem aqua pluuiæ quæ non sit ex domibus plumbo interctis delapsa, utendum est. Talis enim aqua potata etiam sanis dysenteriam propinat. quod si pluuiæ optima nō adsit, fontana utemur: puteorum aqua semper deuittata, utpote quæ subfalsa est, ac uentrem perturbat. Cum aqua autem fructus adstringentes coquere oportet, maxime uero acinos.

*Aquarū præ-
stantia*

*Vinum Roma-
chum firmat*

Post uero ubi uires fuerint deiectæ, etiam uinum præbendum, quo stomachi sanitas firmetur: sit autem uinum adstringens, & non ualde uetustū. Ante cibum uero corpus inunctionibus, & faciei prolutione, similibusq; curetur, quæ in febriū tractatu sunt relata. Atq; hæcenus quidem de dicta. Iam uero ad remedia quæ inferne adhibentur transeūdum. Magnis igitur intestinis affectis etiam infusa adhibeantur: & siquidē tenesmus infestet, ptisanæ succus infundatur, adipe caprino aut hircino admixto. Vbi uero corpora excoarationem incurrant, halicæ aut oryzæ succus magis appositus enitriticea

ticea etiam pitfana ad teneſmos ac excoꝛiationes accommodata cenſetur. Aliquando in uehementi teneſmi ad egerendum promptitudine, murię uſu ægrum ab omni dolore liberauimus. ſufficiūt autem ex ea drachmę ſex, hemina; uni calidę aquę illiquatę: ſi uero ſucco alicui eam amiſcueris drachmas octo inijcito. Præſtantius tamen oliuarum albarum mutria conditarum liquamen cenſetur, tepidum hemina; męſura inſuſum: & ſanę per aſſiduum eius in teneſmi cura uſum optime ſucceſſit. Si uero ex ueteri chirurgię perpeſſione, aut aliās ſubtiliore ſenſu prædita exiſtant circa ſedem ægroti loca, anus aſſidue & maxime ante acrium aut adſtringentium pharmacorum inſuſionem, adipe anſerino aut ſuillo perũgatur, & fiſtula quoq; dyſteris craſſius illita immittatur. Cæterum poſt diſtentionum exolutionem, aſperitates quę circa inteſtinum ſunt, quę quidem mediocriores, per muriam reſecantur: quę uero relinquuntur ſuccis magis adſtringētib; curantur: ueluti gallicę in uino decoctę, aut tritę & uino inſperſę, mali corij item, ac corticis pīnus, & baccarum myrti nigrarũ. Quod ſi ardor conſequatur, oua cruda duo cum uino modico, ac largo roſaceo conquaſſata inſunduntur. Qui uero caput quod facile adſcitur habent, in his ſeminis lini ſuccum reſuſamus, utpote caput replentem. Portulacam aut cum pitfana (ſi poſſibile eſt) decoctam, aut cum aqua: ſi id fieri non queat, ſucco eius cum roſaceo & ouis crudis permixto inſundimus, in his præſertim qui ardoris adfectionem circa inteſtina habent, aut qui aliās à calidorum inſuſorum ardore ſunt læſi: ex roſaceo uero quarta ipſius ſucci pars ſumatur. Mirifice etiam ſeminis lini ſuccus facit, cum candidis ouorum, & lacte aſinino ſesquicochlearij meſura, permixtus: pro quo ſi non adſit, bubulum accipere non incommođū erit. Porro inflam

*Eryſipelate
inflammationes*

*quando ſanguis mittendus
eſt. ꝑ.*

autem incidere ob subiacentem arteriam uitandum: ceterum fissuram omni
no tenuissimam infligemus: non enim ob multitudinem sanguinis euacuā-
dam sectionem facimus, sed ut materiam quasi per riuos trāsteramus. Pau-
cus aut sanguis etiā multo tempore emissus, inflammationem mitigat, & san-
guinis ad intestina delationem reuellit, innatumq; calorem sensim refrige-
rans, somnum magis quā animi deliquium inducit. Est autem optimū dy-
sentericis remedium somnus. Si uero quid uenæ incisionē fieri prohibeat,
ex eorum quæ sanguinem sistunt ammissione infusionem facio. Qua in re
lanarum succidarum cinis optime facit, aut ex spongia noua uista. Spōgiam
autem ipsam liquida pice imbuere oportet aut sanguine taurino, cineremq;
eius in olla exuste in aliquē ex prædictis succis inspergere, atq; hoc modo
infundere. Succī autem in his ad infusiones apti sunt, ex plantagine, sangui-
naria, ac similib. Quin & linteolum alumine liquido imbutū, deinde uisum,
præclare sanguinis eruptiones sistit. Summe autem conducentem cognoui-
mus asininī stercoreis succum, maxime si à pastura prodeat animal mōtana
& adstringente: quod si non sufficit ipse succus, sterces madefacito, exprimi-
to ac infundito. Adhibeantur autem simul & epithemata, & quæ per os ac-
cepta sanguinem sistūt, & qui sanguinem spūcibus commodi sunt pastilli.
Præter opinionem uero eis prosunt, maceris cortex, & mali punici flores,
æquali pondere contusa & cribrata, si inde scrupuli duo cum uino adstrin-
gente propinentur. In his etiam frigida, citra offensionem tamen, infusa ap-
parēt. In reliquis uero dysentericis tepidiora, aut leniter calida. Vloceribus
enim frigidum infestum est, nisi sanguinis eruptio simul adsit. Si uero exub-
ceratio absq; fluxione relinquatur, plura ne infundantur, quā lac bubulū,
aut caprinum, cui lycij drachmæ tres sint ammixtæ: optime faciunt & terræ
famæ drachmæ 1111, aut amyli drach. 1111, cum plumbi uisti drachmis 11, tri-
ticæ pisanæ ammixtæ ac infusæ. Aut cerusæ drac. 11, cū succo iniicio, ægerq;
sanatur. ubi uero fluxione adficiatur & nimiū humecta sit exulceratio, char-
ta uista, aut lentiscus uista, aut cinis pompholygis, aut aridum ex charta con-
stans pharmacum, similiaq; cum succo plantaginis infusa, aut etiam cum al-
tero consimili succo, ægrum à malo adseruant. Quod si uehementior sit flu-
xus & humectatio exulcerationis, ea quæ à callis indurata corpora leuigare
ac à callis liberare possunt adsumantur itemq; ea quæ humecta resiccare &
exurere, exolutaq; adstringere possunt: uelut est sabina: herbæ decoctum,
item saluiæ, polij, ac pilularum cupressi: ex pastillis uero Musæ inscriptus, &
qui ex lanis succidis uistis constat, & consimiles. In potu uero Thralyandri
pastillus, & qui croceus appellatur, consimilesq; qui superne per os sumun-
tur, præbeantur. Cibi etiam magis resiccantes eis exhibendi. Si uero serpen-
do depascent ulcera ipsa, si quidem in intestino ieiuno consistent, paruam
omnino salutis spem promittunt. Si uero circa tenuia intestina fiant, minus
grauē malum est, attamen periculo non uacat. Si autē in colo fiant, ut pluri-
mum

mum sanabilia existunt. Verum quemadmodum in externis ulceribus depascentibus: ita & in his statim in principio, ubi depastio apparuerit, crustas inducentia & exurere ualentia adhibere oportet: si enim ad magnitudinem peruenierit exulceratio, inutilis horum usus fuerit. cæterum ulcera circa leiuum ac tenuia intestina, per potiones curantur. ea uero quæ crustas inducunt in potu accipi non possunt: quare sorbitiones & clegmata extergere ac repurgare potentia, his sunt exhibenda: estq; ptisanæ succus cum melle absorptus his aptus, atq; ipsum adeo mel per se induratum, & in decoquendo in pastillum coactum, quod comestum ulcera potenter repurgat. Sorbitiones item ex eruo apparatus, conuenientissimæ sunt eis qui in superioribus partibus ulcus depascens habent. Apparantur autem hoc modo. Eruum in aqua calida sæpe permutata ad horas octo madescere sinitur, deinde donec testam omnem abiecerit, manibus in aqua confricatur: post uero coquitur, & prima iteq; secunda, tertiæq; & quarta aqua diffusa, semper ubi prius decoctum diffunditur, rursus alia aqua feruens affunditur: quæ ubi post quartam tandem decoctionem fuerit diffusa: acetum mulsum ad ipsum sufficit: iter infundatur, & cum quintæ aquæ effusione ad compagem succi ptisanæ decoquendo reducatur, atq; hoc modo absorbeat. Halica etiam cum lacte bubulo decocta non incommoda efficitur. Maxime uero omnium prodest eis lac bubulum recens mulctum ac potatum. Quicquid uero tandem eis datur, ualde modicum sit. Multi enim dysenterici paucis cibo indigent, sitiq; uexantur. Pharmaci autem loco exhibeantur quæcunq; aristolochia rotunda participant, radiceq; panacis, ac iridis, alumine scissili, moris, & mali punici flore. A uino uero abstineant, depastionem enim dilatat. Quod si circa intestina crassa ulcus serpendo depascens consistat: ea quæ per sedem infusa crustas inducant, adhibeantur: cuius generis sunt pastilli Faustini, & consimiles, & maxime qui Nymphodoto est inscriptus, quo etiam nos utimur: item qui ex thapsia constat, quorum omnium compositiones paulo post dicemus. Cæterum cum attentione crustam inducentibus uti oportet, excellentem ipsorum facultatē reuerendo. Porro cancerosa & maligna, quæ cacoethe Græci appellāt, intestinorum ulcera ferè in totum incurabilia existunt, neq; tamen citra auxilium relinquere oportet, sed uehementes dolores mitigare: optimum autem & his est asininum lac recens mulctum potatum: si quis enim eius usum sustinere possit, nullumq; aliud nutrimentum accipiat, plurimam salutis recuperat: spem habebit: bonum est & bubulum ac caprinum recens mulctum, si illud non adsit: bonum est & scissile lac cum amylo. Præbeantur autem eis & oua cruda, ac iuscula gallinarum & perdium. Succus etiam præbeantur omnes qui facultate obtundendi dolores præstant: infusa quoq; eiusdem generis sint: pharmaca item his conueniunt omnia, quæ ad dysentericos à uenenatorum acceptione factos, conducunt. Cæterum irrigationibus & cataplasmatibus neq; curantur cancerosa & maligna

Cacoethe ul-
cera maligna *in ymnos.*

*Triplicia
remedia ac-
cepti ueneni*

ulcera, neq; mitiora fiunt. Vtere autem & ad eos infusus ad cancerosam uul-
uam describēdis, & pharmaco ad cancos mammatum, ex uino adriano &
rhoe qua coria tinguntur, apparato. Porro si à uenenati pharmaci potione,
ubi mortis periculum fuerit deuotum, dysenteria oboriretur, his quæ à ue-
nenorum potu conueniunt erit utendum. Triplicis autem modi remedijs in
his qui uenenum biberunt utimur, uomitorijs uidelicet, & obtundentib. atq;
extinguentibus: in quorum numero etiam acria comprehenduntur. Vomito-
ria itaq; remedia mox à ueneni potu sunt accepta. Extinguentia uero quæ
acria sunt, tanquam ulceribus minime conuenientia, recusamus. Alterum igitur
tantum genus extinguentium, hoc est aromatica adsumemus: itemq; ea
quæ obtundendi uim habent. Ex cibis itaq; conueniunt psisanæ succus, aut
halicæ succus cum anetho decoctus, aut palmis, aut mali punici acinis. Item
radicis dulcis succus: cum his etiam tum gallinæ, tum perdicis decoqui possunt
donec eliquescant cerebella item ac pedis eliquata præbeantur, & sor-
bitiones ex amylo & lacte, quibus anserinus aut gallinaceus adeps est am-
mixtus. Ex pharmacis autem eis conducūt quæ de uenenis referentur in ter-
tio decimo sermone. In potu uinum non inconueniens est tenue & album,
nisi febris aut inflammatio adsit. Cæterum cataplasmata & fomenta, in eis
quibus ex bilis acredine dysenteria oborta est, uitabimus. Quod enim leue
& bene succulentum in intestinis est, id distrahunt ac diripiunt: quod uero
nulli usui est, & mordax, in ipsis relinquunt.

Cura eorum qui aurum, aut æs, aut tale quippiam deglutierunt. Ca. XLVI
SI quis auro, aut ære, aut ferro, aut aliquo alio huius generis deglutito, san-
guinem per uentrem egerat, maluæ aut seminis lini succo multo, in potu
exhibito, lapsum facies deglutiti, supra hoc quod & in intestinis obortam le-
nies asperitatē. Ego uero, inquit Antylus, quum quidam per iocum anulum
aureum deuorasset, & ramentosa ac cruenta inferne egeret, ob sculpturæ
uidelicet asperitatem: in ipso enim auro capitellum inerat aspere concinna-
tum: non sum immoratus his quæ lubricas uias reddunt, sed confidenti ani-
mo ad ea quæ fortiter purgant pharmaca sum progressus: quare contigit
unā cum recrementis anulum excidere: quo facto, homo ipse ex psisanæ luc-
co, ac forbilibus ouis nutritus, tertia die sanus euasit.

*Antylus.
Anulus au-
reus deuor-
atus*

Communia remedia dysentericorum quæ superne exhibentur. Ca. XLVII
PORRO ubi memor fueris remediorum iam ante in unaquaq; dysenteria
specie dictorum, expedite inuenies, iuxta eundem planè modum, quo-
modo & communibus remedijs, quæ nunc dicenda supersunt, utaris. Com-
mixta enim reperies hic remedia omnia simpliciter scripta quæ dysentericis
conueniunt: nimirum adstringentia, obtundentia & resiccantia. Et simplicia
quidem quæ tum dysentericis, tum cœliacis in potu dantur: alia quidem ad-
stringendo, & firmitatem addendo, humoresq; inspissando, uentrem cohi-
bent, alia autem obtundendo, alia etiam urinam ciendo, ac fluxionē transfe-
rendo

rendo. Quæ itaq; urinam cient omnibus sunt manifesta, & sæpe in hoc opere descripta, quibus etiam hic uti oportet. Quæ uero adstringunt commodae, *Simplicia adstringentia* eis hæc sunt: lapathi syluestris maxime semen, alterius autem lapathi tum semen tum radix, trita aquæ inspersa ac potata, filiquæ aridæ comestæ, thus culinatius, gallæ, spinæ ægyptiæ semen, malicorium aridum tritum, rubi radix, unumquodq; eorum cum aqua ad tertias decoctum, aut tritum potui inspersum: ladanum cum uino austero, acaciæ succus, hypocisthidis succus, lysimachia, balauftium, sideritidis heradæ folia & radix, salicis folia, symphyti radix & folia & semen, rheon ponticum, althææ radix, gnaphalium cum uino austero, hippuridis succus cum passo, loti arboris bacæ, & ligni lotini scobs, potui inspersa & potata prædare faciunt: cortex thuris tritus potatus, semina terra quæ sphragis appellatur: minium sinopicum, cœnanthe polentæ modo potata, holoschoeni iunci fructus torrefactus, uerbasci radices drachmæ duæ, mora acerbita in sole desiccata ac trita liquori potando atque obsonijs inspersa: mora rubi acerba similiter exhibita: acini uuarum, ac uuarum passiarum tum aridi triti, tum in cinerem exusti, plantaginis semen aridum tritum, similiter folia & radix, maceris cortex. Ex eorum autem numero quæ *Simplicia obtundentia* aliquo modo adstringunt, uerum magis obtundunt, est alter samius, & amyllum. Obtundit autem tragacanthus & gummi. Resiccat coagululum leporis ex aqua, cornu ceruinum ustum, herinaceorū testæ asæ, itemq; ostræcorum, & cærorum maxime fluuiialium, atq; etiam marinorum testæ ustæ ac tritæ egregie facit & saluæ decoctum.

Composita pharmaca quæ superne exhibentur. Cap. XLVIII

Vinum uetus adstringens ad tertias decoquito, mellisq; optimi æquale pondus adijcito, rursusq; donec in compagem cogatur coquito, & ante cibum mystri mensura exhibeto. Aliud Aldepiadæ. Ouum recens in uas quoddam euacuamus, putamineq; eius mel optimū ac uinum uetus adstringens, malicoriumq; tenuissime tritum demetitur, piperisq; granis x adiectis, hæc simul in sartagine torremus, atq; tertiam inde partē ieiunis cum pane præbemus. Summe etiam prodesse quod sequimur scimus: corticis thuris, seminis plantaginis, æquales partes tritas, uino diluto ad trium cochleariorū mensuram insperge, ac ante cibum exhibe. Caninum etiam stercus album, tritū, lacti scissili & per filices decocto inspersum, summe dyentericis auxiliatur, si lac ipsum in cibo sumatur. Cæterū canem ipsum per præcedens triduum, nullo alio cibo quàm ossium comestione nutrire oportet.

Aliud ualde approbatum, cuius usu scimus multos à morbo liberatos. Gallarum tenuissime tritarum, piperis, rhois culinarij, malicortij tenuissime triti, singulorū æquales partes misce, ac cum uicellis oui subige, & in mali punici uacuam testam conijce, ex eodemq; sumpto putamine os testæ cõtege: deinde totam mali testam fermento forinsecus oblini, & ad prunas assa: post uero ex hac ipsa mali punici testa repurgata cochlearium ante cibum edendum præbe.

Aliud quod & cœliacis prodest.

Baccarum myrti nigrarū cochlearia 111, anisi, rosarum siccarum, œnanthes, acaciæ, singulorum cochleare 1. Palmarum carne subige, ac drachmā unam præbe. Si œnanthe haberi non potest, uuas immaturas siccitas conijce.

Aliud Marciani, ad eos qui neq; potum, neq; cibum accipiunt, sed pro desperatis habentur.

Baccarum myrti albarum quincūcem, malorum cotoneorum mediocrium ac pulchrorum numero duo, aquæ sextarios 111, scobis corticis arboris loti sextantē & uncia dimidium. Decoquito simul donec sextarij duo reliqui supersint, ac quantum possint bibendum præbe: idemq; etiam per clysterem infundito. Eiusdem facultatis est loti scobes potatus, atq; amplius adhuc co præstat eius decoctum. Quod si lotus non adsit, cortice pini utaris.

Aliud Marciani. Aloes ad carbonum formam exustæ unc. 1, mali corrij usti unc. 1, seminis lini usti unc. 1. contere & præbe cochlearia 11 his qui febre carent cum uino antiquo. Ego uero, inquit Marcianus, quotiescunq; hoc exhibeo, duorum terrestrium herinaceorum membranam internam, quæ abum complectitur desquamatam adijcio. Quare hanc membranam illotam accipito, siccato, ac adseruato. Per se enim huiusmodi pellicula potatæ uentris fluxiones sistunt.

Aliud Marciani, cuius utilitatem ne contempnas.

Seminis anethi, apij, feniculi montani, piperis, singulorū unc. 1. in testaccam pilam conijcto, atq; ubi probe contriueris, herinaceorum terrestrium internam membranam illotam, ac per se contusam & cribratam unc. 1, pondere immisceto. Deinde uinum purum uetus quātum satis uidebitur, in nouum uasculum infundito, & laminam ignitam ex ferro quod stomoma uocant, non minorem libra in uino extinguito, & adiectis aridorum drachmis duabus bibendum præbeto. Tantum enim ad summum datur, atq; hoc medicamine multos ille desperatos seruauit.

Aliud multa experientia cognitum.

Cochlearum terrestrium, maxime montanarū, ustarum, carnem trium drachmarum pondere accipito, piperis scrupulos v 111, simul cum arce pistillo in puluerem redigito, & uini ueteris sexuncem, tantundemq; gari affundito, ac simul uncta omnia in tres partes diuidito, & per tres horas exhibeto.

Oribasius autem siccochlearum unā cum testis exustarū unc. 1, alij trientem habent, gallæ sextantem, piperis unc. 1. in puluillum redige, ac obsonijs insperge, aut cum aqua, aut uino albo tenui præbe. Præclare auxiliatur hoc dysentericis, quibus ulcus nondum est putrefactum.

Aliud Marciani, quod Phemus appellatur.

Myrtiæ, opij, balaustij, rhois rubri, cuiusq; unc. 1, anisi sesquunciam, spinæ ægyptiæ quadrantem, lentisci quadrantē. Cum decocto corticis lotini ligni subigito, & nucis pōticæ magnitudine præbeto, cum lotini corticis decocto: quod si lotinus non adsit, mespilino pro eo utaris.

Stomoma
ferum

Catapodium dysentericum ualde pulchrum, Aſclepiade.
Radiciſ ſymphyti, ſeminis cricæ, mali corij, æquales partes ſubige, & in cata-
potia digere, ex quibus obolos 111 cum uino aut aqua deuorandos præbe.
Aliud eiſdem. Gallarum drach. 1111, opij aſiani drach. 11, petroſelini
drac. 1, aqua ſubigito & catapodia formato, exq̃ eis ad ciceris magnitudinē
præbeto, aut quantum uires tolerare poſſint. Aliud. Thuris, acaciæ,
opij, gallæ, æquale pondus ſingulatim cum ſucco uuarum maturarum ſubi-
ge: indeq̃ ad ciceris magnitudinem, aut pro uirium tolerantia præbe.
Aliud. Florum roſarum, opij, acaciæ, gummi, ſucci hypociſthidis, cuiuſq̃
trientem, ſeminis & ſucci plantaginis, cuiuſq̃ ſextantem, ſucci roſarum unc. 1.
In catapodia redigito, ex quibus obolos tres dato.

Pastillus ex ſeminibus, qui in Alexandria præparatur.
Aniſi unc. 1, ſcœniculi unc. 1, ſeminis hyoſcyami quadrantē, ſeminis apij qua-
drantem, aliq̃ tantum drac. 111 habent, opij unc. 1, dauici unc. 1, aqua ſubigito.

Oribalius autem hoc modo. Aniſi, ammi, ſcœniculi ſeminis, apij
ſeminis cuiuſq̃ drach. 11, petroſelini drach. 11, opij drach. 11. Valet cœliaciſ,
dysentericiſ, cholericis, & tuſſientibus.

Pastillus trigonus, hoc eſt triangularis appellatus.
Seminis apij ſextantē, ſeminis hyoſcyami unc. 1, opij unc. 1, aniſi unc. 1, aqua
ſubigito. Aliud Andromachi, ad cœliacos & dysentericos.

Rhois culinarij drach. 111, piperis drach. 111, myrrhæ, croci, acaciæ, ſcobis
corticis loti, ammi, cuiuſq̃ drach. 11, ſpicæ nardi, lycij, gallarum, ſucci hypoci-
ſthidis, opij, aloes, aniſi, cuiuſq̃ drac. 1. cum rubi ſucco ſubigito, & ante ſom-
num 111 obolorū pondus ex aqua præbeto: non febrientib. ex uino frigido.

Pastillus Philippi, ad diuturnas dysentericorum affectiones le-
uans dolorem, & bibitur & infunditur, & forinſecus quoq̃ im-
ponitur, melle cocto aut palmis paſiſ ſubactis.

Acaciæ, balaſtiorum, hypociſthidis, rhois rubri, opij, thuris, myrrhæ, croci,
gallarum, lycij, aloes, thei pontici, baccarum myrti nigrarum, mali corij, ſin-
gulorum drach. 1111. uino ueteri adſtringente ſubacta in paſtillos digere, &
non febrientibus obolos 111 ex uino præbe, febriticantibus uero ex hydro-
melite. Ego autem hoc paſtillo utor & feliciter mihi ſuccedit, omnibus qui-
dem prædictis ad eius compoſitionem adiectis, præter tuſſem & rhoem. Ad
hec autem omphaci, floris mali punici, caſſiæ, caſtorij, aluminis ſciſilis, roſ-
ſarum repurgatarum & ſicarum, ſingulorum æquale pondus addo.

Catapodium bonum. Abrotoni ſextantem, ſarcocollæ unc. 1, gum-
mi parum, ut obſtructoriam meatuum ac integendi uim inde acquirant.
Catapodia ciceris magnitudine formato, & iciunis unum deuorandum præ-
beto, ſimiliter unum ante ſomnum.

Aliud Oribasij, ad dysentericos & hæmoptoicos, fluxumq̃ muliebrem.
Succi hypociſthidis, terre ſamiæ, gallæ omphacinae, acaciæ ruſſæ, cuiuſque
drach.

drachmas octo, cum aqua pluuiali subige, & pastillos forma, ac utere. Ad dysentericos quidem in potu exhibitis, ac per dysenterem cum succo oryzae, aut lentis, aut aliquo consimili, infusis. Ad hæmoptoicos uero, cum aqua frigida sesquicyatho eius drachma una. Ad fluxum autem muliebrem, cum succo solani, aut sanguinariæ, aut plantaginis lana exceptos subde.

Aliud parabile. Alumen liquidum tritum cum ouo absorbendum præbe, & rursus aqua calida dilutum bibendum exhibe, & admiraberis. Sedat diuturnas dysenterias, & in quibus cruenta excernuntur.

Aliud. Pumicem in tenuissimum puluerem redactum, cum ouis subtilibus, cochlearij mensura præbe, & miraberis. Aliud exquisitum. Fici folia arida contusa cochlearij mensura cum uino austero dato.

Aliud. Macer, mali punici florem, æquali pondere contunde, & ex eis scrupulos duos cum uino adstringente præbe. Valde commodum hoc est in his qui cruenta egerunt.

Pastillus ad dysentericos & coeliacos.

Anisi, seminis apij, ammi, balaustiorum, succi hypocistidis, seminis hyoscyami albi, singulorum drach. viii, opij drach. iiii. Exhibe his qui integræ sunt ætatis drachmam unam cum aquæ calidæ cyathis tribus.

Polyidæ Sphragis, coeliacis, dysentericis, quartanarijs, & oculorum fluxionibus conducens: dolorem enim adimit & reficcat.

Hyoscyami albi seminis drach. iiii, seminis apij drach. iiii, anisi drach. ii, opij drachm. i. contere cum aqua, & informa pastillos obolares: ex quibus unum cum aqua frigida præbeto.

Quæ inferne dysentericis infundantur.

Cap. XLIX

Pastillus
Nymphodoti

Pastillus Nymphodoti, ad dysentericos, & ulcera depascendo serpentina omnibus præstantior: quemadmodum experti sumus, inquit Archigenes: compositus quidem ut Faustinus, dissonans autem in auripigmenti apponeratione: opere uero longe efficacior eo, cognitus. Cuius compositio hæc est. Chartæ ustæ drach. xxx, auripigmenti drach. viii, calcis uiuæ drach. x, sandarachæ drach. vi, uini austeri sextarios iiii. Vinum ipsum per se coquitur, donec tertia pars reliqua fiat, cum qua arida in mortario teruntur, donec in compagem terendo redigantur, ex quibus deinde pastilli drachmarum quatuor aut trium siue duorum etiam formantur, quorum usus iuxta ægri uires adhibetur: cum uino autem & aqua infunduntur: ita ut cum aqua lenticula, rosæ sicce, ac cortex loti decoquantur: cum uino uero bæccæ myrti, ut ex utrisque heminæ mensura superfit. In uniuersum autem, non solum in huius pastilli, uerum omnium qui crustas inducunt usu, stomachum hora una ante eorum exhibitionem, ex oleo myrteo ac uino ueteri irrigare oportet, itemque caput ex oleo largo. Quæ enim crustas inducunt, si infundantur, & stomachum & caput offendere consueuerunt. Ante infusionem autem frustra panis duo aut tria ægro exhibenda, ex aqua frigida aut lactis, si uehemens

Crusta indu-
centia quibus
noceant

mens adfit febris: aut uino diluto, si parua fuerit febris & nullius penſi, pane madefacto. Quod ſi ab infuſione ſtomachus exuratur aut ſubuertatur, aquæ frigidæ cyathi tres confidenter in potu præbeantur: exhibédus & laetudæ caulis cum pane & aceto: oliuæ item albæ ex aceto. Cæterum his qui ſtatim ubi infunditur pharmacum, rurfus reijciunt: imò penitus infuſum retinere nequeunt, muriam præinfundere oportet: aliquando etiam ſalis ammoniaci cochleare unum aut amplius tritum, pharmaco eſt amiſcédum, nullo habito mordacitatis reſpectu. Vilitas enim omnem dolorem exuperans inde procedet. Vtimur autem frequenter oliuarū albarum muria conditarum liquamine, hemina nimirum una ex eo infuſa, ſemihoræq; interſtino facto aut paulo diutiore, paſtillum ipſum conſequenter infundentes, quo modo facile ipſum cōtinent. Et pharmacum ſanè magis efficax ſit ubi nuda ulcera contigerit. Si uero neq; ſic cōtinuerit, iterum atq; iterum infundito: munitum eſt enim pharmacum ne cruſtas inurat. Porro ubi efficacius fuerit pharmacum & uicerit affectionem, multa cum ipſo mucoſa ramenta prodibunt, & à multis moleſtijs, egerendiq; promptitudine, diſtentionibusq; liberabit. Infuſum autem ipſum non ultra duas horas retinendum eſt, neq; infra unius horæ ſpatium. Atq; hic canon uniuerſalis tibi in omni cruſtas inducente infuſo proponatur: unà cum hoc quod & ſtomachus & caput ſit præmunitum. Ante infuſionem etiam anus ex oleo dulci illinatur, maxime uero adipe quoſiam ipſa fiſtula craſſius perlinatur. Poſt infuſionem cum ſpongijſ aut glomis decocto quoſiam adſtringēti imbutis, ſed ſoueatur: adiuuat enim hoc ipſum infuſi retētionem. Mirabiliter etiam prodeſt Andronis paſtillus duarum aut unius drach. pondere infuſus.

Paſtillus ad dyſentericos, cuius multam experiētiā habemus: admirabilis enim in ulceribus ſerpēdo deſcendentibus exiſtit, non ſolū dyſentericis, ſed oris etiam gingiuarum, & ad omnem nomen ſerpētem. Calcis, auripigmenti, chartæ uſtæ, ſquamę aris, æquales omnium partes ramulorum oleæ decocto ſeu ſucco ſubigito ac utitor cum oryza ſucco. Excatur autem olea hoc modo. Ramulos oleæ contundito, eiſq; congruentis mēſuræ aquam affundito, atq; donec quater efferbuerit decoquito, expreſſoq; ſucco unitor.

Fauſtini inſignes paſtilli: quorum alter conſtat ex chartæ uſtæ drach. *Paſtilli Fauſtini* xx x, calcis drach. xx v, auripigmenti drach. x ii, ſandarachæ drac. v i. Inſunditur duarum drachmarum pondere cum rhois & baccarum myrti decocto. Si uero diuturna ſit affectio, ſalis etiam drach. ii adijciuntur.

Alter uero conſtat ex calcis drach. x, ſandarachæ drach. v i, auripigmenti drach. v iiii, chartæ uſtæ drach. xxx. hæc in paſtillos redigito, ac utitor, quemadmodum in Nymphodoti paſtillo eſt prædictum.

Alter adhuc paſtillus Fauſtinus, qui in Alexandria præparatur. Auripigmenti trientē, ſandarachæ trientem, calcis unc. x ii, acaciæ unc. x ii. ſubige cum uino.

Pastillus Philadelphus, ad dysenterias, & sanguinis eruptiones, & omnes nomas.

Sandarachæ, auripigmenti, cuiusque quadrantem, calcis sexuncem, acaciæ sexuncem. Excipe plantaginis succo, aut uino austero, & pastillos drachmarum quatuor, aut trium, aut duarum informa, atque pro ægri uiribus infunde cum uino myrtite. Eras autem hoc modo ipsum præparat. Auripigmenti beffem, acaciæ trientem, calcis trientem.

Pastillus alius, dysentericis commodus, qui euestigio aluum sistit, quod multo experimento constat.

Bituminis, auripigmenti, sandarachæ, aluminis scissilis, squamæ æris, cuiusque drach. iiii, chartæ ustæ drach. x, calcis drach. vii, succi hypocisthidis drach. iiii, balaustiorum drach. iiii, opij drach. ii. Cum uino myrtite subige, ac utere ueluti in Nymphodoti pastillo prædixi.

Pastillus ex subere appellatus, quo ueluti præter opinionem admirando utor.

Gallæ ustæ, chartæ ustæ, suberis ex uase uini ueteri accepti ac usti, panis aridi usti, singulorum drach. xv, auripigmenti drach. xx, sandarachæ drach. x, calcis uiuæ drach. x, acaciæ drach. v, cerusæ drach. v, spumæ argenti drach. iiii, omphaciæ drach. iiii, fecis uini ustæ drach. v. Cum uino adstringente subige & informa pastillos drach. iiii, & iiii, & ii. In principio autem hoc cum plantaginis aut sanguinarie, aut perdicij succo infundito: aut cum aqua tepida, si hæc non adsint: si uero morbus fortis sit & in uigore consistat, cum sceni græci aut lini feminis decocto infundito: in declinatione autem cum myrti & rubi decocto ex uino. Et in pueris quidem cyathorum duorum mensura: in sceminis, trium: in uiris uero qui ad perfectam ætatem accesserunt, quatuor infundatur.

Pastillus Asclepiadæ, dolorem summouens, somnumque inducens.

Diuturnis dysentericis adfectionibus euestigio auxiliatur, si absit febris. Chartæ ustæ drach. iiii, auripigmenti, sandarachæ, squamæ æris, aluminis scissi, omphaciæ, lycij, acaciæ, succi hypocisthidis, calcis uiuæ, cuiusque drachmas v, opij drach. ii, croci drach. ii. Vino myrtite excipe & in pastillos redige, quatuor & trium & duarum etiam drachmarum. Iuxta ægri uires cum palsi cretici cyathis vi, his qui integre sunt ætatis infundito.

Pastillus alius dysentericus.

Auripigmenti sextantem, sandarachæ quadrantem, squamæ æris unciam unam, calcis trientem, aluminis scissilis sextantem, chartæ ustæ quincuncem, omphaciæ sextantem, acaciæ sextantem, succi hypocisthidis sextantem, thuris unciam unam, opij quadrantem. Vino myrtite aut aliquo alio austero excepta subigo. Quod si quis infusum non contineat, sed statim ipsum reiectet, omnino morti propinquum iudicato, quemadmodum sæpe iam sum expertus. Infundito autem ex eo uelut ex præcedente drachmā tantum.

Pastillus

Infusum non
retentum
mortale

Pastillus, thronus Marcellius appellatus.

Auripigmenti quadrātem, sandarachæ trientem, lentisci trientem, balaustiorum quadrantem, aliq̃ dextantem habent, opij sextantem, calcis bessm, omphacij sextantem, succi hypocisthidis quadrantem. Vino austero subige, & utere ut pastillo Nymphodoti.

Pastillus, lycos appellatus, ad dysentericos.

Sandarachæ drach. vi, auripigmenti drach. xii, calcis uiuæ drach. x, æris usti drach. xx, acaciæ drach. v, cadmiæ drach. xii, chalcitidis crudæ drach. xii, rhois culinarij aut quo coriarij utuntur drach. iiii, succi hypocisthidis drach. iiii, baccarum myrti nigrarum recentium drach. vi, foreos drach. i, misyos crudi drach. i, gallæ drach. viii, omphacij drach. i, lycij drach. v. Vino myrtite subigito, affuso etiam plantaginis succo, & pastillos drach. marum iiii, & iiii, & ii formato: cum uiuo uero adstringenti infundito: ægri habita cura, uelut in Nymphodoti pastillo est prædictum.

Pastillus magnus, dysentericos præclare & feliciter iuuans, etiam si ex- Pastillus magnus
treme sint affecti ac desperati, utpote in quibus carnosæ & feculentæ pro-
deunt egestionēs. Infunditur autem cum succo oryzae, ita ut adeps hircinus
& myrtus cum ipso decoquatur. Cæterum in his qui retinere non possunt,
muria oliuarum albarum præmittenda, & post horæ interstitium pastillus
infundendus, stomacho & capite præmunitis, uelut in nymphodoti pastil-
lo est prædictum. anus item ab infusione fomētis integatur. Prodest etiam
ad caua ac profunda crustosâq̃ ulcera: itemq̃ nomas pudendorum. Verum
in dysentericis præstat, ut cum reliquis prædictis remedijs, manus ægri latis
& longioribus fascijs constringantur, superne ex humeris exordio facto, &
in summos usq̃ digitos ligamento protecto: non parum enim hoc ipsum ad
fluxus repressionē facit. Porro ipsius pastilli compositio hoc modo habet.

Balaustiorum recentium, mali corij, rhois quo coria tinguntur, phyllo-
rum, singulorum drach. iiii, isatidis tinctoriæ drach. iiii, aliq̃ drach. vi ha-
bent, spinæ ægyptiæ drach. iiii, seminis hyoscyami drach. iiii, farinæ lentium
drach. viii, suberis ex uase uini ueteri accepti ac usti drach. iiii, gallæ ompha-
cinæ a teredinibus non corrosæ drach. iiii, rosarum siccarum drach. vi, flo-
ris recentis rosarum drach. vi, croci drach. iiii, myrtiæ drach. viii, lycij
drach. viii, bituminis drach. vi, picis sicæ drach. v, acaciæ drach. viii, hy-
pocisthidis drach. viii, gummi drach. xxxii, thuris masculi drach. viii,
omphacij succi sicci drach. iiii, opij drach. ii, amyli drach. ii, solcarum uete-
rum ustorum drach. iiii, cornu cerui usti drach. iiii, ofsiculorum oliuarum
ustorum, ofsiculorum palmarum ustorum, fecis uini ustæ, spongiarum no-
uarum liquida pice & cedria imbutarum ac ustarum, ostreorum ustorum,
æris usti, squamæ æris, singulorum drach. iiii, lapidis gagatæ, coralli, rubigi-
nis ferri, aut scoræ, cuiusq̃ drach. iiii, aluminis scissilis in testa exusti drach.
ii, aluminis quo tinctorum coriorum utuntur drach. ii, auripigmenti drach.

iii, chal-

III, chalcitidis crudæ drach. III, sandarachæ drach. III, gypsi loti drach. III, calcis uiuæ drach. III, minij sinopici sesquidrachmam, atramenti communis drach. II & dimidiam, spumæ argenti drach. II & dimidiam, ochræ drach. II & dimidiam, atramenti indici drach. II & dimidiam, plumbi drach. III, cerusæ sesquidrach. terræ samitæ drach. III, terræ cimolizæ drach. II, pompholygis drach. II, succi mandragoræ & plantaginis quantum

Rebus LV cō
stitui pastillū
magnum

ad hæc suffecerit. Compositio quidem igitur pastilli hæc est, in qua totus ille simplicium pharmacorum cumulus, ex quinquaginta quinque rebus constat, præter herbarum ex aqua decoctionē, quæ ad huius pastilli subactio- nem accommodatur. Cæterum apparandi modus huiusmodi est. In pi- lam thebaicam primum as, & aris squamam, & spumam argenti, calcem, la- pidem gagaten, corallium, rubiginem ferri conijcto: ostrea etiam cōtusa & cribrata probe & contente terantur, donec in puluillum redigantur: deinde adiecta chalcitide, sandaracha, auripigmento, cornu ceruino, oliuarumq; ac palmarum ofsiculis, spongiæq; & alumine, rursus terito, affusis etiam spissa-
mentis, quæ stymmata Græci appellant. Alumen autem hoc modo uritur. Alumen in ollulam nouam coniectam super prunas ponito, & ubi diffun- ditur ac liquefit tollito, & frigesieri sinito, & hoc modo tritum adijcto. His deinde tritis, minium, diphryges, atramentū indicum & commune, ochran, plumbum, terram samiam, cimoliā, cerusam, pompholygem, reliquaq; om- nia metallica addito, & contēuissime sub caniculæ æstu conterito, donec ex spissamentis quartam aut quintam addideris partem. Postquam uero quo- dam modo ad collyrij formam fuerit redactum, arida cōtusa & arctissimo cribro excussa adijcto, ueteribus soleis simul cum aridis contulis: deinde ad ditis spissamenti rursus similiter ut priora terito, sape instillatis spissamen- tis. Vbi autem trita inaruerint, in altero mortario primum trocum cum duo- bus succis, mandragoræ uidelicet & plantaginis, terito: atq; ubi tritum fue- rit, reliqua adijcto, myrrham salicet & thus, omphacium, acaciam, hypoci- sthidem, gummi, lycium, opium, picem, bitumen, & lentium farinam, quod- libet eorum prius per se aridum in tenuissimum pulcrem redactum. Cæte- rum ubi optime in mortario fuerint trita, duobus succis large affusis, quo etiam ad aliorum exceptionem sufficiant: de cætero iam ante trita metallica sic arida terito ac admisceto: omnibusq; probe permixtis ac subactis, pastil- los ad duarum magnarum fabarum magnitudinem formato, & utitor ali- quando quidem cum oryæ succo, aliquādo uero cum uino, aut aliquo con- ueniente liquore. Ego uero ob mādragoræ uiridis succi inopiam, aridi succi drach. IIII addo. Porro spissamenta cum quibus pastillum cōteris, hoc mo- do apparato. Rubi, myrri, florum mali punici, radices symphyti, radices cap- paris, foliorum salicis, comæ cupressi, omnium æquales partes cum aqua co- quito, & uritor. In his ipsis uero spissamentis, aut etiam alijs, spongiam aut glomos rigato, cumq; eis sedem foueto, afsidue quidem, maxime uero à pa- stilli infusione.

Spissamenta,
stymmata

Siccum dysentericum.

Terræ lemnix quæ sphragis appellatur, terræ asteris, amyli, gummi, thuris, æquales partes omniū in puluillum redactas, cochlearij mensura infundito, spissamentis etiam quibusdam adiectis. Indus autem medicus hoc nititur. Terræ lemnix quæ sphragis, buccinorū ustorum, thuris, singulorum æquales partes commisce, indeq; cochlearia duo cum lotini corticis decocto, aut pinus, aut mespili, infundito.

Indus medicus

Quæ dysentericis subdantur. Glans, quæ dysentericis subditur Theosebii.

Theosebii medicus

Opij drach. x. i, myrrhæ, castorij, croci, thuris, hypocisthidis, cuiusq; drachmas sex, styracis drachmas tres, uino excipito.

Alia glans, siue collyrium.

Opij, croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum æquale pondus cum uino ueteri subige, & collyria drachmæ unius pondere informa, ex quorum usu & subditiōe diuinam efficaciam admiraberis. Optime facit & ad dysentericos opobalsamum tomento exceptum & subditum.

Spissamenta, quæ dysentericis cataplasmatibus uice imponuntur.

Florum mali punici, gallarum, mali corij, myrti siccæ, lentisci, mannæ, acaciæ siccæ, æquales omnium partes in puluerem redigito: quem siccum adseruato ac utitor, ita ut usu expetente cum uino decoctum imponas: magis uero mitigatorium fiet, si sapa pro uino accipiat.

Illitio, ad cœliacos & dysentericos.

Acaciæ quadrantem, gallæ, cœnanthes, mali corij, balaustiorum, aloes, succi hypocisthidis, mastiches, aluminis rotundi, omphacij, singulorum unciam unam, cum uino subigito, ac formato pastillos: quibus cum uino aut succo aliquo conuenienti utaris.

Epithemata dysenterica.

Caput I.

Epithema dysentericis commodum Marciani. Mala cotonea repurgata decem, in uino decoquito, diligenterq; terito, ac tritis aloes unciam i, mannæ sextantem, myrrhæ siccæ tritæ quadrantem infarcito, deinde ceræ sextantem, unguenti nardini libram unam addito. Ceratum ipsum liquefacerito, & refrigerato, tritisq; adijcito, ac utitor.

Epithema Marciani

Epithema ex cœnanthe, Philumeni, stomachicis, & cœliacis dysentericisq; in principijs commodum.

Oenanthæ siccæ drac. x. x. v. iiii, gallæ, acaciæ, rosarum siccarum, omphacij, singulorum unc. i, aluminis rotundi sextantem, aloes sextantem, rhois syriaci trientem, olei myrtæ lib. i, ceræ lib. i, picis lib. i. Quidam uero singulorum libras ii accipiunt. Arida uino ueteri adstringente rigato, deinde liquefabilia adijcito, ac simul emollita excipito. Efficaciter auxiliatur ad interaneorū fluxiones, & stomachi fastidia ac exolutiones, & ardores.

Aliud, per multam experientiam.

Rosarum, cœnanthes, acaciæ, gallæ, aluminis scissilis, singulorū quadrantem,

i 2 aloes

aloes sexuncem, rhois culinarij lib. i. ceræ, picis, olei myrtei, cuiusq; libram i, uini quantum sufficit.

Epithema ex lixiuio.

Ammoniacy thymiamatis, nardi celtici, croci, cardamomi, bdelli, cypetorū, singulorum unc. i, lixiuij ex cinere lignorum uitis sesquiunciam, ceræ quadrantem, unguenti nardini sexuncem, uini quantum suffecerit. Apparatut autem & hoc modo. Croci unc. i, aloes quadrantem, styrcis quadrantem, ceræ sextantem, lixiuij ex cinere lignorum uitis, unguenti nardini, cuiusq; unc. xii, uini quod satis est. Illud superius apparauit: & præ cœnāthes inopia, solia uitis conieci, in æstate quidem uiridia, in hyeme uero eiusdem uirgulta, reliquis siccis, contusis & cribratis.

Epithema, clidion appellatum: Cyrilli.

Acaciæ, gallarum, thuris, aluminis scissilis, aloes, rhois culinarij, hypocisthidis, myrrhæ, balustiorum, cœnāthes, rosarum, siccarum, singulorum unc. i, ceræ dodrantem, picis, olei myrtei, cuiusq; dodrantem, uini spathitæ quantum satis est.

Ex libris Philumeni, epithema Mnasetæ, clidion appellatum, ad cœliacos & dysentericos.

Gallæ omphacinæ, succi hypocisthidis, aluminis rotūdi, acaciæ, rhois rubri, malicorij aridi, seminis apij, singulorum unc. i, uisci quercini drach. iiii, ammoniaci thymiamatis drach. iiii, picis siccæ drach. xx, ceræ drac. vii, olei myrtei aut lentiscini drach. xx. gallas & malicorium contusa ac cribrata in uini cyathis i x decoquito, assidue agitando, donec tertia pars relinquatur: deinde in mortarium coniecta terito, ac reliqua similiter in puluerem redacta inspergito: ammoniacū uero aceto diluito, & uiscum cum modico oleo emollito, pici uero ac ceræ liquefactis cū residuo oleo, & ab igne ablatis, uiscum adijcito, ac unito, & simul tritis affundito, fortiterq; cōtūdito, ac utitor,

Andromachi epithema, ad dysentericos & cœliacos.

Seminis hyoscyami albi, seminis apij, cuiusq; drach. iiii, anisi, floris rosarū, succi hypocisthidis, balustij, rhois rubri, cuiusq; drach. ii, opij drach. i, croci drach. i, contere, ac uino myrtite excipe, informaq; pastillos, quos in umbra siccabis: usus uero tempore, ex eis quantum suffecerit contundes ac cribrabis, & subiges, linteoloq; infartum uentri impones.

Dropaccæ. Dropax ex tertio libro placitorum Sorani.

Sorani libri
de placitis

Resinæ lib. i, picis siccæ lib. i, nitri, bituminis, sulphuris uiui, cuiusq; libras ii, pyretri lib. i, uetratri sextantem, olei heminam i. Si uero efficacius reddere uelis, adijce & piperis trientem, adarcæ sextantem, staphidis syluestris sextantem. Alius dropax. Picis sexuncem, resinæ pinus tortefactæ sexuncem, zingiberis, sulphuris uiui, nitri, cuiusq; unc. i, pyretri quadrantem, adarcæ unc. i, euphorbij sextantem, aliq; drach. ii tantum habent, adipis taurini sexuncem. Utendum aut & ad hæc rubefacientibus cutem, phœnigmis à Græcis appellatis, itemq; sinapismis, in tertio sermone descriptis, in declinatione præsertim dysentericæ, quo totum malum penitus destruatut.

Phœnigmi
rubefacienter
cutem

De lien

De lienteria, seu intestinorum leuore.

Cap. 11

Lienteria quemadmodum ipsum nomen indicat, leuor quipsiam intesti-
norum est, qualis etiam forinsecus in corporis cuticula, ex cicatrice con-
tingere solet. Oboritur autem frequenter, dysenteria magna præcedente, &
ex profunda ulceratione, cicatrice densa & leui succedente: quæ deinde ob
densitatē quidem suam, ciborum per corpus digestionem fieri non permit-
tit, quum sanè uenarum ora sint ueluti obturata: uenarum inquam, quæ ali-
mentum ex intestinis ad se auellunt. Ob leuorem uero, cibum statim prius
quàm permutationem & perfectam concoctionē admittat, dilabi finit. Cæ-
terum lienteria ipsa proprie ex permutantis cibos ac digerētis facultatis der-
bilitate contingit: cuius signum est, quod cibi crudi & nihil immutati exceri-
nuntur: quæ ratio & ex hoc amplius corroboratur, quod nō solum à dysen-
teria hæc affectio oboritur, sed & post frequētia uoluulosa tormina, & post
longum profluuium uentris: aliquādo etiam aqua inter cutem per uentrem
euacuata, lienteria consequi solet. Ex quacūq; igitur causā lienteria orta sit,
ægrī cibum nō sentiunt, & malum corporis habitum acquirūt, quod utrūq;
malum incorrigibile existit. Succedit enim ægris assidua excretio cruda, co-
lore subalbida, inæqualis, & aquosissima, citra sanguinis ac bilis cōplexum.
Adest autem simul & ardor per tota præcordia se dilatans, quem cibi fasti-
dium concomitatur. Videtur autē bonum & amicū signum in eis ructus aci-
dus esse. Indicat enim iucūdi quipsiam factum esse, & uentrem ac intestina
nō uelut inanima cibum sinere pertrāsire. Itaq; quum eiusmodi sit affectio,
facile est intelligere, quod uim retentiuā, ac concoctoriā facultatē tum uen-
tris, tum intestinorū, omni modo refocillare oportet, quod sanè per ciborū
conuenientiū exhibitionem fieri potest, perq; diætā restituēdis ac refocil-
landis uiribus aptā: & ut simpliciter loquar, eodem medicationis ductu utē-
dum est, quem ad cœliacos & dysentericos habes præscriptū. Cæterū quod
dignum indicatione hic uisum est nobis: acrium rerū comestiones frequen-
tiores eis aptæ existunt, & maxime quibus cicatricem factam esse coniecta-
mus: acrium enim rerū comestio uelut refrigerationē quandā cicatricum ope-
ratur: quin & insitum calorem reuiuificat, & concoquēdi facultatē quodam-
modo refocillat. Porro uomitus à cœna uentrem etiam in melius transmu-
tant, & actionis suæ cōmonefaciunt: frequentes quoq; dropacum admotio-
nes ad manus ac crura, thoracemq; & uentrem: itemp; rubefaciētia ex ma-
lagmatis & ex sinapi eis commodè existunt. Potiones etiam quasdam ad
dysenteriacos & cœliacos præscriptas, lientericis præpotādas exhibere con-
uenit, quale & hoc catapotium existit.

*Facultas per-
mutans ac di-
gerens cibos*

*Ructus acidus
quid designet*

*Facultas
retentiuā*

Catapotium dysentericum, maxime uero lientericis conueniens.
Malicorū, myrrhæ, cuiusq; drach. v. iiii, aluminis scissilis drach. iiii, succi hy-
pocisthidis drac. iiii, cum aqua catapotia ad erui magnitudinem ex his for-
mato, indeq; v aut vi iuxta ægrī uires exhibeto.

FINIS noni sermonis.

13

☉ AETII ANTIOCHENI MEDICI

DE DISPOSITIONIBVS IOCINORIS AC LIENIS

corundemq; affectionibus, Sermo decimus.

Iano Cornario Zuiccauiensi interprete.

QVAE in decimo sermone contineantur.

De debilitate iocinoris, & his quibus sanguis per uentrem defertur.	Caput I
De oppilatione hepatis.	Cap. II
De hepatis inflammatione.	Cap. III
De hepatis abscessu.	Cap. IIII
Cura hepatis exulcerati.	Cap. V
De hepate in scirrhum indurato.	Cap. VI
De lienis affectionibus cognoscendis: ex libris Philagri.	Cap. VII
Intemperiei splenis cura.	Cap. VIIII
De inflatione splenis.	Cap. IX
De splenis inflammatione.	Cap. X
Cura splenis in scirrhum indurati.	Cap. XI
De splenicorum uisione.	Cap. XII
Splenicorum diæta.	Cap. XIII
Cura eorum in quibus splen frigida, uenter uero calida affectione laborat.	Cap. XIIIII
Cura splenicorum quos tussis infestat.	Cap. XV
Cura eorum quibus splen in magnitudinem excreuit, si multus durus est.	Cap. XVI
De ictero, seu morbo arquato.	Cap. XVII
Cura arquati.	Cap. XVIII
De malo corporis habitus.	Cap. XIX
De hydropis siue aqua inter cutem.	Cap. XX
Ascite ac tympanitæ hydropis cura.	Cap. XXI
Epithemata hydropica.	Cap. XXII
Malagmata quæ euacuant humorem.	Cap. XXIII
Epithemata quæ post euacuatos humores adhibita, pro glutino sunt.	Cap. XXIIII
Aquam ducentia remedia hydropicis ualde commoda.	Cap. XXV
Quæ ad ciendam urinam hydropicis bibuntur.	Cap. XXVI
Cura post euacuationes.	Cap. XXVII
Cura hydropis qui proprie subtercus appellatur.	Cap. XXVIII
Cataplasmata ex libris Asclepiadæ.	Cap. XXIX
Chirurgia hydropis subter cutem.	Cap. XXX
Reliqua prædictorum cura.	Cap. XXXI
Communis diæta omnium hydropicorum.	Cap. XXXII

P I N I S.

De debilitate iocinoris, & his quibus sanguis per
uentrem deferatur: Galeni. Caput 1



Intemperies quidem causæ sunt, ex quibus iocinoris debilitas produciatur, dispositiones autē diuersas in ipso faciūt. quum enim circa inflammationē aut scirrhū circa hepar, propter solam debilitatē, sanguinis effluxio cōtingit: tunc sanē proprie hepaticos ipsos ægros appellant, quemadmodū celiacos & stomachicos uocare, cōsueuerunt, eos qui neq; inflammationē, neq; aliquem alium præter naturā tumorem in uiscerib; habent. Calidæ itaq; intēperies, tum eos qui prius adfunt humores, tum etiā hos qui per uenas mesenterij ad ipsū hepar deferuntur, adassant ac comburant. Frigidæ uero intemperies, pituitosum & crudū humorem, qui iam in ipso continetur, crassum & lentum ægreq; mobilem reddunt: eum uero qui deferitur, semicoctū. Cæterū sicca intemperies, sicciores & densiores humores facit. Humida autē tenuiores & magis aquosos. Itaq; ubi calida intemperies circa hepar cōstiterit, colliquationes fiunt, primū quidem humorū, deinde etiā carnosæ ipsius hepatis substantiæ, bilisc; per uentrem euacuatur: fœtēs ac crassæ, abūdeq; coloratæ, uelut in pestilentib; febrib; fieri solet. Vbi uero frigida intēperies affuerit, neq; alsidux excretiōes, neq; multæ fiunt. Diurnū autē fit malum, & per dies aliquot acutatum eis profuerit: uetēs cæterū egesta non similē putorē habent his quæ per calorē sunt colliquata, neq; colorem etiā, neq; compagē: sed speciem præ se ferūt sanguinis putrefacti & in grumos congelati: & si quis diligenter inspiciat, uelut limus & fex sunt sanguinis crassioris. consimilia enim atræ bili colore apparent: quin & plures & iudicatu difficiles colores iuxta eandē dispositionē in excrementis apparēt. In sicciorē autē intēperie, recrementa adhuc sicciora uidebuntur, ægric; magis sitient. In humida uero, humidiora & plura erūt recrementa, sitisc; minus infestat. Quādocūq; igitur egesta uideris loturę carnis recens mactati animalis similia, uelut si quis cū aqua sanguinē confudisset, certissimū signū debilitatis ipsius hepatis habebis: eodē modo si uelut fecē sanguinis cōspexeris per sedem excretā, hepaticū & hocce signum esse scito. Si igitur sanguis tenuis & serosus destillat, ægri uisceris signum iudicato: si uero uelut fex fuerit, supercalefacti & sanguinem superassantis. incipit enim aliquando etiā circa febrem in frigida scilicet intemperie ipsa adfectio, quo tempore tenue sanguinis serum primū excernitur: temporis autē progressu, corrupto circa uiscus sanguine, leues febres accedūt: quān̄ quum in experti medici negligētes sint, atq; ægrū omnino febri carere putāt, quū nihil p̄ uentrem excretū sit, ipsum ægrū lauāt, cōcedūtq; negligētiori diætā uti, atq; ita uenter rursus corruptū sanguinē excernit. In huiusmodi igit̄ affectionib; primus curatiōis scopus sit, ut intēperie ad cōtrariū deducamus. Calidā enim dispositionē semp refrigerare oportet, frigidā uero calefacere, similiterq; humidā

Hepatici qui

Vene mesenteria alimentum ad hepar deferunt.

Hepatis colliquatio

reficcare, & siccam humectare. Cæterum omnibus hepaticis remedijs, tum quæ per os sumuntur, tum quæ forinsecus imponuntur, aliquid ex adstringentibus ammiscere oportet, quo firmitas uiscerum conseruetur. Atqui in sto machicis idem facere non similiter conducit, quum in ipsis adstrictoria qualitas alijs domineatur. Fomenta igitur in hepatis debilitate conuenientia ex oleo fiunt, in calida quidem affectione, ex chamæmelino, rosaceo, & lentiscino, absinthio aut palmis aut aliquo alio consimili in oleo decoctis. In frigida uero dispositione, ex unguento nardino, cui thus & sâmfucus sint infarsa. In humida autem intemperie, hysdem oleis magis discutientia ac resiccantia incoquenda: uelut est iris, cuminum, ac ruta. In sicca demum intemperie, balnea sufficiunt dulcium aquarum, & humectans diæta commoda erit: cerata etiam atq; epithemata fomentis similia sint, ex palmis scilicet, malis cotoneis, styrace, mastiche, ac aloë: in frigidioribus etiã polyarchia cõducunt, similiterq; in humidioribus. Porro in potu uti cõueniet plerisq; eorum quæ in hepatis inflammatione sunt relata, siquidem calida intemperies fuerit: uelut est seridis ac intybi succus: senecionis succus aut decoctum, perdicij succus, mel rosarum, & quæ his similia existunt: quin & Philonis antidotus semel tantum exhibita, omnem aliquando calidam hepatis intemperiem mirabiliter sanauit, quod etiam Philo de ea testatum reliquit. Vbi uero frigida in hepate intemperies fuerit, calefacientibus ac firmitatem addentibus. utendum est, uelut est nardi spica, capnium, quæ & chelidonia herba circa sepes enata, semel pelecini, & quæ his similia existunt. Vtilissimũ & his nardinũ unguentum, quod die mane cochlearij mēsurâ ieiunis potatum, & à cœna ante somnũ eodem modo. In humida aut intemperie, simpliciora ex eis quæ ab oppilatione liberant, exhibenda, & quæ à proprietate totius substantiæ efficacia existunt: uelut est, lupinũ hepatis, quod sanè diligenter tritum drachmę unius pondere cum uino dulci aqua calida diluto præbetur. Hoc enim multiplici experimēto cognitum omnib. hepatis intemperieb. commodũ existit: utpote proprietate totius substantiæ hanc efficaciam habens, non calefaciendo, aut refrigerando.

De oppilatione hepatis, in quibus plurima remedia. Cap. 11

A Flatibus nebulosis & concoctu difficilibus: aliquando aut & à crassis humoribus uiscosisq; in sinibus uenarum ex sima hepatis parte enatarum, per quas ex uentre ac intestinis alimēti digestio ad hepar contingit, oppilationes fiunt. Cõsequitur autem ad ipsas, grauitatis circa dextrũ ilium cum dolore sensus, aliquando quidẽ obtusẽ, aliquando uero uehementis, & quandoq; quidem absq; febre, quãdoq; cum febre. Crassa enim & uiscosa ac multa, omnino amplius reliquis oppilant, & maxime si ægri à cibo uehementiori motu utantur: si uero acra sint & multa quæ in cibo sumuntur, dolor ex oppilatione uehemētiõr sit, quũ obturata corpora simul & tensionẽ perferant, simulq; pungantur. Cæterũ quũ uaporoſi & crassi flatus multitudo coaceruetur, quæ exitum non habet, nõ grauitatis solum, sed & distentionis sensus

Epithemata
polyarchia

est pariter
philonis antidotus effrago.

Capnium esse
chelidonium

Vena sima
hepatis
paris

Tensus oboritur. Quare attenuantium & oppilationem dissoluētium quā
celerrimus requiritur usus: oppilatio enim inueterata non tātum in hepate,
sed in omni membro putrefactionē operatur, febremq; accendit. Præclate
autem & citra molestiam ab oppilatione liberat, simulq; firmitatē tum he-
pati, tum stomacho addit, pelecini qui in frumētis nascitur semen, tritum co-
chlearij mensura, cum uino aut aqua mulsā in potu acceptū. capnium item,
quod & chelidonia: nomē inuenit, succo eius expresso & defecato reponit
autem is in pastillos redactus, & semel quidem exhibitus dolorē omnem
adimit: ter autem præbitus, in totum ab affectiōe liberat, ultra hoc quod &
firmitatem uisceribus addit: decoctum quoq; huius herbe potatū similem
efficaciam habet, etiā si ualde febricitent ægri: aliquādo autem herba ipsa
exiccatur, contusaq; & cribrata cochlearij mensura exhibetur. Aliud.

Lupi hepar siccū drachmæ pondere, cum piperis granis 1 x, ac myrt hæ ma-
gnitudine fabæ, in passo calido datum, confestim auxiliatur. Aīstatis autem
tempore, alternis diebus, ter potandū præbeto. Liberat ab oppilationē etiā
cupatorium, simulq; firmitatem addit: similiter quoq; steechas, tum cocta,
tum sicca tritaq; data: plantaginis item radix, & semē, foliaq; sicca trita, siue
per se unumquodq; siue simul exhibeantur. Laui cortex tritus potatus, spi-
ca nardi, fructus pistacij, amygdalæ amaræ, anthemis siue chamæmelum,
anagallidis quæ ceruleum florem habet, succus, radices acori, eryngij, radices
dulcis decoctum urinam ciet, & aluum emollit. Radix dracūculi uiscera om-
nia repurgat, crassosq; & instar uisci tenaces attenuat humores. Filicis suc-
cus cochlearij mensura ex aqua mulsā potatus, hepar repurgat, oracq; mea-
tum ac uenarum aperit, citra manifestā calefactionē. Præscriptum autem
iam ante est de his quæ tum simas, tum gibbosas, hepatis partes ab oppila-
tione uendicant, in tertio nimirum sermone.

Catapotium hepatis oppilationem remouens.

Radices chamæpitys drach. 111, radices cichorij drach. 111, contundito, ac
melle cocto excipito, nucisq; ponticæ magnitudine præbeto: aquæ etiā
calidæ cyathos tres ab eius exhibitione absorbendos dato. Cæterum non
modo radices horum hepaticis opitulantur, sed & succus & decoctum.

Pastillus hepaticus, ex amygdalis amaris.

Seminis anisi, apij, asari, amygdalarum amararum decorticatarum, comæ
abfinthij, singulorum drach. 111, appatato, & cum aqua pastillos formati:
ex quibus drach. 1, febre carentib; cum uini diluti cyathis 111 præbeto: febrī
citantibus autem, cum aqua mulsā. Urinam ciet, & placide calefacit.

Aliud hepaticum ualde commodum.

Seminis pelecini, capnij, costi, cuiusq; drach. v, contundito ac cribrato, & co-
chleate 1 ex aqua mulsā dato. Præclare enim summouet oppilationem.

Aliud hepaticum pulchrum, cuius uilitatem ne contemnas.

Lenticulam torrefactam ac probe tritam cochlearij mensura ex uino biben-
dam præbe. Commodum est hoc & lieni, ex poscā, aut aceto mulso.

qz sumidica. habet
pōtius in gnom
uicij præbē.
Capnium,
chelidonia
appellari

Sima et gib-
bosa, hepatis
partes

Aliud, experimento constans.

Comæ absinthij, piperis, costi, calsiæ, radicis gentianæ, amygdalarum amararum, singulorum unciam unam, fœni græci sextantem, seminis pelecini sextantem. Exhibeto cochlearium quomodocunq; uelis.

Aliud, ad hepatis oppilationem.

Cacani scrupulos duos, alij octo habent, costi scrupulos sex, spicæ nardi, iridis, phylli, lupinorum siccorum, baccarum lauri, fœni græci, rhei pontici, singulorum scrupulos sex, piperis, phu, afari, cuiusq; drachmas quatuor. quod si picis sicæ scrupulos tres ammiscueris, efficacius operatur.

Aliud simplicius, quo assidue utimur, ualde admirandum.

Cacani sextantē, fœni græci sesquunciam, piperis unciam unam, cyperi unciam unam, costi unciam unam, contundito & cribrato, ac cochleariū unum cum condito præbeto. decumbat autem æger super affectam partem.

Aliud. Potamogetonis sicci drach. ii, comæ absinthij drach. i, croci, costi, spicæ nardi, cuiusq; drach. ii, amomi drach. i. datur cochlearij mensura aridum. Aliud. Piperis drach. iiii, dorcadadiis herbæ quæ & musci appellationem habet unc. i, costi trientem, alij drach. iiii. contundito, cribrato, & cochlearium in potu exhibeto. Aliud Philagrii. Rhei pontici unc. i, castorij scrupulos iiii, farinæ lupini scrupulos iiii, piperis grana v. ii. contundito, cribrato, & mane cochlearium unum præbeto ex condito.

Dorcadadias
herba quæ
est muscium

De hepatis inflammatione: & cognoscendo utrum hepar, an musculi eius sint inflammati.

Caput iiii

Galen. Hepar consimiliter ut splen & inflammatur & abscessu suppuratur, uerum raro scirrho, hoc est abscessu duro afficitur. Inflammato itaq; hepate, dextri ilij tumor consequitur, & maxime si gibbosa parte doleat, facilius per tactū cognoscitur tumor, grauitasq; coincidit ilium totum distrahens, & dolor in dextram usq; clauiculā ac scapulam pertingit, ut conuelli penitus æger uideatur: linguæ color in principio quidem rubicundior fit, postea uero denigrescit: appetitus deiectio, fastidiumq; cibi uehemens, & implacabilis sitis: uomitus quibusdam contingit bilis puræ atq; etiam uittellinæ, post autem & æruginosæ: alius autem iplis est adstricta, si sanè cum uisceris debilitate inflammatio est oborta, febris adest acuta inæqualis, quæ plerumq; ad uesperam & noctem exacerbatur: sequitur & spirandi difficultas, ruficulaq; paræ, ut plurimum sicce, per quas nihil omnino reiectatur. Aliquando autem & per bilis uomitus pauca quedam reiectantur, quæ res plerosq; decipit, qui ex pleuritide hanc educcionem fieri putauerunt. Cæterum & costæ nothæ ut plurimum condolitant, & color corporis subuertitur in arquati morbi speciem permutatus: singultus quoq; consequuntur. Accessionis autem tempore quidam delirio apprehenduntur, & acre lotium excernunt: & sanè inflammationes quæ iuxta simam epatis partem contingunt, plus fastidij, & nauſeæ, & uomitus biliosos, ac uehementē sitim indu-

cunt

nisi, legēda est uide
gal. 5. de loc. aff. cap. 7.

cont: quæ uetò in gibba parte fiunt, dolores circa respirationem intendunt, tussiculasq; irritant, clauiculamq; magis cum dolore conuellunt. Quando quidem autem musculis hepatis incumbentibus inflammatis, quidam decepti hepatis eam inflammationem esse suspicantur, necessarium fuerit distinguere inter se has affectiones. Hepate etenim inflammato, tumor secundum lineamenta rotundus, figura uidelicet ipsius hepatis, succumbit, quicq; ad corporis decubitus simul conformatur: maior enim apparet corpore ad sinistrum latus reclinato: minor autem tursus ad dextrum deuoluto: nimirum hepate sub nothas costas cedente, neq; uisui, neque tactui similiter succumbente. amplius autem in hepatis inflammatione, incumbens cuticula, naturali modo habere conspicitur: musculis autem inflammatis, cutis circumrenditur, ut si quis digitis apprehensam attrahere uelit, ea minime sequatur. Propriissime autem tactus discernet siue in alto, siue in superficie inflammatio ipsa consistat. Porro hepate inflammato, sanguinis detractionem experiri oportet à cubito, si nihil id fieri praepediat. Incidenda autem in dextro cubito uena interna, ita ut substratam arteriam obseruemus: quæ si nõ appareat, media: si uero neq; ipsa appareat, superior. Multitudinem autem extrahendi sanguinis, ex corporis reperiens qualitate, ætateq; & natura, horaq; temporis, ac regione, ampliusq; ex uiribus ægri: quæ si id ferre queant, semel quantum satis est, detrahendum: si uero non, per uices partitum. Cæterum incisionis ipsa oportune in prima & secunda die contingit: si uero urgeant dolores & adsint uires, etiam septima uenæ incisionem facimus, qua facta post modicum interuallum, simplici dysteri euacuamus, maxime si non sponte egerat aluus. Sequenti à uenæ sectione die, cucurbitæ cum scarificatione affigenda, rursumq; post unam diem cucurbita apponenda: non pauci enim à secunda earum adhibitione opem senserunt magis quàm à priore. At uero ante uenæ incisionem & post eam, fomentis utendum est ex lanis succidis oleo imbutis & impositis: conuenit & ex passo cretico fomentum cum rosa: ceo aut lentiscino aut melino aut cenanthino. Optimũ aut fomentum hocce est. Chamæmeli, anethi humidi si adest, rutæ uiridis, seminis lini, culusq; unciã 1, calicum papaueris numero x, olei sextariũ 1. semen lini contusum in lin teolo colligato, & cum alijs in cacabum cõiectum ad prunas decoquito donec uires suas distribuat: deinde olla in seruati cinere collocata, ex ea multo tempore confideter foueto. Post fomentorũ irrigationes cataplasmati uti oportet, ex semine lini & foeni græci, farinaq; hordeacea aut triticea, his uel omnib. uel uno aliquo ex eis, aut quibusdã in aqua mulla decoctis, ammiscendum etiam absinthiũ & mastiche ac melilotũ. Quod si uehementior sit ardor, etiam ea quæ astringunt sunt ammiscenda, uelut sunt mala cotonea. Oleum uero quod additur rosa: ceũ sit, aut melinũ, aut lentiscinũ. Si uero feruor adhuc persequeret, cotonea mala cum farina imponenda. Remittente aut uehementi calore ficus optimas & althææ radicẽ decoquito, & decocto corũ

*Incubet & adugetur
maior tumor apparet
in ista immo
cubito extengetur & hic in ma
culas, inflamat.*

Fomentum

semen

semen lini, farinasq; hordei, fœni græci, ac lolij infarcito. Quod si durior inflammatio succumbat, etiam chamaeleonem aut chamaepityn, aut polium, aut asarum, aut daucum, eryngijq; tum semen, tum radicem ammiscere oportet, aliquando autem & ficus cum althea decoctæ ac tritæ cataplasmati connectuntur. Cæterum calidius & magis emolliens reddideris cataplasma, si terebinthinæ, aut resinæ pinus, aut piceis quadratæ addas. Brasicæ autem crude folia cum melle trita ac imposita, omnes induratas inflammationes dissoluunt. Hinc ad cerata transeundum ex oleo cyprino aut glaucino ap- parata, altheæ radicibus simul admixtis. Utendum etiam ex palmis cerato, hepatis inflammationib; summe accommodato, maxime si stomachus per consensum simul sit affectus, & costæ coarctatæ. Habet autem hoc modo.

*Ceratum ex
palmis*

Palmas interiore medulla exempta, diligenter contundito, ac cum pari ce- rato rosaceo in mortario probe committito, ac unito, affusosq; modico oleo rosaceo imposito. Aut myrrham in uino ueteri adstringente maceratam, palmis ammisceto, & panniculo uestis detritæ excepta imposito. A ceratis ad epithemata ex styrace, & ex meliloto, & ea quæ polyarchia appellatur, & iam ante ad colicos & stomachicos descripta sunt, transeundum. Com-

*Epithema ex
styrace*

positio autem epithematis ex styrace hæc est. Styracis pinguis, carnis pal- marum, costi, mastiches, calsiæ, singulorum trientem, samuci sextatæ, croci semunciam, uux passæ semunciam, ceræ sexuncem, unguenti nardini bes- sem. Porro in inflammatione hepatis ubi magni circumstant dolores, etiam pharmaca dolorē leuantia in potu eis exhibere conuenit: ita tamen ut alsi- duum eorum usum deuitemus: simplicibus autem potionibus frequentius utendum: senecionis itaque decoctum tanquam maxime commodum, aut succi radicis dulcis obolos duos cum aqua calida exhibeto.

Aliud. Picridis seridis, aut intybi succi cyathum unum cum aquæ cali- dæ cyathis tribus præbeto, mellis etiam cochlearijs duobus affusis. Ad hoc enim quod refrigerat, ac firmitatem uisceri addit, etiam ora uenarum hepa- tis repurgat, neq; tamen frigidas intemperies magnopere lædit. Potest au- tem seridum ac intyborum substantia hepati comodare, tum si sine humo- rum, aut serosi ac uitiati sanguinis complexu, intemperies in ipso fiat, tum si humiditatis cuiuscunq; tandem adsit cum intemperie complexus: mellis ue- ro ammixtio humiditatem per urinam excludit. Quapropter etiam exicca- ta ac contusa utiliter potui insperguntur: eorum quoq; decoctum potatum magnam commoditatem præbet. Quod si nō infestet calida aliqua intem- peries, sed obturatione tantum uiscus ipsum uexetur, ex uino albo, tenui, ac uetusto, cum aliquo urinas ciente pharmaco, potata magnifice auxiliantur. Magni etiam pretij in hepatis inflammatione capnij herbæ, quæ etiā cheli- donia appellatur, succus habetur aut eius decoctum. Auxiliatur & præscri- ptus ex amygdalis amaris pastillus, nisi penitus magna caliditas adsit.

Aliud. Cochlearum terrestrium carnem optime conterito, & uini ni-

gri cyathos tres affundito, calefacito, ac bibendum præbeto. Cæterum hæc iuxta omnem suam substantiã efficaciam existunt: quale est hepar lupinum, cuius rei magnũ periculum fecimus, inquit Galenus. usus autẽ eius idem qui cochlearum existit: optime enim conteritur, & drachma una cum uino aliquo dulci præbetur. Hæc enim phatmaca omnibus hepatis intemperiebus conuenite uidentur, quum neque calidas neque frigidas intemperies lædant: febrientibus tamen lupi hepar melius ex aqua, aut seridis succo, aut aliquo consimili exhibetur.

Epithema ex styrace.

Costi unc. i, croci, thuris, aloes, ammoniaci thymiamatis, mastiches, styracis flauis, spicæ natdi, cuiusq; drach. iiii i, terebinthinæ unc. i, opobalsami drach. iiii, ceræ trientem. Vtere.

De hepatis abscessu: Archigenis.

Cap. iiii

Quod si inflammatio ad permutationem apte se habeat, hoc est, principium permutationis ad suppurationem iam suscepit, omnes prædictæ de inflammatione accessiones augebuntur: dolores (inquam) & febres, & delirium, anxietas, desperatio, cibi fastidium, & displicentia maxime ab eius acceptione. A rigoribus autem serè in totum febriles accessiones incipiunt, præsertim si ad uesperã exacerbationes fiant. Adiuuare igitur permutationem ac puris eruptionem oportet, ut quàm celerrime fiat, ne maiora inde corpora corrumpantur, per usum uidelicet cataplasmatum ex semine lini, aut hordeacea & sceni græci farina apparatorum, admixtis etiam resina, manna, pice, althææ radice, stercore columbino, stercore caprino, caticis, & quæ his similia existunt: fomentis autem utendum ex cruda hordeacea farina, & spongij decocto absinthij, abrotoni, centaureæ, similibusq; imbutis ac expressis: neque uero inconuenienter emplastra quæ puris permutationem iuuare queunt, adhibentur. Quum autem perfecta suppuratio fuerit, dolores remittent, omnesq; accessiones mitiores apparebunt: cæterum rupturæ tempore dolor rursus magis augebitur. quare etiam tunc rupturam adiuuare oportet, per cataplasmatum ad superficiem attrahentium ac subadstringentium usum, & per potiones calorificas: quales sunt quæ ex pipere & zingibere ac myrrha apparantur. Porro post eruptionem, aliquando quidem per alui, aliquando per urinas, puris transumptio contingit. Quiddam etiam per os, puris educationem factam tradiderunt: uerum periculosior alijs per os transmissio existit: id uero quod excernitur nigrum est, quam & album reperitur, quod sanè salutare iudicatur. Aliquando autem humor qui ex abscessu promanat, inter pelliculam uentrem ac intestina amplectentem, peritonæon Græcis dictam, atq; ipsa intestina colligitur: & facile sanè curatur, si quis diducta citissime cuticula humorem ipsum excludat, ea maxime parte qua tumor attollitur: aliquando autem rursus post factam isthuc collectionem, transumptio per intestina contingit. Cæterum in his quibus tumor foras prominet, sectionem obliquam supra inguen infligere

hepar lupinum.

Dolores circa
suppurationẽ
angeri

Maturantia
& rumpentia
abscessus

Dolores sup-
puratione fa-
cta remittere

Pur album
salutare

Peritonæon
pellicula uen-
tris & inter
sina ample-
ctens

s oportet

oportet, ac per eam ipsam humorem euacuare, atq; etiam ulcus ipsum eluere, & pharmaca liquifaccta injicere, donec perfecte curetur. Neque uero negligendum, quo & hepatis post factam abscessus rupturam, remedia auxilioria adhibeantur. Primum quidem igitur emplastra emollientia imponantur, deinde etiam resiccantia, quale est quod Icesium appellatur, quodq; ex salicibus constat, & quæ his similia existunt. Si itaq; per urinas puris transumptio fiat, consimilibus epithematibus utendum est circa totum ile, & iuxta pubem, & tum per cibos, tum per pharmaca urinam cientia, repurgatio eius adiuuanda. Pepones igitur in cibo eis conueniunt, & cucumeres cocti, pastinacæ & sion. Ex pharmacis uero meon, & asarum, spica, calsia, cinamomum. Sunt & composita quæ huc pertinent, quorum compositio nes paulo post dicemus. Per interualla autem etiam humores ipsos dulcorare oportet, uini scybelicæ, theriæ, ac protropi, similibumq; potu. Commoda est etiam ipsis potatio lactis. Si uero per sedem humoris transmissio contingat, epithemata quidem eiusdem materie approbamus: uerum prospiciendum est, ne aluus cohibeatur, neq; etiam amplius humectetur: nam hoc ipsum tum per cibos, tum per pharmaca, ac epithemata fieri potest. Utimur autem & ad hos infusus per clystetes, quo intestina illata cōstruemus ad quam rem ptisanæ, ac tragi, & oryzæ succi apposti existunt. Quod si tamen per os puris educatio fiat, maximam ad hoc curam adhibere oportet, ut humores prius euacuentur: deinde cibus præbendus adstringens & stomacho gratus. Utendum & uino tenui & odoro. Ventri uero epithemata ex palmis apparata, atq; ex cœnanthe, ac eis similia imponenda, de quibus in stomachicorum ac dysentericorum tractatu est prædictum.

Ad hepaticos. Phylly, careophylli, spicæ nardi, costi, piperis, lupinorum siccorum, singulorum unc. i, contundito, cribrato, ac drach. iiii præberetur cum uino. Aliud Philosophi: hepatis, inquit, abscessus discutit.

Radices graminis decoctum bis in die potatū, similiter & scæniculi radicum decoctum, & dauci. Myrrham item & picem siccam contundito ac cribrato, prætilitoq; hepatis ex oleo cyprino, inspergito, & laniam puram oleo cyprino calido imbutā superponito. uehementer prodest hoc utere confidenter.

Cura hepatis exulcerati: Archigenis.

Cap. v

COLLIQUATIO SI exulceratio ex abscessu circa hepar relinquatur, aut illic ex acerbis humoribus ac erodentibus fiat, colliquatio hæc adfectio appellata est. In his sanè uenter cruenta, & putrefacta, ac saniosa excernit: atque omnino consimilia ex hepatis ulceribus promanare solent, his quæ à mortuorum corporibus destillant: quare quidam in experti decepti, dysenteriam hanc affectionem esse putauerunt. Ructus autem foetidi consequuntur, & à ciborum acceptione grauitas præcordiorū: & pulsus eis est depressus ac densus, suntq; ægri amarulenti & iracundi: dolor circa locum fit ulcerosus, usq; ad clauiculam ipsam pertingens: multis autem unà cum uentris recrementis etiam

Dolor
ulcerosus

etiam lotium excernitur saniosum sandarachæ colore: non parum uero frequenter ea quæ in urinis continetur aquæ inter cutem significationem portendunt. Cæterum omnium periculosissima est hæc affectio, & modica omnino ægris est spes salutis: & tamen nihilo minus aggredienda est eorum cura, consimilibus remedijs, eis quæ paulo ante dicta sunt, etiam his adhibitis, epithematibusq; ex materia leniter adstringente, similibusq; fomentis. Liqueoribus autem tum qui ad fomenta, tum qui in cataplasmata adsumuntur, cortex pinus, palmaq; ac cyperi, similiaq; sunt incoquenda. proprie autem ulcera repurgat lac scissile sæpe acceptum: cui aliquando parum mellis addere non ab re est. Post repurgationem citissime ad ea quæ carne replent festinandum: præstant autem id cibi moderati & boni succi, ac gestationes: quod si molestiæ id fieri permittant, etiam exercitamenta conueniunt & uinum. Post cataplasmata uero, cerata & emplastra apta erunt, quorum sæpe in præcedentibus fecimus mentionem. Plurima præterea pharmaca quæ ulceribus conueniunt in potu sumuntur. Quale & hoc est.

*Carne
replentia*

Andromachi ad hepaticos compositio, cyphoides appellata:

quæ etiam ad omnia thoracis uitia conducit.

Vuarum passarum carnis drach. xxxv, croci drach. i, calami indiçi drach. ii, bdellij drach. ii & dimidiam, cinamomi drach. x, calsiæ drach. x, floris iunci odorati drach. ii & dimidiam, myrrhæ drach. iiii, terebinthinæ drach. iiii, scobis aspalathi drach. ii, spicæ nardi drach. iiii, mellis drach. xvi, uini dulcis quantum sufficit. Adstringit mediocriter & resiccac ac discutit serofos ac uitia tos humores, inquit Galenus, corrigit malitiam humorum, & putrefactioni se opponit, intemperies sanat, extergit ac mundos facit, aperitq; meatus, cit urinam, atq; ea propter internas ulcerationes curare consueuit, & eos qui hepatici appellantur. Sunt autem hepatici proprie, qui ob hepatis debilitatem per sedem cruenta liquidiora excernunt, quales sunt loturæ caninum animalium recens maceratorum, quos ipsos ignarum uulgus dysentericos esse putat.

*Hepatici qui
proprie
necantur*

Alia cyphoides Andromachi: facit & ad tusses, & ad liquidorum per os reiectiones.

Croci, cinamomi, myrrhæ, cuiusq; drach. i, bdellij drach. iiii, aspalathi oboles iiii, floris iunci odorati drach. iiii, calami indiçi drach. ii, calsiæ drach. i, spicæ nardi drach. i, terebinthinæ drach. xvi, mellis cyathum dimidium, uuarum passarum pinguium numero clxx carne earum optime mundata, uini ueteris adstringentis, quantum ad uvas passas, bdellium ac myrrham maceranda ac conterenda satis est. Mel autem prius despumato, in coq; resinam liquefacito, & cum reliquis committito ac utitor. aliquando quidem instar eclegmatis ad nucis ponticæ magnitudinē aut amplius exhibeto: alioquando uero aqua mulla dilutum bibendum præbeto. Inuenies & inter arteriaca remedia, ad tussientes item & phthificos pharmaca plurima his si-

milia, quibus ipsis & ad ulceratum hepar uti oportet: proderunt etiam ea quæ ad renum ac uesicæ ulcera sunt descripta.

Comes
Andreas.
Menas
chirurgus

Alia cyphoides, qua usus est comes Andreas, & Menas chirurgus. Croci drach. 1111, calami drach. vi, bdellij drach. 11 & dimidium, calsiæ scrupulos 1111, spicæ nardi sesquidrachmam, floris iunci odorati scrupulos 11 & dimidium, myrrhæ drach. 1111, terebinthinæ drac. 1111, aspalathi scrupulum unum, mellis sextantem, carnis uuarum passarum quadrantem, uini quantum ad hæc satis erit.

De hepate in scirrhum indurato: Galeni. Cap. vi

Scirrhus
hepatis

Non solum à prædictis affectionibus apprehenditur hepar, sed & in scirrhum induratur, inflammatione uidelicet præcedente. Manifestiorem autem cognitionem hepar induratum ex hoc habet, quod tumor circa ipsum scirrhum multo durior quam in inflammatione existit, multo etiam minore dolore uexatur. In huiusmodi quoque dispositionibus corporis scula hepatis insita attenuantur. Ceterum temporis progressu, maiore tumore circa scirrhum facto, difficulter eius cognitio per tactum cognoscitur, propterea quod iam aquæ inter cutem suffusio sit consecuta: unde his qui negligentius notas perscrutantur, tumor ad tactum laxus succumbit: color autem uniuersi corporis in nigredinem pallore permixtum commutatur, uenter & pedes intumescunt, supernæ corporis partes gracilescent, & corpus ipsum tepescit: aliquando autem aluius multa & tenuia excernit: urinæ uero à principio quidem multæ, uerum ubi iam ad aquam inter cutem dilapsi sint, omnino paucæ. Porro incipientem hepatis scirrhum sæpe curauimus ipsi: eum uero qui temporis diuturnitate est extensus, neque ipse curauimus, neque aliū quæpiam qui curare eum posset uidi: in totum enim sic adfectis aqua inter cutem accedit, & in longiori tempore corrumpuntur. Itaque ad prædicta de inflammatione cataplasmata & fomenta, fortiora quædā (inquit Archigenes) sunt annectenda. Constant autem ea quæ inflammatis adhibentur ex absinthij coma, nardo, cum indica, cum celtica, croco, cenanthe, unguento nardino, lentiscino, & mastichino. His igitur althææ radicem ammiscere oportet, & stercus caprinum, ammoniacum, thymiam, bdellium, medullas, & adipem: hæc enim incipientem in hepate scirrhum, conuenienti simul adhibita dicta, sæpe curauerunt. Post fomenta autem & cataplasmata, cucurbitæ hepatis affigendæ cum scarificatione, & emplastra adhibenda: primum quidem simpliciora, uelut est Mnaseæ, & quod ex succis constat, deinde etiam fortiora, uelut est melinum Scapionis, & quæ huic similia existunt. Post emplastra malagmaris utendum, ex baccis lauri, aut eo quod polyarchion appellatur, & similibus, quorum aliqua in colicis præscripta sunt: aliqua uero in splenicis & arthriticis referentur. Quod si neque sic proficias, hirudines admoûdæ: plurimum enim momenti habet ad curationem, sanguis earum suctu extractus. Commodus est eis & dropax & sinapisimus: si uero neque hoc modo res succedat

succedat, uſtio per frequentia interualla adhibeatur: ita ut aut per ferrum, aut per pharmacum cruſte inſigantur, & poſt earum caſum, ulcera multo tempore fluere ſinamus. conferunt etiam potiones conuenientiũ phar-
 matorum, uelut eſt zopyrios ad colicos præſcripta, & quæ eupatorium habet
 admixtum. Complectuntur & urinam cientes antidoti aliquam in ſe com-
 imoditatem: uelut eſt quæ Beſtiana uocatur. Scirrho enim induratae particu-
 le, ob craſſos & uiſculos humores in ſolidis corporibus imbibitos, neceſſa-
 rio frigida habent diſpoſitionem, quare & calefacientibus ſimul & tenuiũ
 partium pharmacis opus habent: uerum hiſ, quemadmodum dictum eſt,
 emollientia ſunt præmittenda. Si enim uehementer calida, antequam ſcir-
 rho indurata corpora præmolleſcant, exhibeantur, ſtatim quidem mani-
 ſtam diminutionem feciſſe apparet, uerum immedicabile ſit quod relinqui-
 tur, utpote nimium reſiccatum. Quapropter facile eſt coniectare in hepatis
 ſcirrho neceſſariam eſſe emollientium admixtionem. Simplicia igitur quæ
 ad hepar induratum bibuntur ſunt: anagallidis quæ ceruleum florem habet
 ſuccus exiccatus, itemq; liquidus ex aqua mulſa, in moderatis autem febri-
 bus, ex aceto mulſo: & ſcillæ aſſatæ medullæ oboli tres, ſeminis iunonis torreo-
 facti drach. i, radix eupatorii, radix dracunculi, cortex radicis lauri.

*Beſtiana
antidotus*

*Incurabile ſit
ri quod à ſcir-
rho relinquitur*

ſuile aſſatæ medulla

Aliud, quo Aegyptius curatus eſt, quum iam aquam
 inter cutem incidere promptus eſſet.

Herbæ ſabinæ, picis ſiccæ quæ in fundo doliorum uini reperitur, eorũ præ-
 fertim in quibus uinum dulce uetustatem eſt adeptum, utriuſque æquales
 partes ſingulatim contundito & cribrato, atq; ex ambobus pariter cochlea-
 rijs meſuram cum uino diluto præbeto. Aliud. Croci, ſpicæ nardi,
 caſſiæ, cuiuſq; drac. ii, coſti, floris iunci odorati, cinamomi, myrrhæ ſtactes,
 cuiuſq; drach. i, mellis deſpumati drachm. xxv. Ex hoc drach. i cum uino
 mulſo præbe. Optimum eſt hoc pharmacum in incipientibus duris ſcirrhi
 diſpoſitionibus, cuius rei plurimum periculum feci.

Aliud, ad omnes inueteratas hepatis affe-
 ctiones, atq; ipſum etiam ſcirrhum.

Picis ſiccæ, coſti, piperis, æquales partes contundito & cribrato, & ex ciſ co-
 chlearium præbeto. Aliud. Myrrham troglodyticen optimam, &
 piper, pari pondere tundito: indeq; ſcrupulum unum cum uino meraco ue-
 teri calefacto, ad dies tres aut quinq; exhibeto.

Oribasij ad hepaticos. Glaucij drach. iiii, aloes drach. ii. hæc arida
 conterito, & cochlearij meſura ſtatim à balineo exhibeto: febre carentibus
 cum uino diluto, febrientibus autem cum aqua mulſa.

Aliud Oribasij, ad diuturnas hepatis affectiones, & cir-
 ca ſima ipſius diſpoſitiones, in quibus tum ſtomachus
 tum uenter ſimul affecti ſunt.

Comæ pinus uiridis decoctum ad tertias reductum, cyathorum trium aut

ſ ; quatuor

quatuor mensura præbe. Quin & sicæ comæ drachma una in potu exhibi-
ta, simili efficacia præstat. Verum ad multos hæc exhibenda sunt dies.

Aliud, Oribasij.

Chamaepityos, petroselini, cuiusque drach. octo, baccarum lauri, piperis, co-
sti, singulorum drach. quatuor, cyperi, fœni græci, cuiusque drach. ii. præbe
cochlearium ex aqua mulsa. Aliud. Anisi, gentianæ, amygdalarum
amararum, absinthij, æquas portiones permisce: indeq; cochlearium ex
calida præbe. Aliud. Thuris unc. i, ammi, acori, cuiusq; drach. iiii.
præbe cochlearium ex aqua mulsa.

Oribasij antidotus hepatica.

Cassie drach. octo, aloes, costi, corticis pinus, cuiusque drach. quatuor, gly-
cyrrhizes sicæ drach. octo, spice nardi, croci, anisi, hyssopi, rhei pontici, cu-
iusque drachm. ii, mellis sesquibram. Mel decoque ac reliqua eo excipe, &
nucis auellanæ magnitudine præbe.

Aliud Oribasij, ad hepaticos, ictericos, sple-
nicos, & præcordia eleuata.

Croci drach. x, floris iunci odorati drach. iiii, cassie drach. ii, spice nardi
drach. octo, myrrhæ, cinamomi, costi, cuiusq; drachm. i, mellis costi quan-
tum his excipiendis sufficit. Præbe ad fabæ ægyptiæ magnitudinem cum
uini mulsi cyathis iiii. Facit & ad thoracis dolores, atq; eos qui plumbeum
colorem habent. Aliud hepaticum pulchrum.

Seminis pelecini, capni herbe, costi, æquale pondus contundito ac cribrato,
& drachmam unam ex aqua mulsa præbeto. Aliud. Fœni græci unc.
i, trixaginis sextantem & unciam dimidiam, costi albi quincuncem, petrose-
lini quincuncem, eupatorii quincuncem, mellis despumati quantum satis est.
Datur sesquidrachmæ pondere. Eius utilitas experimento constat.

Aliud. Castorii, costi, cyperi, amomi, cuiusq; drach. vii, piperis drac-
i, petroselini drach. iiii. Datur cochlearij mensura.

Aliud, ad diurnam uexationem & duriciem.

Costi, fœni græci, piperis, foliorum rutæ uiridis, picis sicæ, æquales partes
commisce, indeq; cochlearium cum aqua mulsa aut uino præbe.

Aliud. Ammoniaci thymiamatis drach. xx xii, croci drach. iiii. Cro-
cum tundito, cribrato, & cum aqua diluito: deinde ammoniacum adijcito, si-
mulq; terito, ac in pastillos redigito. ex quibus alijs drach. i, alijs ii præbeto.

Aliud. Ammoniaci thymiamatis, costi, polij, fœni græci, æquale
pondus misceto: indeq; cochlearium sicum cum aqua mulsa dato.

Aliud. Ammoniaci in tenuissimum puluerem redacti cochlearium i,
mastiches cochlearia x, præbe ex aqua mulsa, & admiraberis. Efficax est
ad hepaticos iam desperatos.

Aliud, Aklepiadæ: quo utimur, inquit Philagrius: quod ad hepar scir-
rho induratum, atque etiam oppilatione obturatum, prospero successu ac
commodatur

commodatur, ad aquæ inter cutem quoque suffusiones incipientes, & ad alias internas affectiones, citra tussim contingentes, optime facit. Habet autem hoc modo. Radicis gentianæ, chamæpityos, marrubij, petroselinij, radicis scolopendriæ, radicis panacis, terræ lemniæ quæ sphragis appellatur, sisonis, rubiæ, seminis brassicæ, radicis cryngij, baccarum iuniperi, seminis fraxini, trixaginis, seminis dauci, dictamni, cestri siue betonicæ, singulorum drachmas octo, sellis ursi siccij, sinapis, seminis cucumeris, aristolochiæ, piperis, spicæ nardi, costi, seminis cruce, singulorum drachmas octo, hoc est omnium æquale pondus, echij, eupatorii, polij, cuiusq; similiter drachmas octo. Quidam etiam lupini hepatis, ac helenij tantundem adiecerunt, quod & nos facere solemus. Oribasius autem neq; fraxini semē, neq; betonicam, neq; trixaginem, neq; dictamnium, neq; daucum adscripsit. Mellis quātum his omnibus excipiendis sufficit. Datur ad nucis auellanæ magnitudinem cum pasci cyathis *iiii*. Pharmacum hoc experimēto cognitum est. Semen autem fraxini, arboris est ex qua fraxinea ligna quocunq; in opere apta ac operæ obedientissima cæduntur.

Epithema ex melilotis ad hepaticos.

Meliloti sextantem, croci unc. *i*, ammoniaci thymiamatis libram unam, ceræ libram unam, cerebinthinæ trientem, cyprini, aut nardini, aut gleucini uiguenti plus minus quincūcem. Ammoniacum & crocum in aceto dissolue. Porro in diætā totum situm esse existimandum est, si quidem omnis diuturnus morbus maiorem ex diætā opem sentit. Quare cibi qui facile concoquantur, eis exhibendi sunt, quicq; & incisoriā uim & repurgantem complectuntur. Neq; uero ineptæ eis acriorum rerum comestiones sunt, si per interualla, & post exercitia ac gestationes sumuntur. Cæterum pro ratione motuum & exercitorum, tum quantitatem, tum qualitatem ciborum augere oportet. Vinum eis conuenit tenue, odorum, moderata quantitate acceptum. Dulcia enim omnia nocentissima sunt hepatis affecto. Vitandum & uinum mustum, fructusq; ac bellaria omnia, præter amygdalas & pistacia: ex his enim moderate à reliquis cibis accipiendum. Vitanda etiam crassa & uiscosa edulia, atq; ea quæ difficulter concoquantur.

De lienis affectionibus cognoscendis: ex libris

Philagrij.

Caput vii

Q Vibuscunq; sub sinistro ilio dolor, aut distensio, aut grauitas, aut tumor subiacet, & dum conuertuntur, uelut aliquid ex illis locis conuellatur, imaginatio contingit, his lien affectus est. Quemadmodū autē reliqua corporis membra iuxta octo intemperierū genera affliguntur, ita & splen afficitur: uerū frequētissime frigida & humida sustinet intemperiem, ex consimili maxime diætā, atq; ex his quæ uoluptatis gratia accipiuntur, ueluti sunt crassi succi placetæ iteq; potiōes. In his igitur omnib. calor tēpore debilitat, Substantia splenis laxa & rara est, prōptissimāq; ad suscipiendū crassiorem

humorem: etenim fecem ac uelut limum sanguinis ex hepate ad sese trahit, hoc modo sanguinem repurgans, ex qua fece confecta & attenuata per maximas in ipso arterias seipsum nutrit. Signum autem certum & compendiosum intemperiei in splene, ea quæ eduntur ac bibuntur exhibent, & quæ forinfecus cuticulæ iuxta sinistrum ilium accedunt. Si enim frigida intemperies iuxta ipsum fuerit oborta, omnis cibus & potus qui efficaciter refrigerare potest, facile & manifeste splenem lædit: pallium item frigidum extrinsecus admotum, maxime si in frigida aeris constitutione amiciantur. uentus etiam & aqua frigida tum in lauando, tum alias quoque adhibita, frigidam arguit splenis intemperiem. Eam uero ipsam intemperiem omnia calida consolantur. Quod si calida fuerit splenis intemperies, à nullis quæ in cibo aut potu exhibentur, aut etiam forinfecus accedunt, dolorem perfert: & si quidem caliditas augetur non solum nihil tumori apponitur, sed & contractionem amplius sustinet, præsertim si exurens simul adsit febris. Ceterum & cibi & potus calefacientes, & quæ extrinsecus corpori calorem addunt, calidas etiam intemperies augent & exacerbant. Solatio autem sunt eis omnia refrigerantia. Si enim hi qui calidam habent dispositionem per interualla frigida potu utantur, statim splen corroboratur, & minuitur, ægrumque melius spirantem reddit: & uenter aliquando ex frigida potu flauam bilem profundit. Atqui tristitia adfectis, aut ira concitatis splen dolet, si calidam habeant intemperiem. Similiter etiam sicca intemperiei in splene signa colligere oportet, maxime quum pro magnitudine propriæ naturæ non eminet. Ea item quæ forinfecus corpori adueniunt, atque intra ipsum deuorantur si arefaciendi facultate prædita sunt, splenem exiccant, quemadmodum etiam reliqua animalis membra deficcare consueuerunt. Qui enim laboriosam uitam degit, assidueque circa marinas aquas uersatur, aut bituminosas, aut aluminosas, aut sulphurentas, quicunque pharmaca assumit hanc habentia naturam, facillime exiccatur. Porro ubi humida affectione splen fuerit detentus, atque ea amplius inualuerit, in tantum eius incrementum facit, ut etiam ventrem pertingat ac hepar. Consuevit autem humida dispositio circa ipsum consistere ab immodice humectantibus, diæta, & exercitio, aerisque & locis. Oboriri solet & his qui circa palustres regiones frequenter uersantur. Amplius autem & humidus morbus præcedens, hanc adfectionem producit: aquæ item largior potus, & holera humectandi ui prædita. Species quoque doloris una cum prædictis signis infestantem intemperiem demonstrabit. In calida enim & frigida intemperie minus dolent, aut nihil omnino, neque quicquam etiam in humida: minimum uero in sicca. At uero ex prædictis coniecturam facere licet compositarum in ipso splene intemperierum. Ferè enim in totum ubi calida intemperies fuerit intensa, sicca eam consequitur: & ad frigidam inueteratam humida conuertitur. Quandoquidem autem & humores in splenem confluentes,

tumores

*Lienis in-
crementum*

tumores producant: eorum quoque diligentem considerationem facere oportet, quales nam sint tandem, atque id non solum ex prædictis iam dispositionibus est faciendum, sed & ex his quæ iam dicuntur. Bilio enim fluore existente, uniuersum corpus calidius apparebit, etiam si non adsit febris, oculique & urinæ per bilem coloratæ: siccitatem semper accusabit æger, & de siti conqueretur ac bili os infestantibus fastidit, & uigilijs infestatur, & frigidam desiderat unâ cum hoc quod linguam subflauam habet: exacerbationes tertianæ fiunt: suntque ipsi ægri moribus iracundi, & qui præcipitater excandescant. Si uero atræ bilis sit fluore, materia, ipsius atræ bilis scilicet, color tum in lingua, tum in reliquo toto corpore apparebit: & appetentia aderit ciborum: mœstique ac subtristes ægri sunt, reliquaque atræ bilis signa eis ad sunt: exacerbationes uero quarto quoque die affligent. At uero ubi pituitosus humor in splenem deferatur, cõsimilis pituitosis aderit color, ægrique minime sitient, & cibum appetent, nisi falsa fuerit pituita: tunc enim cibum fastidiunt ægri, poculorumque magis sunt appetentes: quin & coloris cutis nitentis species, demonstrabit tibi pituitosum esse humorem: & quod singulis diebus exacerbatur. urinæ quoque pituitosæ sunt: ipsi uero ægri secundum mores pigri sunt & legnes. Quidam uero ex eis qui frigidam affectionem habent, magnum & durum splenem acquirunt, atque ubi parum saltem consue tam edendi horam fuerint transgressi, & impasti manserint, dolore afficiuntur, propterea quod neque plenum, neque firmantem, neque sustentantem ipsum habeant uentrem, quique amplius ob inediam refrigeratur, & concalescent: ne opus habet. Quod si sanguineus existat in splenem confluens humor, possibile est ipsum colorem tum iuxta linguam tum circa cutem permu-
 ri: inter appetentiam autem ciborum & fastidium medio quodam modo habent ægri: reliquisque magis languent, etiam si non parem uisceris tumorem habeant. Venæ autem uniuersi corporis, sanguine plenæ apparent, & urinæ subfulvæ.

Salsa pituita

Intempericrum splenis cura.

Cap. viii

IN uniuersum quidem igitur splenis intemperies ferè citra tumorem fiunt: eas autem tum per cibos ac potus, tum per simplicissima pharmaca ac fomentorum irrigationes, quæ intemperiei contraria sint, corrigere oportet.

Calidæ intemperiei cura.

Calidam itaque intemperiem curabis per irrigationis usum ex rosaceo, aut melino, & per simplicia ex his composita cerata. Amplius autem & per uinæ acerbæ immaturæ succum & portulacam & pampinos uitis, ac consimilia. Cibis uero & potibus utendum, quibus calida intemperies castigatio reddatur: lauacris etiam temperatarum aquarum. Quod si pharmacorum usu opus sit, rumicis acuti semen in potu exhibeatur, aut radicem aut foliorum eius decoctum: aut plantaginis, similiterque limonij, quod cynoglossum appellatur decoctum. Sunt autem hæc in posca diluta coquenda.

*Limonium ap-
pellari cyno-
glossum*

Frigidæ

Frigidae intemperiei cura.

Frigidas in splene intemperies sanant irrigationes, & unguenta, ac cerata, itemq; epithemata, quæ moderata calefaciendi facultate prædita existunt uelut est unguentum nardinum & cyprinum ac gleucinum, & cerata ex eis conflata. Poteris & epithema pentamæron appellatum, cum modica cera liquefactum adhibere. A balineis in principio abstinendū, nisi quid obstat cibi & potus moderate calefacientes exhibendi. Quod si medicamentis opus sit, cōuenit eis calaminthæ, pulegij, scordij, trifolij, uiticis, ac similibus decoctū.

Humidæ intemperiei medela.

Floris salis
us

In humida splenis intemperie optimū pharmaci habebis falis florem, siue per se solum, siue cum aliquo simplici cerato imponere uelis. Solus enim calefactus & aliqua uesica exceptus, spleni adhibetur. In epithemata quoque ammiscetur quemadmodum est prædictum. Quin & salugo, & spuma salis, cum cerato aliquo ac modico aceto permixta, commodum pharmacum erunt ad humecti splenis affectionem. Proderit & quinq; folij radix, & plantago sicca, & alumen scissile in testa exustum. Poteris etiam ex plantagininis folijs, radicibusq; quinq; folij, & spuma ac flore salis, pari uel impari modo permixtis, sufficenti affuso aceto, & pice sicca in posca liquefacta, exceptis, cera item alba, ammoniaciq; thymiamate, ac modico rosaceo ammixtis, pharmacum usui reseruare. Melius autem compositionem facies, si & salicis succum addas. hic enim cum uno aut altero ex prædictis permixtus, efficacius pharmacum reddet. Eius autem collectio facile contingit. Lachrymam enim arbor incisa emittit. Conuenientissimæ autem his sunt fricationes, quæ discutiendi facultatem habent.

Siccæ intemperiei remedia.

Siccam splenis intemperiem balineum dulcium & calidarum aquarum curat: inunctio item ex oleo dulci. Cibi citra refrigerationem humectantes, uelut est ptisanæ succus, & post eum qui ex halica est acceptus. Irrigationes sôrinsecus profunt ex rosaceo, & cerata itidem ex eo apprata.

De splenis inflatione.

Cap. ix

QUum inflatio circa splenem est, tumor loci consequitur qui imposita manu ad tactum cedit, & distensionem loci infert. Verum inflatio ipsa aut in uentre oborta ad splenem transfertur, aut in ipso adeo splene generatur. Ventosa igitur status generatio ex frigiditate membrorum ipsum producentium contingit. Quare tum uentrem, tum splenem concalcescere oportet, præsertim his quibus utrūq; membrum est affectum: atq; id tum his quæ forinsecus imponuntur, tum cibus ac pharmacis quæ intra corpus deuorantur, perficiendum est. Ventri itaq; auxiliabimur, si quidem per consensum sit affectus, diospoliticam confectionem exhibēdo, atq; etiam alias quæ huic similes existunt. Panis uero ac edulia, unumq; quod in potu sumit, ex petroselino, aniso, cumino, ac sisone, similibusq; conspergenda sunt.

Foris

Foris autem epithema ex seminibus quod paulo post referetur, imponendum. Hec enim pariter utriusque uisceri auxiliantur. Proprie autem inflationes splenis dissoluere solent, tum ea quæ iam dicta sunt, tum uicis semen torrefactum, & melanthium, serpillumque & thymus, pulegium, origanum, rutæ semen. Pelecini autem semen & stomacho gratissimum, & omnibus uisceribus aptissimum est: similiter & rheon pœticum, & scordium. Hæc enim una cum hoc quod stomachum repurgant, etiam hepati prosunt, neque stomacho molestiam inferunt. ceterum unumquodque horum & per se, & alijs commixtum exhiberi potest, in posca decoctum, aliquando autem & mel eis adijciendum. Porro quæ his fortiora sunt, ea uitare oportet in his in quibus uenter per consensum cum splene est affectus, maxime si inflatio sola infestetur: quæ enim his præstantiora sunt, spleni in scirrhum indurato conueniunt. ubi uero solus splen inflatur præter uentris læsionem, epithema ex seminibus in principio est imponendum. Postquam autem flatus crassities fuerit attenuata, ammiscenda sunt ei ea quæ noxam depellere possunt, qualia sunt epithemata ex alumine & sulphure apparata, quorum compositiones paulo post dicentur, ubi de splenis in scirrhum indutati tractabimus cura.

Epithema ex seminibus: Asclepiadæ.

Epithema quod Asclepiades ex seminibus composuit, hoc est, quod ad aquam inter cutem prospere accommodatum pharmacum existit, & ad omnem inflationem conducit. Cardamomi, meliloti, herbe sabinae, baccarum lauri, nardi celtici, samfuci, iridis, radices panacis, radices cyperi, nitri, calsie, fœni græci, seminis apri, anisi, thuris, singulorum drac. xxv, styracis quadrantem, myrrhæ quadrantem, terebinthinæ libras ii, cereæ lib. ii, ammoniaci thymiamatis lib. i, mellis optimi lib. i, olei cyprini lib. i, uini quantum satis est. Facit & ad stomachi & splenis inflationes, itemque hepatis: estque omnino pharmacum magnæ æstimationis.

De splenis inflammatione.

Cap. x

IN splenis inflammatione uenæ incisio adhibeatur, si nihil id fieri ueteri uenter etiam per clysterem assidue eluatur, & maxime si uenæ incidenda medela relinquatur. Quocumque autem tempore siue per uenam incisam siue per clysterem euacuamus, semper aliquid adstringendi facultate præditum spleni imponemus, in principio præsertim, quum differimus euacuationem: quo id quod influit reprimatur, & quod influxione sua præuenit, à loco depellatur. atque & ad splenis firmitatem conseruandam utilis adstringentium sylua existit: quæ quidem robusta sint, ubi floris impetus fortis contingit: moderata uero, ubi mediocris. Cognosces autem irruentis humoris magnitudinem, ex magnitudine & uelocitate generationis ipsius inflammationis. Itaque si moderata fuerit inflammatio splenis, uinum uetus ac austerum tenuioremque partium oleo dulci permixtum & lana succida excerptum imponemus. Si uero maior sit caliditas, rosaceum sit oleum, aut lentiscinum

*Adstringens
est splenis
commodus*

tiscinum: quæ si non adsint, oliuæ folia, aut rubi, aut mali arboris in oleo decoquantur, atque ipsa etiam mala in decoctione etiam quædam tenuium partium addantur, uelut est absinthium & pulegium. Quod si forti impetu fluxus feratur, acetum pro uino affundendum est. Post irrigationes ad cataplasmata transeundum. In quorum compositionem hordeacea & loliacea farina assumatur, cum posca & mellis ac olei paucissima omnino mensura, in quibus absinthium ac pulegium sint decocta: aliquando & myrobalani infarciendi. Optimum & hoc est. Hordeaceam farinam & salicis folia cum aceto imposito, adipe caprino in aceto colliquato: uerum melius redditur cataplasma si caricæ adijciantur. Optimum autem est & ex lini semine cataplasma, maxime ubi affuerit dolor. Accipitur autem seminis lini pars una, farinæ loliacæ pars una, adipis taurini in aceto & sapa liquefacti, cuius deinde oleum cyprinum sit affusum, quantum his subigendis satis est. Cæterum cauendum ne locus post irrigationes & cataplasmata denudetur, sed ubi hæc fuerint ablata, mox ceratum ex cyprino aut nardino unguento imponatur. Commodum est autem feruentibus inflammationibus Niliæ aut Nili epithema, cum cerato chamæmelino & aceto emollitum: idoneum est etiam Philagrii stomachicum epithema: sunt autem ea integra ad stomachicos descripta. utimur autem aliquando, ob cataplasmatum penuriam, ad splenem inflammatum, fursibus in uino, aut posca & oleo decoctis: quibus etiam absinthium & pulegium aut thymum aut origanum aut lauri folia aut artemisiā, & reliqua incidendi ac attenuandi ui prædita adijcimus: non feruente uidelicet inflammatione, & corpore præeuaçuato. Si enim corpore non euacuato, quis calidioribus utatur, ipse sibi scirrhi autor fiet. Quod si ad permutationem in suppurationē ipsa splenis inflammatio reparatur, quod tamen raro contingit, adiuuare eam oportet: ne plura corpora putrescant, per cataplasmata uidelicet quæ pus producant: de quibus in hepatis abscessu manifeste est prædictum: hepar enim frequentissime abscessum perfert ac exulceratur. Quare ex his quæ de hepate diximus, ad splenis curationem exempla transsumes.

Cura splenis in scirrhum indurati: Galeni.

Cap. xxi

Vena splenis
nitida

Am antea prædictum est splenem quàm celerrime solere in scirrhum indurari, sanguine circa splenitides in ipso uenas obturato, ut neque excerni, neque digeri ob crassitatem facile possit. Quare attenuantium pharmacorum usu opus habet, citra tamen manifestam caliditatem: ne uehementius inspissetur crassus humor in eo obturatus. Ammiscendū est autem eis quippiam ex adstringentibus & austeris, quo ipsius actio & robur conferretur. Si enim præ debilitate feculentum & atræ bilis humorem, ex hepate quem admodum consuevit, non attraxerit, uitiosum humorem uniuerso corpori affricabit. Immedicabilia enim ulcera hoc modo affecti habebunt, & color tem corporis uitiatum ad nigredinem uergentem. Diutius autem durante

malo

malo etiam aquam inter cutem incurrunt. Ob id igitur in ipso splene natura-
lem firmitatem custodire oportet, quo conueniens sibi alimentum attra-
hat, & sanguinem repurget, superfluaq; in ipso generata retrimenta ad ven-
trem demittere queat, quæ postea cum ciborum recrementis excernuntur.
Ad hanc itaq; rem amara ipsi spleni offerimus, quibus aliquando ex auste-
ris quippiam ammiscemus. Amara quidem ut humoris crassitiem secent ac
repurgent: austera autem ut robur & firmitatem eius conferuent. Quale ue-
ro pharmacum hepati est absinthium, tale existit spleni capparitis cortex. Ex
quale est hepati eupatorium, tale spleni est scolopendrium. Similibus enim

secundum genus pharmacis utraq; uiscera opus habent. Verum splen tan-
to fortioribus indiget, quanto crassiore utitur alimento. Cæterum à ueteri-
bus plurima potabilia pharmaca ad induratum lienem sunt descripta. In cu-
rando autem animaduersionem habere oportet: num curandi ægri uniuersum
corpus frigidius sit, an calidius, num humidius, an siccius. Eis igitur qui

corpora natura habent calidiora, citra molestiam myricæ folia dantur, uir-
gultaq; & radix: scolopendrium item, & rumicis syluestris, maxime uero acu-
ti semen, foliaq; & radix: optime autem facit radices uiridis confusæ succus
cyathi unius mensura potatus. Probe facit & lycaplos, quæ & anchusa ap-
pellatur: danda autem radices eius drachma una, aut cacumina hederæ tria,

aut folia eius, uel etiam radix: item polytrichon, & capni, quod chelidoni-
um uocatur, decoctum ad tertias reductum, folia salicis & cortex, itemq; ra-
dix limonij, quod & cynoglossum uocatur: folia & radix, & semen quoque
pelecini. Hæc enim neq; uehementem in se habent caliditatem, neq; si cali-
dior temperatura adsit, ei molestiam inferre solent: quapropter his tum ad
prædictos, tum ad reliquos utendum in principio adfectionis: à mitioribus
enim auspicari oportet. His autem efficaciora sunt, quæ in ueteratis scirrhis

conducunt, & corporibus agrestionibus, & qui omnem corporis habitum ha-
bent frigidiores: trixago, gentianæ radix, calamintha, pulegium, & cydami-
ni radix, scordium, trifolij bitumen olentis semen, hyperici coma, acori, asari
& eryngij radix, uiticis semen torrefactum, centaureæ maxime minoris suc-
cus etiam si sit exiccatus, chamæpitys, polium, lonchitidis radix, anagallidis

quæ ceruleum habet florem succus, glycyldes aut præoniæ, itemq; dracur-
culi radix tum uiridis tum sicca. Aliud. Caroi ex terra suscepti, radi-
cis rubiæ, bryoniæ, ammoniaci thymiamatis, cuiusque drachmam i. horum
unumquodq; aliquâdo tritum ex posca datur, aliquando autem decoctum
eorum præbetur: quod si sicca dare uelis, sufficit drachmā plus minus unam
exhibere. Conducit item hoc. Ammoniaci thymiamatis sextantem, calto-
rij unciam i. conterito, & drachmam i. ex posca aut aceto mulso præbeto.

Aliud. Scillæ assatæ drach. i. corticis radices capparitis drach. i. præbe
ex posca, uel aceto mulso. Mouet enim crassos & uiscosos humores, inquit
Archigenes: aliquâdo & cruenta non per urinas tantum, sed & per uentrem
educit

*Absinthium
eupatorium } Epan. carum
Capparitis cortex } Spleni.
Scolopendrium }
Scleritis uiridis uiridissima (audas
pro splene a Gal. i. lib. de splen. ad
ca. in 9. uita r. r. r. r.*

*corpus calidioris splenem
splenem uiridis*

*Lycaplos
anchusa*

*Ammoniaci
caroi*

*Ammoniaci
thymiamatis*

*Scillæ
assatæ*

educit. Aliud. Thuris obolos duos, seminis fœniculi cochlearium unum, præbe ex uino.

Aliud Marciani, præsens remedium: quod etiam si sit induratus, citra dolorem ipsum laxiorem reddit, ut neq; significationē neq; etiam suspicionem suffusionis aquæ inter cutem relinquat.

Seminis uitiis contusi & cribrati per angustissimum cribellum drachmas v, his qui perfectæ sunt ætatis ex posca bibendas præbe.

Aliud eiusdem, ad splenem & hepar indurata, & principium aquæ inter cutem, & ad alui, & intestinorum, ac stomachi inflationem, simplex & periculo uacans.

Bryoniæ radicem contusam & cribratam, repositam, ab acre & uento intarctam ne quid inde transpiret, adserua, & pro uiribus ægri præbe. Perfecta mensura exhibitionis est cochlearium unum, hydropicis quidem & splenicis ex posca: hepaticis ex hydromelite aut uini dulcis cyathis tribus.

Pastillus ad splenicos, Asclepiadæ liquefacit splenem, ut multo experimento constat.

Seminis eruce drach. v. iiii, piperis albi drach. iiii, spicæ nardi drachm. iiii, ammoniaci thymiamatis drach. iiii, scolopendrij drach. ii, costi drach. ii, cum aceto scillitico subigito, & drach. i cum aceto mulso aut posca præbeto.

Conuenientissimum autem spleni in scirrhum indurato remedium existit ferrum aqua, aut uino, aut posca extinctum. Ea ipsa enim aqua, aut uinum, aut posca in principio exhibita iucunda & utilissima existunt, & per plures ex ordine dies dantur. Itaq; febrientibus aquam, aut poscam dilutam præbeto: eis uero qui teneram carnem habent ac febre carent, uinum. Sit autem

ferrum quod in ipsis extinguitur stomacho. Ipsius autem stomachatis ferri squama, (quam in fabrilibus officinis ferrum dum ignitur & malleo tunditur, abijcit) postea agrestioribus hominib. utiliter exhibetur. Præclare enim hæc splenem liquefacit, utpote quæ consumendi facultatem præstat, quare

aliarum rerum complexu opus habet, ne inde stomachus male afficiatur. In calidioribus igitur temperaturis, pelecini semen ei ammiscere conuenit: aut si id non adsit, scolopendrium: aut si neque hoc haberi possit, absinthij comam, aut rumicis acuti radicem aut semen. In frigidioribus autem tempera-

turis, ad squamam ipsam, calsiam, aut amomum, costum, anisum, aut serpillum montanum, & similia addere oportet. Quamquam tum in his, tum in omnibus pelecini semen maxime conueniat. Omnia aut nunc dicta, itemq; ea quæ paulo ante sunt relata simplicia pharmaca, in principio cum posca diluta coquantur, postea uero etiam meraciore. Progressu uero temporis etiam ipsa contusa & cribrata cum aceto aut aceto mulso exhibentur. Ver-

rum certam unicuiusq; horum mensuram definire difficile & periculosum est, quum diuerse eorum qui ea accipiunt sint naturæ: quare in principio pa-

rum quid ex unoquoq; exhibendum, & pro ratione deinde exhibitionis mensura

gal. 7 lib. de singl.
cap. de ferro.

stomomatis
ferrum

Squamæ ferri subradia
agrestioribus corporibus
stomachum mod.

difficile esse mod.
mensuram eorum designare.
sed primum parum ad
quod unusquisq; exhibetur.

mensura

mensura augenda, iuxta ipsius pharmaci, atq; etiam ægri uires. Omnia igitur prædicta quomodocūq; tandem potata, aut semel saltem deglutita permanere solent: uerum glans unguentariorum, quam myrobalaon appellant, nisi cum posca bibatur, facile uomitu reijcitur. Licet igitur singulis prædictis simplicibus pharmacis per se uti, & duo ite uel tria aut quatuor, permixta æqualiter uel inæqualiter præbere. Ex compositis autē ferē pulcherrimum est, id quod ex olsibus constat, ad podagricos descriptum Philagrii pharmacum. Efficax enim reperies ipsum, inquit Philagrius, & conuenientissimum ad omnia splenis uitia, præsertim cum tumore magno & duritia oborta. Sensibiliter enim huiusmodi affectionibus auxiliatur: uirpote quod ui sua emollit & concoquit, ampliusq; diffundit & purgat, ultra hoc quod paulatim discurit & resiccat. Est autem tum gustui, tum odorati suauissimum, maxime si plurimo despumato melle mixtum, delingendum præbeatur. Secundo autem loco inter ea quæ ego noui est & hoc, inquit Philagrius, ipso sanè usu probatum. Corticis radices capparis drach. vi, foliorum myricæ drach. vi, squamæ stomomatis ferri drach. vi, myrobalani drach. x aut vi, ammoniaci thymiamatis drach. viii, seminis pelecini drach. v, stœchadis drach. iiii, comæ absinthij drach. iiii, scolopendrij drach. x. Excipe aceto & informa pastillos, ac exhibe drac. i ex posca aut aceto mulso aut uino. Hoc itaq; robustum est pharmacū, ut etiam ad duriora corpora quæ dret.

Myrobalaon
glans unguen
taria

Philagrii
pharmacum
aliud.
ex calibr pastil

Aliud eo imbecillius tale est.

Pulegij drach. xii, radices rumicis acuti drach. vi, seminis eiusdem drac. vi, capni iuxta sepes nascentis sici drach. vi, pelecini drach. iiii, scolopendrij drach. iiii, spicæ nardi drach. ii, rhei pontici drach. i, corticis capparis drach. ii. Excipe aceto ac redige in pastillos, exhibe q; drach. i, quemadmodum in præcedenti dictum est.

Pastillus ad splenicos, splenem liquefaciens: Asclepiadæ.

Seminis erucæ drach. iiii, piperis, ammoniaci thymiamatis, spicæ nardi, cuiusq; drach. ii. Quidam etiam costi drach. ii, & scolopendrij drach. ii. Arida contundito & cribrato, ammoniacum in aceto dissoluito, ac simul in pastillos digerito: ex quibus drach. i, cum aceti mulsi cyathis iiii propinato. Qui huius pharmaci compositionē docuit, per triduum hoc suis catulo se exhibuisse dixit: postea ubi canulū dissecuisset, ipsum sine splene repertum.

Consumpti
splenis exen
plum

Aliud, ad spleneticos & hydropicos, quod optime urinam ciet, & uentrem emollit: Archigenis.

Scillam magnam luto oblitam assato, deinde repurgatæ internæ libras ii accipito, dauci unc. i, anisi, seselis, radices panacis, iridis, cuiusq; unc. i, seminis urticæ sextantem, cedridum hoc est fructuum cedri sextante, myrt hæ drac. iiii, farinæ erui unc. xvi, cum uino informa pastillos, & præbe drac. i, cum aceti mulsi cyathis iiii. Aliud. Radices panacis, ammoniaci thymiamatis, corticis radices capparis, radiculæ, scillæ assatæ internæ, æquales omnium

partes

partes committe, & obolos tres aut quatuor præbe: conducit anhelosis & hydropicis.

Pastillus summæ utilitatis.

Cacuminum hederae nigrae drach. i. x, spice nardi drach. v, seminis rutæ syluestris drach. ii. ii, castorei drach. i, iudis drach. vi. Cum succo uerbenacæ rectæ pastillos informato, & per quinque dies mane drachmam unam ieiuniis ex uino ueteri præbeto. Mouet urinas cruentas. Atque hæcenus quidem de pharmacis potabilibus. Cæterum ad splenem in scirrhum induratum etiam sanguinis detractionem commodam esse scimus, quæ inter paruum sinistræ manus digitum & eum qui medio proximus est, sit facta. Quidam autem uenam retro sinistram auriculam sitam diducunt, inquit Archigenes, & ex profluente inde sanguine splenem illinunt, ac magnum commodum sentiunt. Idem etiam hepate affecto faciunt, incidentes retro auriculam dexteram uenam. Quare neque absurdum fuerit etiam his auxilijs uti: animaduersione tamen habita ne arteriam pro uena disseceamus. Nos autem in his qui multo sanguine abundant, inferiorem in sinistro cubito uenam secare consueuimus, uerum & hic cauendum ne subiacentem arteriam simul disseceamus. A uenæ incisione, etiam cucurbitulae spleni affigendæ sæpe & cum scarificatione, extrahendusque per ipsas plurimus sanguis: quin & hirudines summa commoditate in ipsum splenis locum affiguntur. Loci etiam amplius per spongiam acida muria inbutam fouendi, furfuribus quoque in aceto decoctis, absinthij coma, ac pulegio, & lauri folijs, similibusque adiectis. Quidam autem lapidem molarem aut gagatem longitudine octo digitorum, & latitudine sex digitorum, secundum crassitudinem leuem, igniunt & aceto adspargunt, panniculoque in aceto calido madefacto circumposito, locis imponunt, & quam diu calidus sit incumbere sinunt, atque huic fomento testimonium præbent, inquit Archigenes, tanquam quod insensibiliter deprimat tumorem. Post fomenta ad cataplasmata transeundum, ex farina ordei ac lolij, absinthij coma, myrobalano, & althææ radice, cum aceto mulso. Aut panem aridum cum capparis cortice, & myrobalano contusum, cribratum, & cum aceto mulso decoctum imposito. Optime facit & stercus caprinum cum farina ordeacea ex posca cataplasmate impositum. Lupinorum item farina ex posca, & fabarum eodem modo. Cinis quoque ex officina fabrilis: & bryoniae radix cum caricis, aceto, & cydamino, eodem modo. Brasica etiam syluestris cum melle imposita auxiliatur. Similiter & folia isatidis, & marrubium cum ordeacea farina ex posca. Cardamomum cum caricis. Cydaminus cum caricis ex aceto decocta. Cataplasma optimum. Fœni graeci trientem, farinae ordeacæ quadrantem, cardamomi unc. i, caricarum pinguium lib. i, uerbenacæ herbæ unc. i. ficus in aceto acerrimo macerato, fortiterque in mortario contudito, reliquisque adiectis ac simul unitis utitur.

Optimum cataplasma & hoc est.

Seminis raphani partes ii, foliorum salicis partem i, farinae araci partes iii. seminis

feminis pastinacæ partes 11. in aceto cum pari sapæ mensura decoquantur.

Aliud, ad inueteratum malum, & corpora dura.

Corticis radices capparis, radices struthij, sinapis recentis, omnium æquales partes, farina tritici duplum ad omnium trium mensuram. Vtere ueluti prædictis.

Aliud prædarum ad durities.

Stercus gallinarum sicum, contusum, ac cribratum cum aceto maulso decoquo, confidenterq; imposito.

Vnguentum optimum.

Ammoniaci thymiamatis, thuris, foliorum rutæ uiridium, singulorū æquales partes cum aceto contere, & quàm crassissime illita exicari permittite.

Aliud, quod antea quàm medeatur non abscedit.

Ammoniaci staterem 1, thuris staterem 1, piperis staterem 1. Ammoniacum cum aceto contere, eodemq; etiam reliqua modo. Aliud. Ammoniaci staterem 1, acaciæ stateres 11, aloes staterem 1, thuris stateres 11. Apparatur autem hoc modo. Ammoniacum & aloen ac thus in aceto macerato, acaciam autem contundito, cribrato ac prædicta contrita omnia ammisceto. Crocomagma etiam utiliter cum aceto illinitur: sepe enim non abscedit priusquàm medeatur. Cæterum epithematum medelæ magis fidendum. Pleraq; enim eorum quæ in medicamentarijs libris referuntur ex alumine & sulphure composita, prædominantem habent adstrictoriam facultatem: Quare in eis animaduersionem habere oportet, non modo simpliciter facultatis eorum pharmacorum quæ ammiscuntur: uerum etiam quantitatis ipsius mixturæ. Etenim in plagis quæ flatuosum habent tumorem, & maxime in quibus tumor laxus est, nihil peccaris etiam si plurimum ex alumino sis adieceris. In tumoribus uero in scirrhum induratis emollietem & discussoriam facultatem præcellere oportet, quibus parum quiddam ex adstringente sit admixtum. Vnum igitur ex simplicibus & naturalibus ac nulla arte apparatus, discussoriæ & adstringentis simul est facultatis, ipsa uidelicet salis spuma, quæ splenem in scirrhum induratum sanat, inquit Galenus, calida in uescicam bubulam coniecta, & forinsecus imposita. Oportet igitur medicum ad affectionem respicere, & pro eius ratione tum addere, tum adimere ex eis quæ in epithematum compositionem conijciuntur. ueluti exempli gratia, si duritiem emollire uelit, ammoniacum & bdellium pingue, ac styracem optimum æqualiter unicuiusq; drac. 111 ammiscere debet. Si uero crassos humores dissecare uelit, opopanacis tantundem addet. Quum autem humores diffunduntur, etiam discussoria ac digerentia sunt ammiscenda: aut stercus caprinum in aceto dilutum addendum. Hoc enim & crassitudinem dissecat, & simul discutiendi uim habet. Quod si discutere tantum uelit, humoribus uidelicet antea sufficienter attenuatis, nitrum pro stercore caprino ammiscet. Capparis autem cortex ammixtus ultra hoc quod dissecat & repurgat, etiam splenem corroborat. Habito igitur ad ea quæ ubilibet accidunt respectu, aut emollientia augebis, aut attenuantia, aut etiam

Salis spuma

Modum temperandi epithemata

t 3 ca quæ

*Epithema
emolliens ac
discussorium*

ca quæ discutiant & robur addunt. Optimum autem epithema emolliens & discussorium hocce est. Cerae quadrantem, propolis sextantem, galbani drach. iiii, opopanacis drac. iiii. Vtere: contunditur hoc pharmacum, & strumas recentes, omnemque duncicem recens obortam dissoluit.

Aliud malagma Asclepiadae, quod articulos incuruatos relaxat. Bdellij pinguis, adipis vitulini, ammoniaci thymiamatis, indidis, cuiusque drac. xv, opopanacis, galbani, thuris, canchryos, styracis, cuiusque drach. octo, piperis grana clx, cerae drachmas xl viii, fecis olei irini sextantem ac unciae dimidium, vini quantum satis est. Arida contundito & cribrato. Ammoniacum, opopanaca, thus, bdellium in uino dissoluit: liquecibilibus autem liquefactis, adfusis, ac simul emolliis utitur. Extreme emolliendi facultate praestat hoc, inquit Galenus: neque enim aliud magis eo emolliens repereris: quod si irini olei inopia sit, cyprino aut sicyonio eius loco utor.

Aliud malagma Amythaonis, ad praecordiorum distensiones: conducit & articulis qui difficulter mouentur, omnemque duriciem dissoluit, & priore quidem minus emollit, magis aut digerit ac discutit.

Compositio sic habet.

Ammoniaci thymiamatis drach. xxxvi, cerae drach. xxxvi, terebinthinae drach. viii, bdellij drach. viii, myrrhae drach. iiii, thuris drachm. iiii, galbani drach. viii, olei cyprini sexuncem. Myrrham, bdellium, thus, uino premacerata conterito: ammoniacum in aceto dissoluit: liquecibilia autem liquefacito, affundito, ac utitor.

Aliud, praedicto longe efficacius, & fortius, inquit Philagrius: discindit enim & attenuat inspissatos humores, & viscosos res purgat. Habet autem hoc modo. Malagma Asclepiadae.

Ammoniaci thymiamatis sexuncem, galbani, myrrhae, cuiusque sextantem, cerae sesquibram, thuris quadrantem, opopanacis quadrantem, radiceis panacis sexuncem, propolis quadrantem, acetii sextarios ii, stercoris caprae quadrantem. Ammoniacum cum aceto terito, deinde etiam thus, galbanum, opopanaca, & myrrham. Propolin autem cum modica cera in mortario tundito: cetam uero cum olei triente liquefacito paulatim donec cogatur decoquendo, & deinde propoli adiecta, ab igne tollito, percolato, ac frige fieri sinito, perpolitaque tritis adiecto, unito, ac utitor. Ceterum epithema quod ego composui, inquit Philagrius, optimum ad diurnas & frigidiore affectiones existit. Myrobalani drac. xlviii, ammoniaci thymiamatis drac. xlviii, bdellij drac. xlviii, scythicum uero bdellium maxime probo, corticis radiceis capparidis drac. xlviii, mannae drac. xxxiii, opopanacis drac. viii, styracis drac. iiii, uisci drac. xii, cerae drac. xxxiii, floris salis drac. xlviii. Ammoniacum cum salis flore dissoluit: capparin uero, myrobalanum ac manam cum aceto: reliqua autem iuxta ignem emollito & in mortario tudit, & trita eis adiecto, unito, ac utitor. Hoc pharmacum splenem consumit,

*Epithema
Philagrij*

Aliud

Aliud. Verbenacam viridem cum manna terito, atq; axungia suilla ueteri excepta imponito. Dura enim corpora & diuturno malo affecta quàm maxime inde iuuantur: reliqua uero integre sanat. Prodest etiam uerbenaca per se imposita, itemq; trixago.

Aliud epithema Aſclepiadæ, ad splenicos: consumit tumores.

Foliorum sambuci tenerorum libras ii , aloes pinguis libram unam: cum acetato terito ac lenito, linteoloq; excepta imponito. Verum si malum recens est, uniuscuiusq; par pondus coniuncto. Aliud. Seminis ericæ libram i , galbani libram i . Semen contusum & cribro excussum galbano excipito, rursumq; tundito olei irini fece addita, quo malagmatis formam acquirit, & linteolo inditum imponito. Vniuerso autem uiscere, recrementisq; eius, atq; meatibus opportunis, per emollientia, repurgantia, dissecantia, attenuantiaq; & diffundentia humores, ampliusq; etiam per ea quæ uias dilatant, tum in potu accepta, tum foris imposita præparatis, efficacius euacuare poterit: est uetudum, ac primum quidem simplicioribus, postea uero etiam fortioribus. ueluti exempli gratia: primū quidem epithymi drach. iiii , cum feri lactis cyathis v præbeto, postea autem epithymi drach. iiii tenuissime tritas cum modico sero dato, atq; ubi uenter operari inceperit, serum per se paulatim absorbendum exhibeto. Cæterum post aliquot dierum interstitium, ubi uires recollerint, hieram Archigenis ex colocynthide præbeto, aut quæ Iusti appellatur. Post horum autem omnium usum, farinæ tenuissimæ radicis cyclamini sicæ drac. iii aut iiii ex aqua mulla dato, atq; quo sudorum exclusionem iuues ægrum uelamentis contegito, & in lecto concalefacito. Epithemata discussoria & resiccantia. Postquam corpus fuerit repurgatum, epithematis quæ digerere siue discutere & resiccare possunt, utendum: qualia sunt quæ ex auripigmento & alumine componuntur: ex quorum numero est etiam id quo ego, inquit Philagrius, utor.

Hiera Archi-
genis
Hiera Iusti

Ceræ tyrrhenicæ drach. xci , resinæ pinus sicæ drach. xci , resinæ pinus liquidæ drach. xvi , auripigmenti drach. xvi , aluminis scissilis drach. xii . Metallica terito, & liquefabilia cum modico oleo liquefacito, ac refrigeratis sicca adijcito, unito, & utitor.

Aliud aurei coloris, Aſclepiadæ, ualde pulchrum.

Ceræ libras duas, resinæ pinus sicæ libras duas, auripigmenti sextantem, aluminis scissilis sextantem, calcis uiuæ unciam unam, olei cyprini uncias sexdecim, aceti uncias sedecim.

Aliud, ad splenicos & hepaticos.

Aluminis liquidī, sulphuris uiui, nitri, ammoniaci thymiamatis, manna, radicis capparis corticis, singulorum sexuncem, picis libram unam, resinæ pinus sicæ libram unam, olei cyprini sexuncem, aceti quantum sufficit.

Aliud epithema hepaticum, ipoterium appellatum.

Resinæ pinus sicæ libram unam, ceræ libras duas, picis libras duas, alumi-

nis liquidi, nitri, sulphuris uiui, mannæ, cuiusque libram unam, aloes sex un-
cem, pyretti, aristolochiæ longæ, bdellij, ammoniaci thymiamatis, amo-
mi, uisci, cardamomi, olei, cuiusque quadrantem, acetī sesquiseptarium. Am-
moniacum, alumen, sulphur, nitrum, cum aceto diluta terito : reliqua uero
arida quidem contundito, ac tritis admisceto : liquefabilia autem liquefa-
cito, atque reliqua cum eis excipito. Optime faciunt & ex caprino stercore
apparata : item plurima eorum quæ ad hydropicos sunt descripta : & Ma-
chæronis emplastrum, & emplastrum ex rumice, quæ in decimo quinto
sermone referentur.

Phœnigmi, cutem rubefacientes.

Efficaciter autem in ipsis phœnigmi auxiliatur, tum qui ex sinapi apparan-
tur, tum qui eis consimiles existunt. Cæterum corpore prius à superfluis hu-
moribus euacuato, eos adhibere oportet. Pulcherrimus autem phœnig-
mus talis est.

Phœnigmus Asclepiadæ authemeros, quasi eodem die auxilians
inscriptus : qui sanè ab uniuerſa affectione liberat.

Pyretti drachmas octo, myrobalani, cardamomi, seminis urticæ, piperis, eu-
iusque drachmas octo, sinapis trientem. Omnia conterito, & aceto subigi-
to, & tepefacta ex interuallo per horas tres imponito, si saltem tam diu sus-
stinere possit : deinde ablato pharmaco, lauari præcipito, in feruētioris solij
desessu. A balineo autem cerato ex rosaceo apparato utendum.

Alius. Lepidij folia trita cataplasmatīs modo imponito, atque ubi
morsum sentiant, in balneum inducito, & ablato pharmaco, in feruentem
aquam immittito & perfundito. Difficulter enim ferunt nimiam mordaci-
tatem. Sani autem exeunt, inquit Archigenes. Idem remedium & ad coxen-
dicum dolores efficacissimum reperitur. Summe etiam auxiliantur myro-
balani cortices & nitrum. Nitrum per se terito, & parum acetī ammisceto,
deinde resinam ac ceram cum pauco oleo liquefacito, affundito, emollito,
ac utitor. Cæterum quod opere præcium est cognosse, fortia pharmaca non
nisi corpore prius à superfluis humoribus repurgato, & probe concoquen-
te, adhibere oportet.

Smegmata, siue repurgatoria.

Oportet autem locum ipsum sensim ad phœnigmorum rubefaciētium to-
lerantiam irritare, quod per repurgatoria smegmata commodè fieri potest.
Componantur autem smegmata ex staphide syluestri, pyretto, pipere, ac
alcyonio, pari uel impari modo prout uidebitur cōiectis. Quod si teneram
carnem habeat æger, iridis, & cyperi, & herbæ sabinæ aliquid his ammisce-
bis : aut farinam aliquam, ueluti crui, aut fabarum, aut cicerum. Quod si
etiam odoratum reddere uelis pharmacum, cassiæ quippiam & phylli ac
amomi adde. Si uero durius contingat curandum corpus, ex pumice ad-
des, atque adatte. Postremum autem phœnigmis ex sinapi consimili-
busq;

busq; uteris: corpore prius uniuerso à superfluis humoribus repurgato: ne uidelicet uehementia caloris alia adtrahat recrementa, durioremq; reddat ipsum locum.

De splenicorum uisione.

Cap. xiii

Quod si prædicta auxilia irrita sint, ineffaciterq; adhibeantur, ad uisionis patrocinium confugere oportet: ita ut uel per cauteria, uel pharmaca crustas inuramus, & multo tempore saniem effluere sinamus: corpore tamen prius per uenæ incisionem, & purgationē euacuato. Etenim quum ferè in totum uiciatis humoribus splenici sint referti, & non præuacuetur uniuersum corpus, maligna ulcera ex crustis fieri consueuerunt.

Dieta splenicorum.

Cap. xiiii

Porro dieta ipsorum splenicorum tempore inflammationis simplex sit & quæ facile concoquatur: uelut est halica lota, & ptisanæ succus, panis madefactus. Si uero inflammatio diutius remoretur, etiam auicularum carnes eis concedendæ, & pisces petrosi aquis degentes. Vbi uero scirrhus sit perfectus, dieta attenuatoria exhibeatur, & acrium rerum comestiones per interualla. Proprie autem splenicis cōuenit capparidis comesta ex aceto mulso. Vinum sit non ualde uetus, quod aqua permisceatur, in qua ferrum sæpe ignitum sit extinctum: Plurimum autem fiducia in exercitamentis ponendū, quibus ante cibum uti conuenit, corpore superfluitatibus non abundante. Ex eorum autem genere ex superabundanti faciunt deambulationes & cursus: & noui sanè aliquos, qui ex his solis ab omni affectione sint liberati: gestationes etiam omnes conueniunt, proprie aut quæ sit in equo. Manifestum autem est quod uociferationes quoq; oportune & in tempore assumptæ eis summe opitulantur.

Cura eorum in quibus splen frigida, uenter uero calida affectione laborat.

Cap. xviii

Cognitu uero necessarium est, quod in aliquibus splen frigidam intemperiem habet, & ob id calefacientibus opus habet: uenter autem bile agitur, & cōtrariam spleni sustinet intemperiem: aut etiam citra priuatam affectionem, ex meatu qui bilem susceperat, flauam bilem assumit: & absq; *Meatus bilem susceperat* hoc etiam, sæpe ob ægram cōcoctionem & ciborum in uentre corruptionem splen afficitur: etenim aliquando quum frigiditatis sensus cum grauitate circa splenem percipitur, uenter biliosum uomitū reiecit: tunc equidem difficilis cura nobis instat, & quæ difficulter procedit: nimirū splene caloris focū expulente: uentre aut atq; etiā uniuerso corpore refrigeratione indigente, atq; id uno & eodem tempore. Quo igitur quāu possibile est utriusq; membri affecti effugiant læsionem, pro uiribus conabimur ut eos à tristitia & cura, iracundia & uehementibus motibus, multa item inedia ac malo cibo auocemus simulq; per ea quæ citra molestiam purgant pharmaca biliosum humorem euacuemus. Quos uero uentris firmemus ac corroboremus, ne quid eorum quæ

*Calida frigi-
dis in cibo
premittenda*

quæ ex reliquo corpore ad ipsum influunt, suscipiet. Cæterum corroboratio ipsius per ea quæ difficulter corrumpitur, contingit de quibus in secundo mentionem fecimus sermone. Suffecerit autem ipsis exhibitio modici panis cum oliuis albis aut colymbadibus appellatis, citra potum, si balneum & prandium differant, ne bilis efferatur. Melius autem est si priusquam bilis efferatur ieiuni lauent. In prandio cibi eis præbeantur tum quantitati tum qualitatis moderata: uerum ut splen illæsus permaneat, conuenit primum boni succi & actu calidos præbere, ac deinde postremum tum actu, tum potentia frigida porrigere, ueluti lactucam & frigidum potum, ac similia: non frigida enim frigidis præsubstrata splenem illæsum ab his quæ postea ingeruntur frigidis, conseruant ex quibus os uentris corroboratur, & calida ipsius intemperies corrigitur. Optimum igitur fuerit postremum omnium mala punica, aut etiam alia, aut pira, aut quedam quæ stomacho grata sunt acceptare: atque eodem omnino modo etiam cenam instituire. Conueniunt etiam per ea quæ forinsecus imponuntur hoc modo affectis opitulari. Refrigerant autem uentrem circa uocumetum forinsecus imposita, oleum melinum & rosaceum: cerata item ex hisdem apparatus, modica mastiche amixta, aliquando etiam oleo addito omphacino. Calidus itaque uenter per prædicta lenitur. Ad splenem autem calefacientia adhibenda sunt, qualia sunt epithemata polyarchia appellata.

Cura spleniconum quos tulsis infestat. Cap. xv

Quod si tulsicula splenicum infestet, sintque eiusdem generis affectiones circa utraque uiscera, ueluti si contingat & splenem & pulmonem eodem tempore crasis ac uiscosis humoribus siccis, aut aliquo alio frigido morbo detineri, tunc sanè podagricum pharmacum ex ossibus constans, uehementer utile tum spleni, tum eo modo tulsientibus existit, & antidoti qui ei similes habentur. Si quidem igitur similes contigerint affectiones, similia remedia adhibere oportet: ubi uero diuersæ erunt affectiones, diuersis pharmacis utendum est: utpote si splen à crasis & uiscosis humoribus, & frigidis liquoribus adficiatur: tulsis autem à tenui & acri destillatione contingat, si modo possibile fuerit, & destillatio non urgeat uehementer, à pharmacis fluxum condensantibus abstinere conducit, ueluti est quod ex papaueris calicibus constat, itemque ex seminibus pastillus, & quæ his similia existunt. Vehementiore autem & acriore existente destillatione, & quæ periculum exulcerationis pulmonis minetur, utendum quidem ex papaueris calicibus confectio, uerum spleni epithemata attenuatoria imponantur, atque nisi magna impendat necessitas, ea quæ stupefaciunt uitanda. capiti autem aliquis ex seminibus pastillus cum aceto rosaceo ad strigmentitiam crassitudinem reductus imponatur: præstat autem ex ipsis in hoc præsertim usu, hi qui crocci appellantur. Cum aceto enim & rosaceo oleo triti, & ad limi densitatem reducti, lanaque conuoluta excepti, ac sincipiti impositi

siri tenuitatem destillationis inspissant, simulq; exurentem & acrem in capite qualitatem refrigerant, tussis sedant, & somnum suauem inducunt. Post hæc autem theriace per opium recens apparatus in potu accepta, tussis sientibus quibus simul splen affectus est, auxiliatur.

Cura eorum quibus splen in magnitudinem excreuit, simulq; durus existit. Cap. xvi

Quidam ex splenicis immodice auctum splenem habet, ut non solum hepar & inguina contingat, sed & ob soliditatem attollatur, uitalisq; cordis uires maximopere lædat, ac imbecillitatem inducat, utq; ex eo uniuersum refrigeretur corpus, ipsumq; adeo hepar tenuissimum & aquosissimum in ipsis fiat. Horum sanè qui hoc modo sunt affecti curam recusare oportet: quod si cogamur tamen, à dubijs & hebetibus remedijs auspicabimur, periculo eis incumbente prædicto. Verum neque intra corpus lumen dum, neq; forinsecus adhibendum, ullum aliquod uehemens pharmacum offeremus: neq; euacuationem etiam coacervatim faciemus, sed paulatim & per simpliciorum medicaminum usum. Cæterum tum per os exhibitis, tum foris admotis, & quantum possibile fuerit conuenienti diætâ, uirium imbecillitate refocillata, si in melius proficere ipsos uideamus, fortioribus omnino remedijs utemur, ita tamen ut sensim aucta ipsa apponamus.

De ictero, seu morbo arquato: ex libris Ruffi & Galeni. Cap. xvii

Icterus à similitudine ad animalculum, quod ictis, id est uiuetra appellatur, nominatus est: est autem mustela syluestris, quæ auricolores oculos habet. Verum icterus morbus biliosi humoris circum corpus effusio est, obsecernentis eum facultatis debilitatè, quæ eum segregare & ad proprios excretionis locos demittere non ualet. Errare autem eos credendum est qui hepatis affectionem in omnibus ictericis adesse putauerunt. Conspicitur enim sæpe quum hepar nihil male est affectu, flauæ bilis ad cutem effusio facta in iudicationibus morborum. Conspicitur etiam citra febrem aliquando sanguis in bilem exagitatus per corruptionem uidelicet aliquam peregrinam: qualis quoq; à uenenatarum bestiarum moribus contingere consuevit: etenim quum quispiã à uipera morsus esset, uniuersum corpus præsini siue porracei coloris habuit, & quum assidue theriacè bibisset, celerrime sanatus est: quare nihil mirum est talem aliquando contingere humoru in corpore per mutationem, ut uniuersum corpus ictericum colorem assumat. Quin & hec si potest ut propter naturalis temperiei ipsius hepatis mutationem, eiusmodi humorum corruptio contingat, ut aliquando herbis pallore albicantibus totum corpus manifeste assimiletur, aliquando etiam plumbi colorem induat. Quemadmodum etiam eiusmodi colores nigricantiores fiunt, si ob splenem quàm si ob hepar affectum cotingant. Splene scilicet ad attrahendum ad se ex hepate atræ bilis humorem, & ad repurgandum sanguinem.

pro

pro more suo, debilitato. Fit autem aliquando icterus ob imbecillitatem uesicae bilis susceptricis, quae biliosum humorem, ueluti consuevit, in sese ex hepate non attrahit, & ob id impurum sanguinem relinquit. Possibile est etiam eam nimis repleti, aut repletam propter repletionis multitudinem non posse euacuari. Aliquando autem & propter obturationem aut debilitatem uenarum, quarum ora ex ipsa ad hepar deferuntur, biliosum humorem non adtrahit. Quare in ictericis affectionibus recrementorum figura necessario consideratur, quum in aliquibus multum colorata per flauam bilem appareant recrementa, quemadmodum etiam in alijs urinæ. In quibus enim ratione iudicationis bonæ in febribus, biliosus humor ad cutem prorumpit, his & recrementa & urinæ naturali modo se habere uidebuntur. Quibuscumque uero citra febrē, unā cum grauitatis alicuius aut doloris sensu circa dextrum ilium, arquatus contigit, in his uesicæ bilis susceptricis obturationem factam esse putandum est. Quibus autem neque grauitatis neque doloris sensus circa ilium adest, in his splenem uitiati humoris causam esse iudicabimus. Si autem neque dolor neque grauitas circa ilia infestet, neque febris præcessit, & tamen sanguis in uniuerso corpore in bilem mutetur, atque ita arquatus contingat, his pruriginosior cutis fiet & magis etiam arefcet. In quibus uero atræ bilis humor unā cum sanguine ad cutem est delatus, hi omnino grauius afficiuntur. Consequitur enim ipsos tristitia præter rationem, & mordacitas eorum quæ circa uentrem sunt, difficultasque spirandi, & cibos auersantur, & nigra lotia excernunt. Aliquando autem & per interualla quædam corpora ipsorum tepescunt: stercora uero chalcanti colorem referunt, & alius magis his resiccatur. Cæterum eos qui ex pallida bile arquatum contrahunt: nulla mordacitas eorum quæ circa uentrem sunt consequitur, neque etiam in tantum auersantur cibos: sed obtusior tamen aliquando fit in eis ciborum appetitus. & stercora quidem albida egeruntur, urinæ autem crocci coloris, turbatae tamen & tenebras referentes permanent. Communiter autem omnibus ictericis pigricies & tumor ad motum corporis contingit, & ad dulces cibos animum habent alienatum: amaros uero non admodum auersantur, & uarijs imaginationibus uexantur. Pruritus etiam uniuersi corporis comitatur, & difficulter exudat. Porro alba oculorum & partes faciei temporibus propinquæ, itemque male pallorem ostendunt: uenæ etiam sub lingua repletæ repeniuntur, & abundantem humorem significant.

Cura arquati.

Cap. xviii

Rarescentia cutem **A**Rquati igitur qui ratione bonæ iudicationis febribus perfecte soluti sunt, facillime sedantur: si ægni lauacris aquarum dulcium utantur, ac olei discussorij perfrictione, omnibusque quæ rarefaciunt cutem: qualia sunt oleum chamæmelinum, anethinum, itinum, glaucinum, samfucinum: & rosæ marinus herba oleo incocta ipsum plurimum discussorium facit. Dietam quoque uniuersam humectiorem in his constituere oportet, & ut mediocriter humorum

ter humorum crassitudinem attenuare possit. In reliquis autem ictericis duo maxima remedia principatum obtinent, sectio venæ, & purgatio. In quibus igitur multitudo sanguinis unā cum bile in toto corpore abundat, & quos citra hepar aut splenem dolor aut distensio infestat: nihil venæ incisione commodius fieri potest, si nulla alia re id facere præpediaris, particulatim autem & per uices sanguis est detrahendus, ne per coaceruatam euacuationem uires ægri prosternantur: neq; uto inepte clyster adhibetur, si venæ sectio impediatur. A venæ aut incisione etiā commodè clyster assumitur, qui propter stercoreum euacuationem spirandi facilitatem inducit, intestinaq; irritando ac mordendo, humores ad cutis superficiem delatos, ad ipsa retrahit & reuellit. Purgationes autem magis propriæ & familiares huic morbo existunt, inquit Rufus. Cæterum edulj & potionibus itemq; pharmacis, humores prius attenuare oportet, obturationesq; deoppilare, atque deinde pharmacum exhibere quod flauam aut nigram bilem ducit. Sint autem purgationes ictericis exhibendæ fortiores: ob uentris enim siccitatem, imbecilliores, inefficaces in ipsis cognoscuntur: quare in principio purgare non oportet, priusquā per deoppilantia bilis attenuetur, & quodam modo ad intestina reducat. maximi namq; mali causam, purgationes in principio datæ præbuerunt. Itaq; conuenit primum deoppilantibus mox dicendis uti, atq; ubi attenuatus humorum ac deoppilatio fuerit facta, tum deum conueniens, & forte (ut dixi) pharmacum purgatiuum est exhibendum. Quod si primo purgatiuo pharmaco nihil proficias, rursus forte aliquod deoppilatorium pharmacum bibendum præbe, & post triduum rursus uolentius pro secunda uice purgato, inquit Rufus, ut etiā ad finem purgationis unā cum uehementissima mordacitate bilis excernatur, quæ cerulea magis sit quā flaua. Ego itaq; euphorbium, epithymum, aloem, petroselinum, & dauci semen misceo, ac ictericos purgo. Optime etiam ipsos purgat hoc. Piperis scrupulos iiii, piperis nigri scrupulos v, scammonia scrup. vi, ammi scrup. iiii, seminis feniculi selquiscrupulum, seminis apij scrupul. ii & dimidium, caroi scrup. iiii, anisi scrup. iiii, mellis quantum satis est, quo ad strigmentitiam crassitudinem redigatur. Datur nucis ponticæ magnitudine cum cochleari aceti albi & aquæ calidæ tantundem. In melancholicis autem ad prædictum dimensum farinæ epithymi scrup. iiii addere oportet. Vehementer commodū & hoc est. Colocynthidem magnam superne perforato, cicutoq; semine, id quod instar tomenti in ea est finito, ac uinum uetus dulce infundito, & pernoctare in ea permittito: mane uero per panniculum detritæ uelut diligenter percolato, & uinum calefactum his qui flaua bile abundant bibendum præbeto. Ad melancholicos autem epithymi scrupuli sex in uino dulci præcoquantur, id ipsumq; uinum colocynthidi infundatur, ac ut dictum est, bibendum præbeatur. Cydamini quoq; radix trita potata, post deoppilantia remedia, aptissima est ad uiscera repurganda, & ad bilem

*Clysteris
utilitas*

Rufus

*Purgationes
fortes ictericis
requar*

*Purgationes
arquatorum*

in uniuersa cute excludendam per sudorem: quare post eius potionem, sudorum exclusionem per uelamenta ac concalefactionem in lecto iuare oportet. Dantur autem ad summum ex ea drachmæ quatuor ex aqua multa. Quod si inflammatio circa partem aliquam uiscerum subiaceat, primum irrigationibus & cataplasmatibus utendum est, & post ea ceratis & epithematibus ad uiscerum inflammationem præscriptis. Præstat autem farinæ ammiscere rosmarinum herbam, florem iunci odorati, absinthium, artemisiā, abrotonum, rutam, cardamomum, chamæpityn, scordium, polium, ac chamædryn. Hæc enim singula ammixta urinam cient, quod morbo maxime conducit, & uisceribus inflammatis prodest. Cucurbitulis etiam utendum, hepate quidem affecto inanibus, & aliquando cum scarificatione: splene autem adfecto omnino cum scarificatione: inanes enim splenem nihil iuant. Pharmaca autem quæ in potu accepta ab obturatione ictericus liberant, maxima ex parte urinam cient, uelut est apij decoctum, & adianci, ac similia: item calamithes & uerbenacæ rectæ ac oxallidis. Est autem oxallis rumex acris sapore, fuluis ramulis & folijs, caule itemq; semine quadrangulari, pallida radice: hæc sanè per se comesta, & radices decoctum ad tertias redactum ac potatum celerrime auxiliatur. Prodest etiam rumex satiuus, & anchusæ radix, rubiæ radix, chamæpityos, rosmarini, & aristolochiæ. Mirifice etiam prodest, serpillum, hypericum, & eius generis plurima alia. Singula hæc in aqua ad tertias decocta cum uino dulci bibenda præbeto: aut contundito & cribrato, ac singulorum drachmam 1 dato. Præclare quoque facit corticis raphani succus, uino meraco dulci permixtus aut uino mulso: ita ut succi cyathi duo, uni uini cyatho contemperentur. Datur item ualde commode cichorii & feridis succus, febrientibus quidem per se, febre carentibus cum uino: brasiacæ item succus eodem modo, & cornu ceruini ramenta cochlearij mensura, petroselinum, anisum, asarum, rheon: commo dissimum autem est chamæmelon quæ & leucanthemos adpellatur, itemq; buphrthalmum.

Aliud multi experimenti.

Spumæ nitri albæ drach. 11, in uino ueteri dulci macerato trium cyathorum mensura, & per totam noctem sub diuo ponito, & ad triduum aut quatuor triduum bibendum præbeto.

Aliud præter opinionem.

Vermes terrenos coctos ac cum myrrha troglodytica tritos, in fabæ magnitudinem, ex passo aut uino mulso dato, & postera die icterum per lotium ejicient. Idem faciunt & absq; myrrha data. Exhibeto hoc ad triduum, ac utere confidenter.

Pastillus ictericus, qui ictericis & hepaticis mirabiliter conducit.

Amygdalarum amararum repurgatarum drachm. 111, anisi, comæ absinthij, cuiusq; drach. 11, spicæ nardi drach. 1, asari drach. 1. contundito & cribrato reliqua, amygdalas autē cum aqua terito, & pastillos informato: ex quibus drachmam unam febre carentibus ex uini mulsi cyathis 111 præbeto.

Cæterum

Oxallis rumi-
cis species

Rumex satiuus
et oxalis
his facultatibus.

Cæterum pharmaca quæ in potu accipiuntur omnia si fieri potest, in balneo exhibeantur, ubi ægri in calidum lauacrum conscendere parant. Plurimum autem diætæ uirium refocillatrici intentum esse oportet, per quam uis discretiva reparatur, & si quod membrum læsum sit corroboratur, ac præsens coloris corruptio repurgatur: quapropter conueniunt exercitamenta, & gestationes, & inunctiones ac exudationes: ita ut ad pyriateria, hoc est uaporatoria sicca, & ad solem, & in balneis quoque, corpus nicti pulcre uisti, ac uini sece arida ustaque ac tenuissime trita defricemus. Optimum autem & serpillum & thus pari modo cum oleo illita. Rosmarinus item herba in oleo decocta, si oleum illinatur prodest. Cibi autem omnes incisorij sint & attenuatorii, & quicunque inter attenuatoria edulia prædicti sunt in secundo sermone: ex uolucrum quidem genere, montanæ: ex piscibus uero, qui petrosi aquis degunt: ex ostreis, hennacei recentes. Olera uero sint quæ magis urinam cient, præsertim feris, intyba, asparagi palustres, smyrnium, carduus, eryngium: ex satuiis autem conuenit brasiica, asparagus coctus, raphani, allia cruda & cocta. Carnes autem ferinæ mansuetis magis sunt aptæ: pro liquamine seu embammate, ualet acetum in quo scilla & aristolochia sint macerata. A fructibus abstinendum. Bellaria sint amygdalæ, sed modice sumantur, & cicer modicum torrefactum. Ex leguminib. cicer assatum, & maxime decoctum ipsorum assidue potatum. Ieiuni autem citrium comedant repurgatum. Vinum conuenit album & subadstringens, neque ualde uetustum: ubique autem mediocritas optima censetur. Quod si quippiam ex ictero circa faciem & oculos relinquatur, urinæ autem appareant puræ, aliusque consueto more egerat, & appetitus in nulla re obstet, neque infestet sitis: & ut compedio dicam, quum omnes prædictæ accessiones fuerint sedatæ, & tamen circa oculos uitiatus color relinquatur: narium infusis utendum. fortissimè autem omnium est claterium cum lacte muliebri infusum. facit & cyclamini succus, & melanthium cum aceto: debiliior his est anagallidis succus, & succus radicis betæ. Depurgat autem cyclaminus crassissimum mucum: claterium autem pituitam & bilem. Omnium autem efficacissimum ad eos reperi atramentum sutorum lacte muliebri dissolutum ac naribus infusum: inde enim bilem largetur ex naribus destillantem uidebis. Oportet autem poscam probe dilutam in ore detinere dum infunditur hocce pharmacum. Præstat tamen primum cyclaminum infundi, quo crassa per eam euacuentur, & postea ipsum sutorum atramentum.

Pyriateria, uaporaria sicca

Mediocritas ubiq; optima

De malo corporis habitu: Archigenis.

Cap. xix

QUum corporis habitus in aquositate diffunditur, cachexia, id est malus habitus à Græcis appellatur, in quo uniuersa corporis miscella laxior sit ac emollefit, quod maxime ex somno inæqualiter contingente fit manifestum: corpusque ipsum totum cum uisore albicans redditur ac inualidum, ita ut crura inter eundem uacillent. & in principio quidem concoctio,

Cachexia, malus habitus

nes impediuntur, manente etiam dum appetitus: postea uero & fastidium accedit & respiratio ipsis fit rara ac debilis, quæ motibus & actionibus cõdenatur. Alius etiam inæqualia recrementa excernit. Hæc affectio ut plurimum ex longo morbo congregatur: iam uero & ex uiscere quopiam in scirrhum indurato consequitur, maxime hepate & splene: neque raro in dysenteria diuturna & affectionibus coeliacis contingit, ob cõsuetam item aliquam cohibitam excretionem. Capiuntur autem hac adfectione maxime senes, qui etiam maxime liberantur: imo & pueri, qui facile pereunt, propter uitalis firmitatis debilitatem, & quod ob cutis raritatem succi in eis facile transpirant. At uero qui in uigore sunt, raro incidunt, & facile se inde extricant. Quod si diutius adsit malum, in aquam inter cutem transit. Quod uero ad curam attinet, si quidem ex cõsuetæ excretionis cohibitione affectio contingat, admonere ac irritare eam ipsam excretionem oportet. Aut uenam incidere in cubito, si nihil sit quod id fieri præpediat, paulatim ac partitis uicibus per triduum sanguinem detrahendo. Si uero uenæ incisio impediatur, conuenienti medicina depurgante ipsos purgare oportet. & maxime ex hiera Archigenis ex colocynthide apparatus. Quod si hepar sit adfectum aut aliquod aliud ex uisceribus, medelam adhibere his ipsis conuenit, per auxilia ad singula ipsorum supra præscripta. A localibus autem remedijs, ad dietam uiribus reparandis aptam transeundum, per quam spes est eos qui huic malo sunt impliciti ad restitutionem in integrum perueneros. Dieta autem qua uires refocillantur in moderatis deambulationibus consistit, gestationibus, uociferationibus, & defecationibus per linteola ex lino crudo, deinde per inunctionem ex oleo, cui quædam quæ humorem resiccant sint infarta, ueluti sunt nitrum & sales. Postea uero & exercitamenta moderata conducunt. Ad lassitudinis autem curationem balneum per interualla quædã adhibeatur: quod si quis ad frigida laueturum adsuehi possit, compendio ad omnem mali curationem peruenerit. Aquæ item quædam naturales calide robori ac uiribus reparandis conduxerint, quales sunt aluminosæ, sulphureæ, ac nitrosæ. Mirabiliter autem ipsos iuuat absinthij delibatio, & adhibiti dropaces. Cibi eorum sint simplices, & qui facile concoqui possint, parum conditi olerum uidelicet gratia: si quidem opus sit per ipsa utriusque cieri, & aluum submollire. Vinum conuenit cis album, tenue, odoratum. Bellaria omnia uitent, omnia item nidorosa, & graucolætia: humoris crassi, & uiscosa, & quæ difficulter concoquuntur à cibis eorum sint aliena.

De hydropse, siue aqua inter cutem.

Cap. xx

HYdropis differentia tres sunt: alius enim ascites, ab utre appellatur. Alius tympanites, à tympano: & tertius sarcites, aut iuxta carnem, hoc est subtercutis, à Græcis etiam leucophlegmatias nominatus. Ascites igitur fit, quum inter pelliculam peritonæum appellatam, & intestina plurima aquosi humoris collectio contingit, ut uere utris modo pellicula ipsa repleta esse

Transfusa
in
gu.

Dietæ uires
reparans

Ascites

esse uideatur: aliquādo uero ubi peius habent ægri usq; ad scēmora tumor
 producitur, quando sanē ascitæ & sarcitæ hydropis complexus factus appa
 ret: unde aliquando quidem pedes inflantur, aliquando naturalī modo ha
 bent. Tympanites uero flatus aere repleti ac superflui plurimam collectio
 nem in iisdem uentri incumbentibus locis facit, ut in principio sola inflatio
 esse uideatur: postea tamen flatus inspissatur, & ueluti nubilus redditur, atq;
 ita unā cum flatu, quasi nebulosus humor consistit ac congregatur. Infert au
 tem tympanites multam circumtensionem, atq; in ipso etiam usque ad scē
 mora & pedes tumor procedit. Porro sarcites per omnē corporis coagmen
 tationem ac miscellam humorem disseminat, ut instar spongiarum aut pa
 pyri uniuersa caro permadefacta appareat: atq; ob id totum corpus simili
 ter ut ilia intumescit, ac mortuo simile euadit. Cōmuniter autem omnis hy
 drops spirandi difficultatem, & tumorem, & grauitatem, & uitiatum colo
 rem inducit, ex uirore nimirum albicantibus ægris: fastidiunt etiam cibum,
 potum autem largiorem plurimi appetunt, maxime qui ex ascite laborant.
 Extremum humor qui in locis detinetur falsus est & putrefactus, quare & sitis
 & febris augetur: ferē enim in totum plurimi ex hydropicis febriunt. Con
 sequitur autem aqua intercus omnes morbos qui habitum corrumpūt: una
 est enim ad hydropem aptitudo, coagmentata corporis miscella: demoliti
o & ruina. Contingit autem hæc aut ob superexcellētem hepatis frigidit
 atem, aut ob aliqua alia membra uehementer refrigerata, quæ hepar in ean
 dem dispositionem deducere ualent: citra enim hepatis refrigerationem im
 possibile est aquam congelari. Coafficitur autem hepar spleni refrigerato,
 aluoq; & intestinis, maxime his quæ iuxta ieiunum intestinum sunt, pulmo
 niq; & renibus, ac septo transuerso. Congregatur etiam ex immodica hæ
 morrhoidum euacuatione, aut ex fluxu muliebri, aut ob menstruorū reten
tionem, aut ob aliam quandam magnam uulvæ affectionem. In his enim
 omnibus nullum præter naturam tumorem hepar habere conspicitur, & ta
 men aquæ inter cutem morbo corpus apprehenditur, ex sola refrigeratio
 ne hepate in his in principio affecto: post uero aliquando & durū fit, quod
 palām in illis uidere est, qui ex intempestiua frigidæ aquæ potione hepar
 aceruatim refrigeratum habent, ut statim aquæ suffusionem operetur, pri
 usquā ipsum in scirrhosum tumorem eleuetur. His autem qui ex frigidæ
 potu aquam inter cutem incurrerunt, uehementes ciborū appetitiones sūt,
 propter oris ipsius uentris frigiditatem. Multi autem & a podagra & coxen
 diam dolore uexati, aquam inter cutem inciderunt. Frequentissimē autem
 eos qui cibum non sentiunt, & malo corporis habitu præditi sunt, itemq; ab
 arquato infestatos, hydrops consequitur, cœliacam item affectionem & dy
 senteriam. Nouimus etiam quosdam qui ex recta spiratione quam ortho
 pnean uocant, in aquam inter cutem sunt deducti. Ceterum huic affectio
 ni non minus scēmora quā uiui sunt obnoxij: pueri uero ut plurimum ab

Tympanites

Sarcites,
subtercut

Hydropici
cur sistant

Miscella
corporis
demoliti.

Hepar refrige
ratum conge
lationis aquæ
causa est

a frigida au
tem potio
causa est
hydropi.

Frigida por
tio hep
at ledit

Pertusio, pun-
ctio, paracen-
tesis

hydropes sarcite apprehenduntur. Est autem tympanites omnino periculo-
sus, minus coascites: adhibetur enim in eo pertusio siue punctio, quam pa-
racentelin Græci appellant, & reliquis quoque remedijs promptius quàm il-
le obedit. Sarcites quoque aliquando curabilis sit per ea quæ cuti adhibentur
humorem detrahentia ac resiccantia pharmaca. Omnes autem inueterati hy-
dropes & qui iam habitum corrumpunt, sunt periculosi. Fiunt etiam aliquan-
do bullæ inter peritonæum pelliculam & intestina, figura uesicæ similes &
serosum humorem continentes: hæ ipsæ sanè per fluctuationes quasdam inæ-
quales deprehenduntur: nimirum proprium locum secundum lineamenta
quædam distributum ac uelut circumscriptum, ipso humore tenente.

Ascitæ ac tympanitæ hydropis cura.

Cap. XXI

QUum itaque difficilis sit, quemadmodum prædictum est, aquosæ affe-
ctionis cura, plurimo artis auxilio opus habet in his igitur qui feбри-
citant hydropicis febre intermittente curam faciemus: itaque cataplasmata
ex farina ordeacea, althæa & ac caricis, ipsis adhibebimus: ita ut in tympani-
te quidem magis ex seminibus flatus discutientibus commisceamus in ascite
uero magis ea quæ euacuant humorem. Cæterum post principium effi-
caciora sunt cataplasmata quæ pro ordeacea, fabaceam farinam suscipiunt,
itemque eruinam, cuiusque paræm mensuram, coquuntur autem cum muria aut
aceto mulso. Præstat etiam loliacea farina cum caricis & absinthio, hyssopos
& origano ex aceto mulso: item bulbi cum melle: aut armentariæ bo-
uis sterco ex posca siue aceto mulso: habeat autem quartam partem sulphu-
ris uiui inperlatam. admirandum hoc est, ac minime prætereundum. Valet &
caprinum sterco in pueri incorrupti, & uenerem nondum experti urina im-
positum: humorem enim per uentrem euacuat. Valet & lupini farina, aut he-
dæ folia trita & uino decocta: aut ficuum partes duæ cum cupressi coma,
& nitro: aut lens palustris in figulino uase desiccata, trita & imposita: aut co-
chleæ crudæ cum carne sua tritæ impositæ, non enim priusquàm humor de-
siccetur discedunt: aut alumen plurimum sæuo caprino exceptum impone-
re: aut caricas, nitrum, castorium, marrubium, aut filicem in pila contundito, &
raphanos donec colliquescant coquito, deinde simul terito, & farina ordeae
adiecta, cataplasmatibus modo imposito.

Cataplasma optimum ad ascitem.

Lathyridum partes III, squamæ æris partem I, radicis chamæleonis partes
III. coquantur in aceto mulso in quo adeps taurinus sit præliquatus.

Aliud optimum ad ascitem. Stercoris columbini partem I, stercoris
caprini tantundem, bupthalmi herbæ tantundem aut leucanthemi. hæc tu-
sa in acerrimo aceto ac melle coquantur. Aliud. Salis fossilis partem I,
salis cappadocici partem I, lathyridum contusarum partes III. coquantur simul
aqua marina aut sulphurulenta. Optimum est hoc pharmacum. Sensibili-
ter enim uidebis materiam euacuatam, & tumorem discussum.

Aliud

Aliud. Rhois quo tinctores coriorum utuntur sextariū 1, pollinis frumentacei aut loliacei aut farinae fabaceae sextarium 1, thuris quadrantē, aluminis scissi quadratē. imponito cum aceto mulso hydropicis, splenicis, dysentericis, ac coeliacis. **Aliud.** Radicis cucumeris agrestis unc. xvi, sicuum pinguium unc. xv, radicis altheae unc. xvi. Radicem unamquamque per se tundito ac cribrato: ficus uero cū uino coquito, ac probe terito, siccatque trita inspergito. Utitor, per aluum enim humorem educit. **Aliud.**

Elatery, staphidis syluestris, succi hyssopi, fellis taurini, ficuum. Omnia in mortario tundiro, subigito ac utitor. Poteris & praedicta in secundo sermone cura uti, de diuersis uidelicet terrae differentijs.

Cataplasmata, quae magis ad tympaniten faciunt.

Farinae fœni graeci, farinae ordeaceae, uirgultorum rubi, comae absinthij, foliorum rutae, seminis apij, cumini, sisonis aut ligustici, mellis, & uini, & olei.

Aliud, ad hydropicos inflatos.

Panis contusi sextarium unum, cumini sextarij quartam partem, samuci quadrantem, pyretri sextantem, euphorbij unciam unam. Cum uino mulso uniuersam spinam & aluum usque ad mamillas & pudenda contegito; alternisq; diebus soluito, atque id quinquies aut sexies facito. Ego pro euphorbio struthion conieci.

Vnguentum Apollonij.

Stercus accipitris cum syluestris brassicae succo assidue illinito, mirifice facit uerum melius fuerit si aquilae stercus ammiscueris. **Aliud.**

Laterem diligentissime instar uasis figulini assatum cum hyoscyami aut plantaginis succo terito, & quam crassissime ad solem frequenter illinito.

Vnguentum ad hydropicos.

Radicis cucumeris syluestris libras duas, staphidis syluestris sexuncem, nitri sexuncem, olei libram unam, aquae marinae sextarium unum. Quod si non adsit aqua marina, pro ea muriā conijcito. resinae à nauibus unā cum cera crassa, apochyma Graeci appellant, libras tres. Radices tenuiter contundito, nitrum & staphidem terito, & per triduum madefacito, deinde usque ad aquae consumptionē coquito, percolato, & apochyma adijcito, quo liquefacto utitor, ex eo saepe illinens tumorem.

Epithemata hydropica.

Cap. xxxii

A Sclepiadae. Epithema hydropicis ualde commodum, quod adiacentem humorem absorbet: quo etiam priuatim, inquit Archigenes, utor.

Farris clusini appellati mola triti sextarios duos, floris lapidis asij sextarium unum, alij autem duos habent, mannæ sextarium unum, diligenter terito, & adipe suillo ueteri probe subacto, & per noctem in uino macerato excipito. Eius autem quantitas tanta sit, quanta ad hoc ut ad tactum mole reddatur pharmacum suffecerit. **Aliud.**

Seminis rutae, quod besafia & harmala quidam appellant, contusi & cribrati

ti sextarium unum, mannæ sextarij dimidium, adipis suilli ueteris quantum sufficit, ut prædictum est apparato.

Aliud, cui testimonium præbet Oribasius.

Fœni græci trientem, farinæ ordeacæ quadrantē, stercoris columbini trientem, resinæ pinus sicæ lib. i, picis lib. i, ceræ libram unam, axungia ueteris libras duas: quæ eliquari possunt eliquato, & ad alia in mortario contusa & cum aceto trita adfundo. Aliud ex farinis epithema.

Picis sicæ libras duas, resinæ pinus libras iiii, ceræ libras iii, olei ueteris libram i, farinæ tritici, ordeci, fœni græci, baccharum lauri, anisi, salis, farinæ radicis chamæleonis nigra, singulorum bessem, uini austeri sextarium unum, apparato ut prædictum est, ac utitor. Facit & ad hepaticas dispositiones. Ego autem, inquit Asclepiades, & chamelææ quadrantem adieci, & pro triticea farina, irinam admiscui.

Pharmacum, quod omnem tumorem generose resiccat.

Cimoliæ quadrantem, ceræ quadrantem, olei quadrantem, salis unciam i, resinæ à naubus cum cera derafæ drachmas centum & sexaginta, farinæ fœni græci drachmas uiginti, foliorum brasicæ uiridium quincuncem. Liquefacta reliquis tritis in mortario adfunde.

Aliud epithema ualde pulchrum.

Stercoris caprini sextantem, stercoris bubuli sextantem, stercoris columbini sextantem, farinæ fabacæ sexuncem, calaminthæ, salis niri, seminis apij, seminis dauci, seminis fœniculi, cumini, cuiusq; unc. i, panis aridi quadrantem, mellis sexuncem, terebinthinæ quadrantem. Utitor.

Epithema ex stercore caprino ad hydropicos, qui hepar induratum habent apparatus.

Olei cyprini, aut si hoc non adsit uetustissimi lib. iiii, ceræ lib. ii & dimidia, stercoris caprini bessem, baccharum lauri decorticatarum bessem, iridis bessem, terebinthinæ lib. i, sinapis, niri, cyperi, pyretri, seminis raphani, corticis radicis capparis, cuiusque quadrantem, medullæ colocynthidis unc. i, fœni græci unciam unam. Aliquando quidem arida liquefactis insperguntur: aliquando uero aceto prius subiguntur. Ego autem, inquit Asclepiades, colocynthidis sextantem adijcio. Quod si alius fluat, omnino colocynthidem amouero: stercus autem caprinum si quidem aridum sit, tunditur & cribratur: molle autem & recens aceto dilutum teritur.

Malagma, quo Eras usus est: quod imponendum est, neque prius amouendum quam sua sponte decidat.

Visci lib. i, lapidis asij sexuncem, calcis uiuæ quadrantem, olei cedrini lib. i. Viscum & oleum ad calidum ac feruentem cinerem coquito, inspersisq; aridis tritis, remollito ac utitor. Aliud. Caricarum pinguium lib. vii aut iiii, spumæ niri lib. i, origani lib. i, sulphuris uiui quadrantem, cochlearum africanarum libram unam. Arida contundito & cribrato, ac fisis cum cer-

ne cochlearum contulis excipito, & melle cocto sufficienti adiecto tritor in linteolum infartis. Aliud. Radicum brasicæ tenuissime tritatur libram unam, calcis uiuæ lotæ libram 1, elaterij quadrantem, axungia ueteris libras tres. Ad formā malagmatis reducito, & in linteolum infartito, ac per omnem aluum imponito, alterhisq; diebus soluito. Vrinam prolicit.

Malagma ipoterium inscriptum: pharmacum accommodatum, ac prosperi successus, cuius periculū feci, inquit Philagrius, in hydro-
piscis, splenicis, & affectionib. inueteratis: deprimit enim tumorem.

Resinæ pinus torrefactæ lib. 1111, ceræ lib. 11, picis lib. 11, aluminis liquidi, nitri rubri, sulphuris uiui, mannæ, cuiusq; libram unam, aloes sexuncem, pyretri, aristolochiæ, ammoniaci, bdellij, amomi, cardamomi, uisci probe subacti, myrrhæ, radices cucumeris syluestris, succi sycomororum, cuiusque quadrantem, olei libras tres, acci sesquiseptarium. Quemadmodum moris est apparato. Arida aceto diluuntur.

Malagma ex baccis lauri aridis, ad hydropicos & splenicos, omnem dunitiam dissoluit, abscessus in profundo siros absorbet.

Ceræ, resinæ pinus, picis brutæ siccæ, nitri rubri, baccarum lauri aridarum, ammoniaci thymiamatis, adipis uinulini probe subacti, singulorum libram unam. Arida contūdito, ac per tenuissimum cribrum excutito: quæ uero eliquari possunt liquefacito, eisq; arida inspergito ac unito, deindeq; ammoniaci cum aceto dissoluto affundito. Ego etiam nitrum cum aceto dissoluo.

Emplastrum Tonsoris appellatum, ad splenicos & hydropicos. Hoc Tonsor ex Bithynia usus, multos à coxendicium dolore in totum liberauit.

Picis siccæ lib. 1111, ceræ lib. 11, resinæ pinus lib. 1, farinæ fœni græci, pollinis radices herbæ chamaeleonis nigra, cuiusque bessem, cumini tenuissime tritientem. Apparato, & ut dictum est utitor.

Emplastrum pardalis appellatum: Andreæ. Pharmacum inueteratis hydropicis prospere accommodatum.

Grani enidij depurati, rhois rubri, spumæ nitri, salis ammoniaci, aristolochiæ tenuis maxime corticis, radices cucumeris syluestris, terebinthinæ, cuiusq; drach. 111, piperis communis, piperis longi, ammoniaci thymiamatis, iridis, bdellij, thuris, cardamomi, obassami, casisæ, myrrhæ, amomi, adipis taurini, adipis caprini, resinæ pinus siccæ, cuiusq; drach. x, ceræ sesquialteram. Visci probe subacti sextantem, unguenti irini aut potius fecis sexuncæ, succi sycomororum sextantem si haberi possit. Ceram, resinā, adipē caprinum, liquefacito, refrigerato, & cerati modo leuigata ac cōtecta asseruato. Bdelliū aut & ammoniacū & succi sycomoronū sextantē, præcedenti die in uini quincuncce macerato, sequentiq; in sole terito, & coniecto in mortariū cerato bdellium & reliqua cū eo adiecto & diligēter tūdito, deinde arida trita paulatim addito, & per biduū tusa in densam pellē recōdito, ne quid inde transspitet.

Quidam

bras duas, terebinthinæ liquidæ, picis brutæ, adipis taurini, cuiusq; libram unam apparato & imposito ut prædictum est. Aliud. Veratri nigri, nitri, pipерis, fellis taurini, singulorum æquale pondus melle cocto excipe, & utere ut dictum est.

Epithemata, quæ post euacuatos humores adhibita pro glutino sunt.

Cap. xxiiii

Mellis libras duas, myrt hæ sextantem, thuris unciam unam. Mel usque quo uiscosum fiat decoquito, cuiq; myrtham ac thus tenuissime trita adijcito, simulq; subigito, & spongiæ nouæ infarta per omnem aluum imposito, colligatoq; cute quodammodo constricta, & tertio die soluto.

Aliud. Thuris drachmas octo, gummi drachmas octo, rosmarini herbæ exiccate drachmas decem, mellis libras duas, apparato, ut dictum est, similiterq; uitior post euacuatos humores.

Aliud epithema, quod post humorum euacuationem, toti affectioni se opponit.

Lapis asij sextantem, farris mola triti unciam unam, thuris trientem, chamelæ contusæ & cribrate drachmas quatuor, adipis suilli uteris quantum sufficit. Vtere ut dictum est.

Emplastrum Magus appellatum: quod quidam etiam Hephæsiæ nomine insigniunt: facit ad sinus, & fistulas conglutinat ac reficcat præter opinionem. Egregium censetur & ad hydropicos & ad herniam hydrocelen appellatam.

Spumæ argenti sexuncem, lateris fumo assati scsquilibræ, scoriz argenti quæ helcysima Græcis appellatur libram unam, olei libras tres, ceræ scsqui-
libram, succi coridis scsquisextariū, alij sextarij dimidium accipiunt. Oleum, Helcysima
spumam argenti, helcysima & laterem tenuissime tritum, itemq; succum, donec amplius non inquinet decoquito, deinde ceram liquefacito, & percolatam adijcito, ac unitis utitor. Quæ difficulter aliàs sanatur ad cicatricem perducit. Præstat autem arida prius contundi, & cum succo in mortario teri, ac deinde decoqui. Quidam autem pro cera, pentatheton pharmacum coniecerunt, & ad hydropicos usi humorem reficarunt. Epithematis igitur per se uerantius & promptius utimur, si absit febris: quod si febres sint coniunctæ, per interualla quædam assumuntur. Cæterum ad tumores crurium hydropicorū, panem madefacere oportet, terereq; ac sale tenuissime trito amixto, illinire, ac quatuor horis sinere. Quod si aquosus humor defluat, spongia mundare, ac panniculo uestis detrite extergere, oleoq; myrteo, aut melino, aut leniscino inungere.

Aquam ducentia remedia, hydropicis ualde comoda.

Caput xxv

S Milacis quæ iuxta aquas in sepibus reperitur, ac siliquas producit quemadmodū hortensis similax, quæ lobia appellatur, huius foliorum succum

succum sextarii unius mēfura accipe, & ad tertias decoque, indeq; cyathum unum bibendum præbe. Aliud. Smilacem accipe & donec flaccescat in aqua decoque, deinde unā cum decocto folia ipsa tere usquequo succus inde exprimat: & ex eo cyathum quotidie bibendum præbe donec sanetur: in his autem qui perfectæ sunt ætatis plus omnino exhibendum est.

Aliud, quod aquam ducit.

Seminis cnici drach. iiii, aloes unc. i, grani cniidij scrupulos vii, scammoniae scrup. iiii. cum succo scorpiuri ceruleum colorem habentis catapotia infornato, & ex eis his qui iam primum inciderunt scrupulos iiii exhibeto: quibus autem in tumorem malum processit, scrupulos vii, ieiunis.

Quæ ad ciendam urinam hydropicis bibuntur. Cap. xxxvii

Porro toto curationis tempore, aliquo istorum potuum utendum erit. Cancrī fluvialis decorticati interioris exiccati, manibus ac pedib. auulsis lib. i. asari lib. i. In aqua permisce ex ipso flumine unde cancrī sunt extracti, ac bibendum præbe: aliquando pro asaro, opobalsami par pondus conijciatur. Aliud. Corallij drach. i, aluminis scissi drach. i. cum calaminthæ decocto in pastillos digerito, & ex ipsis obolum i cum calaminthæ decocto bibendum præbeto. Summe (inquit Archigenes) & nephriticis cōducit. Lauetis item decoctum exhibeto, idemq; lauer edendum dato, aut trifolij bitumen olentis drach. i, ex uino, aut iunci odorati, aut nardi, aut asari, aut phu, aut mei decoctum, aut corticis radices ari, aut ipsius radices drach. i ex uino, aut seminis uiticis drach. i ex uino, aut radices bryonig concisæ decoctum, aut anagallidis ceruleæ succum per se, aut amoglossum ab aridorum ciborum comestione quotidie paucum comedendum præbe, ita ut inde reliquo cibo utatur: aut seminis hyperici drach. i ex uino, aut cicerum decoctum, aut scillinum acetum afsidue sorbeant. Etenim ex eorum numero quæ citra grauitatem urinam cient, est scilla assata delincta ex melle: aut scillam assatam terito, eiq; farina: erui albi par pondus ammisceto, sic cato, ac drach. i ex uino dato: aut polium, aut samfucum ex uino decocta bibenda præbe. Egregie etiam commodam myurum herbam perhibet, quæ folia alimo similia habet, uetum per terram strata est, ac uelut corymbos in summo oblongos habet: hanc itaq; decoctam afsidue bibendam præbeto. experimento constat. Aut herinacium terrestrem excoriato, eiusq; carnem in sole exiccato, ac drachmam unam ex uino tritam præbeto. Præter opinionem etiam faciunt uermes terreni cocti triti ex uino potati. Est & compositum pharmacum quod urinam ciet ipsis conuenientissimum, hocce. Carpobalsami, spicæ nardi, casisæ, cumini, radices dulcis, hyperici, floris iunci odorati, asari, amomi, dauci, smyrnæ, petroselinæ, calami aromatici, piperris, fœfelis, spondylii, omnium æquale pondus. Conducit etiam unūquodq; per se.

Orybasij pharmacum aquam ducens.

Salis ammoniaci drach. i, mastiches drach. ii, euphorbij drach. i. Hæc pro una

una uice dantur: est autem ex fortissimis remedijs.

Potiones aquam ducentes, ex Asclepiade.

Cæterum per interualla longiora uti conuenit pharmacis aquam ducentibus: nam incommodus est assiduus eorum usus, utpote qui uires ipsas dissoluit. Similiter autem & his quæ urinam cient per modica interstitia utendum est. Ducunt autem aquam, quemadmodum conuenit inter Eran, Dioscoridem, Asclepiadem, & Archigenem hæc. Radicis struthij decoctum, polypodij decoctum, corticem radicis tithymalli characitæ appellati contusum & cribratum scrupulorum quatuor pondere in uino per integram noctem macerato, ac mane uinum ipsum bibendum præbeto: euestigio enim aquam educit. Aliud. Radicis cucumeris syluestris contusæ & cribratæ obolos duos in uino adstringente per triduum macerato, ac per dies tres ex ordine præbeto, factoque interstitio rursus eodem modo dato, quousque tumor demittatur. Inde enim aquositas leniter secedit: neque stomachum hoc lædit, & uires conseruat.

Aliud, quod multam aquam per alium ducit.

Ex solano hortensi succum exprimito, & quotidie donec perfecte curentur cyathum unum bibendum præbeto. Aliud. Salis fossilis melle subacti & assati drachmas duas, piperis longi drachmas duas, cõterito, & cum succo ptisanæ totum præbeto. Hæc enim est perfectum dimensum.

Aliud. Radicis umbilici ueneris drachmam unam, scilicet repurgatæ drachmam unam, conterere, & cum uini mulsi cyathis duobus per horam ieiunij bibendum præbe. Aliud. Euphorbij drachmam unam, salis communis drachmas tres, castorij drachmas quatuor, alij drachmā unam habent, contundito & cribrato, dimidiumque ex aqua calida exhibeto.

Aliud. Chamelætæ, petroselinij, piperis, æquales partes omnium contundito, & cochlearium ex aqua calida dato.

Eclegma ad hydropicos.

Seminis ricini ex herba quæ cici appellatur deputati numero grana triginta quinque, spumæ nitri cochlearia duo, probe contrita melle excipito, atque id totum delingendum præbeto, & aquæ mulsæ calidæ cyathos tres, ab eius sumptione bibendos porrigit. Euacuat adhærentem humorem citra læsionem: & purgat aliquando usque ad dies sex. Oportet autem ante eius sumptionem commoda diæta uti.

Aliud inæxuperabile.

Grani cnidij repurgati drach. iiii, lathyridum mundatarum drach. iiii, euphorbij drach. ii, aloes drach. ii, gummi drach. iiii, aqua subigito, & catapota cuius magnitudine formato, ac perfectis ætate septem præbeto, & uini miri immixti cyathos quatuor inde bibendos dato. Reliquis autem iuxta iurium tolerantiam exhibendum.

Aliud Xystici, siue Spiculatoris, ex cuius solius usu sanabatur.

Grani cnidij repurgati drach. v, probe conterito, squamæ æris drach. v, x lapidis

lapidis magnetis drach. v. i, seminis ricini drachm. iiii, succi scillæ mundatæ cyathos ii, mellis cyathos ii. Succum & mel usquequo cogatur coquito, ac reliquis adiectis catapotia ciceris magnitudine formato, eaq; pro uiribus exhibeto: ita ut aqua mulsæ ab eorum sumptione bibatur. Pueris autem unum tantum præbium sufficit. Aliud. Aeris usti drach. i, foliorum rutæ drach. i, stercoris columbini drach. i, salis communis parum. Hoc totum cum dimidia hemina uini tenuis præbeto.

Aliud potabile, lagonium appellatum, commo dum his quibus uenter plurimum tumet, & reliquum corpus molle est.

Radicis bryoniæ repurgatæ drach. xx, myrrhæ drach. vii, cumini æthiopici drach. vi, anisi drach. vi, seminis capparis drach. vi, uini adstringentis sextarios ii, palsi cretici sextarios iiii. Radicem bryoniæ cum reliquis in mortarium conficito, atque citra myrrhæ admixtionem tundito, omniaq; in uas uitreum recondita affusis liquoribus macerato, & post septimū diem percolato, ac myrrhā simul dissoluito: indeq; cyathos quatuor ante cibum exhibeto, & rursus interiecta die cyathos quinque præbeto: ac rursus interposita die cyathos sex offerito, atq; deinde rursus carnem ferinam assatam edendam dato, & uinum austerum meracius in potu.

Aliud pharmacum, quod prospere accommodatur, & aquam multam per sedem educit, optime etiam cit urinam.

Grani cnidij depurati drach. iiii, radices bryoniæ drachm. iiii, scillæ crudæ mundatæ drach. x, cumini æthiopici drach. iiii, lathyridum drach. ii, myrrhæ drach. iiii, uini adstringentis sextarios iiii. Arida tusa per dies septem macerato, ita ut quotidie bene circumagites: deinde percolato, ac dissoluta myrrha, prima die cyathos tres præbeto, secunda duos, tertia unum. Facta autem purgatione, uirium refocillatrice diæta utitor.

Aliud, urinam ciens, aromaticum, crunion appellatum, quo usus est Eras & Asclepiades.

Catapotia
pharmacia

Oportet autem purgatio quod ei præscriptum est præpurgare, atque ita ipsum quod urinam ciens pharmacum exhibere. Purgatio autem quod præexhibetur hoc est. Succu cithymalli recentis cyathos ii, aloes drach. iiii. Aloë in succo dissoluito, & in catapotia magnitudine ciceris redigito, indeq; duo, aut pro uiribus dato. Porro ubi probe purgatis, ipsam urinam ciens pharmacum propinabis, cibo bis aut ter per diem exhibito. Cum animaduersione autem utaris, & ubi urinam profluam uideris, ne amplius dederis: quod si non feceris, urinam cohibere nequibis. Compositio ipsa hæc est. Seminis apij drachm. xi, myrrhæ drach. vii, dauci drach. vii, croci drach. vii, mei drach. vii, phu drach. vii, aconiti drach. iiii, floris iunci odorati drach. iiii, seminis fœniculi drach. iiii aut vi, asari drach. vi, spicæ nardi, cassiæ, cinamomi, fœnelis, sabinae, singulorum sesquidrachmam. Excipe uino odorato, & pastillos quosdam triobolares, quosdā diobolares, alios etiam unius oboli

oboli pondere formato, eosq; pro uiribus præbeto. Facit & ad calculo laborantes cum uini diluti cyathis tribus.

Aliud, urinam ciens.

Seminis fœniculi, cardamomi, radices eryngij, corticis radices capparis, cuiusque drachmam unam, stercoris columbini cochlearia duo, contere, & cum aqua catapotia ciceris magnitudine informa, & v ex eis quotidie præbe.

Potus hydropicis commodus experimēto constans, qui tum per urinas, tum per uentrem euacuat.

Caroi scrupulos x xvii, fœniculi uncias xiiii & dimidiam, anisi scrupulos xiiii & dimidium, cumini lati scrupulos v, mei sesquiscrupulum, iridis siliquas iiii, mellis sesquilibram, uini libras vi. exhibe mensuram mediocrem icimus in infessu solij balnei præcalefactam: est & suaue gustui.

Alius potus ciens urinam, ex cuius usu insignem uirum tympanite detentum, seruatum uidimus, etiam si à multis medicis iam esset detritus.

Ammoniaci thymiamatis sextantem, radices herbæ lonchitidis sextantem, petroselinij sesquiunciam, calami indicij, costi, cinamomi, spicæ nardi, piperis longi, myrrhæ stactes singulorum unciam unam, seminis rutæ quadrantem, phu drachmas quatuor, styracis drachmas quatuor, phylli quadrantem, mellis dēspumati quantum sufficit. excipe melle, & fabæ ægyptiæ magnitudine præbe, cum calidæ aquæ cyathis tribus.

Aliud ualde commodum, ducit urinam multam, & ad lumborum dolores facit, itemq; eos quibus pituita in uniuerso corpore abundat, ad pleuriticos, peripneumonicos, quartanarios, articulorū morbum, ac tetanicos, quibusdam cum uino, aliquibus cum aceto mulso, alijs uero cum aqua mulsa. Habet autem hoc modo. Aristolochiæ, myrrhæ, absinthij, abrotoni maxime seminis, iridis, canchryos, singulorum drach. iiii, anisi, cedridum, radices panacis, pyretri, ammoniaci thymiamatis, cardamomi, singulorū drach. i, cumini drach. ii & obolum i. Digerito in pastillos quorum aliqui tres, aliqui duos, aliqui unum obolum habeant, eosq; pro uiribus exhibeto.

Oribasij, ad hydropicos.

Amara ex aceto mulso confectio. paulatim euacuat, nihil ex uiribus subuens: est autem in stomachicis relata.

Aliud, urinam ciens, Oribasij.

Aluminis liquidi ad fabæ magnitudinem in aqua dissolue, & per lintheum excolatum bibendum præbe. Aliud. Opobalsami, spicæ nardi, caropobalsami, calsiæ, cumini, radices dulcis, hyperici, floris iunci odorati, asari, anomi, dauci, seminis smyrnij, petroselinij, calami aromatici, piperis, fefelis, spondylii aut umbilici ueneris, omniū æquale pondus, præbe cochlearium cum uino mulso. Conducit etiam unumquodq; per se.

Pessus

Pessus siue talus ad hydropicas mulieres.

Anisi, cumini, cardamomi, nitri, aristolochiae, pulegij, sceni graeci, medullae ficus, omnium aequales partes cum uino subige ac utere.

Cura post euacuationes.

Cap. xxvii

Post auxilia quae humores euacuant, ligamentis ægrum amplecti & constringere oportet, ab extremis autem partibus incipiamus, ac ligamentorum distributionem ad supernas partes faciamus: ita ut sæpe super ipsa ligamenta spongas posca imbutas imponamus iuxta tumefactas maxime partes. Venti uero uniuerso quædam ex præscriptis epithematis imponantur, quæ post euacuatam humorem adhibentur. Reliquum diætae concredendum: quæ sanè in moderatis deambulationibus sita est, exercitationibusq; ac frictionibus. Adhibeantur autem & inunctiones & exercitamenta: si sol adsit, in sole, capite tamen uelato: si frigus sit, in domibus per subiectum ignem concalectis, aut iuxta ignem obuoluendi etiam ægri in pelli bus sole ustis, aut in arenam defodiendi. Post exercitia extergantur, aliquando etiam lauentur propter fatigationem: in balneo autem siue in dispersione, siue confectione huiusmodi utantur. Samsuci, nitri, cumini, melanthij, serminis rutæ, singulorum unciam unam, foliorum rhododaphnes siccorum, sextantem. Utendum quoq; in sole luti oblatione, quemadmodum prædictum est in secundo De terrarum differentiis sermone. Porro quum res scilicet processerit, & tumor fuerit imminutus, & uires aliquantulum in integrum restituta, præ omnibus ex frigida lauatio fiat. Neque uero balneæ sponte naturæ calidæ inepte hoc tempore ipsis exhibentur: ab extersione autem cibi offerendi: qui sanè communes sint cum his qui post hydropis subter cutem curam describuntur.

Cura hydropis qui proprie subtercus appellatur.

Cap. xxviii

Infolationes

HYdrops subtercus, qui aliquibus etiam leucophlegmanias appellatur, maximam curandi rationem in infolationibus habet: itaq; tumefactæ partes ad solem exponantur, capite saltem uelato, cauendo etiam ne tumor uehementius supercalefiat. Si enim corpus supercaleseat, febres accedunt, unaq; cum ipsarum febrü generatione tumores duplicantur, atq; id multo magis quàm febres remittant, ac tumor refrigerationem capiat. Utendum igitur frictione prima quidem die per modicum oleum moderate ac mollior facta: in progressu autem & sicca & multa & cum intensione magis appressa: deinde etiam per lintea asperiora. Oleum autem quod ad inunctionem apparatur, scillam mediocri magnitudine ad tres olei sextarios habeat incoctam, aut canchryos uncia una ad heminam olei addatur, & facta percolatione utitor. Ab inunctione autem exercitijs utantur ac pro uiribus curant: indeq; sudorem per lintea asperiora extergant, & post hoc oleo dulci ungantur. Cæterum post dies aliquot nitro tenuissime trito per uniuersum corpus large conspergantur, sustineantq; ex eius morfu exudationem. dein de rursus

de rursum sudorem extergant ac oleo dulci ungantur. Optime autem facit & frictio ex sale in aqua aut oleo trito donec uiscosum reddatur, si cum eo in sole aut iuxta ignem fricentur. Valde enim celeriter & sudores elicit pluri mos, & carnem cogit, siue in sole, siue iuxta ignem defricentur, modo caput habeant probe contextum. Utendum & in puluere uolutionibus, si aut ci-
molia tenuissime trita substernatur, aut super asium lapidem deuoluantur. Aliquando autem & arena probe à sole ignita, aut pellibus similiter à sole feruefactis egrum oculere oportet, capite tantum uelato, & facie cum spon-
gia assidue extersa. Post hæc autem aqua marina aut etiam aluminosa aut sulphurelenta lauetur. Aliquibus enim qui ad huiusmodi lauacra adsueue-
runt, ea ipsa tum ad deterendum morbum, tum ad habitum ualentiorum red-
dendum suffecerunt. Adhibenda etiam his oblitio ex luto, ueluti prædictum
est in secundo De terrarum differentijs sermone.

Cataplasmata ex libris Asclepiadæ.

Cap. XXXIX

Optime conuenit & his cataplasmatum admolitio, eorum præsertim quæ
resiccare simul & uisceribus firmitatem addere possunt, pueris maxime
ac alijs qui mollē carnem habent: qualia sunt ex malis cotoneis, myrti baccis,
pampinis uitis, malicorio, ac lenticula decocta, aliquando quidem per se, ali-
quando inuicem permixtis. Efficacissima sunt etiam corna ex acinata tenui-
ter trita: item thus culinarijs cum farinæ flore, & quæ eis similia existunt, &
alumen sanè cum duabus adipis caprini partibus subactum. Neque uero in-
conueniens tuta ipsa censetur si per interualla adhibeatur, neque bulbi cum
melle triti. Plurimum etiam cohibent ac adstringunt tumorem origanum, aut
thyma, aut absinthium, aut hyssopum, aut nitrum cum caricis diligenter tri-
ta: aliquando hæc ipsa loliacæ farinæ in posca decoctæ permixta adhiben-
tur. Stercus item bubulum conuenienter resiccatum, non inepte cum posca
aut aceto mulso imponitur infarcta sulphuris quarta parte. Caseus quoque
recens multum coaguli habens, optime ad omnes tumentes partes imposi-
tus facit. Similiter & cochleæ crudæ tritæ & impostæ: adglutinantur enim
neque discedunt priusquam uniuersus humor resiccet: fermentum etiam
sale multo permixtum commodè locis adhibetur, aut panis cum puluere
hyssopi: aut fabacea farina aqua marina & melle cocta, pari absinthij mo-
do adiecto: aut farinam halicæ fermentato, & cum raphani emollito corti-
ce imposito: aut lentem palustrem in figulino uase siccato, ac terito, & cum
prædictis cataplasmatibus uice imposito. Porro ex eorum quæ tumores cohi-
bent numero, est & id quod byne appellatur: est autem ordeum madefa-
ctum, quod germen emisit, & deinde unā cum enatis ligulis tostum est: si tri-
tum pro cataplasmate imponatur. In principio igitur adstringentibus cata-
plasmatis utendum est, deinde paulatim ad resiccantia transcūdum, postre-
mum etiam ea quæ firmitatem addunt adiicienda. Cæterum omnia impin-
guantia & resinosa cerata ac malagmata similiaque uitanda sunt, ueluti quæ
inflicunt

inflent & tumores distendant. Asidue autem & crura, & manus, aliæq; tumefactæ partes in sole aut iuxta ignem, ex his inungantur. Sulphuris uiui, thuris, aluminis scissi, æquales singulorum partes aceto cõtere, ac utere. Experi etiam Herodoti remedium conuenit, neq; enim minus quàm ipsa fricatio auxiliari potest: uesticis itaque bubulis aut etiam alijs magnis omnino, ac probe inflatis, & uacuis, tumentes locos pulsato, atque id autoritate tum Archigenis, tum Herodoti facito: inde enim citra molestiam caro condensatur, neq; dolore, neq; repercussione duriore resistente.

Chirurgia hydropis subter cutem.

Cap. xxx

*Pertusio
sine paracen-
tesis periculū*

OMnibus prædictis efficacius auxilium in hac hydropis specie chirurgia præstat, Asclepiade autore. fissuras autem circa internum talum infligere oportet in loco quatuor digitorum spatio supra talum eminente, ea profunditate, qua quis in uenæ sectione utatur. Pauco enim sanguine in principio euacuato, per reliquum tempus indefinenter aquositatis excretio procedit, citra omnem inflammationem, ut neque claudi fissura possit, nisi humore omni ante expenso, & homine gracili relicto. atque id cito contingit, nulla inflammatione scissuram occupante, sed ipsa in quadam congruenti temperie permanente, quo omne alienum per ipsam excoletur, & ut nullo opus sit extrinseco pharmaco. Præterea periculum hic nullum uerendum est, uelut in hydropis ascite pertusione: non enim coaceruatim quemadmodum illi euacuantur. ac uero si quis uelit, excretionem plurima facta, eam cohibere, nihil uetuerit ipsas in talis fissuras linamentis obturare, ligamentisq; constringere, atque ubi rursus prodire quid uelimus, laxatis ligamentis, & ablatis linamentis, gestatoq; ac moto ægro, excretionem irritare. Leonides autem inquit, Quod si excretio fissuræ supra talos tardius prodeat, necesse est etiam alias corporis partes findendo diducere: ueluti scrotum tumefactum, fœmora, pudenda, locos supra manuum iuncturas. Quidam enim uulnusculis pluribus ac altioribus incusis, plurimā aquosam substantiam exhauserunt. Et Hippocrates sanè non supra talos adhibet chirurgiam, sed iuxta scrotum & fœmora uulnuscula infligere iubet, eaq; sale maxime conficere: hic enim modus paulatim & incessanter humorem educit, & ualde celerem compressionem tumores ipsos recipere, ipse tradit. Porro si aliquibus excretionem amplius mouere uelimus, post impacta uulnuscula, & talorum lincinationes, eos ipsos pro deambulatione, serculo gestamus aut lectica sublimes circumuectamus. Cæterum Archigenes ita prodit, Non sunt audiendi, inquit, qui per huiusmodi lincinationes nihil excerni dicunt, quin potius cum fiducia hæ ipsæ incutiendæ: nam & nos, inquit, his cutis fissuris sumus usi, & per ipsas quantum plurimum exduimus humorem, ut & fœmora, & suræ, & superior uenter euidenter sint demissa ac compressa.

Reliqua

Reliqua prædictorum cura.

Cap. XXXI

Maximum hydropis subter cutem auxilium uomitus præstant, quod
 ipsum difficile est in ætate puerili adhibere, propterea quod non faci-
 le ut id admittant persuaderi possunt: quare varias excogitabimus artes, qui-
 bus uomitum concitemus: tonfillas uidelicet pinnulis aut digitis oleo illitis
 irritando: aut ficus assata oleo imbuta & pipetis puluere conpersa, post de-
 ambulationes à somno exhibeatur. Butyrum etiam cum melle gustandum
 præbeatur: aut raphanus coctus adipose conditus detur: aut fassamentum
 pingue cum oleo multo offeratur, aliquando etiam aceto ammixto. Sunt
 & alia plurima quæ uomitum mouent, relata in tertio sermone. Amplius au-
 tem tum uentrem, tum intestina ligamenti adstringant, iidemque omnem
 cutis coerceant tumorem. Fiant autem ligationes ab extremis parnis inci-
 piendo, & ad supernas procedendo. Vinctiendæ etiam partes, manus uideli-
 cet & pedes, oleo cyprino prius illinantur: spongiæ item imponantur late
 ab acida muria optime expressæ: potest & iuncus odoratus, aut rosmarinus,
 aut pulegium, aut calaminthe, & maxime omnium absinthium in ipso ace-
 to decoqui. Post uero ligamenta ipsis spongijs circumdêtur. A uomitu pro-
 spiciendum ut inferior aliis inclinationem ad uomendum permute: ueteri
 fassamento crudo ante cibum reliquum accepto. Mercurialis item cocta sa-
 leque ac oleo condita in uino tincta sumatur: aut decocti ipsius scsquicyathû
 cum sale dato: quædam etiam in ascite dicta his exhibeto. Præbenda & quæ
 urinam cient, uelut est daucus, fœli, cardamomum, radicis asparagi deco-
 ctum, trixaginis, radicis trifolij decoctum, aut ipsius radicis drachma una
 ex uini cyathi iiii. radix cryngij sicca cum uino, item decoctum eius in po-
 tu acceptum, seminis uitiis drachma una. Commodè etiam seminis hyacin-
 thi bulbi drachma una cum uini cyathis tribus potatur: urinam enim ducit.
 Quidam autem hyacinthi flore coria tingunt. Inter omnia autem pharma-
 ca quæ omnibus hydropicis, maxime tamen eis qui subtercutaneo dicto la-
 borant, exhibentur: præstantissimi sales thcriaci censentur tum cibus ammi-
 xti, tum in liquameta additi eorum qui ad perfectam ætatem perucnerunt.
 Eorum autem apparatus in xiiii reperies sermone.

Communis diætæ omnium hydropicorum: Archi-
 genis.

Caput xxxii

Post quotidiana exercitia communis omnibus hydropicis diætæ hæc
 sit. Ab aridarum rerum comestione initium faciemus: quod si tamen in-
 tensa sitis instet, parum quid delibandum dabimus solati tantum gratia,
 & leniendæ sitis. Sit autem uniuersus cibus facilis concoctu & sufficien-
 ter coactus: exolutus enim aptus est ut in aquositate commutetur: sit ita-
 que panis optimus clibanites, qui salem, ammiu, & fœniculum habeat
 admixtum: conueniunt etiam eochele assatæ, oua assata, & auiculæ sic-
 ciores, uelut perdices, coturnices, turtures, Ex terrestribus, lepus, capra

x 4 syluestris

uomit. hypopar-
uatis.

Vomitum
cientia

spongiæ uenter appo-
nit.

Urinam
cientia

syluestris, dorcades. Ex mansuetis, extreme suum partes: ex aquaticibus, cancri, locustæ, herinacci recentes, squillæ. Olerum rarus sit usus: quæ uero ex eis exhibentur acriora sint, & magis syluestria, uelut est coronopus, eryngium, pastinaca, porri capitati, allia cocta. A leguminibus uero abstineant in totum. Pro liquamine utatur aceto cum pipere & lasere, aut quibusdam ex oxyporis cito penetrantibus ad colicos descriptis. Sales sint ex rosmarino, sceniculo, hyssopo, silphio, ligustico, & apij semine compositi. In potu tantum præbendum quantum ad infringendam aliquo modo sitim sufficit: in commodus est enim eis plurimus potus. Porro maximam ciborum partem in cena accipiant: omnes autem placentas ex similagine & passo apparatus uident, plurimos itidem fructus & secundas mensas. Concedendæ tamen palmulæ, nuces, amygdalæ, uua pensilis, mala punica, pira cocta, ac caricæ, omnia moderate, neque omnia quotidie. Vinum autem sit tenue, & quod ciet urinam. Dulcia uero uina & uinum mulsum uitanda. Lectus non ualde mollis sit, præsertim his qui hydropem subter cutem laborant: substernantur autem arundinum folia, & herbæ resiccantes, uelut est uitex, pulegiū, calaminthe, & similia. Mirum est enim quantum huiusmodi per somnum resiccant, ut constet iam quosdam frumenti acetuis obuolutos & absconditos a somno surrexisse firmos. Opercula etiam ipsa quibus teguntur, apparentur duriora. Moderatus autem esse consuevit ipse tumor, secundum anni tempus.

Decimi sermonis

Finis.

AETII ANTIOCHENI MEDICI

DE RENVM ET VESICAE AFFECTIONIBVS ET

de priapismo, ac seminis profluio, rebusq;
ueneris, Sermo undecimus.

Iano Cornario Zuicauienti interprete.

INDEX Capitum Vndecimi Aetij Sermonis.

De diabete, hoc est profluio urinæ.	Caput I
De renum cruentam urinam excernentium debilitate.	Cap. II
De his qui per circuitum quendam sanguinem mingunt.	Cap. III
De calculosis renibus.	Cap. IIII
Cura renum calculosorum.	Cap. V
Dietæ præseruans ne lapides renascantur.	Cap. VI
Vnguentum renale: Oribasij.	Cap. VII
Dietæ eorum quibus renes è lapide laborant, reliqui uero totius corporis habitus gracilis est.	Cap. VIIII
De calculosa uesica.	Cap. IX
Pharmaca lapides uesicæ atterentia & urinam ducentia.	Cap. X
Communia remedia uesicæ & renum calculosorum.	Cap. XI
De hircino sanguine.	Cap. XII
Antidoti uariæ ad calculosos.	Cap. XIII
Cura eorum in quibus lapis atteri non potest, neq; item per lotium excerni.	Cap. XIII
Dietæ post exactos lapides, adseruans ne alij renascantur: & de affligentis humoris cognitione ex lapidis colore.	Cap. XV
De renum inflammatione.	Cap. XVI
De duritie renum.	Cap. XVII
De suppuratis renibus.	Cap. XVIII
De disuria, id est emittendi urinam difficultate: & stranguaria, id est stillicidio urinæ.	Cap. XIX
De difficultate emittendi urinam in febribus.	Cap. XX
De ischuria, id est urinæ suppressione.	Cap. XXI
De scabiosa uesica.	Cap. XXII
Simplicia remedia ad suppressam ac ægre prodeuntem urinam, si aut eius multitudo, aut crassities in causa sit.	Cap. XXIII
De resoluta per paralysem uesica.	Cap. XXIII
	Ad eos

Ad eos qui se in somno perthungunt.	Cap. xxv
De inflammatione uesicæ.	Cap. xxvi
De sanguinis ex uesica eruptione, & de grumis eiusdem.	Cap. xxvii
Quæ tubercula in uesica concoctione indigent.	Cap. xxviii
De uesicæ ulceribus.	Cap. xxix
Diæta ex libris Archigenis.	Cap. xxx
De uesicæ fluxione, & his quæ capillorum forma exeunt cum urina.	Cap. xxxi
De priapismo & satyriasi: Galeni.	Cap. xxxii
De feminis profluuiis: Galeni.	Cap. xxxiii
De feminis in somnis profluuiis.	Cap. xxxiiii
De his qui re uenere uti non possunt.	Cap. xxxv

F I N I S

De diabete, hoc est profluuiio urinæ.

Caput 1

Diabetes, hys
deros, siphon.
Urina leuor,
dipsacos



simile

Diabetes diuturna est affectio circa renes consistens, multum potum inducens unâ cum hoc quod quicquid bibitur, simul ut acceptum est per urinam reijcitur. Quidam autem affectionem hanc hydropem, siue hyderum, & siphonem à fusorij instrumenti similitudine appellant, alij urinæ leuitatem uocant, alij dipsacon ab inexplebili siti appellauere. Concomitantur ægros pertinax sitis, neq; ulla satietas ex alicuius liquoris exhibitione contingit. Aliquando & sitis supra sitim inexplebiliter ægros urget, hoc est ut assidue potum assumere cogantur, neq; tamen satiantur propterea quod citissime per lotium expellitur potatum. Caterum proprius renum affectus diabetes existit, qui uidelicet immoderate humorem appetunt, ipsumq; propter debilitatem retentiuæ in eis facultatis continere non possunt. Quemadmodum enim in appetitionibus caninis, & in quibusdam lienterijs uehementissimæ quidem appetentiæ oboriuntur, quæ multos cibos, eosq; assatim accipere cogunt: uerum nihil ferè ex acceptis retinetur: sed in caninis quidem appetitionibus ob grauitatem reuomuntur: in lienterijs uero tum ob grauitatem, tum ob præsentem retentiuæ facultatis infirmitatem, inferne cruda excernuntur. Eodem modo etiam in renibus uehementissima ferosi humoris appetentia contingit, propter debilitatem autem retentiuæ in eis potentia, cum ipsum humorem acruatim in uesicam excernunt. Aretæus etiam hæc addit, Viscera ipsis uri uidentur, anxij sunt ac animo dubij, & non longe post moriuntur: igne amplius ardere se putant

tant, acceditq; sitis & mictio festina: sed quamuis aliquando parumper urinam retineant, intumescunt lumbi, testes, & coxæ: quod si adhuc amplius mordens caliditas in uisceribus augeatur, superior uenter corrugatur, & uenæ in ipso eleuantur, uniuersum habitū gracilem habent, & tabes totius corporis grauis accedit. Porro alij sunt qui non mingant, neq; ex eis aliās potatum transpirat. Quare ob potus insatietatem, & humoris inundationem, & uesciæ circumtensionem, acruatim uentre rumpuntur. Cæterum humores uisiosi in ipso renum corpore imbibiti, affectionem ipsam inducunt. Scopus igitur in curationibus nobis sit, ut humorum acredinem deleamus, sanguinemq; ac cum eo permixtum serosum humorem ad motum tardiotem redamus, & renum intemperiem reuocemus.

Archigenis. Itaq; mox ubi occiperit malum, nondum ad perfectionem progressum, optimū est cubiti secare uenam, & moderate sanguinem auferre. Utendum etiam mediocriter urinam cientibus, quæ uinum in renes imbibitum humorem repurgare possunt. Quod si uero inueteratum sit malum, neq; uenæ sectio assumatur, neq; quicquam quod urinam cit exhibeat. Concidunt enim in inueteratis uires, & ex uenæ incisione totum corpus acrius redditur, & urinam cientia in ipsis multiplicat malum. Maximū autem remedium huic affectioni, ut statim potatum reuomat. Sit autem perquam frigidus ipse potus, reliqua item diætā conuenit uti frigidior: quare olera refrigerantia minimeq; urinam cientia in cibo profunt, pro sorbitione autem ptisanæ succus frigidus probatur. Materia etiam ipsa ad exudationem diuertenda. Optima uero, inquit Aretæus, est in dolio facta euaporatio, ad exudandum, eo modo ut caput extra dolium promineat: frigidumq; aerem attrahat, reliquum uero corpus omne calefiat. De cætero uelut æstuantem febrem, *causor, fibris æstans uel exarsens* Græci appellant, curare oportet, quo celerissime sitis extinguatur. Farinæ itaq; florem aceto & rosaceo subactum cataplasmatis modo præcordijs imposito: uitis item folia tenera trita, aut umbilici ueneris, aut portulacæ, aut seridis, & quæcunque alia consimilia. præbibendum etiam sanguinariæ succum ex uino nigro assidue præbeto. Symphytum item & palmarum cremorem, baccarumq; myrti & pisorum. Vermes quoq; terrenos coctos ex aliquo prædictorum succorum. Cibi exhibeantur boni succi, mordacitate carentes, & qui acredinem obtundere possunt, uelut sunt oua sorbilia, & siligo, & halica ad sorbitionis formam apparatus, carnes porcine macræ leues coctæ. Vinum sit rufum, crassius, frigida amplius dilutum, ad sanguinosorum humorum proolutionem, qui finem inducunt. Vinum enim corporis miscellam ad dulcorem permutat: neq; uero incommode exhibetur eis caseus recens compactus citra salem, & lac per silices aut ferrum ignitum scissum, seroso humore adempto. Porro si prædicta auxilia frustra adhibeantur, affectioq; ipsa augeatur non absurdū fuerit etiam stuporem inducentib; uti, ita ut soporiferū antidotum ex papauerum capitibus

capitibus apparatus exhibeamus, aut aliquem ex doloribus leuantibus par-
stillis. infuso etiam soporifero utendum, uelut est opium erui magnitudine
cum pari modo castorij, aut etiam maiore: hæc in passo cretico dissoluantur
non ut in colicis fieri solet, cum oleo rutaceo: refrigerare enim in his præsu-
mimus. Infunditur etiam utiliter oleum in quo uermes terreni sunt decocti.
Forinsecus autem retro ad lumbos & ad pectinem illitiones & cataplasma-
ta refrigerantia adhibenda, qualia sunt quæ ex lactuca, umbilico ueneris, len-
ticula palustri, perdicio, & similibus apparantur. Cerata etiam his locis ex
rosacco adornata imponenda, aut ex chamæmelino quibusdam ex prædi-
ctis succis ammixtis. In quibus autem uehementer stupefacere sensum in-
tendimus, etiam mandragoræ succum in cerata ammiscemus, foliorum item
papaueris succum, & similia. Per interualla autem quædam, etiam antidoti
ad lethalia uenena destinata exhibeantur, & maxime theriace ex uiperis
constans Andromachi inueto, recens apparatus, & ea quæ Esdra in scribitur.

De renum cruentam urinam excernentium
debilitate: ex libris Rufi.

Cap. 11

Renum porro & alia affectio est, in qua tenue sanguinis serum mingi-
tur, quod ipsum itidem propter renum debilitatem contingit, quemad-
modum in hepate fieri solere diximus, atque propter amplitudinem osculo-
rum ex uena cava urinam ad renes excolantiū. Quum enim ampliores me-
tus sint, quiddam etiam ex sanguine uenæ laxatum emittunt, aliaque itidem
crassa: adeo ut postquam ea quæ mixta sunt constiterint, subsidentia quæ-
dam in uase reperiuntur, & superne quædam concreta, marinum maxime
pulmonem similitudine referentia. Concocto igitur cibo & in uenas distri-
buto, qualia dicta sunt minguntur: recens autem ingesto & crudo adhuc ci-
bo, pura & aquosa, quæ nihil subsidens habent, per lotium eiciuntur. Nihil
uero dolitant, aut omnino parum, & eiectione lotio leuati melius habent. Exte-
nuantur autem & emaciantur temporis progressu omnes, & magis adhuc
hi qui plus sanguinis mixtum excernunt. A principio itaque conuenit his quies,
& cibi adstringentes, & uinum nigrum in potu. Ab his quæ urinam cient &
à coitu omnino abstinendum. In potu autem hæmoptoica pharmaca exhi-
benda, maxime uero sanguinariæ succus, & radices symphyti decoctum, &
tragacanthus in uino nigro macerata. Sistit uero sanguinis ex renibus eru-
ptiones strationæ aquis innatantis succus potatus, & radices magnæ croco-
diliadis iuxta aquas nascentes, quam Syri orophen appellant, decoctum,
pæoniæ siue glycyssides grana fulua xii ex uino. Cornu ceruini usti drach-
ma una ex uino, folia falicis trita cum uino, lysimachij succus, lapidis hæma-
titæ drachma una, ramentorum loti arboris tremor, radices spinæ albæ de-
coctum, & similia, quæ in sermone de hæmoptoicis sunt prædicta. Forinse-
cus autem renibus & lumbis imponuntur ea quæ ad muliebrem fluxum de-
scribuntur epithemata, item ea quæ ad sanguinis per sputum reiectiones sunt
descripta

*Sistitia
sanguinem*

*Crocodylias,
orophe*

descripta: & quæcunq; unâ cum eo quod adstringunt & resiccant, etiam ro-
bur addere possunt: qualia sunt rubi folia, & glandes, & myrti ac quercus fo-
lia, itemq; myrti bacce, malicorium & balauſtia, & perdicj folia, & similia
palmis pafsis excepta, & imposita. Post hæc habitus cibarijs, lacte ac auicu-
larum carnibus, suillis etiam ac macris reficiendus est, quo uniuersum corpus
ad pristinas vires reducat, & renes corroborati proprium obeant munus.
Est autem proprium renum munus, serosum humorem à sanguine secer-
nere & excolare.

Loc. ex libro 1. 67.

*Renum mu-
nus proprium*

De his qui per circuitum quandam sanguinem min-
gunt: Archigenis. Cap. III

Quidam per circuitus quosdam sanguinem è renibus excernunt, simi-
li modo ut ex hæmorrhoidibus in sede fieri consuevit: & in principio
quidem propterea quod citra ullum aliquem dolorem excernitur, nihil in
totum mali formidant ægri: ubi uero diuturnior fuerit affectio, & aliquan-
do cohibeatur quod pro more excerni consuevit, grauitatem inducit, alio-
rumq; pessimorum morborum causa existit, sanguine nimirum ad alias
particulas dilabente. articulares enim affectiones in aliquibus ex cohibicio-
ne accidunt, aut uertigines, aut deliria ex atra bile, & insaniz, aut oculorum
cæcitates, qualia etiam mala hæmorrhoidibus cohibitis contingunt: ut plu-
rimum uero in malum habitum corporis & hydropē delabendi aptitudo
inde oboritur. Manifestum autem fit sanguinem è renibus excerni, quod
ipsi ægri excreti sanguinis transitum iuxta renum locum sæpe sensu perci-
piunt, & maxime quum urinæ ammixtus sanguis reperitur. Contingit affe-
ctio hæc magis in ætate uigoris, præsertim iuuenibus qui licentius rebus ue-
nereis utuntur. Quidam autem sanguinem ex renibus excernunt, propter
uenæ rupturam in renibus factam. Quemadmodum contingit his qui gra-
ue onus leuarunt, aut ualde saltarunt, aut ex alto ceciderunt, aut aliud quip-
piam tale uiolentum pertulerunt. Aliquando autem & ob acres ex supernis
defluentes humores erosio uenarum contingit. Conandum igitur statim in
principio ut sanguinis impetus cohibeatur: præsertim in his qui cum secun-
dum circuitum excernunt. Si enim ab exercitatione, ut dictum est, excretio
contingit non tuto cohibetur: itaque uenæ sectio in cubito commoda fuit
his qui per circuitum sanguinem excernunt, paulo ante circuitum adhibita:
eis uero quibus ob ruptam uenam promanar, statim in principio. Cate-
rum sanguinis detractionem partiri melius erit, ut paulatim eius reuulsio ac
diuersio fiat. Loci autem circa renes spongijs posca imbutis cooperiatur, aut
lanis succidis cum rosacco & aceto. Post hæc & emplastra imponenda cru-
entis uulneribus & colicis apta. Commode etiam cucurbita adhibetur, præ-
sertim si suspicio sit inflammationem adesse in his, qui ob uenæ rupturam
sanguinem mingunt. Conueniunt item potiones hæmoptoicis aptæ. Por-
rò ubi sanguinis excretio cessauerit, diætâ utendum est unde non multus

*no est coheret neq;
cretia.*

y sanguis

sanguis gignatur, maxime in his qui per circuitum excreuerunt, & supetnae corporis partes assidue exercendae. In his uero qui ob uenam ruptam sanguinem mingunt, si exulceratio in locis relinquatur, ipsam post sanguinis superfusionem, curabimus per ea quae in loco de exulceratione dicentur.

Emplastrum renale.

Cerę sesquiciantiam, croci statereim unum, uitellorum ouorum numero duo, palmarum numero decem, aceti & rosacei quantum satis est.

De calculosis renibus: Archigenis & Philagrii. Cap. IIII

Simile **R**enum calculi homines proeuctae aetatis magis quam pueri apprehenduntur: quemadmodum uesicae calculis pueri frequentius quam aetate proeucti. Causae autem generationis horum calculorum assidue existunt cruditates, unde materiae incoctae ac crudę multitudo congregatur, & ardor circa renes & uesicam exoritur, qui humores adassans eos cogit, & in lapidem indurat, ad modum toforum qui in aquis reperiuntur, quae in aeris praesertim balnearum uasis coquuntur. Consistunt autem lapides in renibus iuxta uentriculos ipsorum, aut parui, aut maiores: & aliquando quidem pauciores, aliquando autem plures: & magnitudine, & forma, & colore, & asperitate, & multitudine inter se differentes: nigri enim & subalbidi & pallidi reperiuntur. Ex eorum numero rotundi & leues facile excernuntur, non item qui alia quacunque forma praediti sunt, maxime tamen oblongi & asperi difficulter excernuntur. Accedit agris loci dolor, tumore nusquam foris apparente, nisi inflammatio per lapillos producat: spina aegre flecti potest, & totum corpus ad mortuum pigrum est: crura torpent, & maxime crus rheni affecto propinquum. Urinae circa obturationis principium paucae, aquosae minguntur: postea uero perfecta earum suppressio contingit, aluiusque nihil excernit, uerum promptitudines multas ad egerendum facit. Excernitur autem aliquando sanguis propter uiolentiam calculorum praesertim asperiorum. Ceterum ubi lapis ex renibus fuerit emotus, & ad uesicam delatus, urinae multae prodeunt arenosae subsidentiam habentes, & aluius similiter large egerit. Sensum autem aeger percipit, ueluti calculo a renibus ad uesicam transeunte.

Cura renum calculosorum.

Cap. v

Quoniam lapis in renibus fuerit obturatus, & uehementissimos intulerit dolores, sanguinis etiam multitudo periculum minitantis materias ad tensionem affectam partem aduocat, ob acutos uidelicet dolores. uena igitur cubiti propinqua manus in corpore ex repletionis affecto secanda est: uerum multo minus euacuandum est quam ipsa repletionis copia expostulat: neque enim futurum speramus ut omnino cito e renibus excidat lapis, praesertim si magnus existat: quare seruire oportet sanguinem in eam quae cum tempore futura est in corpore expensam. Itaque qui sanguinis multitudinem congregauit, eis uenae sectio commoda existit: qui uero uitioso hu-

more

more abundant, eis purgatio apta est, quæ abundantî humori conueniens erit, neq; omittenda hæc est, nisi aliud quidpiam id fieri prohibeat. Post sanguinem euacuatum aut expurgatum humorem, communis ad omnes calculosos curatio quam infra subieciimus adhibenda. Doloribus igitur repente aut paulatim irruentibus, & per arenularum cum urinis excretionem auctis: deindeq; aquosis urinis excretis, & prædictis signis consequentibus, ægri aluo per clysterem infundere oportet furfurum decoctû caricarumq; ac sceni græci & aristolochiæ: & siquidem decenter euacuentur, sineresi uero non, etiam bis aut tertium infundere, atq; id maxime si uenæ sectæ aut purgationis auxilium sit relictum. Cæterum ubi sufficienter excreuerit uenter, quædam infundere oportet, quæ corpusculorû circum lapidem sitorum inflammationes lenire & laxare possunt: id ipsum uero oleum anethinum facere poterit, adipe gallinaceo recenti in eo eliquato, & maxime anserino, & phasianî, aut etiam butyro: quæ si non adsint, etiam scœnum græcum & althææ radicem oleo decocta infundemus. Infectiones item in balneis assuendæ, & post hoc statim ægri in solum tepidius demittendi, atque id alsi due facere non ab re est. Fomenta quoq; locis admota commodant ex furfuribus, præsertim in prædictis decoctionibus incoctis. Post fomenta conueniunt cataplasmata ex farina tritici, cum semine lini & scœni græci, melleq; & oleo anethino aut glucino, ita ut in decoquendo etiam althææ radicem contusam & cribratam cataplasmati inferciamus: in sine autem cocturæ terrebithina quoq; iniiciatur. Optimum etiam cataplasma fit ex lupinorum farina in passo cocta, peucedani radice quàm tenuissime trita, & chamæmele in puluerem redacta ad farinam lupinorum ammixtis. Bonum est & panem passo decoctum circa lumbos & uentrem imponere, neq; tamen absurdum foret eadem cataplasmata uesicæ ac peccini adhibere. Oportet autem coacervatim alia super alia cataplasmata adferre, priusquàm primum frigescat: aut si id non libeat, calefactorio alio extra contingere ne refrigerentur: id quod cõmode fieri potest per saccellos, aut alia uaporaria cataplasmati imposita. Multis enim ad lapidis per urinam eiectionem hæc sola suffecerunt: uerum tu etiam ea quæ urinam cient præbibenda dato. Urinam autem multam ducit, mei athamantici, rhej pontici, acori, graminis & nardi decoctum, calami aromatici, ammij, dauci, oreoselini, hyperici, rosmarini, asari, radices asphodeli, radices bryoniæ decoctum, coccus item tinctorius. Ex his singulisq; similia tum per se, tum inuicem permixta data, urinam manifeste mouent. Crassa autem locia ducit, radices cardui decoctum, radices rubiæ farina potata, radices capparis cortex, & similia. Exuscitat autem facultates ad excretionem irritando, allium, chamædaphne, asparagi uitis albæ, asparagus, tertium scillæ decoctum primo ac secundo diffuso. Deducunt autem ad renes ea quæ calculos confringunt, peucedani radix, bryonia, apium, radícula. Cæterum lapides ipsos in renibus confringunt ac aterunt, sion, adiantum,

y 3 bdellium

Laxantia in
inflammationesUrinam
ducentia

Crassa Graia ducunt

Tecolithon.
Lappa, philan-
thropos, &
xanthium

Vreteres
meatus

Catheter

bdellium, uitis semen, oxymyrthes radix, radices lauri cortex, paliuri semen, tribuli decoctum, sarxiphagi, betonica, radices graminis, damasonij radices, ciceris iusculum, radix cyperi, lithospermon, tecolithon à liquefaciēdo lapidem dictum, lappæ quæ philanthropos & xanthium dicitur semen quod in spinosis pilulis reperitur, & lithospermo assimilatur: asparagi palustris radices, uirum contusum tritum, althææ semen & radix, rumicis domesticæ radix, pruni arboris gummi, ex spongijs marinis lapilli, uermes terreni cocti: horum singula partim decocta, partim tenuissime trita, præbeto bibenda. Sunt & composita plurima lapidem frāgentia, ex quorum numero utiliora in cura calculosæ uesicæ subiungam. Porro ea quæ urinam cient ac lapidem frangunt, tunc exhibere conuenit quum uehementēs dolores remittunt. Transmoto enim lapide & ex sede agitato dolores quiescunt. Quod si obfirmati sint lapides, plunimus potus uitandus, itemq; ea quæ urinam ducunt, fomentis autem & cataplasmatibus ac infusionibus membra relaxanda, & uenter per infusa ac infusus euacuandus, ne ureteres meatus urinam ex renibus ad uesicam transmittentes comprimantur. Post hæc autem doloribus aliquantulum lenitis, etiam cucurbitæ uiliter ipsis adhibentur & præsertim præsius affixæ, inflammatione uidelicet id non impediēte. A deo enim coaceruatim transmouent sæpe cucurbitæ ipsos lapides, ut repente dolores supprimant, lapide nimirum in uesicæ amplitudinē transuēcto: quapropter in principio superne à rene cucurbitæ sunt affigendæ & ad inguina adtrahendæ oblique secundum meatuum qui ureteres appellantur situm. Cæterum si calidius sit ægri corpus, sitisq; uehementer infestet: sit autem uniuersum corpus iam per uenæ sectionem, aut purgationem, & efficacissimos dysteres præeuacuatum, ac nulla superfluitate abundet, si quidem cōsueti fuerint ad frigida potum, & nullum ex uisceribus debile existat: frigidam a quam frequenter & acuatim ægro bibendam exhibuimus, & confestim corroboratis renibus, obturatum in ipsis lapidem expulerunt. In repletis autem corporibus & abundantibus superfluitatibus, & in his qui uiscera debilia habent, uitare oportet frigida potum. Sæpe autem delati ex renibus in uesicam lapides, & præ magnitudine circa collum uesicæ detenti, in extremum periculum ægrum deducunt, tum propter dolorum acumen, tum quod urinam excernere non permittunt. Decubitus igitur formam in talibus moliri oportet, ita ut supini sicutentur, & longe altiores coxarum uertebrae habeant: deinde multiformiter eos commouere, quo omnibus machinamentis adhibitis lapidem ex ipso uesicæ meatu excidere faciamus: post uero ægros iubere ut alacriter urinam ejciant, & eiecto lotio sinere: at uero ubi lapis non fuerit euacuatus, rursus mouere, atq; hoc ipsum sæpe repetere. Quod si non euacuetur, catheter instrumentum proleclandæ urinæ aptum immittatur, quod pro ægri ætate congruenter sit moderatum: eoq; humor educatur: post uero per potiones lapidem in amplitudine uesicæ existentem

stentem confringere ualentes, lapis ipse atteratur. Si uero ex uesica quidem excidat calculus, iuxta medium autem meatuum ipsius pudēdi obfirmetur, & uulnerando exulcerationis periculum inducat, decoctum quoddam ex prædictis urinam ducentibus plurimum exhibendum est, iubendusq; eget ut multam urinam congreget, eamq; postea emingat ac diligentius expellat: ita enim detractus lapis celeriter excidete consuevit. Noui autem, inquit Philagrius, quendam in quo quidem aliās lapis fuit progressus, nō penitus autem quā in summo pudendo fortiter obturatus, & parum abfuit quin homo periret, propter urinæ suppresionem, & maximum dolorem. Angusta igitur uolsella ipsum lapidem extrahere non potuimus, quare sensim & quiete agitauimus per quā tenui auriculario specillo, quum uero neq; hoc modo eum extrahere possemus, secare statuimus, uulnuscūlo superne iuxta glandis magnitudinem incusso. Inferne enim secare non expedit, quando quidem fere semper in fistulam proficit, ac postea per ipsam fissuram urina excernitur. Porro ubi per urinam prodierit lapis, lac asininum melle modico mixtum præbeatur, & reliqua etiam diæta cōmodior, ueluti ad ulcera fieri consuevit, cōstituatur, ob uexationem uidelicet in locis ex lapide factam. Inde uero præseruare hominem oportet, ne rursus renes lapide infestentur.

Philagrii experimentum

Glans inferna non secanda

Smegma Archigenis, ad uescicam & renes affectos ut atenam per lotium excernant, quo in balneis sudans utaris.

Piperis, calcis uiuæ, sinapis, fecis uini ustæ, staphidis syluestris, niri, adarces, pumicis, aluminis scissi, sulphuris uiui, æqualibus partibus utere. Ex oleo præillitis locis.

Diæta præseruans ne lapides renascantur. Cap. vi

Maximi ad lapidis generationem præcauendam momenti, moderatus cibis & bonæ concoctiones existunt: satietates enim & cruditates non solum exasperant morbum, sed etiam quum non sit generant. quare ægros admonere oportet, ut à cœna sæpe uomant, & absinthium assidue bibant, & per tempus certum conuenienti temperaturæ ipsorum purgatio pharmacum se per uentrem purgent, Cibos autem deligant è quibus neq; satietates neq; cruditates contingant: urinam etiam cientibus utantur: pastinacam indies edentes ualde percoctam, & sceniculum, sion, catuum, pulegium, calamithen. Et ex marinis herinacios recentes, strombos, locustas, gammauros, & caneros fluuiatiles: atq; hæc quidem quotidiana sint, per plures autem dies radicis eryngij decoctum bibant, similiterq; trixaginis, & dictamni, ac radicis tribuli, reliquaq; pharmaca lapidem atterentia partim iam prædicta, partim dicenda. Oportet autem ipsam etiam aquam per omnem uictum purissimam esse & percolatā: uinum item tenue, album, urinam ciens: exercitamenti uero utendum est mediocribus, & fricationibus in balneis ex nitro assato, & fece uini ustæ, ac pumice: psilothris item assidue utatur, ac reliqua adseruante diæta, quæ in calculosa uesica loco dicitur.

y 3 Vnguen

Vnguentum renale: Oribasij.

Cap. VII

CYprini libras III, ceræ lib. II, terebinthinæ lib. I, unguenti amaracini & laurini cuiusq; lib. I, centaureæ, castorei, saryri, myrrhe, piperis, euphorbij, cuiusq; quadrantem, cyperi, pyrettri, pulegij, cuiusq; unciam I. subige, & in fine etiam opobalsami trientem ammisce. Quidam euphorbij sesquunciam tantum adiiciunt.

Aliud malagma: hoc exquisitum est ad eos quibus renes aut uesica lapide laborant, inquit Archigenes: neq; reperias aliud his affectionibus conuenientius.

Picis liquidæ, italicas heminas duas & dimidiam, ceræ, resinæ pinus, sulphuris uiui, cuiusq; sesquilibram, nitri sesquilibram, pyrettri sexuncem, fecis uini uisæ lib. II, cardamomi italicum sextarium I, staphidis syluestris sextarium unum, galbani sexuncem. Liquecibilibus liquefactis arida trita infarcito.

Emplastrum renale: facit ad colicos & coxendices: est autem Asclepiadæ.

Ceræ trientem, styracis sesquunciam, aloes sesquunciam, croci, pyrettri, opopanax, galbani, thuris, cuiusq; unciam unam, ammoniaci thymiamatis sextantem, olei ueteris trientem. Apparatum ac pro more subactum confidetur usurpato, & miraberis, inquit Asclepiades. Aliquando uero olei tantum sextantem coniicimus.

Dietæ eorum quibus renes è lapide laborant, reliqui uero totius corporis habitus gracilis est: Philagrii.

Cap. VIII

MAligna corporis constitutio est in qua renes quidem lapidem generant, uniuersi uero corporis natura gracilis existit. Etenim quum lapides laborantes pharmacis & uictu indigeant attenuatorijs, hæc ipsa gracilibus corporibus maxime contraria existunt. Noui enim quendam qui ob renum ex lapide affectionem huiusmodi dietæ usus, proprios digitos ægremobiles, obtusiq; sensus, & ueluti strepentes ac ignitos sensit: medici autem ipsi familiares refrigeratos digitos ipsius rati, & resolutionem, quam paralylin Græci uocant, meditari, pharmaca ex euphorbio & adarce adhibuerunt: quorum usu dispositio multo peior reddita est, & accessiones semper ad superiores partes progressæ sunt, unaq; uehementissimos dolores intulerunt. Post uero ubi æger me accessisset, inquit Philagrus, & quæ contigerant circa ipsum declarasset, auxilium meum implorabat. quare dietam ei inueni per quam citra omnem renum læsionem, uniuersam corporis siccitatem sanauit. Pisanæ igitur succum excogitari, & ex piscibus in petrositis aquis degentes, itemq; maritimos, & quæcunq; alia nihil uiscosum habentia. Simili modo & ex uolucrum genere quæcunq; consimilem habent carnem, ueluti sunt perdices montanæ, attagenæ, sturni, turdi, & merule, & deinceps columbæ in turribus habitantes, & passeruli itidem in turribus nidos struentes ac habitantes, deinde etiam gallinæ in altioribus locis connutritæ. A lacte autem

Paralysis
resolutio

tem

tem reliquorum quidem animalium abstinere iussimus, solo uero asinino uti indulsumus. & ut compendio dicam, media inter ea quæ impinguant & attenuant esse oportet, quæ his ciborum loco exhibentur.

De calculosa uesica.

Cap. ix

Generantur etiam in uesica lapides, pueris frequentius quam ætate pro-
uectis. uoraces enim pueri sunt & perpetui motus, & cibus utuntur obla-
tis & nociuis utuntur, & neque horam cibum capiendi seruant ordinatam: quin
etiam prius quam prior assumptus cibus concoquatur alium ingerunt: &
quum uehementius à cibo moueantur, crudus & incoctus in uenas cibus di-
stribuitur. Mollia autem sunt ipsorum corpora, & quæ facile cedant, eiusque
rei gratia obturationem circa renes non perferunt. quum uero crassissima lo-
tia in uesicæ amplitudinem perferantur, ibidem ueluti uini fex, & limus aquæ
subsistunt, ac postea ex loci caliditate desiccata lapidescunt. Cæterum aquæ
impuræ, & multo limo refertæ, itemque duriores & uehementer frigida, lapi-
dum generationem adiuuant. Lapides igitur in uesica obortos in principio
subiectis pharmacis subducere conabimur.

Pharmaca lapides uesicæ atterentia, itemque urinam ducentia. Cap. x

Sunt & pharmaca quæ lapides in uesica atterunt: porri semen, foeniculi
styluestris radix, artemisia, chamæmelum, amaracus, altheæ radix & se-
men, carpobalsamum, sion quod circa aquas nascitur, graminis radix, adian-
tum, philetærii radix, smyrniæ semen, oxymyrsmes radix & semen, rumicis
radix, pæoniæ grana fulua comesta, umbilici ueneris radix, leucanthemum,
lapides spongiarum, amomum, tecolichon, lithospermon, scolopendra her-
ba, lapis qui ab ægris per lotium eiectus est tritus ac potatus, lappæ herbæ
quæ xanthium & philanthropos dicitur, semen: uermes terreni recentes co-
cti triti cum uino, aut condito, aut alio quopiam potu, ex uino & melle, pro-
pomatis nomine Græcis appellato: paliuri semen: amomum, quod ipsum
& aquas lapidem gignentes depurgat, si cum ipso amygdalæ amaræ gum-
mi coquatur: radiculæ radix cum panacis radice & capparis cortice similiter
lapidem per urinam eicere facit: thuris granum cum uino mulso, abrotoni
semen cum piperis pari modo ex uino. Horum unumquodque cum uino al-
bo datur decoctum, aut siccum inspersum, aut cum melle, aut cum quopiam
ex uino & melle potu. Danda etiam in potu ea quæ urinam cient: eis qui-
dem qui calidiore habitu præditi sunt, cucumeris semen, aprij, petroselinij,
hyacinthi bulbi semen, uiolæ albæ semen, croci radix, & similia quæ ad cal-
culosos renes sunt prædicta. eis uero qui temperiem corporis frigidioram
habent, his calidiora præbeto: quale est meon, phu, acorus, carpobalsamum,
iris, & similia in renum affectionibus prædicta.

Oribasij, ad calculosos renes & uesicam.

Herbæ profopidis quam scordiam appellat, & Romana lingua personatam,
est autem folio lato, similis symphyto, huius unciam unam, pipenis drach-

Profopidis, pers-
sonata

y 4 mam

*In uino spiritibus que
ad hunc Cap. 10.*

mam unam, iridis uncia unam, tritam in vitro reponito. Datur inde cochlearij pleni mensura cum hydromelite: datur autem quarto quoque die.

Aliud Oribasij.

Corticis radices uerbasci decoctum large per dies quinque bibendum ex ordine præbe, & interiectis decem diebus, rursus per quinque præbe.

Communia remedia uesicæ & renum calculosorum. Cap. xi

A Cetum mulsum aqua temperatum omnibus è calculo siue renum siue uesicæ laborantibus exhibendum est, qualicumque tandem temperie præditi sunt, & qualemcumque sanguinem gignant: acetum item scillinum. Carduus enim frequentius eis exhibendus est. Oportet autem radices eius recens è terra extractas, si tempus ita ferat, aut aridas iuxta aliud anni tempus, in uino albo substantia tenui decoquere, & largius eam potionem offerre. Crassæ enim urinae copiosam multitudinem ducit, tum ex omnibus uenis, tum ex calculosis partibus detractam. Carduus igitur secundum totius substantiæ suæ proprietatem, & pro priuati temperamenti facultate, uim crassos humores detrahendi habet.

Oribasij.

Commodæ sunt etiam calculosis, cicadæ arida trita potu insperfa tum per se, tum cum nardi spica. congruenter autem miscetur ad cicadas duas & dimidiam, nardi drach. i. Dato ex eis per dies nouem: pitimum, cochleariū i, deinde ii, postea iii, deinde rursus ii, & post i. hoc modo progrediendo, donec nouem ex ordine potiones fiant, i, ii, i, ii, i, ii, i, ii, i, ii.

De passerulo.

Sunt & alia quæ aliam naturam habent, & per hanc ipsam prædicta efficacia prædita sunt: quali sanè præstat passer troglodytes appellatus: est autem passerulus minimus iuxta sepem & muros uictum quantans, estque hoc animalculum omnium auicularum minimum, ea excepta quæ regulus appellatur: similis est autem regulo in multis, præterquam quod in fronte auricolarum pennas non habet. est etiam troglodytes passer regulo paulo maior & nigrior, caudamque semper subrectam & albo colore retro interpunctam habet: magis item garrulus quam regulus est, & sanè iuxta summum alæ lineam metum cinerei amplius coloris. breues item uolatus facit: naturalem autem uim omnino admiratione dignam habet. Itaque sale conditus & crudus in cibo acceptus, morbum perfecte sanat: & noui adeo quosdam ob eius usum nunquam amplius ab affectione uexatos. Conditur autem optime pennis euulsis, atque inde largo sale adobrutus, & postquam fuerit arfactus comeditur, & affectionem perfecte sedat. Melius autem est etiam aliter ipsos edere si plures contigerint, coctos nimirum eius præsertim generis quod per hyemem ubique apparet. Exhibetur autem & alio modo. Passerulus non deplumis in ollula contigitur, ac deinde operculo addito uritur, animaduersione assidua habita, ne fallaris quum in cinere sit redactus, & in aerem exhalans per exustionem totus consumatur: cōsueuit enim hoc contingere tum ipsi, tum alijs quæ uruntur

Passer, troglodytes

Passer, troglodytes
lib. 8. cap. 11.

uruntur: quapropter præstat ollæ operculum non oblinire, ut per interualla quædam operculo adempto uſtionis modum intueamur. Exhibendus eſt autem ſemel omnis unius paſſerculi uſti cinis per ſe, aut modico phyllo & pipere ammixto, quo ſaporis iucunditate ori commendetur. Vſtus itaque paſſerculus peregre proficiſcentibus commodus eſt, licetq; melle cocto exceptum in promptu habere. Melior autem mihi uidetur condiendi modus, atq; adhuc dictis præſtantior, ſi quis præeuulſis pennis uiuum paſſerculum ſale adobruar. quod & ego facio, inquit Philagrius. Arbitror enim & ſanguinis naturam quiddam in ſe complecti, quod minime uulgariter proſiſt: cui amplius ſtercoris efficacia accedit, quam exuſtione debiliore reddi placere credo. Proderit etiam eis qui abūdant aſſatos edere integros, ita ut nihil ex eis præter pennas abijciant. Atq; hæc quidem ſunt quæ ſecundum proprietatem totius ſubſtantiæ efficacia exiſtunt. Caterum non minus generoſe etiam compositæ facultates calculi affectionem in renibus & ueſica deterrunt: prius autem quàm ad eas progrediar, unius ſimplicis pharmaci mentionem faciam ualde celebris, quod perfectam affectionis deſtructionem promittit, & quodam modo ad ea quæ ex proprietate totius ſubſtantiæ operationem faciunt accedere uidetur. Habet autem hoc modo.

Pharmacum ſimplex ad calculoſos, cui Marcianus teſtimonium præbet, medicus Aphcr.

Leporis pellem in ollulam conijce, & in furnum demitte, atq; ubi uſta fuerit ut probe conteri poſſit, acceptam tere, & ex ipſa cochlearium unum cum uino, ieiunis in ſolij calidæ aquæ inſenſu præbe. Si uero uelis experimentum pharmaci ipſius accipere, ex eo in uinum conijce, & in uinum item lapidem ex flumine acceptum iniſce, & conſectum per paucaſ horas ſine, & in grumos lapis diſſoluetur.

Experimentum euident

Presbyteri Indi pharmacum ad calculoſos, quod itidem externum lapidem in grumos reſoluere poſſe quidam aiunt, quemadmodum id quod præcedit.

Acori, phu, hyperici, cuiuſque drachmas ſex, ſeminis porri drachmas xii, ſpicæ nardi drachmas decem, caſiæ, lithoſpermi, cyperti, cuiuſq; drachmas xxxv. excipe melle. Datur magnitudine fabæ.

Aliud, quod lapidem celerrime per urinam expellit.

Alliorum unguiculos ſiue nucleos ſeptem, piperis grana nouem, contere ſimul quàm tenuiſſime, & cum uino albo ueteri adſtringente, pro una uice in balneo bibendum præbe, ubi ad calidum eius locum fuerit ingreſſus. A dolore quidem hoc ægrum liberat: aliquando autem & lapidem poſt unicam potionem exigit.

Oribasij nephriticis.

Acori, mei, phu, aſari, ſarxiphagi, piperis nigri, ſeminis rutæ, betonicæ, ſpicæ nardi, piperis albi, ſingulorum æquales partes accipe: & ex eis ſiccis cochlearium cum uino adſtringente aut aqua præbe.

Aliud

Aliud, Oribasij, ad affectionem renum, quod & somnum inducit. Anisi, apij, petroselini, spicae nardi, piperis albi, nigri, & longi, singulorum drachmas decem, cinamomi drachmas octo, myrrhæ drachmas quatuor, opij drachmas quatuor, castorij, sifonis, dauci, cuiusq; drachmas duas, seminis hyoscyami scilicet drachmam, sarxiphagi, rhei, betonicæ, calsiæ, cumini, seminis cucumeris decorticati, cuiusq; drachmam unam. excipe melle, & nucis ponticæ magnitudine præbe ex aqua calida. Facit & ad ulcera.

Aliud eiusdem, celebre.

Piperis nigri, albi, longi, sarxiphagi, betonicæ, petroselini, asari, nardi celticæ, spicae nardi, omnium æquales partes misce. Dato drachmā unam cum condito calido temperatam.

De hircino sanguine.

Cap. xii

Sanguis hircinus tum ad nephriticos, tum ad calculosos præfens remedium: nam & præexistentes lapides soluit, atque ita per lotium excerni eos facit, ut etiam alij amplius non gignantur: præterea & dolorem sedat. Colligitur autē hircinus sanguis hoc modo. Quum uua maturescere cœperit, ollam nouam accipito, & infusa in ipsam aqua, donec terreum depoluerit olla coquito: & accepto ē grege hircio atate matuta, plus minus quatuor annorum, cum mactato, eiusq; sanguinē medium olla excipito, ita ut eum qui primum effluxit, itemq; postremum penitus relinquant: medium autem inspissari finito, & in olla situm per acutam arundinem in multa frosta discat: indeq; reticulo denso, aut linteolo raro, aut cribro arctiore contextum sub dio exponitoq; ut in soletur & rosidus fiat, cauendo ne hyembre commascat: porro ubi exiccatus fuerit eum diligenter terito & in pyxide adseruato, & remittente malo cochlearium plenum cum passo cretico exhibeto. Cognominatur autem pharmacum hoc Thychir. Huius & nos, inquit Philagrius, in breui tempore non aspernandum periculum fecimus. Aliquando autem odoris commendandi gratia parum phylli, aut amomi, aut similitum ammiscemus. Ego, inquit, hoc pharmacum cum troglodite passerulo permixtum, cuidam penitus nihil lotij eiicienti post magnos dolores exhibui, & per magnum lapidem attritum ab eo expulsi.

Thyche
pharmacum

Iulianus dia-
conus Aetij
medicus fuit

Antidotus Iuliani diaconi, cuius frequens periculum in me fecit: calculos enim & in renibus & in uelica confringit, & paulatim per lotium expellit: facit ad comitiales probe: ducit menses ob densitatem aut frigiditatem restrictos.

Olsium ceruinorum ustorum quadrantem, castorij, piperis albi, agarici, acori, ammi, calsiæ, amomi, sarxiphagi, corticis capparis, radices panacis, calaminthæ, coaguli leporini, serpylli, petroselini, singulorū unciam unam, mellis quantum sufficit. Datur nucis ponticæ magnitudine: ad renum affectionem & menstrua purgamenta, cum uino mulso: ad comitiales, cum frigida aqua: ad bestias uirus eiaciantes, cum uino.

Antidotus

Antidotus ex hircino sanguine.

Componitur ex hircino sanguine antidotus huiusmodi. Sifonis scrupulos xii, spice nardi scrup. xii, piperis communis scrup. xii, piperis longi scrupulos xii, cumini aethiopici scrup. vi, petroselini, dauci, rhei pontici, croci, caroi, ligustici, myrrhæ, acori, cuiusq; scrup. xii, sanguinis hircini exiccati ut luti prædictum est scrupulos xxxvi, mellis despumati quantum satis est. Datur auellane nuci magnitudine condito calido temperata: datur autem in balneo in calidi solij incensu.

Alia, Archigenis: celebre & clarum est, inquit, ad calculosos & hoc quo utor: hæc antidoto inquit, usus est etiã Philotimus & Iustinus.

Spicæ nardi drachmas decem, croci drachmas octo, myrrhæ drachmas quinque, castorij drachmas quatuor & obolos totidem, calsiæ, floris iunci odorati, cinamomi, cuiusq; drachmas quatuor, aliq; drachmam unam tantum habent, costi drachmas duas, scordij, polij, cuiusq; drachmas tres, asari drachmam unam & obolos quatuor, mei drachmam unam, piperis albi & longi, dauci, petroselini, opobalsami, rosarum siccarum, singulorum drachmam unam, catpobalsami obolos quatuor. quidam etiam sanguinis anatis scemi næ drachmas duas, & succi radialis dulcis drachmas duas addunt. Excipe melle despumato, & fabæ magnitudine præbe cum uini mulsi diluti cyathis duobus, aut aqua calida. hanc etiam Oribasius commendat.

Antidoti uariæ ad calculosos.

Cap. xiiii

Archigenis. Spicæ nardi, seminis apij, dauci, cuiusq; drach. quatuor, aluminis scissi drachmam unam, cinamomi, calsiæ, floris iunci odorati, cuiusq; drachmā unam, croci obolos tres, myrrhæ tantundem. Trita cum uino cenantithe subige, & cum uino mulso obolū unum præbe. Præclarum inquit, huius pharmaci experimentum feci, neq; præstantius aliud reperias, neq; ad huiusmodi affectionem destruendam, neq; ad lapidis coactionem prohibendam, neq; ad iam compacti attritionem, neq; ad defecationē, neq; ad educationem & repurgationem limosæ in urinis fecis: coadiuuante præsertim diata, quæ potissima præseruatiuæ facultatis pars est existimanda.

Philagrii pharmacum ex damasomio constans,

quod secundi ordinis esse dicit.

Damasonij drachmas decem, seminis dauci drach. sex, radidis dauci drach. sex, radidis herbæ lanariæ, corticis radidis capparidis, cinamomi, cuiusq; drach. sex, calsiæ drachmas octo, betonicæ, piperis, cuiusq; drachmas octo, nardi celticæ, iridis, acori, asari, seminis fornicali, petroselini, cardamomi, spice nardi, cyperi, costi, sarxiphagi, seminis apij, myrrhæ, fescelis, radidis panacis, zingiberis, piperis albi, cuiusq; drachmas quatuor, lapidis syrii masculi drachmas sedecim, lapidis foemineæ drachmas sedecim, seminis smyrnij, lincurij quod succinum itemq; electrum appellant, cuiusq; drach. xvi, seminis eru-
æ drachm. xvi, mellis quantum sufficit. datur nucis ponticæ magnitudine

*Lincurium,
succinum,
electrum.*

cum

cum radicis asparagi palustris decocto, aut floris iunci odorati, aut radicis dulcis. Datur à balneo.

Aliud Philagri, ex damafonio pharmacum, quod tertij ordinis esse ait in lapide atterendo. Facit & ad renum affectiones.

Damafonij drach. x. xiiii, seminis dauci, radicis herbae lanariae, corticis radicis capparis, calsiae, nardi celticae, cuiusq; drach. vii, alij drach. xvi habent, iridis, mei, asari, sceniculi, cardamomi, cyperi, petroselinii, costi, seminis apij, myrrhae, croci, cuiusq; drach. ii, fefelis drach. iiii, radicis panacis drach. iiii. quidam & zingiberis drach. iiii, & piperis item drach. iiii addunt, mellis attici quantum satis est, excipe & utere quemadmodum praedictum est.

Oribasij, ex libris ad Eustathium, antidotus Xenophili.

Facit ad uesicam & renes calculosos & exulceratos. Atterit enim lapillos, & ulcera sanat.

Calsiae unc. i, sarxiphagi trientem, betonicae, cyperi, petroselinii, costi, tribuli, seminis uitis, lithospermi torrefacti, cuiusq; sextantem, seminis apij sesquiunciam, phylli, spicae nardi, asari, dictamni, baccarum lauri, seminis ocyimi, singulorum unc. i, zingiberis drachm. iiii, nucum pinearum quas strobilos Graeci uocant sexuncem, mellis lib. ii. in balneo exhibeto, aut ante balneum ex uino mulso aut passo chrysattico magnitudine fabae.

Andromachi antidotus ad calculosos, quae paulatim confringit & extrudit lapides, donec uesicam perpurget, & pellucidum lotium procedat: & quod maximum est, ita per sanat, ut nec in posterum gignantur.

Habet autem hoc modo.

Seminis dauci, anisi, seminis cucumeris decorticati, seminis apij, petroselinii, myrrhae, cuiusq; sesquidrachmam, calsiae, cinamomi, nardi celticae, cuiusque drachmam unam. trita aqua subigito, & ad paruorum lupinorum formam redigito: ieiunis autem quotidie per dies triginta cum aqua cyathis tribus exhibeto. Ceterum ad huius pharmaci apparatus religiosè, inquit, accedendum est: in lignea enim pila, & pistillo item ligneo haec contundenda sunt: oportetq; amplius eum qui haec contundat neq; annulum ferreum gestare, neq; calciamenta clauis ferreis transfixa, atq; id ut mysterium habe.

Asclepiadae ad calculosos compositio.

Carpobalsami, lapidis qui in spongijs reperitur, pulegij sicci, seminis malue sylvestris sicci, singulorum aequales partes contusas & cribratas reponito, indeq; cochlearium unum cum uini diluti cyathis tribus praebeto.

Alia compositio celebris.

Electri siue succini unciam unam, lapidum qui in spongijs reperiuntur unciam unam, sarxiphagi unciam unam. Dantur ex ea scrupuli duo quomodo cunq; uelis.

Pharmacum, ex cardamino ligno ualde celebre.

Spicae nardi, piperis, hyssopi, tecolichi, cuiusque unciam unam, piperis albi scrupulos

scrupulos xviij, calsiæ scrupulos ix, helenij siue inulæ scrupulos v, scobis eboris scrupulos xij, ligni cardamini scrupulos xij, mellis quantum sufficit. dantur ex eo obuli tres cum condito, aut aqua mulsa.

Aliud laudatum.

Seminis brasiæ drachmas sex, cyperorū, petroselini, electri, piperis, singulorum unciam unam, mellis quantum satis est. datur nucis ponticæ magnitudine cum condito febre carentibus, aut cum aqua mulsa. Aliud. Cucurbitam aridam exure, & cineris cochlearium unum, ut uelis bibendum præbe: aut catapotia ex cinere formato ac exhibeto, & celerrime per lotium calculum extrudet.

Aliud, quod calidioribus præcipue conducit.

Ex portulaca succum exprimito, cumq; rescissum in catapotia redigito, & drachmam i exhibeto, ad miraculum usque lapidem per urinam expellit.

Aliud. Cancros iij aut v aut vii tantum, cum ingenti strepitu indefinenter sub testa uiuos exure, & cōtriti eorum cineris cochlearium unum cum condito præbe: eoq; calculosos renes sanabis. Aliud.

Phu aqua feruefactum bibendum præbe, omnesq; lapides educet: quod si Mithridatis compositione abundes, eam quæ scincos admixtos habet, unā cum decocto præbe. Experimento constat: utere.

Conditum Oribasij.

Vini sextarios duodecim, mellis sextarios duos, piperis sesquunciam, sarxiphagi, betonicæ, mei, phu, spicæ nardi, petroselini, calsiæ, cuiusq; sextantem.

Aliud conditum, ad uesicæ lapides accommodatum.

Sarxiphagi, spicæ nardi, cuiusq; drachmas quatuor, piperis unciam unam, carpesiæ, zingiberis, mei, asari, calsiæ, sisonis, petroselini, acori, dauci, singulorum drachmas quatuor, mellis sextarium unum, uini sextarios quatuor aut quinque.

Aliud renale.

Spicæ nardi, phu, sarxiphagi, betonicæ, asari, lithospermi, petroselini, cuiusque unciam unam, costi uncia dimidium. Ex hoc arido cochlearium unum in conditum mitte, idq; æger hora ante prandium bibat. lapides atterit, & per urinam expellit, neque amplius cogi lapidem permittit.

Aliud Oribasij conditum renale: facit enim ad inueteratos renum dolores, & ad difficultatem emittēdi urinam ex uesica, ad strangulationem item ac urinæ suppressionem, ad eorundem etiam membrorū frigiditatem: callosas durities extrudit, lapides confringit, & ad alias affectiones eodem modo probe facit.

Sarxiphagi drachmas duas, betonicæ drachmam unam, petroselini scrupulos sex, spicæ nardi scrupulos tres, phylli scrupulos tres, thei scrupulos tres, irionis scrupulos sex, piperis scrupulos duodecim, mellis sextarium unum, uini boni sextarios quatuor.

Aliud pharmacum renale.

Zador id est zeduarix, galangæ, ligustici, sefelis, cardamomi, piperis longi, Zador, zeduaris
z piperis

piperis albi, cinamomi, zingiberis, seminis smyrnij, careophylli, phylli, statichyos, myrobalani, phu, costi, scordij, silphij siue laserpitij, rhei barbarici, pæoniæ alij etiam arboris nucis uiscum, & paliuri semen, itemq; sarxiphagum ac casiam addunt. Ex his singulis stateres duos commisceto. Datur cum condito aut uino uetere ad balneum ituris, & sine balneo: uesperi similiterq; mane.

Ab sinthaton renale, ualde bonum.

Petroselini unciam unam, sarxiphagi scrupulos duodecim, betonicæ scrupulos duodecim, seminis irionis sesquiunciam, spicæ nardi scrupulos sex, phylli scrupulos sex, rhei pontici scrupulos sex, calami aromatici scrupulos quinque, dictamni scrupulos tres, mellis sextarium unum, uini sextarios quinque, præbe mediocri poculi mensura ieiunis.

Pharmacum lapides in renibus atterens, adeo ut in una die commoditatem suam ostendat.

Abrotoni drachmas octo, croci drachmas octo, herbæ anthyllidis drachmas sedecim, foliorum rutæ uiridium drachmas xxxii. Probe contrita in pastillos digerito, & ex eis drachmā unam cum acero mulso præbeto. Vt re ipso, inquit, asidue: mirum enim quanta utilitate præstet.

Cura eorum in quibus lapis atteri non potest, neq; item per lotium excerni.

Cap. xiiii

Quod si uesicæ lapides per lotium excerni non queant, sed in meatu sint obturati, & urinæ suppressionem inducant: ægrum supinum decumbere, ueluti dictum est oportet, ita ut coxarum partes magis sursum uergant: indeq; huc atque illuc multiformiter commouere, quo ex meatu excidat, post uero ita adhuc supinum & positu sursum uergentem mingere iubere. si uero neq; sic excernere possit, per catheterem instrumentum urinam prolecltare. Quod si ob lapidis asperitatem uesica incidatur, & ex hoc subcruenta mingant, aliquādo uero purulenta, & submucida, illis ipsis siue mingant siue non mingant plus quàm alijs dolorum adest. ceterum in potu exhibenda sunt his pharmaca quæ lapidem atterere prædicantur, & ulcera ipsa sanant. quibus uero ulcera nondum sunt oborta, lapides autem in uesica detinentur, hi pellucida & tenuia ac aquosa mingunt: quin & arenam subidentem urinæ habent, & in lotij eiectione dolores augefcunt. Quod si neque per hæc adhibita pharmaca lapis in uesica atteri possit, ad sectionem transeundum quæ pro more inferne fiat, atq; ita lapis subtrahatur, & fissura quàm diligentiissime carne repleatur, cicatrixq; inducatur, ne fistula per successum oboriatur.

Diæta post exactos lapides, adseruans ne alij renascantur, & de affligentis humoris cognitione ex lapidis colore.

Cap. xv

Post exactum lapidem, & cicatricem ulceri obductam diæta constituida est, ne eos renasci contingat. Coniectura etiam faciendâ tum ex alijs tum

tum ex exacti lapidis colore, cuius humoris materia in corpore abundet, ex qua adeo lapides cogantur. alij namq; subalbidi apparent, atque hi pituitiosiores humorē ostendunt: alij uero pallidi sunt, & bilem abundare demonstrant: alij autem coloris testacei sunt, ob superaffatam uidelicet à plurimo calore bilem: alij nigri, qui atræ bilis humorem exuperantem declarant. Omnes igitur quomodocūq; calculosi à cœna assidue uomant, neq; quicquam feruens in cibo sumant, quod renes & uescicæ exalfacere possit. Cauere autem conuenit cibaria substantiæ duræ, & quæ ægre manducatione atteruntur: itemq; ea quæ multam substantiam habent, plurimumq; similiter nutriunt, & quæ acruatim digeruntur antequàm perfecte concoquantur: grauis item qualitatis, & quæ difficulter commutantur, ac supernatant, & ægre per aluum subeunt, ac inflant: item quæ meatus obstruunt, aut aliàs diutius in corporibus insident. Ex huiusmodi enim cibus uenter labore fatigatus, ipsos aut crudos aut semicoctos ad hepar & renes digerit: atque ita quod crudum cumulatim allatum est, inepte præterq; naturam excolatur, & cum turmultu ad renes progressum, statim coactum inspissatur. Quare omne lac præter asininum eis incommodum existit: hoc enim inquit Archigenes, & substantia tenuissimum est, & facultatis facillime dissoluentis. igitur mirabiliter articulorum tumores & nodos (quos ad callosæ duritiæ modum ex uitiosi lactis usu pueri sustinere coguntur) leuigat & delet. unde admonendum duxi, ut ipsum calculosis assidue heminæ mensura exhibeatur, post matutinas deambulationes, atque id adseruandi à lapidis generatione gratia præ omnibus alijs fiat. Potus aliàs sit aqua caligla, fontana, pura, defecata, leuis. Vinum autem tenue, uriniæ ciens, non ualde uetus. Dulcia enim uina calculosis sunt nociua. Porro ut compendio dicam: omnis diætâ in frigidiore temperatura prædictis, exquisitè attenuatoria sit: in calidioribus uero, inter attenuatoria & impinguantia media. satietatem uero præ omnibus alijs uitare oportet, dulcium præsertim & ex caseo conflatorum ciborum: unde & cruditatem infestissimam eis censere oportet: in quam si quando incidunt, impastos & absq; cibo manere decet. Frigora quidem magis quàm æstus cauenda. In temperatis uero locis degant in quibus anni tempora & horæ nimio seruore non infestent. Assumantur etiam ociosæ deambulationes, & exercitia moderata: segnitie enim & ociositas nocent. Caterum uentrem semper probe laxum habere oportet: hic enim si bene subierit, puriora lotia prodibunt. Vnguentis utatur quæ locos defendere queant, ne facile grauius oblaedantur: epithemata etiam cutem rubefacientia, itemq; lancinantia, dropacēs & sinapismi adhibeantur. Malagma autem exquisitum hoc est, neq; facile reperias aliud, inquit Archigenes, ad huiusmodi affectiones magis ac commodatum. Picis liquidæ heminas ii & dimidiam, ceræ sesquilibram, resinæ pinus sesquilibram, sulphuris uiui sesquilibram, staphidis agrestis bessæ, galbani sexuncem. Liquefcebilia eliquantur, & inspersis aridis tritis,

Lac asininum

non est utrum sit

simul optime subacta & unita imponuntur. Varosa asperitas ex hoc inducitur mucum plurimum ducit, & pruritus non malum facit, adeo etiam ut uolupte sit si per resolutionem refrigeretur. Quod si aliquando levis molestia inde oboriatur, cerato eam lenire oportet per unam diem, ac deinde rursus eadem imponere. Conuenientissimum etiam renibus est, si super uentris locum idem malagma imponatur. Sinapismi item calculosis apti sunt, & naturalium aquarum usus: lauent autem non saepe, ungantur autem frequenter. Curiose etiam temporis oportunitas dispicienda est ut uenam secemus, si quidem sanguis abundare uideatur, aut ut purgationibus conuenientibus utamur in eis quibus uitiosi humores coaceruantur. Bibant autem & ea quae urinam ciant per interualla quaedam tum simplicia, tum composita praescripta: in huiusmodi enim omnibus quicquid modice relictum est, facile ad debitam commutationem deuenit. Aiunt autem quidam terram ex latere ueteri tritam cum uermibus terrenis, & pectini crassius illitam, praeparare ut lapsus in uescica aut renibus per locium eiciatur.

De renum inflammatione: Ruffi.

Cap. xvi

*Dolor
pulsantis*

O plurimas causas renes inflammentur. nam & humores corrupti, & plagues, & attritiones, & pharmacorum potiones inflammationem generant, & praesertim equitationes continuae & uehementes. Accedit aegris dolor pulsantis retro iuxta primum dorsi uerticulum, paululum supra spurias costas. distendit autem dolor sursum usque ad hepar, praesertim dextro rene affecto: deorsum uero usque ad uescicam & pudendum, lumbosque & coxendices, pectinem item ac femora. Consequitur etiam stupor propinqui cruris: & neque recta erigi possunt, neque pedibus ingredi: & siue sternutatio, siue aliqua alia concussio irruat, uehementi dolore lancinantur. frigent eorum extrema, & magis surae ac pedes: adest urinae emittendae difficultas, minguntque assidue ac laboriose, in principio quidem tenuia & aquosa, in quibus nihil subsidet, inflammatione uero in pecius proficiente, rubicundiora, deinde etiam crassa & mucosa, adsuntque febres uehementes. Quod si adhuc amplius inflammatio augetur: haec omnia itidem fiunt uehementiora. His accedit nausea, & stomachi morsus, & uomitus bilis. Quidam autem ipsorum usque ad animi deliquium anguntur & exudant. Sistitur ipsis uenter adeo ut inflentur, & assidue ructus emittant. Sequitur fastidium uehemens, & quibusdam continuae fiunt exacerbationes: quibusdam uero per interualla: in uniuersum autem uentris egestio, & urinae multa excretio dolores ipsos praecedunt. Noui autem ego quendam, qui post uehementem uexationem animo linquebatur multumque exudabat: ubi autem restitutus sibi animum recepisset, simul ab omnibus molestiis liber euasit. Renes igitur inflammatos hoc modo curare oportet. Aegrum in lecto mollissimo decumbere oportet, ac primo die a cibo abstinere, non tamen in multos dies inediam extendere. Urinae enim puriores & aciores per inediam redduntur.

ditæ, uehementissimos morfus infligunt: itaque in principio forbitionibus tenuibus morfus lenientibus connutrire oportet, & aquæ calidæ potu. Aquam uero mulsam in principio non laudo, priusquàm concoctæ & consumptæ fuerint inflammationes. neq; item eorum quæ urinam cient usum, oblaedunt enim mordaces humores inflammatis partibus inducendo. neq; etiam purgatiuum pharmacum exhibendum, ueluti quidam consueuerunt. Per dysenterem autem maluæ decoctum, aut seminis lini, & foenij græci, cum oleo infundendum, ammixto etiam melle: aut ptisanæ succus cum oleo & melle. Cæterum copia non multa infundatur, ne repleta intestina comprimant renes: ubi uero stercora prodierint, & intestinum fuerit euacuatum, oleum iniiciatur anethinum aut gleucinum cum butyro, eliquatis in his adhibitis quibuscûq; anserino uidelicet aut gallinaceo, aut medulla ceruina. Subcunte autem uentre, incumbente lanam ex oleo calido assidue rigare oportet: melius tamen fuerit si anethum, ruta, althea, & artemisia oleo sint incocta. Porro si adhuc maiori acumine renes affligantur, & uehementior exurgat dolor: uenam cubiti secare conuenit sanguinis detractiōe repetita: & si post id auxiliij aliquid ex inflammatione relinquatur, ad cataplasmata procedendum; primum quidem ex farina in aqua mulsâ cocta, aut ex semine lini, postea etiam ex chamæpity, polio, abrotono, trixagine, asaro, iunci odorati flore ammiscendum, atq; tum non amplius in aqua mulsâ cataplasmata coquenda sunt, sed in passo. Mixture autem modus sit, ut ad farinæ partes 1111 quorundam ex prædictis pharminacis partes 11 commisceantur. Bonum est & hoc cataplasma. Galbani, terebinthinæ, farinæ erui, cuiusq; drachmas quinquaginta, iridis drach. 1111, cerati ex gleucino aut amaracino aut irino aut cyprino aut aliquo consimili oleo apparati libram 1, farinæ triticeæ sextantem, paksi cretici quantum satis est. Apparato ac supra ilia ac lumbos imponito. Facit idem ad uesicam inflammatâ si pectini imponatur. Quod si per cataplasmata dolor nō leniretur, cucurbita lumbis ac ilijs est adhibenda, & fissuris impactis plurimus sanguis attrahendus, deinde spongiarum foru utendum, & in calidam aquam descendendum, in qua calamus aromaticus, chamæmelum, flos iunci odorati, semen lini, anethum, maluæ syluestris radices sint incocta. Prius autem & uesica ingens aqua & oleo semiplena ipsius locis imponatur, fomentis etiam pinguioribus admotis, postq; etiam ceratis: quin & malagmata amplius imponenda. cerata quidem conueniunt ex cyprino aut irino apparata: malagmata autem odoratissima sint, qualia sunt hepatica ex styrace conflata. Cæterum dolore affligente bibenda sunt pharmaca quæ dolorem leuant: eiusmodi sanè. Calicis papaueris tosti obuli dimidium, styracis tantundem, thuris obulum 1, seminis cucumeris grana 2xx, seminis apij quantum tribus digitis comprehendi potest, opij ad erui magnitudinem. Hæc omnia quàm tenuissime terito, ac cum aqua dulci permixta pro uice una exhibeto. Statim enim quiescet dolor, & obdormiet

Pharmacum
potabile dolo
rem leuans

æger. Conferunt item cōsimiles pastilli dolorem leuantes. At uero ubi perfectæ concoctæ fuerint inflāmationes, & quieuerint dolores, tunc etiam per urinam cientes purgandū: ueluti sunt acorum, meon, phu, petroselinum, grāmen, casia, chamapitys, polium. Horum unūquodq; ex aqua coquendum est, & cum uino & melle bibendum. Cibi autem post concoctas & consumptas inflāmationes exhibendi, sunt panis optimus maxime clibanites: ex uolucris, montanæ: ex marinis, herinacci recētes: ex oleribus, sceniculum, apium, daucus, & syluestria omnia, & cucumis coctus. Hęc enim optime urinam prostant: maxime uero id præstant pastinacæ probe percoctæ, & crithma, & scandix, & gingidia. A concoctis inflāmationib; urinx his prodeunt multæ & crassæ, & in quibus bonum est quod subsidet, atq; hæ ipsæ maxime iudicant ac fecerunt morbum: aquosæ autem mictiones & puræ ac pelluentes, ægre morbum secerui indicant.

De duricie renum.

Cap. xviii

Q Væcumq; duricies circa renes oboriatur, dolores quidē non amplius inferunt: ægris autem ex uacuo uentris loco ueluti quippiam pendere uidetur: & stupor adest coxenditum, & impotentia crurium, minguntq; pauca, & reliquo corporis habitu aqua inter cutem laborantibus maxime similes existunt. Quidam etiam temporis progressu manifeste hydropem incurrunt, ueluti etiam ab alijs uisceribus induratis contingit. Hos itaq; ceratis & malagmatis itemq; frictionibus ac pinguib; fomentis remollire oportet, & urinam ducentia eis exhibere. Ventrem item ex altheæ, sceni graci, & caricarum decocto subluere, melle & nitro ac oleo iisdem adiectis. Ad noctem item infusa per clysterem conueniunt, oleum anethinū cum butyro & adipe anserino.

De suppuratis renibus: Rufi.

Cap. xix

Q Vibuscūq; renum inflāmationes ad puris permutationem uertuntur, his omnes in renibus inflāmatis prædictæ accessiones extenduntur, & febres cum horrore irruunt atq; id maxime circa uesperam. Iam uero & tumor quodammo do circa ilia apparet, & uehementis caloris sensus ipsos circa renes affligit: minguntq; ruffa & pura. Vbi uero suppuratio fuerit perfecta, tunc & febrium & dolorum accessiones minores contingunt, & grauitatis sensus magis circa affectū renem infestat: tempore rupturæ magis exacerbantur, ad quam etiam humorum excretio cum ipsis urinis cōsequitur: inuehuntur & sordes quædam ex substantia renum elotæ. ut plurimū enim ad uescicam ex renibus erumpens pus deferitur, quod sanē cōducibile putandum est. Aliquando autem & ad intestina eruptio deuoluitur, & per sedem pus euacuatur. Quibusdam uero neq; in totum suppurata erumpūt, sed circa renes per multum tempus consistūt, donec caute adhibito aut alio modo forissecus apertionem & educationem moliaris. Igitur postq; abscessus signa apparuerint, quā celerrime adiuuare oportet tum suppurationem, tum puris eruptionem. Qua in re spongiæ aqua & oleo itemq; fursuribus imbutæ

abscessus renum.

imbutæ assidue proderunt fatus gratia admotæ. eundem usum etiam cata-
plasmata præbent, ex farina ordeacea cum ficum & altheæ ex aqua mulla
decocto, aut ex crético passo. Bonū est & ipsas ficus ammiscere tritas, & ab-
sinthij comam contusam, aut chamelætam, aut irin, & bryoniam: addatur &
cerebintina, pix, manna thuris, thus ipsum, columbæ sterus, poliū, & quæ
similia his existunt, & simpliciter omnia adhibeantur quæ in hepatis absces-
su supra approbauimus. In malignis & putrescentibus humoribus, quos ex
febrium acrimonia cognoscēs, etiam rosæ in cataplasmata commiscendæ, &
myrti baccæ, eruiq; ac lentis farinæ. Hæc enim eisq; similia humorum putre-
factionem sistunt. Post hæc emplastris utendum quæ pus permutare pos-
sunt, quemadmodū in hepaticis est prædictum. Quod si ruptura moretur,
acriori infuso, aliud est subluenda, ueluti ueratri nigri cremore, raphani item
& aliorum ac cucumeris syluestris radicis cremore. Macerare autem hæc in
aqua maris aut salfugine uel muria oportet, parūq; olei ammiscere, quo in-
fusa lubrica reddantur. Hæc sanè per dysterem infundenda, lubendiq; ægri
quo plurimo tempore apud se detineant. cōsueuerunt enim sæpe ipsam sup-
purationem dirumpere, unā cum hoc quod uētem emollire solent. Si uero
uehemētiore sunt dolores, ptisanæ succus infundatur & lac recens multū:
infectus quoq; in aquam & oleum appareatur. In potu leniora urinam duce-
ntia exhibeantur, ueluti cucumeris semen decortictum ex aqua mulla, pal-
mulis in ipsa incoctis. Danda etiam iris cum melle despumato delingenda,
aut ipsum mel in decoquendo in pastillum redactum. Remorantē item ru-
pturam iuuat cuminum cum passo, ruta cum uino mulso. Si uero ex habitu
corporis & doloribus languidioribus coniecturam facias, ob crassiciem pus
ipsum non excerni, sceniculi decoctum in potu dato, & chamæpityos, pule-
griq; & origani. Post rupturam autem carunculæ paruæ oblongæ cum uri-
na excernūtur: & si quidem maligna fuerint ulcera, humores foetidi, liuidi &
mucosi. si uero benigna fuerint, etiam pus ipsum album, & æquale, & leue,
absq; odore graui, & paucum reperietur. Lac itaq; cum melle post puris eru-
ptionem eis præbendum: & primum quidem asininum aut equinum, ad ul-
cera enim repurganda conducit. quū uero repurgatione amplius opus non
habent, & morsus fiunt obtusiores, indigetq; æger nutrimento, tunc etiā bu-
bulum lac eis exhibendū II & III heminarum mensura. Amplius aut omne
lac recens multū calidum præbendum est, animali in domum ubi æger de-
cumbit deducto. hoc & aliorū internorū ulcerum optimū est pharmacum,
& graui puri maxime amicū, & corpus probe nutrit. Porro ad uires refocil-
landas ac restituendas, ægrum decubentem molliter fricare singulis diebus
mane cōuenit, & primum bubulo lacte nutrire: postquā uero concoxerit
lac, sorbitionem ex ptisana apparatā præbere, aut amyllum, aut similaginem
lotam cum lacte coctam. dandum & lac ouis permixtum, & iusculum galli-
næ pingue. Ex oleribus conueniūt, malua, leris, rumex, portulaca, asparagus

Putrefactionē
sistētia

ueratri nigri cremore
or. raphani radicis

Lac ulcera
repurgat

palustris, cucumis, lactuca, omnia cocta, neq; quicquid crudum uorent. Hæc sanè morsus obtundunt. Cæterum succedentes repletiones uomitu euacua-
re oportet. Vt uero facile uomant, cucumeris semen tritum ex passo eis præ-
beat: aut pitisanæ succus cum passo. Oleo autem cyprino præsertim illinan-
tur penne, quibus item ad uomitum irritetur. Non solum aut ad repletiones
uomitibus laudo: uerum si quis omni mense audenter uomat, forte & renum
ulcus, & quicquid inde mali accedere possit, dissoluat. Reliqua diæta eadem
sit cum ea quæ postea ad uesicæ ulcera dicitur. Ex his uero quæ urinam du-
cunt simpliciora iam sæpe dicta itemq; dicenda, ad repurganda renum ul-
cera bibantur. Quum uero munda fuerint ulcera, quod inde tibi palam fiet,
si neq; tectorium nec iam ulceri obductum cum urinis excretum appareat, neq;
etiam pus excretum sit feculentum: sed subalbum, & leue, & æquale, & pau-
cum: tunc sanè pro emplastris malagmata assumenda sunt: id quod ex semi-
nibus constat: item quod ex bacis lauri: & quod apollophanium inscribi-
tur: & omnia quæ curem rubefacere possunt, quale est id quod ad calculi as-
fectionem est præscriptum. Pro his uero quæ urinam cient resiccantia adhi-
beantur: quare cibus ipse adstringens sit, & pharmaca quæ corpora cogant.
Conferunt etiam dropaces, & sinapismi, & naturalium aquarum calidarum
& frigidarum usus. Porro ad inueterata renum ulcera, pharmaca sunt assu-
menda quæ ad exulceratam uesicam describentur. Atqui nosse oportet om-
nem exulcerationem, & uesicæ, & renum, ægre curabilem esse, præsertim quæ
ex erosione sit oborta, adeoq; paucos nouimus qui ab ea perfecte sint liber-
rati: si uero extra suppuratio uertatur, inflammatio magis tumescit, & ad ma-
num & ad oculum magis euidenter exposita est. His merito medici manum
admoliuntur ubi maxime tumor attollitur, curamq; adhibent quæ ad com-
munia & caua ulcera requiritur: non ignorandū tamen ea in fistulam abire
solere, quare diligentiori omnino indigent tractatione.

De disuria, id est emitendi urinam difficultate: & stranguria, hoc
est stillicidio urinæ. Cap. xix

Disuria dicitur, quum meiere æger cupit, & cum ui urinæ excernuntur.
Stranguria autē appellatur, quum paulatim & guttatim urinæ destil-
lant, & assiduam ad mingendum irritationem faciunt. Hæc autem contin-
gunt aut ob acrimoniam urinæ, aut ob exulcerationem uesicæ, aut ob uesi-
cæ debilitatem: aliquādo autem & affectis renibus aut hepate, quū absces-
sus rumpitur, & pus per uesicam excernitur, assiduam irritationem ad min-
ctionem propter acredinem suam inducit. ex intemperie etiam quadam æ-
gra uesica in propria læditur actione. necessarium igitur est scire causas quæ
stranguriam & disuriam præcesserunt, atq; ad ipsas remedia adornare. Si
igitur frigiditas has affectiones præcessit, oleo rutaceo calido pectinem fo-
uere oportet, ægrumq; in fassuci aut rutæ decoctum desidere, ac inum uen-
trem contingere ac calfacere: aliquando & per sedem oleum rutaceū calidum
infundere

*difficilis curatio est rem
ulceris renum in uesig*

tius corporis humores, per ea quæ efficacius urinam cient, ad uesicam prius afflictam deducuntur.

De ischuria, hoc est urinæ suppressione. Cap. XXI

Ischuria, hoc est urinæ suppressæ affectionem, etiam ipsum nomen declarat: aëris enim in totum urina supprimitur ac cohibetur. Atque id aliquando ob imbecillitatem contingit, uesica ea quæ in ipsa continentur arcte complecti ac exprimere non potente, aliquando autem & inferiore meatu à crassis humoribus obturato, aut lapide obstructo: quandoque autem ob inflammationem aut talem quempiam tumorem meatum angustum reddentem, & perfecte obturantem. Sanguis etiam in grumos concretus in uesica, suppressæ urinæ causa existit: pus item crassum per ipsam uesicam à renibus aut hepate, aut alio quopiam inferiore membro excretum, urinæ suppressionem operatur. Accidit & sanis sæpe urinam ipsorum cohiberi, aut ob negotiorum importunitatem, aut in concionibus, aut foro iudiciario, aut somnis, si diutius continuerint mictionem. Afficitur enim in his comprehensua & urinam obuolvens uesicæ uis, ex immodica uidelicet repletionem & tensione: imò quantum amplitudo ipsius uesicæ expleta circumtenditur, tanto angustior seipso fit meatus. Urinam igitur ob inflammationem suppressam uesicæ sectione curabimus, fomentis item ac cataplasmatibus alijsque remedijs adhibitis, quæ iam sæpe ad inflammata sunt prædicta, & in sequentibus describentur. Si uero sanguinis eruptio præcesserit, coniectare oportet sanguinis grumos suppressæ urinæ causam esse: hi itaque dissoluendi sunt eo modo, qui de eruptione sanguinis ex uesica dicitur. quod si lapis sit qui urinam supprimit, & hunc ex loco excutere ac dimouere oportet, quemadmodum de calculosis est prædictum. Si uero crassi humores in causa sint, fomentis & infusionibus ac cataplasmatibus cura concedenda est: ab his uero quæ urinam cient in totum abstinendum, ueluti in loco de difficultate emittendi urinam in febris est relatum. Quibus uero citra inflammationem & eruptionem sanguinis, aut aliam quandam ex prædictis causam, urinæ excretio supprimitur, propter ægrum uesicæ sensum contigit id scilicet: quapropter irritando submonere, ac excitare eius actionem oportet, & per infusus auxiliari, nitroque ad meatum admoto, aut nitri spuma, aut coridis semine contuso. Quod si ita non procedat, ad catheterum usum confugiendum, per quod hoc ipsum instrumentum immisissum urinæ prolestanda. Urinam ducentia nequaquam bibant, ne multitudinem eius uesica distendatur. In sanis autem, quum ut dictum est ob negotiorum importunitatem lotium diutius retentum uesicam debilem reddat, auxiliari oportet ipsi, ambabus manibus supra imum uentrem admotis, ac urina lente expressa.

Ad urinam ægre prodeuntem.

Cucurbitæ semen præmundatum aqua macerato, quum uero emollitum fuerit, sufficienter aqua affusa terito, percolato, ac succum bibendum præbet. Vterque experimento constat.

Vis compræhen

Visa urina

Visa urina

Visa urina

Visa urina

De scabiosa uesica.

Cap. xxii

QUibus uesica scabit, his pruritus tum imi uentris, tum pectinis succedit, inq̃ urinis asperæ & furfuracæ subſidentię deferuntur: progrediente uero morbo, uesica exulceratur, accēſionesq̃ ad ulcera præſcriptæ inducuntur. Noſſe igitur operæpretium eſt quod non penitus curabile ſit malum, conandum tamen ut pro uinibus leniatur. A mordacibus igitur & quæ humores acriores ac falſiores reddunt abſtinendum. Exhibenda autem uina dulcia & lac & gallinæ aut hœdorum aut agnellorum carniū iuſcula, palmarumq̃ cremor, ſiligo item & amyllum, ac ſorbtiones ex his apparatæ, piſces molles carne & omnes coctos, & ex olcibus quæcunq̃ urinam quidē ſubducunt, nihil uero mordax in ſe habent, uelut eſt paſtinaca probe cocta, crithma, ſœniculum, apium, hippoſelinum, aſparagus, cucumis, & quæcūq̃ eius generis exiſtunt: nam & urinam agentibus mitioribus tamen, uesi-
*Vrinam cienti-
 tium periculū*

cam ſubpurgare oportet, periculū enim eſt ne fortioribus exulceretur, quod omnino peius extat. Vrinam itaque commodè cient cancri, & pinæ conchæ, & herinacei marini recentes, & herinacei terreſtris caro exiccata & drachmæ pondere in potu accepta. Neq̃ minus commodæ cicadæ cenſendæ, & uermes terreni tres ex paſſo potati. Non inconueniens item ſceni græci ſuccum cum melle ſorbere: id ipſum enim & inteſtini morſus obtundit, & ſi ad uesi-
cam

cam procedat ſcabiem eius mitigat. idem etiam tragacanthus facit. iucundus eſt item baccarum myrti cremor cum uino potatus, aut mali coto nei cremor, aut cuiuſcunq̃ alterius adſtringētis fructus. Hæc autem adſtringentia, inquam, pruritus quidē mitigant, affectionem uero non ſanant. Dieta porro optimi ſucci ſit, & per aliquot dies uomant. Sero autem lactis alius ſubducatur. Mediocribus etiam exercitijs moderate utantur.

Aliud, quod conſeſtim auxiliatur.

Serpillum cum cicere ſatis diu coquito, percolatumq̃ decoctum bibendum præbero.

Oribasij, ad ægre mēientes.

Amomi, cardamomi, floris iunci odorati, cuiuſque drach. vi, coſti, caſtorij, myrrhæ, cuiuſq̃ drach. iiii, caſiæ drach. i, mellis quantum ſatis eſt. datur ſabæ ægyptiæ magnitudine cum uino temperatum. Aliud eiſdem.

Petroleſcini, baccarum myrti nigrarū, ſingulorū drac. xvi, ſeminis apij drac. xxxii, ammij drac. viii, nardi celtici drac. ii, myrrhæ drac. ii, mellis quātū ſufficit. datur drac. i ex aqua mulſa, aut uino diluto cyathorū iiii mēſura.

Simplicia remedia ad ſuppreſſam ac ægre prodeuntem urinam, ſi

aut eius multitudo aut craſſities in cauſa ſit.

Cap. xxiii

VRinam difficulter prodeuntem & ſuppreſſam, uiſcera herinacei terreſtris ſanant exiccata, ac ſuffita egro undiquaq̃ probe contexto. Oportet autem ipſa ſale condire ac exiccare. Quin & in potu accepta ſicca trita quantum tribus digitis apprehendi poteſt ex uino multas urinas cient: carnis item herinacei in ſole exiccati drach. i ex uino datur, & urinam multam citra moleſtiam educit.

Aliud. Afelli qui & millepedæ sub aquario stabulantes uase, egregie difficultatem emittendi urinam soluunt, si duo aut tres in modico gario coquantur, ipsumq; garum cum aquæ cyathis duobus bibatur.

Aliud. Vermes terrenos tres aut quinque tritos ex uino mulso aut aqua multa præbet: cito enim urinam ducunt. Forinsecus autem artemisiæ folia cum myrtha trita pectini illini, itemq; imo uentri: & lotium prodibit.

Aliud. Perdicium herbam terito, & affuso oleo serues facito, atque ita uesicæ imponito. Eandem item herbam cum oleo coquito, ipsaq; proiecta lanam oleo imbuito ac imponito. Aut peponis pulcherrimi pelliculam cum modica ipsius carne imo uentri imponito & colligato, & prodibit urina. Si uero arida sit pellicula, ipsam in aqua macerato, & imponito, ac colligato. Infessus etiam eis ex famulci maxime decocto apparetur, aut si id non adsit, ex decocto rutæ artemisiæ & althææ.

De dissoluta per paralysem uesica.

Cap. xxiiii

EX his qui paralyti exolutam uesicam habent, alij qui dem præter uoluntatem urinam emittunt, & quanto plus id eis contingit, eo minus periculo sunt obnoxij: alij autem lotium non excernunt, sed eo suppresso uesica & lumbi eis distenduntur similiterq; pecten: scemora autem tumefacta habent, & quum non ejiciant lotium subiecta membra mortificantur, neque ita longe post moriuntur. Quum igitur lædi contigerit neruos qui ex spinali medulla ad musculum uesicæ collum claudentem deferuntur, exoluta musculo, inuoluntaria urinæ excretio contingit. Si uero proprij uesicæ nerui fuerint affecti: nerui autem musculi qui ceruicem uesicæ complectitur uires suas conseruantes in actione sua ualidi sunt: urina ipsa cohibetur. Cæterum quum cuidam ob casum spina in anteriorem partem esset luxata, & inflammatio successisset, tertia die urinæ suppressio ei accessit: curauimus autem ipsum, inquit Galenus, ueluti contra inflammationem renitentes. Alius aut quum cecidisset, uertebis retro inuersis & luxatis, præter uoluntatem urina ab eo prodijt, citra tamen uesicæ dolorem: ex quo coniecturam fecimus neruum esse læsum musculi eius qui uesicam claudit, & propterea medelam spinali medullæ adhibuimus, affectis inquam, uertebis. His igitur quibus citra casum urina supprimitur, hoc modo auxiliari oportet. Infessus assiduè in foeni græci, seminis lini, althææ, rutæ, ac artemisiæ decoctum cum oleo eis apparetur: & loci ex oleo calido rutaceo, aut sicyonio, aut gleucino sæpe per diem & noctem, & maxime post infessus irrigentur & perfundantur: cucurbitæ etiam locis affigendæ, & cataplasmata imponenda ex cruda ordeacea farina, ex uinoq; dulci & uino mulso. In aluum autem per clysterem infundatur centaureæ, & radices cucumeris agrestis decoctum, addito oleo rutaceo & melle. Post sublutam uero aluum oleum rutaceum sicyonio ammixto infundendum, adiecto aliquando etiam modico castorio. Vnguenta item & supra medicamenta illitu lassos neruos rescipientia, acopa græci uocant, & supra ad resolutiones

Laxatio spine
ante & retro

Acops

resolutiones sunt descripta, tum spinæ, tum imo uentri adhibenda. Casto-
rium itemq; theriace in potu propinanda. Modicus autem eis conuenit po-
tus, & uomitus qui pituitam educunt. Post euacuationes sinapismi tum pe-
ctini, tum lumbis comodi sunt. A quibus cerata quæ partes mitigent, & ma-
lagmata odora imponantur. Porro urinæ suppressionem quæ ob fauciatam
spinam, aut casum, aut uerteræ luxationem, aut ob lethales accessionum
concurfus, suborta est, impossibile est curare, quare caute remedia adhibere
oportet. Cæterum eos qui præter uoluntatem urinam emittunt curare con-
uenit per mordacia cataplasmata, & malagmata, & per rubefacientia ex si-
napi apparatus, & arenæ à sole seruefactæ iniectione, aquisq; naturalibus
primum quidem calidis, postea etiam frigidis, & maxime sulphurentis &
bituminosis. Exercendæ etiam ac perfricandæ partes, ueluti in loco de reso-
lutione est prædictum. Vrinam autem ducentia nequaquam exhibeantur.
Dietæ uero calidior & siccior sit, nisi acriores ac mordaciores appareant uri-
næ.

*Vrinæ sup-
pressio quan-
do incurabilis*

Ad eos qui se in somno permingunt. Cap. xxv

Affectio hæc pueris maxime contingit: ad eam Archigenes hæc descri-
psit. Pulmo hœdi moderate assatus, & citra panem large ad tridui
um in cibo acceptus, eos qui lectos commingunt corrigit. Aliud.
Leporis cerebellum siccum potatum ex uino lectos permingentes sanat.

Aliud. Testiculum leporis siccum in uinum radito, & bibendum da-
to. Quidam autem leporis cerebrum in uescam porcina coniectū & assa-
tum, unā cum uescica edendum præbent. Etenim ipsa porcina uescica per se
usta, & in potu exhibita, iuuat. Simili modo & ouilla uescica facit: cinerem ita
que ex eius posca præbeto. Aliud. Adipem anserinum drachmæ
pondere, cum coagulo leporino oboli pondere, & cum farina subigito, &
reclinatis in lectum præbeto. Aliud. Linguae anserinæ coctæ per tri-
duum exhibita affectionem sanant. Quidam assatas præbent.

Aliud item Archigenis. Myrrhæ, calaminthæ, cuiusq; obolum i-
terito, & cum uino odoro ante cœnam bibenda præbeto.

Aliud eiusdem. Raphanidem marinam contusam urito, cuiusq; cine-
rem totum bibendum præbeto. Aliud. Rutæ præsertim syluestris
semen torrefactum duarum drachmarum pondere bibendum præbe.

Aliud. Castorij drach. i in potu præbe. Quod si acriores & morda-
ciores sint urinæ, lactucæ seminis drach. i bibendam dato. Aliud.
Galli guttur ustum ac tritum cum aqua tepida ieiunis bibendum porrigere.

Aliud. Gnaphalium aut anthyllin herbas quibus pro tomento &
strato usus est uirger, easq; perminxit, siccato, urito, & cum potu exhibeto.
Cæterum in somno pudendum illinant ex cimolia cum perdicij succo. Cir-
cumligent etiam scemora intra inguina, more luctatorum, atque id similiter
per cimoliam cum perdicij succo fiat, & per uiticis uirgam. Porro ubi sitie-
rint, omnino amplius dormiant: multus enim potus affectioni incommo-

A dus

us existit. Atqui si diuturnum & inueteratum sit malum, uelut eos qui prae-
ter uoluntatem ob resolutionem uescicae urinam emittunt curato. Differunt
autem hi ab illis, in eo quod his per somnum saltem haec accessio contingit:
illi uero quibus ob musculi colli uescicae resolutione hoc accidit, etiam dum
uigilant eodem modo afficiuntur.

De inflammatione uescicae: Rufi.

Cap. xxvi

Majorum qui circa uescicam oboriuntur grauissimus & maxime mor-
talis inflammatio existit. Consequuntur autem aegros communia in-
flammationis signa. Febri acuta infestantur, & uigilant, & delirantes aliena
loquuntur, & uomunt biliosa pura, & lotium ejicere non possunt: durus fit
pecten & pubes cum uehementi dolore, & egerendi appetentia uelut in te-
nesmo fieri solent: quod uero egerit tenue est, & subsidentiā non habet.
aliquando & inflationes sequuntur, & aluus adstricta est, intestino recto ab
inflammatione uescicae compresso. His itaq; si nihil aliud prohibeat uenam
citra cunctationem in principio morbi secato, & pauco cibo adseruato, & a-
qua potu. locos uero oleo in quo anethum, semen lini, aliquando etiam ru-
ta & althea incocta sint irrigato. In decoctum item seminis lini & feni gra-
ci insidere facito, odorato aliquo semine, uelun petroselinum, dauco, aniso, si-
mul incocto. Admoneaturq; ager quo in aqua decocti desidens mingat:
uesica enim non satis robusta est ad amplectendam & expellendam urinam,
igitur ipsum agrum aut aliquem ex adstantibus scite ac placide pectinem
premere oportet, neq; id ultra modum ne dolor inde intedatur. Est autem
inuentum hoc Philumeni, qui hominem hoc modo a se tractatum urinam
eiecisse testatur. Ceterum primum omnium aluus leni infuso subluatur, &
post stercoreum eductionem, oleum quo supra ad irrigatione usus es, in in-
testinum solatij & leniendi doloris gratia iniiciatur. Praestat autem & papa-
ueris calicem simul cum oleo incoquere, & adipem anserinum aut gallina-
cum recetem in ipso oleo eliquatum simul infundere. Ego uero, inquit Ru-
fus, uehementioribus existetibus doloribus opium magnitudine erui cum
modica myrrha & croco lane illitum, in podicem indidi, & statim dolores
quieuerunt, confestimq; ager obdormiit. Post clysterem & infusa, in scissusq;
& irrigationes, etiam cataplasmatibus utendum ex cruda ordeacea farina, capi-
tibus papaueris, & hyoscyami folijs, ac modico mēdragorae succo adiectis.
Fomenta autem fiant per aquam & oleum in uescicis bubulis semiplenis ad-
motā: aut farinam calidam in sacculis aut detrita uestis panniculis ligato, &
pro fotu admooueto. Post cataplasmata, etiam cerata imponantur ex hyssopo,
& cera, & sicyonio aut gleucino oleo cum castoreo apparatus. Quod si neq;
sic mali tumultus cesset, cucurbitam affigemus locis una cum scarificatione.
Ceterū ubi euidentis declinatio apparuerit, ad emplastra & malagmata transi-
eundum est. Porro catheteris immisionem ad inflammata uescicam in uiro
quidem non probet: etenim quum laboriose immitti queat, dolores exacuit,
& inflam

Philumeni
inuentum

fomenta per aquam & oleum in uescicis bubulis admotā

cerata

& inflammationem auget.uerum mulieri ipsum adhibere nihil absurdum: breuis enim in ipsis urinę meatus existit, & recta situs, ut citra dolorem hoc molimen admittant. Si uero urinę suppressę periculū urgeat, necessario ad catheteris usum confugimus, non quod affectionis molestiam tollat, sed ut urgentem urinę suppressionem corrigat, & à præcipiti periculo liberet. Post urinę prolestationem rursus ad eadem mitigatiua auxilia accedendū, usq; quo inflammatio soluat, aut suppuretur. Solet autem sæpe repēte inflammatiō solui, crysipelate iuxta cutis superficiem oborto, & permanente, neq; rursus intro recurrente: imò & lotio multo eiecto sæpe eadem iudicatione liberum hominē reliquit. nihilominus tamen etiam si hæc appareant, ipsam remedijs insistere oportet: quādoquidē ut plurimū tentiōne perfecta oborta, continuę exacerbationes fiunt, & mali constitutio diuturna. At uero ubi periculosę accessiones cessarint, & morbi cōstitutio iam fuerit inueterata, ad unguenta quę humores ex profundo euocāt ac transferunt, metasyncritica gręci appellāt, & ad malagmata trāseundū est, quę cutē rubefacere possunt.

*q. solui dicitur
neq; fluit.*

De sanguinis ex uelica eruptione, & de grumis eiusdem. Cap. xxvii
Est & alius acutus uelicę morbus: rumpitur autē uena in ipsa, & partim quidem sanguinem foras mittit, partim uero intus condensatur. Sanguine autē condensato, & grumis coactis, æger animo linquitur & pallescit, pulsusq; paruos, obscuros, & densos habet, mœrore angitur, refrigeratur, ac uiribus destituitur. quum uero grumus aliquādo in unnarum meatum incidit, is etiam lotę excretionem supprimit. uerū omnino difficilioris curę censenda est eruptio ex erosionē facta. Quare q̄p celerime uelut etiam in alijs sanguinis eruptionibus auxilium ferre oportet, extremas partes cōstringendo, & pectinem ex spongjs posca imbutis irrigando. Quod si inflammatio nem suspectā habes, lanas succidas uino & rosaceo madidas imponito. Cæterum ob prædictum periculum, compendiarium curam facere conuenit, & nequaquam rem differre: & siquidem nihil prohibeat, uenam secare partita sanguinis detractiōe, ut eo modo sæpe & paulatim sanguis detractus reuelatur. ægi uero in decumbendo sursum uersus collocentur, & coxendicibus ipforum leuandis & simul refrigerandis spongię posca imbutę subdantur, aut pelles substernantur: summe autē profunt urgente malo cucurbitulę illis ac lumbis affixę. Post irrigationes autem cataplasmatibus utendum sanguinaria, rubo, plantagine, perdicio, mali punici floribus, lenisci & myrti folijs: horum unumquodq; cum farina flore pro cataplasmate imponendum est, & frequenter priusquā tepescat, altero imposito, auferēdum. Optime etiam faciunt ex palmis, acacia & hypocisthide ac alumine apparata cataplasmata, & quę his similia existunt. Summe autē cinis linteoli usti auxiliatur, si palmis ammiscetur, aut alicui ex epithematis infarciatur. Spongia item picē li quida imbuta, usta & epithematis ammixta mirifice sanguinis eruptiones sistit. Cæterum detritę uestis panniculus ustus, & spongia usta, non solum

*Sanguinem
sistit*

forinfecus locis apposita, sed & cum plātaginis, aut sanguinarie, aut herbæ sideritidis succo uelice infusa, maximopere auxiliantur. Oportet autem infusi fistulam aliās catheteri similem esse, uerum ex summo utriculū aut uellicam adaptatam habere. Quandoq; & sedi hæc infusa profunt. Inseffus autem conueniunt ex consimili materia constructinam & posca & lentisci decoctum, itemq; rubi & similium eis cōuenit. Danda autem & in potu pharimaca eductioni sanguinis apta tū simplicia, tum cōposita, ueluti sunt rheon ponticum tenuissime tritum, & loti arboris scobes & ramēta, præsertim corticis eiusdem, & glycyfides aut pæoniæ grana rubra xii, terra samia, & lemnia, sphragis appellera, hippuris, centaureæ magnæ radix, thuris cortex, & similia. Optimum uero & hoc est, quo Archigenes usus est.

Ad sanguinem mingentes: Archigenis.

Aluminis scissilis drach. i. gummi obolum i, tragacanthæ drach. ii. in passo diluito, & in pastillos redigito: & ex eis obolos ii cum passo prabeto.

Ad sanguinis è uesica eruptionem: Aesclepiadæ.

Balaustij, acaciæ, succi hypocisthidis, cuiusq; drach. iiii, aluminis scissi drach. ii, in pastillos cum aqua digerito, & obolos iiii, cū uini myrticæ cyathis iiii exhibeto. Porro quibus sanguis in uesica in grumos cogitur, primū tentandum est ut pharmacis diffundatur: artemisia igitur in potu præbenda est, & elichrysum, & cyrenaius succus, aut laser purum, aut conyza præsertim parua, absinthium, raphani semen, rubi succus, betæ succus, leporis coagulū aut hædi, unumquodq; cum aceto mulso. Ego autem, inquit Galenus, pharma cum eis præbui bibendum quod lapidem confringit ex aceto mulso: imò ipsum per se acetum mulsum exhibui, & quibusdam ipsorum grumi dissoluti paulatim per lotium prodierunt. Quod si hoc modo nihil proficias, sed urina supprimatur, necessitatem inducet catheteris adhibēdi: per quem ubi urinas eduxerimus, rursus prædicta in potu exhibemus præstantia ad grumorum coactorum dissolutionem. si uero neq; sic grumi dissoluantur, intercapedinem inter anum & pudēdum perinæon Græcis dictam inferne dissecare oportet, quemadmodū in calculosa uesica est prædictum, & eductis grumis de cætero uelut ad sanguinis eruptionem uesicę opitulabimur. ubi uero sanguinis eruptio cessarit, uelut alia ulcera curato. At uero sanguinis ex cole eruptiones, epithemata colem refrigerantia, & quoddam ex prædictis infusum sanāt. Quæ tubercula in uesica maturefcere oporteat. Ca. xxviii

Perinæon

Primum quidem est in principio conari quo tubercula dissoluātur, ut ne in pus permutetur: si uero id cito fieri non possit, auxiliorum usu ea matura facere oportet, quæ supra renib. cataplasmatibus modo dixi imponenda, atq; amplius adhuc nasturtio cum erui farina & melle, & columbino stercore cum caricis imposito. Fomentis autē & alijs remedijs utendum quemadmodum isthic est prædictum. Vt plurimum uero circa uesicæ collum suppurantur, quapropter etiam urinæ stillicidium amplius inducunt, suppurantur & in

& in vicinis sedi locis, & magis recrementi egestionē impediunt. Suppurantur etiam circa pectinem utrinque: uerum non difficile est ea coniectare, tum loci dolore, tum grauitate, atq; ipso adeo tactu: duriora enim & calidiora sunt corpora quæ suppurationem incurrent. Ex tuberculis etiam quædam foras uertuntur ad sedem, quædam quocunq; contigerit defluxus. Periculosa igitur & hæc sunt ac omnino lethalia, periculosiora autem sunt quæ intus rumpuntur.

De uesicæ ulceribus: Rufi. Cap. xxix

Si uesica sit exulcerata, aut propter abscessum, aut ob tuberculū quod præcepsit aut ex ruptura, aut ob fluxionis erosionē, aut ob aliam quamcunq; causam: ægros dolor acutus uesicæ omni quidem tempore comitatur, maxime uero tempore mictionis & excretionis puris: & liquidem sordida fuerint ulcera, feculenta simul excernuntur, & mucosa, & quæ crassam sublidetiam ad modum farinæ habent: aliquando autem & pellicula tenues ad modum foliorum & lamarum cum urina excernuntur. Si uero serpendo depascant ulcera, subruenta excernuntur & saniola ac fetentia. Ad hæc accedunt urinæ emittendæ difficultas, & pudendi affectio ac petulantia, & dolor non solum quum urinæ meatus fuerit affectus, sed & quum tale quippiā in profundo existit. Cognoscetur autem num in profundo, siue iuxta urinæ meatum sit affectio, ex eo quod si in amplitudine sua uesica sit affecta, dolor circa pubem cōsequatur. Si uero iuxta collum uesicæ ulcera cōsistant, tempore mictionis tantū & maxime ubi mingere inceperint ac cessauerint, dolor sentitur, atq; id amplius contingit si urinæ sint aciores. Omnes quidem igitur assidue decumbunt, & neq; erecti stare possunt, neq; reclinati quiescunt. ab indeficiente dolore, febribus, uigilijs, & colliquatione perimuntur: alij quidem citius, alij tardius. Dolores enim acuti sunt & ulcera iniucunda, partim quod urina assidue ea contingat, partim quod urinæ naturā acris exultat, neq; quā uis plurima excernatur, uniuerſa uesica euacuari possit: sed semper ex urina quippiam in ipsa relinquitur, quod continue ulcera contingit: semperq; uesica lotio plena existit. etenim quum multitudo eius euacuatur uesica contrahitur, & quod in ea relictum est quātumuis modicum, id ipsum omnes eius partes contingit, & quantum rursus repletur, paulatim simul extēditur. Propter hoc ipsum itaq; & quod neruosa est, insanabilia ut plurimū eius ulcera existūt: periculosiora autem sunt quæ ex erosionē orta sunt, & modica spes est ea restaurandi. Attamen quum sæpe etiam præter expectationem quædam eueniant cura est aggredienda, per quam si nihil aliud certe accessorijs dolores minuentur. Primum igitur persuadendus est æger ut decumbat, & in lecto quietem toleret. idq; maxime si febres simul adsint: deinde remedia febribus intermittentibus adhibenda. maximum uero hic fuerit lactis potus, neq; scio an post ullum aliud remedium secundo saltem loco id sit habendum: nam & asperitates lenit, & ulcerationes eluit, aliāsq; affectionem extergit. Reliqua uero dicta frugi sit & commoda. Per pharmaca etiam cōsolari

insanabilia
cur sint ul-
cera uesicæ

Lactis potus
ulceribus
commodus

A 3 agrum

agrum oportet, quæ superne pectinem amplectantur. & si quidem cum inflammatione exulceratio consistat, cataplasmata ex lini semine & scæno græco apta erunt, & reliqua quæ inflammationem soluere possunt: infusiones item & fomenta ex oleo & per spongas. quin & cerata imponenda ex hyssopo, butyro, adipe asnerino, & styrace apparatus: & ceratū myrteum, quod pro cerula, samiam terram, aut lemniam, iphragidem appellatam, aut minium sinopicum, aut diphryges habet ammixtum. Quod si loci uiolentius coarctentur, nardinum quidem sit ceratum. maluæ autem radices probe in aqua multa coctæ, deinde tritæ, in ceratum infarciantur: aut cerata ex meliloto & scæno græco similiter adhibeantur: aut quod tetracharmacum, item quod quod enneapharmacum inscribitur. laxationem enim mali faciunt, uerum his omnibus aliquid satis amplum de styrace addendum. Porro si exulceratio pascendo serpat, epithematis subadstringentibus utendum est, atque his quidem calidis, ut ob calorem quidem partes circumdolitantes leniendo iu-

Nome

uent, ob potestatem aut ipsorum Nomen uicinos locos apprehendere prohibeant. Sylua horum sepe iam relata est, utpote in palmis, uuis pafsis, gallis, mali corio, alumine, acacia, hypocisthide, & similibus sita. ex his singula aut palmis excipiuntur, aut cataplasmatibus ex liliacea farina, decoctio autem sit in posca. Utendum etiam pharmaci per catheterem infusione: ita ut in inflammationis & exasperatis lac recens multum infundatur, aut rosaceum optimum recens tepefactum. Si uero nihil horum adsit, aqua dulcissima tepida assidue infundenda, mordacitatis tempore instante: in intestinum quoque per sedem pituitæ succus infundendus est, & seminis lini succus: & cucumeris semine decorticatum tritum cum lacte, rosaceo oleo ad singula instillato. Cæterum ubi clysterem adhibere uelis ei qui uesciam habeat affectam, non supinum ipsum decumbere oportet, non enim permittunt uesciæ infusum intra transire, utpote indurate & graues factæ, & intestino incumbentes. uerum in genua proutum reclinare hominem oportet, atque ita infusum adhibere. In hac enim situs figura uesciæ secedunt & intestinum laxant, quo infusum assumere possit. Frequenter autem & in aquam calidam desideant ægri, & in deco-

Depositiones

siue Nomen

sistentia

ctiones relaxantes: nam hæc mitigant dolores. At uero ubi ulcera iam pascendo proferant, per catheterem iniicienda sunt quæ depastionem sistere possunt. Multa autem eius generis sunt: sed plurimis item quæ nobis familiaris est, ex charta sicum pharmacum, quod cum rosaceo infundere oportet, facit & Musæ pastillus, cum passo cretico tepidus infusus. Quod si uero sortida sint ulcera, pharmaca infundenda sunt, quæ repurgandi uim habent: uelut est Epigoni chlora, siue uiridis compositio: item quæ liliis appellatur, multo rosaceo diluta: aut ea quæ ex herbis constat: aut huiusmodi quæpiam alia. Si uero acrimonia consequatur & mordacitas, lac recens multum cum optimo amylo infundatur, aut pompholyx pluribus aquis elota & exiccata, atque deinde cum lacte diluta, aut collyrium Aster inscriptum, aut quod Cynarium

clyster

rium appellatur: aut pastillus ex physalide: aut panchrestus, à commoditate dictus, qui somnum inducit. Quum uero repurgata fuerint ulcera, adiuuare oportet quò ad cicatricem perducantur, atq; id per infessus adstringentes & eiusdem facultatis epithemata. Emplastrum igitur ex ouis commodè superponitur, & ex hordeo ulso, & ex cadmia tripliciter apparata, cerato myrteo, aut rosaceo contemperata. Si uero magis fluxione affectio infestetur, post repurgationem ulcerum, emplastro ex salicibus, aut Icesij, aut ex lolio utendum est, donec in totum ad cicatricem perducantur. Atqui nosse operæ precium est quod in quibusdā ob solidam cicatricem inductā, seminis meatus excæcantur, & uis generandi perditur: ita ut appetentiā quidem habeāt ad coeundum, nihil autem in totum seminis emittant: atq; hæc affectio pernitus incurabilis existit. Catenum si ad multum tempus exulceratio duret, quemadmodū in plerisq; fieri cōsuevit, tunc sanè & exacerbationes & interualla siue remissiones ægros apprehēdūt: quare in exacerbationib; quidem cataplasmata, & fomenta, & irrigamenta leniendi uim habentia adhibeantur. remissionis uero tempore ductū ad destruendum malum apto utēdum est. Pecten igitur iuxta membranæ peritonæi appellatæ, locū per malagma tum ad hanc rem destinatorum impositionē rubesciat. sunt autem huius facultatis, id quod ex lauri baccis constat, & epithema uiride appellatum, & si milia, maxime uero quæ ad calculosos renes sunt præscripta. quin & sinapismo utendum, & diætā uiribus reparandis apta est constituenda. Quod si non manuescāt, & diutius durent affectionis dispositiones, crustas circa peretnē & peritonæū membranā infligere oportet, aut per pharmaca, aut per ferrū, sinereq; ut per multū tempus ulcera se per effluxionē repurgent. Neq; uero inepte pharmaca dolorē leuātia in potu exhibueris, si uehementes insistent dolores. Ex sanè quidā iam papaueris succū erui magnitudine cū croco & myrrha lacte dissolutis in podicē indiderūt, aut cerato ex adipe anserino apparato permixtū & lana exceptū eodem modo intruserunt, scimusq; eos non uulgare cōmoditatem inde cōsequutos. Assumantur etiā quæ per os exhibentur, si quidē urgeat urinę emittēdæ difficultas: ueluti est papaueris albi tosti semen, qd' drachmæ pōdere tritū in 111 cyathos decocti floris iūci odorati, aut calami indicij, aut radice dulcis inspergitur & exhibetur: his fortiora sunt meon. phu, acorū, daucus. Plurimū aut exulcerationis dolorem mitigat hoc, semen cucumeris granorū xxx, nuces pineas xii, amygdalas amaras decorticatas v, croci quantū ad colorandū satis est. quotidie ieiunus accipiat eū lacte recēs mulcto, aut passo protropo, aut uino, aut sapa. quod si lenius reddere uelis, pro nucib; pineis maluæ semen pari modo recte conieceris. minore item molestia ab ægro procedet urina, si tragacanthus prædictis cōmiscetur. Probe aut exulcerationē iuuāt uerbenacæ rectæ folia cum passo potata, in 11 cyathis dissoluta, quo facile potu accipi possint. Ad urinę difficultatē quidē & ad ipsam exulcerationē pariter cōueniūt, papaueris albi semē,

Semini meatus cicatricis excacari

Glares ex succo papaueris

amylum, myrti baccae nigrae, singulorum drachmae quatuor, crocei oui assati dimidium: unio & drach. i ex passo dato. Quod si multum pus effertur, seculæ uisæ drach. i, ex passo diluto exhibita, ipsum repurgat. Deinde autem singulis diebus cucumeris semē decorticatum, & crocum, obolorum ii ponere, & nuces pineas pityidas appellatas desquamatas v, & anisi obolos iii simul trita cum uino mulso ex calida aqua temperato, exhibeto. Cyphi item & cyphoides ad hepatis ulcerationes praescripta, in paucis adeo diebus uescicæ ulcera perferare possunt. Ego autem, inquit Archigenes, ad uetera ulcera hoc usus sum, neque opus fuit mihi pharmaco magis uariiegato. Trixaginis, chamæpityos, cuiusque drach. xxi, asari drach. vii, pipetis albi drac. vii, cinamomi drach. i quā tenuissime terito, & unita simul reponiro. Ego, inquit, ex eo cochlearia ii cum passo diluto praebeto. Quum uero morsus contingit ulcerosus, amyli cochlearijs ii, & feminis cucumeris granis xv adiectis, quod uolui sum assequutus. Suffecerint quidem igitur uolētibus bona methodo remedijs uti, hæc à Rufo & Archigene praescripta pharmaca. Apponam tamen & alia consimilia iidem à ueteribus tradita. Sint autem praescripta eorum quæ describentur quod ad usum pertinet exempla.

Andromachi, ad ulcera renum & uescicæ.

Seminis lini, feminis papaueris albi, feminis cucumeris repurgati, tragacanthi, singulorum drach. ii, amyli drac. iii. cum aqua conterito, & in pastillos nucis ponticæ magnitudine redigito: ex eisque drach. i, cum passo diluto dato.

Asclepiades autem & Eras hoc modo apparant ad assiduos morsus, & sanguinis ex uescica eruptiones. Seminis lini torrefacti, feminis cucumeris repurgati, feminis papaueris albi, tragacanthi, cuiusque drach. vi, passii quantum satis est, apparato, & ponticæ nucis magnitudine cum passii diluti cyathis ii praebeto. Ad sanguinis eruptiones, cum aqua dato.

Oribasij, ad uescicæ ulcera. Profunt & his quidem quæ ad renes affectos sunt descripta, proprie autem in potu accepta: portulacæ succus cum passo, graminis decoctum, lac, uinum dulce, cupressi coma cum myrrha, erui magnitudine. Ad uescicæ dolores. Seminis lini cochlearium i ex passo, scesamum, feminis hormini drach. i, oxyschceni semen, loti arboris bacca, feminis papaueris drach. i, cum aqua mulsa, floris cotoneorum decoctum.

Eiusdem, ad renum & uescicæ exulcerationem.

Nucum pinearum heminam italicam, phyllalidas numero x, nuces iuglandes viii, alij x habent, croci drachm. v, feminis rumicis drach. vii, opij drach. iii, feminis cucumeris decorticati drach. iii, feminis apij drac. iii, mellis cocti quantum satis est. Datur obolorum iii pondere.

Aliud, Andromachi, ad uescicæ exulceratā & urinæ emittendę difficultatem.

Nuces pineas xxx, amygdalas præmundatas uistas viii, comes palmarum xxxv, tragacanthi drach. iii, succi radiceis dulcis drach. ii, croci obolum i, myrrhæ tantundem. Excipe passo, ac utere ut dictum est.

Aliud

Aliud, ad uesticæ ulcera & inflammationes.

Nuces pineas ꝛ ꝛ, seminis cucumeris grana ꝛ ꝛ, amyli obolos 111, spicę nar di drac. 1, seminis apij drac. 11. Spica & apium in sextario aquę uno coquuntur, deinde ad decoctum prædicta miscentur. dantur cyathi 11, ad uehementes morfus calefacti. Aliud. Amyli drac. v 111, baccarū myrti nigrarum maturarū caruncula drac. v 111, seminis papaueris drac. x v 1, paksi protropi quantum satis est, apparato, & nucis ponticę magnitudine ex passo dato.

Pastillus ex physalidibus, ut tradit Eras. ualet ad renum & uesticę affectiones, etiā si pus, aut sanguis, aut corpuscula mucosa, aut fibris similia, aut crassa, per urinam exeant. Facit & ad scabiosas affectiones, & stillicidiū urinę, & ulcerationes ægre cicatricem recipientes: idem & bibitur & in uesticam iniicitur.

Granorum herbę physalidis numero ꝛ ꝛ v, sunt autem halicababo similia, paulo tamen maiora: amygdalarum marinarum decorticatarum, croci, nucum pinearum tostatarum, seminis rumicis hortensis desquamati, singulorum drach. 111, seminis cicutę, opij, seminis sceniculi, cuiusq; drac. 111, seminis hyoscyami albi, seminis apij, cuiusq; drac. v 1, seminis cucumeris satiui desquamati drac. x 11. Excipe passo, & drac. 1 præbe febre carentibus, cum paksi diluti cyathis 111: febricitantib. cum aqua. Ceterum si uehementes fuerint dolores etiā ante somnum præbe. Per catheterē item iniice. Vtere autem ut efficacissimo. Quidam etiā nucis ponticę tostę drac. 111 addunt.

*Physalidis
grana*

Aliud, ad omnem renum & uesticę exulcerationem, omnemq; emittendi urinam difficultatem, & calculi affectionem.

Portulacam exuccato, succumq; resiccato, & in pastillos redigito, drach. mamę unam cum aqua calida potandam præbeto.

Pastillus ex tragematis siue bellarijs, ad renū & uesticę exulcerationes.

Vuarum passiarum albarum mūdatarum bessēm, nucum pinearum sextantem, seminis cucumeris decorticati, baccarum myrti exacinatarum, amygdalarum amararum delibratarum aut dulcium, amyli, palmarum pinguium, seminis apij, singulorum sextantem, seminis papaueris albi drach. 111, traga canthi, croci, radice dulcis, cuiusq; drach. 1111, myrti drach. 11. Redige in pastillos cum cretico passo. Exhibe drach. 1 cum paksi cyathis 11.

Aliud, experimento constans, Olympij sophistę, ad exulceratam uesticam.

Rhei pontici drach. 1111, seminis cucumeris decorticati drac. 111, seminis hyoscyami drac. 11, seminis maluę drach. v, nucum pinearum tostarū drach. v 1, seminis apij drach. 1, amygdalas amaras delibratas ꝛ ꝛ ꝛ. cum sapa subige, & ponticę nucis magnitudine præbe, cum paksi diluti cyathis tribus.

Afclepiadę pharmacum accommodatum: ex cuius usu multos renum affectione apprehensos in totum liberatos scimus. Oportet autem ad multos dies pharmaco hoc uti. Sanat etiā uesticę affectiones: datur & calculosis: remedio est & colicis. Habet autem hoc modo. Nucum ponticarum

reput

repurgatarum, amygdalarum amararum mundatarum, feminis cucumeris depurati, feminis caroi, singulorum drach. iiii, feminis papaueris albi, aut si *Cicutā pro papauere* non adsit, cicutæ drach. vi, croci, feminis maluæ, opij, cuiuscq; drac. vi, feminis hyoscyami albi drach. xii, feminis apij drac. xii. excipe melle cocto & informa pastillos, datoq; obolos iiii, cum aquæ mulsæ cyathis tribus.

Aliud, ad exulcerationes renum & uesicæ.

Damaſonij drach. ii, palmarum drach. x, nucum pinearum drach. v iiii, feminis cucumeris drach. iiii, anisi drach. ii, amygdalarum amararum drach. ii, croci drach. i. dato obolos v ii ieiunis cum passo diluto. Quod si damaſonium non adsit, eryngium conici. Vt re etiam Xenophili antidoto ad calculosos capite xiiii præscripta, & similibus quæ ad exulceratâ uesicâ itemq; renes valent, unâ cum hoc quod arenulæ minguntur.

Dicta ex libris Archigenis.

Cap. xxx

Vitet æger omnem lassationem, & longiorem ac effluentem gestationem, maxime uero quæ sit in equo, uigiliisq; & omnem uehementem concitationem, & ecôuerso perpetuum oculum, & balneorum assiduitatem: amplius autem & cruditates, & supra quàm conuenit repletiones: & ne quid crudum in cibo accipiat, & neq; quod ægre concoquitur, aut facile corrûpiatur, aut inflationes pariat, sumat maxime tamen uitet quæ facile accedunt, & quæ crassi humoris sunt, quæ urinâ cient, quæ ægre secernuntur, quæ difficulter inferne excernuntur, & quæ amplius uentrem perturbant. item omnia acria & feruentia, & quæ accepta amplius adstringunt, & magis resiccant, & non nutriunt, & quæ stomacho inimica sunt, & quæcunq; bilem aut pituitâ præcipue gignere possunt. quare & multus potus, & meracior potus, ac ieiunus porus, omnes incômodi existunt: & uice uersa longa sitis, & inedia, & eduliorum uarietates, & superflua cõdimenta. omne ite nidorosum & graueolens & putridû & crudum præsertim olus incômodum. Hæc enim omnia tum renum tum uesicæ ulceribus inimica sunt. atqui si quâdo appetitui gratificari uelimus, lactuce cauliculos, aut serin, cruda & cocta minore offensione sumere possunt. A placetis uero & alijs pinguib. abstinere oportet, & à plerisq; belarijs. Vua passa enim non incômoda est, & nuces pineæ recètes duab. aquis maceratæ, & amygdalæ uirides quidē, maturæ tamen & probe mûdatæ, sic æ uero non uetustæ, sed præmaceratæ & decorticatæ: licet & pistaciû sumere, melius quidē uiride, aut si id non adsit, madefactû, minime uero uetustû. Thebaica aut palma caryotus qui os non habet, siue id à natura, siue arte ei contigit, acerbior est, & stomachi & renum & uesicæ debilitati cõuenit. Ceterum genera quidē reliquorû tandem describantur. speciatim aut panis sit recens cibariis decenter apparatus. Ex uolucrib. montanæ & teneræ tamen habêtes & non antiquæ. Ex pedestrib. conueniētiore sunt hædorû extremi tates. Ex aquatilib. ad renum & uesicæ ulcera magis congruunt, apua marina minima assidue comesta, non inepti sunt etiam alcelli parui, & qui gobij appellantur

pellantur. extergunt item ulcera gammarus, locusta, & aliquantulum etiam squilla: cancer autem fluuiialis uelut remedium præbeatur, & herinacius recens familiariter permittatur: ex conchis uero & peloridibus parum quiddam uarietatis gratia detur. Pro liquamine autem uoluptatis gratia acetum modicum, & quam minimum gari albi & boni concedendum. Parce autem utendum est pipere & lasceris succo, nasturtioq; & sinapiab eruca uero in totum abstinendū, nam & uenere[m] excitat: coitus autem omnibus renum & uesicæ affectionibus insensibilissimus est, & maxime senibus ac natura imbecillioribus. Omnia porro quæ in cibo sumuntur mediocriter multitudinis sint, etiam si utilia esse ferantur. Aqua pluuia non corrupta omnino melior est: ex alijs uero quæ nullam omnino gustanti qualitatem exhibet, exquiratur. A frigida potu in totum abstinendum: frigidum enim ulceribus inimicum. Balinei uero rarus sit usus: quo uero aliquando appetentiæ gratificemur, & lassitudinem refoueamus, permittatur. Ceterum naturales aquas experiri non inuile fuerit, aluminosas uidelicet, sulphurentas, & consimiles, quales sunt albulae, & lactei temperament. Frigida etiam lauare ac irritare commo-
dissimum est: supra naturam enim ulcerationes ægre sanabiles, tum externas tum internas destruit.

Aque quæ præstant

De albularum aquarum potu.

Conferent itaq; aquæ albulae si adsint, & consimiles post matutinam deambulationem, trium heminarum mensura prima die potatæ, deinde usq; ad quinq; & sex heminas perueniendum. Ad hoc enim quod intestinum eluant, aer etiam ipsarum fuliginosus uescam ad doloris sensum percipiendum hebetat, & humoribus segregatis puriorem ac lucidiorem sanguinis uaporem reddit, quin & ipsæ aquæ ulcera utiliter repurgant, & cum uoluptate infra subeunt, atq; adeo nihil ægro sanando efficacius deprehendere possis. Hora autem calidior ad eas accipiendas apta est. Quod si non adsit huiusmodi aquarum qualitas, adsint autem aliæ nullam gustui qualitatem exhibentes, sed late se ad gustum diffundentes, hæ ipsæ reliquis meliores sunt censendæ, & proximo ab eis loco bituminosæ. Nitrosarum etiam si adsint & salсарum experimentum sumere prodest: maiorem enim quam credi potest sæpe ex his succedentem uidi effectum. Intercapedine autem & distantia à balneo facta, aridarum rerum comestio primū utilis est, nisi sitis simul adsit: tunc enim aqua calida modica sitis extinguenda est, aut aliquo uino dulciore. Adsit autem & crenanthites & myrtites uinū: nam ea post balnea & exercitia utiliter ad ulcera delabuntur.

N. A. de potibus aquarum præstantibus.

salut. proferat

De uesicæ fluxione, & his quæ capillorum forma exeunt cum urina.

Cap. xxxi Archigenis.

FIt aliquando & fluxio circa uescam, ut aliquādo quidem mucosa, & for-
liss ac lamis similia, itemq; crassa excernatur, & aut crebro, aut post tem-
poris moram lotia reddantur aliquādo aut aquosa & tenuia. Nouimus aut
quosdā etiā pilos per locū eiecisse, modo inuicē perplexos, modo simplices,
& alii

imponenda sunt ex cruda ordeacea farina . Optimum etiam fuerit alium submollire per betæ & maluæ decoctum pauco mercurialis succo admixto. Concharum item decoctum in potu exhibendum: ab efficacioribus autem purgantibus pharmatis in totum abstinendum. Cauenda etiam quæ urinae facultatem habent. Utendum autem cibus frumentacei generis qui leniter attenuare ualent, citra manifestam calefactionem. Lumbis uero quæ euidenter refrigerant imponenda, uelut est solanum, portulaca, hyoscyamus, & semperuium . Necessario etiam coles & intercapedo inter anum & pudendum ex aliquo leniter refrigerante illinitur , uelut est argenti spuma, cimolia, & cerusa, si aceto, aut posca, aut aqua sint diluta. Opime autem facit in ipsis ceratum ex rosaceo optimo apparatus, & frigida aqua saepe elutum, si tum pudendis, tum lumbis imponatur. Porro in latus decumbere ipsos ex re est, & substernere ea quæ ad seminis profluium dicuntur in potu amplius præbere quæ ad illos describentur . A spectaculis uero & narrationibus, ac commemoratione eorum quæ ad uenerem excitare queant, penitus sunt arceendi.

De seminis profluo: Galeni. Cap. xxxiii

Profluium seminis excretio est eius præter uoluntatem, citra pudentis integritatem. Nomen autem habet ex eo quod inuitis profluit semen. Fit autem affectio ipsa ob retentiuæ in uasis seminarijs facultatis imbecillitatem. Quemadmodum enim in his qui secundum naturam integris uiribus præstant, ea quæ in nutrimentum cedunt retinentur, & excrementa excernuntur: sic in his qui præter naturam habent, recrementa aliquando ob expulsuæ facultatis infirmitatem retinentur, & ob retentiuæ debilitatem excernuntur, aut etiam ob aliquam aliam affectionem, quæ seminariorum uasorum partes eodem modo quo expulsua secundum naturam facultas mouet: ueluti in comitialibus, & alijs uiolentioribus conuulsionibus contingit, aliquando etiam in his qui ex conuulsione moriuntur, ut uidelicet semen eis excernatur. Profluium igitur seminis uasorum seminariorum affectio est, non pudendi, quæ dolorem quidem non ita ualde inferre solet, molestiam autem non uulgarem & pollutionem exhibet, ob asiduum & inuitis contingentem seminis fluxum. Oboritur autem aliquando etiam ex seminariorum uasorum fluxione: quâdoq; etiam satyriasi præcedente profluium seminis succedit. contingit autem affectio maxime pubertatem transgressis citra decimum quartum annum, imò alijs item ætatibus. Est autem semen quod profluit aquosum, tenue, citra appetentiam coeundi, & ut plurimum quidem citra sensum, quandoq; uero cum uoluptate quadam promanans. Corruptur affectis sensim uniuersum corpus ac gracilescit præsertim circa lumbos. Consequitur & debilitas multa non ob multitudinem seminis profluentis, sed ob locorum proprietatem. Non solum autem uiris sed & mulierculis hoc accidit, & in feminis sanè ægre tollitur. Cæterum cura communis est cum ea quæ in omni fluxione adhibetur. Primum igitur in quiete, & pau-

*Mulierculis
etiam semen
profluere*

eo cibo, ac aquæ potu affectos adseruare oportet: deinde etiam lumbos & pubem tegere lanis uino & rosacco, aut cenanthino, aut melino madefactis. neque uero ineptæ sunt spongiæ poscæ imbutæ. Sequentibus uero diebus cataplasmatibus ex palmis, malis, acacia, hypocistide, cenanthe, rhoë rubro, & similibus, insensibus item adstringentibus utendum est, ex lentisci, rubi, myrti, & similium in uino austero siue mero siue diluto decocto. Cibis autem utendum qui ægre corrumpuntur, & difficulter permutantur, & rescicandi uim habent. Dandum etiam cum potu ac cibis uiticis ac cannabis semen præsertim tostum, rutæ item semen ac folia, lactucæ semen & caulesculi, ac nymphaeæ radix. In potu uero quotidie pro communi aqua, aqua in qua ferrum sæpe extinctum est præbeatur. Quidam uero corticem radicis halicacabi ex aqua eis bibendum præbuerunt, neque ineptum fuerit huius aliquando periculum facere. Antidotus etiam hæc magnæ celebritatis, tum ad hoc modo semen profundentes, tum ad assidua in somnis profluuiâ, cōmode exhibetur. Seminis salicis drach. vii, calaminthæ drach. vi, seminis uiticis albæ drach. v, rutæ drach. iiii, seminis cicutæ drac. ii, cum aqua in pestillos digerito, & ex eis ad ponticæ nucis magnitudinem cum poscæ cyathis tribus præbeto. Omnem uero acrium rerum esum, & multi uini potum, & olerum exhibitionem uitare oportet: dietam uero uniuersam rescicariariam & adstringentem constituere. Post prima autem mox tempora ad unctiones & exercitaticem dietam transeundum, per quam totum corpus & præsertim affecta ad sanitatem perducantur. & plurimo quidem tempore circa unctiones immorandum: paucies uero lauandum, si aut lassitudini aut cruditati mederi uelimus. Bonum fuerit etiam, si nihil prohibuerit, ad frigida lauationem defugere, quæ omnem morbum ex fluxione obortum depellere consuevit, maxime si medicamentaria qualitate aqua prædita sit, uelut sunt in Albulis aquæ, quæ etiam in potu acceptæ eis summe profunt. sunt autem sapore subsalfo, & tactu lacteo. Conuenit item per interualla quædam illitionibus & epithematis & malagmatis uti, quæ rubefacere & emolliere possint, atque ea quæ in profundo hærent ad superficiem transferre. De cubitus porro frequenter in latus fiat, calaminthæ folijs, & rutæ ac uiticis substratis. Epithema autem in eis usu uenit hocce. Capillum ueneris multum, contundito & terito cum aceto, aut apij succo, aut seridis, aut psyllij, eoque coctilearum carnes coctas excipito, & simul in lineoolum infarta coxendicibus imposito. Utendum uero & præscripto ad priapismum cerato, & his quæ paulo mox ad seminis in somno profluuiâ dicentur. Omnem autem de rebus ueneris cogitationem excludere oportet.

De seminis in somnis profluuiis: Philagrii.

Cap. xxxiiii

Semen in somnis profundere dicuntur, quicumque dum dormiunt naturæ genitale semen emittunt: quod ipsum eis ut plurimum ob uitati humoris materiam, aut materię multitudinem, aut ob partium seminalium robur contingit

Antidotus celeberrima ad omne profluuium feminis

Uita ois resicatoria et apigros.

frigidis lenis cum morbo fluxione etiam p. h. t.

Albuli: ipse acapte
sapor subsalfo et
tactu lacteo.

Epithema ad profluuium feminis

contingit. Iam uero quidam & ob animi deliquium, aut inedia, per somnos præter consuetudinem semen extraherunt: atq; id materiæ acrimonia irritati, non ob partium feminalium robur pertulerunt. Huiusmodi sane qui uidelicet animo linquuntur, aut inedia diutius pertulerunt, in totum ferè nulla imaginatione præcedente, citra sensum etiã, in somnis profluit semen. Reliquis autem non solum cum pudendi intensione, sed etiam cum quadam propoſita imaginatione, quæ in somnis occurrit, inordinate semen profunditur. Caterum pessimus corporis habitus hic est: quum semen multum & calidum aliqui generat, quod eos ad excretionem urget, atq; postquam per coitum eiecerint, exolutionem oris uentris patiuntur, & toto corpore exoluntur. debilesq; sunt & siccæ, & tenues, & pallidi, oculos etiam cauos habent hoc modo affecti. Quod si à coitu uenero abſtineant propterea quod ita afficiantur, capite discruciantur itemq; stomacho, & astu fastidioq; anguntur, nihilq; magnopere ex continentia iuuantur: contingit enim eis per somnum semen profundentibus consimilia perpeti offendicula qualia coeundo perpersi fuissent. Quidam uero ipsorum mordax & calidum semen percipiunt in excernendo, ueluti ipsi continentur. His igitur, inquit Galenus, consulere oportet, quo à cibus semen gignentibus abſtineant: accipiant autem non solum cibos, sed & pharmaca quæ semen extinguant: ueluti est uiticis semen tostum & perfrictum: folia item & flores uenerem cohibere creditur, non comesta tantum, sed & in potu sumpta & substrata. Lentium uero decoctum etiam membri tēiginem remittere ac sedare aiunt. Portulaca comesta, & lactuæ semen potatum, & nymphææ radix & semen in cibo accepta, semen refrigerando extinguunt. Ruta uero comesta calore suo semen coagulat & corrumpit. Calaminthem autem assidue edentes generandi potentia priuari dicuntur, id quod similiter & uiolæ albæ semen, & hedere caryocumina nigra tria faciunt. Caterum aqua fabrorum ferrariorum in qua ferum sæpe extinctum est, assidue potata, citra molestiam imminuit semen. Horum autem omnium sylua uniuersa in secundo huius tractationis præscripta est sermone. Compositis potè ad ipsos utor, tum his quæ ad seminis profluuium sunt præscripta, tum hoc ipso. Ammij grana vi, feniculi tantundem, foliorum rutæ parum quiddam cum caricis pinguibus tribus, per mensem semel edito, aut quotiescunq; uelis. Atqui assiduum eorum quæ uementer refrigerant usum, tum in his quæ per os exhibentur, tum in eis quæ forinsecus apponuntur, uitare oportet: ueluti sunt ea quæ ex papauere & mandragora apparantur unguenta. Illitiones autem à balneo adhibeantur ex mediocriter refrigerantibus. Sunt autem hæc oleum ex crudis oliuis exprellum quod omphacinum appellatur: rosaceum maxime quod ex omphacino est apparatus, & melinum. Componenda autem sunt aliquando unguenta compage crassiora, ne uidelicet facile defluant. Compositio uero ipsorum est ex cera, & succo aliquo adstringente aut refrigerante commixtis,

Semen extinguentia

N^a p^a p^a p^a

B 2 hoc

hoc modo. Cerae partem unam cum quadruplici oleo liquefacto, deinde in mortario cum manibus sufficienter emollito, & paulatim ex succo refrigere rante quantum expedit instillato, unito, ac utitor. Succus uero ad hanc rem apti sunt, succus semperuiui, solani, umbilici ueneris, psyllij & sanguinariae, tribuli, perdigij, nymphææ & portulacæ: uerum hæc succum non emittit, nisi ad eam contulam in pila, aliquis alius tenuis succus affundatur, uix præferat immaturæ, & rosarum, qui sanè in æstate facile parabiles sunt. Alij uero multi etiam alijs temporibus haberi possunt, ueluti lactuca, feridis, stratio, tæp & lentium quæ in aquis nascuntur: semen lini etiam in aqua coctum, succum moderate refrigeratæ reddit rhanni item foliorum succus, & quæ his similes existunt. Optimum etiam censetur laminam plumbeam lumbis supponere, tum eorum qui in somno, tum qui alias semen profundunt: multum enim refrigerare consuevit. In his uero qui plumbi duriciem ferre non possunt, consulere oportet, ut ex prædictis herbis quædam arcraftæ substernantur, quibus etiam uiticis folia & modica ruta ac calaminthe commisceantur, maxime uero ipsa rosa. Prosunt enim hæc citra renum lationem. Vehementes namq; refrigerationes eorum quæ lumbis subduntur, renes iniuria afficiunt. Ipsum etiam stratum pellicum sit & non ualde molle. Decubitus porro ut plurimum in latus fiat, uicata forma decubitus supina, ne lumborum arteriæ inde supercalfiant. Atq; hæc quidem communis est omnium quibus semen in somnis profluit cura. Cæterum eos qui prædictum uitiosum corporis habitum & constitutionem habent: de illis dico, quibus ex coitus usu stomachus iniuria afficitur: illos, inquam, obseruare oportet quando maxime seminis multitudo, quæ excretionem expetat, congregata appareat: & tunc sanè in die quadam moderato ac boni succi cibo usi, à cena quum ad somnum uertuntur, coitu utantur: sequenti uero die quum sufficienter dormierint, & à somno surrexerint, linteolo corpus perfricent, donec cutis quendam attrahat ruborem: deinceps olei confricatione, & intritu moderate utantur, & aliquantulo temporis spacio interiecto, panem bene fermentatum, clibanitem, purum, modicum ex uino diluto accipiant, atque hoc modo ad consueta munia obeunda perueniât. Eo uero tempore quod inter olei intritum & panis exhibitionem intercedit, si locus adsit in uicinia aptus, in eo paulisper deambulent: si uero hyemis tempus instet, melius fuerit tamdiu intus deambulare. Abstineant autem à spectaculis & lectionibus quæ uenerat rei usum in memoriam reuocare possunt. Ex quotidie sanè hoc modo affecti exerceantur his exercitiorum generibus, quæ per suas pernas partes sunt. At uero corroborationem stomachi ex usu panis communem designamus in omni homine, cui bilis efferuescit, & qui stomachum exolutum habet. Quare & hi circa horam tertiam diei modicum panem, ex uino cum calida aqua diluto, madefactum accipiant, atque ita ad consueta operas prodeant.

De his

N. de portulaca

No goli

lou phiti i multans capi
vib que applicata ramis

De his qui re uenerea uti non possunt.

Cap. xxxv

Qui re uenerea uti cupiunt, ignaua autem & impotentia membra habent, infernas corporis partes exerceant, inguinaq; & femora his confricent, pipere uidelicet, nitro, & euphorbio cum oleo, unguentisq; ex huiusmodi rerum ammixtione apparatis. exempla autem componendi paulo post dicemus. Dormiant in mollibus lectis, legantq; quæ ad coitum cohortantur, lectionibus item ac spectaculis eiusmodi assideant. Cæterum edulia & pharmaca ipsis conueniunt calefacientia & inflantia, ueluti sunt, cicer, fabæ, halica, porri, bulbi, pastinacæ radix & semen moderate, nuces pineæ, aridæ coctæ, colocasi radix cocta, itemq; dracunculæ, urticæ semen, rapi semen, erucæ tum folia tum semen, maxime agrestis, costus & piper cum uino mulso, satyrium, scellum, hominum, amygdalæ moderate, anisum, polypodes & concharum genera omnia: perdicis item oua ad coitum excitant, & testiculus galli. Seminis uero multitudinem augent omnia bono succo præditæ: testes uulpis siccæ tritæ cochlearij mensura potati innocuam & minime uanam membri tentiginem faciunt: partes etiam renes scinci amplectentes ad tentiginem pudendorum excitandam bibuntur. Orchis, herba est quæ testiculæ appellationem habet, eius maior bulbus cum lacte potatus tentiginem cit minor uero cum aqua potatus, tentiginem remittit.

Cibi inflantes

*Semen
augentia*

Compositum, tentiginem ciens, & faciens ad languorem membrorum.

Sinapis, radicis panacis, seminis erucæ, cuiusque drachmas octo, seminis cardamomi drachmas quatuor, piperis grana uiginti, redigito in pastillos cum erucæ succo, & dato drachmam unam scinici cum uino ueteri adstringente.

Aliud. Seminis hederæ nigræ, floris chamæmeli, seminis oxyschoeni, cuiusque drachmas quatuor, seminis erucæ, piperis albi, sinapis, cuiusque drachmam unam, pyretri drachmas IIII. excipe melle, & ad strigmentorum spissitudinem redige: præbe à balneo nucis ponticæ magnitudine.

Aliud. Pudendum cerui aridum urito, & drachmam unam cum uino meraciore præbe. Experimento constat. Aliud, quo & ego utor.

Seminis hormini, scellami, piperis, seminis erucæ, sinapis, nucum pinearum, caudæ scinci, satyrii, floris iunci odorati, styracis, seminis porri, uuarum passæ, singulorum æquales partes, mellis quantum satis est: præbe drachmam I.

Aliud, quo etiam ipse utor.

Salis communis torrefacti sesquiseptarium italicum, hoc est uncias triginta sex, seminis hormini scrupulos duodecim, spicæ nardi unciam unam, salis scinci unciam unam, caudæ scinci drachmas quatuor, ammi scrupulos duodecim, satyrii sextantem, piperis unciam unam, seminis cardamomi unciam unam, seminis sceniculi unciam unam, myrrhæ unciam unam, seminis erucæ drachmas sex, seminis uerbenacæ supinæ aridi drachmas tres, seminis sanguinaræ siccæ drachmas duas, nucum pinearum unciam unam, physalis

B 3 lidum

lidum drachmas quatuor, seminis hyperici drachmas quatuor, contundito, cribrato, & ad uesperam cochlearium quomodocumque uelis exhibeto.

Aliud, uehementer efficax.

Myrrhæ, piperis, spicæ nardi, tragacanthi, cuiusque drachmam unam, thuris sesquidrachmam, croci drachmam unam, styracis, galbani, dauci, seminis hormini, cuiusque drachmas duas, canchryos, seminis feniculi, seminis lini, seminis urticæ, fœfelis, cumini æthiopici, anisi, seminis erucæ, cuiusque drachmas sex, erui albi tosti drachmas sex, seminis apij drachmas tres, sesami non loti drachmas decem, amygdalas amaras delibratas quindecim, amygdalas dulces triginta, nyces pineas centum, bulbos crudos magnos sex, mellis quantum sufficit, ut ad cerati crassitiem redigatur. præbe drachmam unam ante cenā, cum uino mulso maxime, aut uino austero. Facit ad tentiginem, & superabundantem rei ueneræ usum ciendum, in senibus præsertim & debilitatis. Facit & ad liberorum procreationem.

*Ad liberos
procreandos*

Vnguentum efficacissimum.

Olei uetustissimi libram unam, erucas in tithymallis repertas nonaginta sex. Erucas in æstate dum in uigore est herba accipe, & in oleum coniectas ad solem per dies septem expone, & postea oleo utere: ani & pudendi intercapedine, itemque lumbis ex eo confricatis. Idem etiam pinus erucæ faciunt, & tentiginem uehementer ciunt.

Oribasij satyrica.

Zingiberis, radicis satyrii superioris, cuiusque drachmas octo, caudæ scinci, mei, asari, petroselinii, cardamomi, fœfelis, cuiusque drachmas quatuor, seminis erucæ drachmas tres, cinamomi drachmas tres, hormini, piperis, seminis urticæ, cuiusque drachmas duas, floris iunci odorati drachmam unam, spicæ nardi drachmam unam, sanguinis hircini sicci cochlearium plenum. datur drachma una cum uino, imbecillioribus uero cum lacte.

Oribasij, ad pudendi languorem, præsertim senum.

Seminis erucæ drachmas duas, cumini unciam unam, portulacæ unciam unam. excipe melle, & mane ac uesperti cochlearium præbe. Porro ad coitum concitat, passer troglodytes appellatus, in cibo acceptus. Verum his, qui frequentius & supra quàm conuenit inde coeunt, urinam ca præ bibendam præbe.

Oribasij, tentiginem ciens.

Piperis, petroselinii, nucum pincarum, icobis pudendi ceruini aridi, terebinthinæ, æquales omnium partes melle excipe, & cum uino bibendas præbe.

Aliud, Oribasij. Stellionem ustum quàm tenuissime conterito, deinde oleum affundito, atque ex eo magnum dextri pedis digitum inungito, & coito: ubi uero à coitu cessare uelis, digitum ipsum abluito.

Aliud eiusdem. Leporis coagululum, aut leonis adipem pendendo illinito: deinde tria piperis genera cum tragacanthi succo testiculis, interca

intercapedini inter anum & pudendum, ac lumbis oblinito.

Ex Rufi libris unguentum efficax tentiginem ciens.

Myrrhæ drachmam unam, sulphuris uiui drachmam unam, cnicî interioris drachmam unam, pyrettri obolos duos, melanthij drachmas duas, piperis grana triginta, grana cnidia deprata uiginti, contundito: & cum drachma una succi scillæ terito: ceræq; unciam unam, cum olei cicini besse colliquato: mellis item quadrantem adijcito. Vtitor. Post coitum uero cum linteolo loci diligenter extergantur. Quidam uero hoc unguento sedem illinunt.

Porro Rufus etiam hæc addit. Facile est, inquit, & hic remedium tepere, his qui uenere uti non possunt. Adolescens enim quispiam nos accessit, & se uehementer coitum appetere confessus est, uerum ubi commiscetur semen emittere non posse, sed flatus plurimos sibi per sedem erumpere. In hoc itaq; coniecturam feci, uasorum seminariorū siccitatem adesse: quod ipsum etiam adepta sanitas demonstrauit. nam postquàm humida & boni succi diæta esset usus, semen emisit. Alius item adolescens domesticus mihi noster, confessus est se, quando cum muliere rem haberet, semen effunderè non posse: quum uero dormiret, plurimum ei semen prodire. Visum itaque mihi est, uasa eius seminaria propter multam unā cum frigidityte humiditatem, cal fieri non posse: propterea quod caliditas in coeundo ad corporis superficiem diffunderetur. in somnis uero amplius calefieret, propterea quod somni inerna calefaciunt, & refrigerant exteriora. Quare

hunc ipsum infernas partes exercere iussi, atque id maxime per equitationem. Castorium etiam bibendum præbui, & diætā omnem calidam & siccam constitui.

*Exempla
curatorum*

Vndecimi Sermonis

Finis.

B 4

AETII ANTIOCHENI MEDICI

DE ISCHIADICIS SIVE COXENDICVM DOLORE,

deꝗ podagra & articulari morbo, quem Græci ar/
thridem appellant, Sermo Duodecimus.
Iano Cornario Zuicauienti interprete.

TABVLA Capitum Duodecimi Aetij Sermonis.

De ischiadicis siue coxendicum dolore.	Caput i
De herba iberide, quæ & cardamine appellatur, eiusqꝫ sinapismo.	Cap. ii
De uisione.	Cap. iii
Cura affectionis exacerbata.	Cap. iiii
Epithemata & malagmata ad ischiadicos.	Cap. v
De podagra & arthritide siue articularum morbo.	Cap. vi
Causæ uniuerſales.	Cap. vii
Quare in quibusdam magnus sit morbus, in alijs uero paruus.	Cap. viii
Quare multo tempore aut pauco morbus duret.	Cap. ix
Quæ sit incuruatorum articularum causa.	Cap. x
Quæ causa generationis toforum in artubus.	Cap. xi
Quæ causa sit cur inflammationes in podagricis non fa/ cile suppurentur.	Cap. xii
Quomodo ex inflammationibus & consequentibus ac/ cessionibus, siue symptomatis, adfligens humor co/ gnoscat.	Cap. xiii
Sanguinei humoris influentis signa.	Cap. xiiii
Bilioſi humoris signa.	Cap. xv
Pituitosæ fluxionis signa.	Cap. xvi
Bilis atræ influentis signa.	Cap. xvii
Serosarum fluxionum signa.	Cap. xviii
De his qui ex humorum complexu fluore infestantur.	Cap. xix
Diæta & cura podagricos præseruans.	Cap. xx
De olei & salis affricu in podagricis.	Cap. xxi
Vniuerſalis methodus curationis podagricorum.	Cap. xxii
Cura eorum qui ex sanguinis copia ægrotant.	Cap. xxiii
Quod eleuatas & incuruas uenas ex membris fluxione infestatis, uelut in uaricibus, auferre oporteat.	Cap. xxiiii
De perustione in morbo articulari.	Cap. xxv
Cura in fluxibus sanguineis post sanguinem euacua/ tum.	Cap. xxvi
	Cura eorum

Cura eorum qui neque uenæ sectionem, neque purgationem sustinere possunt.	Cap. xxvii
De his qui ob bilis influxum ægrotant.	Cap. xxviii
Parabilia remedia ad inflammationes non ualde feruentes.	Cap. xxix
De stupefacientibus medicamentis.	Cap. xxx
Vnguenta recalcfactoria quæ post stupefactiuorum usum adhibentur.	Cap. xxxi
Pharmaca & edulia eorum qui flauæ bilis influxu infestantur.	Cap. xxxii
Cura eorum qui ob pituitæ influxum ægrotant.	Cap. xxxiii
Cura eorum qui ex atræ bilis influxu ægrotant.	Cap. xxxiiii
De his qui ob tenuem & serosum influxum ægrotant.	Cap. xxxv
De fluxionum inter se complexu.	Cap. xxxvi
Cura affectionum ex sanguinis & bilis complexu.	Cap. xxxvii
Cura bilis ad pituitam permixtæ.	Cap. xxxviii
Cura humorum atræ bilis alijs permixtorum.	Cap. xxxix
Cura durorum tumorum qui post inflammationes relinquantur.	Cap. xl
De tumorum crudorum & incoctilium cura.	Cap. xli
Malagmata diuersa, in quibus etiam Leucij malagma est, ad articulorum distortionem destinatum.	Cap. xlii
Cerata podagrica.	Cap. xliii
Vnguenta & acopa diuersa ad podagricos, articulorum dolores, ischiadicos, membris exolutos, & tremulantes.	Cap. xliv
Ad durities in artubus instar toforum.	Cap. xlv
De medicamentis purgatiuis articulari morbo accommodatis.	Cap. xlvi
Antidoti podagricæ.	Cap. xlvii
Qui podagrici lauandi sint, & quomodo.	Cap. xlviii



Archigenis. Ischiadici, hoc est ex coxendicum dolore affecti, proprie dicuntur quibus dolor circa iuncturam quandam uertebrae ininitur. Antecedit autem & quasi auspicatur hoc malum aliquando quidem uicinarum musculorum dolor, & maxime lumborum: aliquando uero ab ipsa iunctura initium fit affectionis. Iam uero quandoque etiam contingit ut uertebrae dolore ferè sublato, circa poplitem solum afflictio hæreat: alijs autem iuxta talum: quibusdam uero totum crus æqualiter dolore affligitur. multis item circa inguina dolor figitur, & tum sanè uesica ipsa molestiam transsumens, urinae difficultatem inducit: & tunc maxime totum crus à coxendicibus usque ad calcaneum dolorem perferret, & non solum si ipsum crus moueatur conuulsiones infert, uerum si etiam aliqua alia corporis pars agitur. Generant autem hanc affectionem assiduae cruditates, & immodicus rei uenerae usus: aliquando etiam deambulationes concitiores, & hæmorrhoides suppressae, & uomendi consuetudo intermissa, & purgationes menstruae, aut etiam aliae familiares excretiones impeditae, & exercitiorum contemptus. Communis quidem igitur ischiadicis, podagra, & articulari morbo existit ualida alicuius humoris ubertas, quae affectum articulorum nexum occupat: quo impleto ex potrecta neruosa corpuscula tensione affliguntur, atque ex his oboritur dolor. Cæterum ad affligentis humoris cognitionem conferret digita quae præcessit, & anni tempus, & aeris nos ambientis status, ætasque & habitus, itemque color corporis: amplius autem & doloris speciem, siue fetuens & pungens, siue stupidum. Initium igitur curationis fiat ab affligentis humoris euacuatione. & si quidem humoribus ex æquo redundarit corpus, præ omnibus uenae sectio adsumatur: deinde etiã purgatio: postea uero ea quae dicuntur pharmaca oportune & ordinate adhibeantur: ita ut in manibus quidem & pedibus pharmacis fluxum repellentibus utamur, circa coxendicum uero iuncturam id facere uitemus. quum enim hic conexus in alto situs sit, sanguis ex uicinis & ambiētibus uenis ac muscularis ad ipsum impellitur: quare lenitiuis in principio opus est pharmacis ad coxendicum dolorem, atque ea neque omnino refrigerent, neque fortiter calfaciant. Etenim quae refrigerant, ad conuulsam materiam impellunt: quae uero uehementer calfaciunt, aliam amplius materiam ex adiacentibus partibus adtrahunt. A multitudine itaque sanguinis coxendicum dolorem obortu uenae sectio curat, si primum cubiti uenam secemus: deinde etiam eam quae iuxta talos est, aut poplitem. In principio enim omnium inflammationum diuulsoriam uenae sectionem facere oportet, ueluti si pes sit inflammatus, ex uena è directo loci affectu sita sanguinem extrahemus. In affectionibus uero iam inueteratis, maxime quidè ex ipsis locis affectis extrahemus: aut si id fieri non possit, ex uicinis. Post sanguinis uero è cubito deductionem

Humoris ualida
ubertas

detractiōnem, à talo repetita sectiōne auferre oportet. secunda est autem interna uena iuxta talos sita: uiriliter enim imbecillis auxiliatur. Et scio, inquit Galenus, coxendicum dolores in una hora curatos per hanc ex cruribus euacuationem, maxime si non à frigidityte sint oborti, sed ex uasorum sanguinis circa coxendicem repletionē. In omni equidem coxendicum affectiōne, præcipue tamen ea quæ humoribus ex æquo redundantibus oboritur, si quis prius quàm corpus euacuet, acris pharmacis ad affectam partem lam utatur, ægerime sanabilem affectiōnem reddit, utpote multitudine ibidem insolubiliter condensata: supra reliqua enim inspissatur & uiscosa redditur, & ob acrium pharmacorum caliditatem & siccitatem nō dissimile quippiam assationi perpetitur. Ab euacuatione igitur totius corporis, ut quæ maxima facultate ad huius affectiōnis curam præstet, curandi initiū faciemus: & non solum à cruribus, sed & à cubito primum sanguinem extrahemus. Sunt & uomitus ischiadicis commodi, atq; adhuc amplius quàm per uentrem euacuationes, nimirum retrahentes humores infra repentes. Eos igitur in principio affectiōnis facere à cibo expedit. Inueterato uero malo etiam à pharmacorum uomitum cientium acceptione, ita ut à mediocribus incipiamus. Porro quibus iam indissolubilis humorum coactio in ipso articulo à medicis per immodicum acrium pharmacorum usum facta est, his cucurbita quàm maxima cum scarificatione locis affixa auxiliatur, & purgatio per infusa efficaciora. Qui igitur iam dicta præ oculis habuerint, etiam præscriptis à ueteribus medicis pharmacis iuxta methodū poterint uti. Itaq; post uenam in cubito sectiōnem, & à talo item sanguinis detractiōnem, aut per purgatiuum euacuationem, ubi uidelicet aluus seniori clysteri injecto extenuerit obturata, irrigare locos oportet, primum quidem ex oleo rutæco, postea uero etiam efficacior irrigatio adhibenda quæ sensim calfactet, & materias ex alto ad superficiem attrahere possit: qualis est quæ ex cyprino, aceto, nitro, & canchri constat: ita ut octo quidem cyathi olei cyprini, quatuor uero acris aceti, duo autem nitri, & unus canchrys conijciantur, & donec ter aut quater effuerit coquantur: post uero expressus & in lanis succidis exceptus succus super affectos locos imponatur. uerum quotidie renouare hanc irrigationem oportet, & tribus locis hoc fotu admoto profectus animaduersionē habeto. Multos enim, inquit Archigenes, uidi qui nullo alio præsidio opus habuerunt. ego uero, inquit, post prædicta etiam simpliciorē clysterē infundo, & sequenti die acriorem. atq; haud scio an ullus tam degener coxendicū dolor reperiatur, qui huic præsidio non cedat: aut si aliquādo ad primā adhibitionem nō celsit, post alterū eius usum penitus excisus est. Apparatur aut acrior clyster hoc modo. Mellis sesquicyathum, olei tantundem, aquæ cyathos ii, nitri drach. viiij, terebinthine drach. iij. hæc unita & calefacta infundito, & podici fomentum apponito, quo diutius infusum contineatur, nam sic magis operatur. ut plurimū uero mucosam humiditatem extrahere

Localia phar
maca quando
necesse

Irrigatio
ischiadica

Clyster acri,
or ischiadica

consequitur

confuevit, aliquando autem & sanguinem, quando etiam maior incommoditas refultat. Quod si adhuc affectio ipsa persistat, paucis horis interpositis, non tamē ut prioris praesidij utilitatem demoliamur, rursus clysteri uremur pro simplici aqua, centaurea decocto ad praedicta affuso, quo robustius pharmacum reddatur. Supra opinionem autem ipsis commodat cucumeris sylvestris radix in tenues partes concisa, deinde paululum cocta, atque decocto eius cum solo melle infusa, citra omnem mordacitatem euacuat affligentem humorem. Optime etiam facit lupinorum amarorum decoctum cum pari oleo infusum. Saepe enim, inquit Archigenes, haec praedicta cura ad omnes ischiadicōs mihi sufficit. Quod si tamen affectio adhuc remoretur, cucurbita quā maxima cum plurima flamma locis affigatur, uulnusculis etiam altioribus per scarificationem impactis. Ceterum & reliquam curam referre operae pretium existimo, ut nota sit si quando usus eius necessarius expetatur. In omni enim tempore plurima curationis principia constituenda, hoc enim modo facilius affectio destruetur, si assidue praesidiorum permutationes fiant. Itaque ubi rursus mederi coeperis, uomitibus uteris siue a coena, siue a raphani acceptione concitatis; deinde loci affecti & totum corpus in balneo per nitrum extergatur, post balneum autem loci ex unguento per adarcem & euphorbium composito illinantur. Deinde rursus aliud medendi initium à purgatione facies. Solitus autem fui, inquit, purgatiuum ad ischiadicōs assumere huiusmodi. Colocynthidas quotquot uelis accipito, & derafa ac proiecta medulla ipsas oleo optimo expleto, & totam noctem finito, deinde oleo per se effuso, cū uacuo colocynthidis calice aquam una & dimidia olei mensura commensurato, ac in ollam fundito, atque cum ea ipsa communi aqua colocynthidas ipsas donec flaccescant coquito: & expressas ipsas quidem abiecto, liquorem autem excolato & affuso ad ipsum oleo seruefacito, ac panis siliginei contusi & cribrati quātum satis erit inspergito, manibusque satis diu emollito, ac pilulas ad nucis ponticae magnitudinem formato, ex eisque $\times \times \times \times \times$ pilulas à balneo exhibeto. Si uero fortius reddere pharmacum uelis, ad hanc dosim ueratri nigri corticis tenuissime triti obolos tres, & scamoniae scrupulū unum adijcito. Possum autem idem de hoc praesidio quod supra de clysteri dixi referre, quod uidelicet solum aliquando sufficit etiam eam quae per multum tempus indurata est coxendicum affectionem extirpare. licet itaque eo saepe uti multitudine tamen eius imminuta, & sanē moderatam eius multitudinem obseruauimus numerum $\times \vee \text{iiii}$ pilularum. Eis uero qui pilulas deuorare non possunt, colocynthidis cremorem exhibeto hoc modo. Colocynthidem quā maximam perforato, & eiecto semine, relicto autem eo quod instar tomenti inest in rotum, colocynthidem ex uino dulci ueteri expleto, & per totam noctem finito, & cum defecto ex ea operculo cooperito. Mane uero excolatum per panniculum uinum & tepefactum bibendum praebeo. Si uero parua fuerit colocynthis

*Pilule ex
colocynthide*

*Colocynthi
dis cremor*

cynthis, duas pro una uino expleto & exhibeto. Quorū si efficaciorē red-
dere uelis hunc cremorem, ueratri nigri obolos tres adijcito, & scammoniae
sesquibolus. Ceterum per interualla quādam prædicto clysteri ex cucu-
meris uidelicet syluestris radice apparato, etiam ad ipsos utaris.

De herba iberide, quæ & cardamine appellatur, eiusq;
sinapismo.

Cap. 11

Quod si uestigium quoddam affectionis relinquatur, herba iberidis *Cardamine*
quæ & cardamine appellatur, radix assumenda est: etenim odorem *herba unde*

& saporem ac figuram cardami, hoc est nasturtij, habet. Multa autem ubiq;
nascitur, maxime tamen circa uetera monumenta mugosq; & circa uias in
incultis locis. folia autem habet nasturtij uere quidem uiuentia, & nasturtio
multo maiora: longitudo uero caulis cubiti parui est aut paulo amplior: æ-
state florem lacteum promit, & tunc sanè efficacissima censetur: semen fert
quā minimum, atque id ipsum per totum caulem enascitur. Radix uero
acerrimum habet odorem, & maxime omnium nasturtio similem. Hanc
æstate maxime recentem effodito (arida enim uires amittit) & diligēter tun-
dito: tūditur autem difficulter, & axungia ueteri modica excipio, ac iunctu-
re coxæ & uniuerso cruri imposito, adalligato, ac incumbere finito, mulieri
bus quidem non infra duas horas, uiris autem per quatuor horarum spa-
tium, si possibile sit id perferre. Excitat tumores cum ardore & rubore, uelu-
ti sinapismus facere solet: post uero in balneum inducito, nullo ungento aut
smegmate eis illito. ubi uero modicum exudauerint, in solium ob feruorem
mordacius desiderare iubeto, idq; fortiter perferre cogito. morsum enim cum
ardore in principio inferre consuevit: deinde educito. Ferme enim semper,
quāuis ab alijs fuerint importati, sua sponte pedibus ingredientes, exhibunt.
Verum à balneo ad oleum multum paucum admodum uinum ammisce-
to, & conuassata illinito, ac humore cum aspero panno deterfo, crus ipsum
cum leuissimis lanis cooperito. Ex sanè consuevit hoc ipsum præsidium nul-
lo alio inde auxilio opus habere. quod si tamen aliquando uestigium affe-
ctionis relinquatur, uicenis horis siue diebus interpositis, rursus eodem præ-
sidio utaris. Atq; hic quidem sinapismi est modus. Ceterum pharmacum
ipsum plures quā sperare possis in se complectitur commoditates, & cum
minori acrimonia eius usus perficitur. Hoc autem utendi modo etiam ad in-
ueteratos capitis dolores, omnesq; alios diuturnos dolores, quacūq; tan-
dem corporis parte constitierint: ad affectiones item ægre solubiles, & reso-
lutiones persanandas uti licebit.

Ceratum ad ischiadicos: Archigenis.

Porro interiectis diebus quibus ab exhibitione remedium quiescis, cera-
tum locis imponatur huiusmodi. Opopanacis drach. vii, in aceti cyathis
ii dissoluito, deinde cere trientem, cum besse olei cyprini liquefacito, refrige-
ratoq; ac leuigato, & ad dissolutum opopanaca conijcito, unito, ac utitor.

C De uestio-

De uſtione.

Cap. III

Vſtio per cau-
primum ſtercusDioſcoridis
locus

Antylus

Veteres, inquit Archigenes, etiam uſtione in iſchiadicis uſi ſunt, tum per cauteris ferreos igni candefactos, tum per ſtruthij & ariſtolochiæ ra-
dices coxæ iunctura in altum peruſta, itemq; crure per interualla quædam,
circa dolentes maxime locos cautere admoto. Quidam uero alij ad propin-
quæ cruri affecto manus locum inter magnum digitum & indicem medi-
um, circa infernum magni digiti ſive pollicis articulum, caprinum ſtercus fer-
uens per forſicem imponunt, ſtercora q; uariant ac permutant, donec ſen-
ſus uſtionis ad locum affectum perferatur: tunc enim ſufficietem uſtionem
eſſe dicunt. Dioſcorides autem hanc rem ita tradit. Caprinum, inquit, ſter-
cus ſeruſſificato, & extenſo magno manus digito, cauum locum circa inferni
articuli eiſdem digiti finem notato: deinde locum ipſum ex oleo prælini-
to, & lana conuoluta oleo imbuta ad cauum locum ſubſtrata, ſigillatim ca-
prinum ſeruſſatum imponito, quouſq; ſenſus per brachium ad affectam
coxam procedat. Antylus autem: nos, inquit, etiam huiusmodi urendi mo-
do utimur: ſtercus caprinum ſiccum ſeruſſificamus, eoq; uentrem magni di-
giti affecti pedis perurimus paulo infra unguem uſq; ad os ipſum uſtione
penetrante. Hæc ipſa uſtio extremas coxendicum affectiones, & quæ nulli
alij præſidio cedunt, diſſoluit. Cæterum poſt uſtiones porri folia cum ſale
trita, aut oliuas nigras cum ſeſamo illo tritas, aut nucum interiora trita, ad
locum cruſtoſum imponito. Eis uero qui molles carnes habent, lac cum melle
adhibeto. Tercio autem die ab uſtione, lenticulam coctam cum melle do-
nec cruſtæ penitus excidant, cataplaſmatis modo imponito: atque deinde
ſuppuratorio ductu utitor, ulceribus ad plures dies adſeruatis, ne cicatrix
eis obducatur. Nouimus, inquit Archigenes, plurimos qui ex prædictis
uſtionibus opem ſenſerunt: uerum nobis, inquit, ad coxarum affectionis
demolitionem prædicta remedia ſuffecerunt, itemq; malagmata quæ pau-
lo poſt dicentur: appoſuimus autem De uſtione, ne uidelicet eius uſus
ignoraretur.

Cura affectionis exacerbata.

Cap. IIII

Archigenis. Tempore porro exacerbationis reliquæ partes ſaſcijs
circumligandæ ſunt, & diligenti fricatione contrectandæ: irrigationes
item locos impinguentes, & per uices mutatæ, ex oleo ſicyonio calido adhi-
beantur, & cum lana conuoluta contegantur. Cataplaſmata autem ex ſemi-
ne lini ac ſœni græci affectis partibus imponantur. Maxime uero quæ ex
loſiacea farina apparantur, ac quædam caleſcientia aſſumunt, & althææ ra-
dicem. Mitigant etiam uehementes dolores ex oleo ſomenta, & ex milio fri-
cto, itemq; ſale in ſacculis calfacto.

Potiones ad iſchiadicos.

Succus cyrenaiſcus exacerbationes diſſundit, erui magnitudine potatus, aut
deuoratus. Sunime facit & caſtorij drach. i. cum opopanax obolis tribus.

Alia

Alia potio ad ischiadicos.

Farinæ trui, anisi, sceniculi, singulorum parem mensuram coniungito, tundito & cribrato, obolosq; nouem in dimidia uini hemina dato. Multa crassa per urinam ducit, Vbi uero purum prodire uideris lorium, ne amplius præbeto.

Alia. Centaureæ minoris ramulos contundito & cribrato, ac ieiunis cochlearium ex aqua calida ad horas tres aut plures dato. Alia.

Radicem rubiæ contundito & cribrato, similiterq; præbeto. sanguinem per urinam educit, quotidie autem bibentem lauato. Auxiliatur item irionis semen cum uino, & smyrnijs semen eodem modo. Seminis nasturtij drachma una, cum uino: radices capparis corticis drach. 1, cum uino: radices iridis tritæ drach. 1, cum passo: ruta syluestris, & domestica, cum anisi decocto: symphyton in petris nascens, cum uino mulso decoctum: radices altheæ decoctum, aut centaureæ minoris: ammoniaci thymiamatis drach. 1. ex aqua malsa: seminis hyperici drachma una, quod ipsum & stercorea educit itemq; picuita. Baccæ iuniperi ex uino: Bitumen pro carapotio deuotati: catapoballamum ex aqua malsa. Cæterum & potiones dolorem lenientes, itemq; soporifere, ubi dolores restiterint, commode assumi possunt: maxime tamen omnium antidotus quæ pæonia appellatur, in tertio decimo sermone descripta. Ego autem, inquit Archigenes, etiam in exacerbationibus prædicto dysteri usus sum, eo uidelicet qui ex terebinthina & nitro constat, & euidentem permutationem feci. Poteris autem & cucumeris syluestris decocto in exacerbationibus uti.

De reliqua diætâ Archigenis.

Subiungemus autem ex ordine & paucis reliquâ curam. Præ omnibus igitur adhortor ut contentiones, & exquisitæ negotiorum incommoditates eis exhibeantur, non solum à cibo accepto, sed etiam sumendi cibi tempore, diætâ unctoria & impinguante constituta, quo similiter carnis incremento sit consultum, Nam si hanc ueluti neruorum operculum acquisierint, tutum si mul ad omnem externam causam inuentum habebimus, simulq; commodam exercitationem omni unctoria diætâ potiore apponemus. Vngantur autem ab expertis & gymnasijs exerceantur, Minime enim molesti labores fient cum perito præexercitatore: & manus sanè exercitijs trita commodiore sunt mollibus ad curationem. At uero significandum est etiam quod ischiadici ab assidujs flexibus & decambulationibus, & moderato cursu quàm commodissime opem ferre possint. Præcedat itaq; gestatio in equo, deinde naturalium aquarum usus, primum quidem calidarum, deinde etiam frigidarum, si enim ad frigida lauationem adfuescant, sola suffecerint ad incolumitatem acquirendam. Cæterum diætâ tempore quidem exacerbationis forbilis sit & modica. per interualla uero solidior & reparandis uiribus magis accommodata, habeatq; acrium eduliorum comestiones quasdam per aliquot dies adjunctas. Eorum autem syluam sæpe iam apposuiumus, utpote quæ nihil uiscosum, aut crassi succi, aut ægre coccotile, aut quod dis-

Comestionum
utilitas

*Purgationis
momena*

*Dysenteria
exordium
morbum
currit*

ficulter digeritur, complectitur. Bonæ uero concoctioni imprimis cōsulant, non solum damni quod ex cruditatibus prouenit ratione habita, sed & incrementi carnis, quæ præ omnibus ischiadici opus habent. Quin & qualitates eorum quæ ægre concoquuntur fugiendæ sunt, præsertim eorum quæ urinam ducunt. Alium autem probe solutâ habere expedit: premuntur enim & aggrauantur articuli ubi ipsa sit adstricta. Neq; uero assidue profluat uenter, Nam id imbecilles reddit, & quod cum purgationis impetu à toto corpore attractum est, id ipsum uicinas partes replet. Contingit tamen etiâ aliquid quando à periculosa dysenteria oborta omnem coxarum molliciem ac aptitudinem ad affectionem corrigi & emendari. Prestat etiam uomitus per intervalla siue à cibo accepto, siue à raphanis. Neque latet nos quosdam ueratro ad ischiadicos usos esse, Scimus item ueratrum efficaciter auxiliari. Verû non suspicamur eius usu opus esse ad hanc affectionem, utpote quæ ab ante tradita cura extirpabitur.

Cataplasma ischiadicum.

Farinam lupinorum amarorum in aceto mulso aut posca decoctam imponito. Aliud. Calaminthen præsertim uiridem, aut si haberi nequeat, cum posca locis imponito, est enim præsidium prædarum.

Aliud, facit ad uehementes dolores.

Papaueris calices in aqua mulla decoquito, ipsisc; proiectis farinam ordeaceam aquæ mullæ incoquito ac imponito. Aliud. Calices papaueris uirides terito, & adpersa polætæ farina, in pastillos redigito, eosq; in umbra reficcato. Vsu uero expetente in sufficienti aceto dissolutos ac calefactos imponito.

Aliud Asclepiadæ, ischiadicis, podagricis, & articulorum morbis euestigio auxiliatur.

Fœnum græcum in fictile uas coniectum & posca sufficiente affusa per integram noctem macerato: mane uero ad ignem appositum donec soluatue coquito: deinde in mortario tritum, & sufficienti melle affuso calefactum, & linteo exceptum ad affectos locos apponito, & fasciola adalligatum finito, idq; per dies duos aut tres facito. Aliud. Radicis symphyti sexuncem rasam & in tenuous partes concisam in pilam testaceam conijcito & enixe terito, atq; ubi contrita fuerit, mannæ quadrantem, & ouorum recentium crudorum candida tria unâ cum luteis adjicito, rursusq; enixe terito, & contritis libram unam adipis suilli ueteris probe subacti addito, unito, ac linteo excepta imponito. Euestigio dolores mitigat, & præsertim cum fluxione articulorum obortos.

Aliud Asclepiadæ.

Fœni græci mola triti, corticis radice mandragoræ, mannæ, cuiusque quadrantem, oua cruda recentia x, radice maluæ lib. i, radice symphyti lib. r, camis cochleæ terrestres sexuncem. Ut prædictum est apparato diligenter, & sublatum reponito. Vsu uero tempore phatmaci partem unam, adipis suilli ueteris partes duas accipito.

Epithema

Epithemata & malagmata ad ischiadicos. Cap. v

MAlagma, inquit Archigenes, quod ualde multo experimento nobis constat, est subscriptum. uerum cucurbitam prius ad dolentes locos affligere oportet: ipsum autem malagma aliquandiu inhætere consuevit, quare expectabis eius utilitatem. Colophonix libram unam, baccarum lauri besslem, seminis raphani trientem, corticis capparis libram unam, picis aridæ libram unam, pyretri libram unam, ceræ libras duas & dimidiam, fœni græci besslem, iridis libram unam, sinapis besslem, nitri libras duas. Nitrum cum aceti libris duabus terito: deinde reliqua arida inspergito, simulq; terito, affusisq; liquefactis, emollito, ac utitor. Hoc quidem igitur malagma eiusmodi est, quod malum penitus extirpat, cutem rubefacit, & materias ex alto ad superficiem educit, quo sanè in principio non oportet uti. Verum quod sequitur leuissimum est & multæ commoditatis, quoq; citra formidinem conuenit uti. Ceræ trientem, styracis sesquunciam, latynj sesquunciam, aloes primariæ sesquunciam, ammoniaci thymiamatis sextantem, croci unciam unam, pyretri unciam unam, opopanax unciam unam, galbani unciam unam, thuris unciam unam, olei ueteris libras quatuor, aliquando autem sextantem solum. In æstate apparato, & utitor. Præter opinionem etiam facit ad ischiadicos emplastrum pardalis appellatum, quod ad hydropicos inuenies descriptum.

Lexna emplastrum, malum penitus extirpans.

Olei ueteris libras duas, plumbaginis, salis communis, terebinthinæ, singulorum libram unam, squamæ æris quadrantem, æruginis, herbæ lanariæ radicis, chamaeleonis nigri radicis, aristolochiæ, sinapis, singulorum sextantem, aliquando etiam canchryos unciam unam, aut pro eo pyretri tantundem. Auxiliatur etiam capiti ad hemicraniam impositum.

Heræ, ad ischiadicos. hoc, inquit, usus sum ad Frontinum statim ab exacerbationibus imposito.

*Heræ Prōtini
medicū fuit*

Ceræ drachmas centum, uisci drachmas sedecim, terebinthinæ drachmas uiginti quinque, galbani, myrrhæ, iridis, cuiusq; drachmas sex, cedriæ cyathi dimidium, olei cyprini cyathi dimidium. Ceram, cedriam, cum cyprino oleo liquefacito: deinde resinam & galbanum adijcito, & ablatis ab igne statim uiscum addito, & ubi dissolutum fuerit irim inspergito & unito, & ad myrrham in mortario cum aceto tritam affundito. Quidam etiam nitri drachmas duas adiecerunt. Asclepiades autem ita inquit. Malagma quod ischiadicos statim post exacerbationum remissionem imponitur, facit ad ossa contrita ac omnem neruorum per consensum affectionem, omnemq; duriciem dissoluit: facit item ad alias inflammationes, comprimit & committit malignas cicatrices, Prodest luxatis & collisitis, & ad omnes malignas mammillarum dispositiones. Est enim ualde generosum. Ceræ, terebinthinæ, uisci, galbani, myrrhæ, iridis siccæ, singulorum drachmas XLVIII, olei cyprini

Vnguenta & acopa, quæ neruorum lassitudinem
in ischiadicis resciant.

Ad coxendicum dolorem pæoniæ radicem in oleo ad triduum contusam accipito, & quarta die paululum coctam illinito. Cæterum præpurgandos eos scito, ex succi tithymalli guttis quinque tantum cum caricis acceptis, aut ex corticis tithymalli decocto. Corticem etiam ipsum contusum & cribratum quatuor scrupulorum pondere in uino per integram noctem macerato: mane uero excolatum uinum præbeto.

Nycteria herba, unguentum helenes appellata

Aliud. Nycteridem herbam, quam unguentum Helenes appellant, oleo decoquito, & per diem unam in oleo manere sinito, percolato: & illinito.

Aliud, multo experimento constans.

Herinaceum terrestrem uiuum in oleum coniectum donec flaccescat coquito: deinde eo extracto, farinæ adarces sextantem oleo iniçito, & olei cypriini unciam unam. Vtitor autem illito ex eo loco. Cæterum oleum ipsum in quo herinaceus coquitur librarum duarum pondus esto.

Aliud ischiadicum, quod isotheon appellatur. Facit & ad resolutiones, & ad omnem neruorum per consensum affectionem.

Castori, popapanacis, euphorbi, hyssopi humidi, ammoniaci thymiamatis, galbani, terebinthinæ, singulorum sextantem, medullæ ceruinæ trientem, styracis unciam unam, olei styracini trientem, olei irini sexuncem, piperis unciam unam, ceræ libram unam, olei sicyoni libram unam, olei ueteris libram unam. Ammoniacum, galbanum, opopanaca cum uino terito: liquecibilia uero eliquato, & ab igne ablata reliquis affundito, ac probe unito: styracem uero in pila tundito, ac paulatim ex pharmaco ei addito: ubi uero dissolutus fuerit, cum reliquis unito, ac utitor.

Acopon, ad ischiadicos efficacissimum est, quod inter communia acopa post articularia remedia refertur, & Orchestæ inscribitur: eo itaque confidenter utitor. Vtere, & similibus acopis ac unguentis quæ isthic describentur.

Inspergimen ad ischiadicos in balneo.

Inspergimen ischiadicum efficax. Farinam lupinorum in balneo inspergito, & in exudatoria tabella prostratum sudare facito.

Aliud, facit & ad inueteratas affectiones.

Costi, piperis albi, pyretri, cuiusque quadrantem, nitri unciam unam, fecis uini ustæ libram unam, contusa in balneo inspergito.

Aliud.

Costi quadrantem, pyretri quadrantem, nitri unciam unam, piperis albi, adarces, euphorbi, cuiusque unciam unam, fecis uini ustæ libram unam, samfuci sexuncem, contundito, cribrato, ac in balneo utitor.

C 4 Heræ, ad

Heræ, ad ischiadicos inspergimen lenitium doloris.

Picis aridæ partes octo, sulphuris partem unam, terito ac misceto, & prælo-
to ægro dum corpus adhuc calet inspergito, & cum charta contegito, atque
donec sua sponte decidat finito: nihil autem uetat ægrum lauare charta ad-
huc inhaerente.

Alia inspersio.

Adarces, staphidis agrestis, canchryos, sinapis, cardamomi, piperis, euphor-
biæ, sulphuris uiui, cuiusq; unciam unam, contundito, & cribrato: ægro uero
inducto, & in secunda balnei domo reclinato, pallio prius ad tabellam sub-
strato, ad dolentem locum inspergito, & contente adfricato: deinde in cali-
dam desidere facito, & proluum educito ac extergito, rursusq; insperginẽ
inijcito & adfricato: postea uero dum adhuc calidum corpus habet, eiusmo-
di malagma imposito. Cineris caulium brassicæ ustorum quadrantem
& uncia dimidium, cineris lignorum ficulnorum agrestium ustorum tan-
tundem, picis aridæ libram unam, cineris lignorum uitis ustorum quadran-
tem & uncia dimidium, sulphuris uiui quadrantem, axungia libram unam.
Liberabitur enim æger, atque id breui ab omni dolore, ut incantationi simi-
lis facultas uideri possit.

De podagra, & arthritide, siue articularum
morbo.

Cap. vi

Podagrica & arthritica affectio eiusdem speciei inter se existunt. Differt
autem podagra ab arthritide non toto genere, sed affectis locis. In om-
nibus enim debilitas est articularum diurna cum fluxione. Quæ quidem
si in pedibus perficitur, podagra appellatur. si uero in aliquo coxarum uerte-
bro, Ischias, hoc est coxendicum morbus nominatur. Si uero in multis cor-
poris articulis innititur, arthritidis, siue morbus articularis uocatur. Coniungit
autem aliquando ut repente irruat malum æqualiter per omnes articulos
dispersum: quod ipsum conuenire consueuit, his qui consueta exercitia coacer-
uatim relinquunt, & licentiore diata utuntur: ut plurimum uero clanculum
& paulatim fluxus irruere solet. alteri enim cuiuspiam magni digiti pedis arti-
culum dolor inuasit, alijs uero calcanei extremum, rursusq; alijs cauum pe-
dis, aut ex calciamenti aut ex consimilis rei affricu. Cæterum initio à pedi-
bus sumptum, paulatim ad genua malum procedit, ad coxendicum item ac
femorum iuncturas, deinde ad manus, singulis articulis particulatim affe-
ctis, quando sanè proprie, ueluti prædictum est, arthritidis & articularis affe-
ctio appellatur. Qui uero extreme ab hac affectione apprehenduntur, his
& spinæ uertebrae & costarum iuncturae & genæ dolent, alijs uero autem &
guttur: neq; est aliqua ossium connexio, quæ ab hac affectione sit immunis.

Causæ uniuersales.

Cap. vii

Generant autem affectionem cruditates coaceruatæ, & ebrietates, atque
his adhuc amplius immoderatus rei ueneris usus: iam uero & de-
ambulationes concitiores quàm pro more, & stationes diutius produ-
ctæ

etæ, & familiares excretiones suppressæ, & consuetorum exercitiorum intermissiones, Vt plurimum vero aptitudines à parentibus in filios ac posteros transferuntur, In uniuersum vero amplius omnium crudorum humorum multitudo affectionis causa existit.

*Hereditarius
morbus arti-
culorum*

Quod humorum multitudo affectionem inducit.

Quando quidem igitur humorum multitudo in corpus digeritur, hiç ipsi ad pedes deferuntur, & in ipsis partes omnes distendunt, inflammationesq; & dolores inferunt, manifestissimum sanè id existit. Nam & tumore attoluntur affectæ partes, & uenæ sanguinis in ipsis apparent repletæ, & euacuationis ipsis in naturalem habitum æger reducitur. Verum multitudo influens non in omnibus æqualis existit. Etenim alij ex caliditate ægrotant, alij ex frigidityte, atque exinde etiam refrigerando, aut calefaciendo, aut resiccando opem sentiunt.

Quam ob causam membra fluore infestentur.

Posteaquam igitur humorum multitudo in corpore congesta hominem molestia afficit, unumquodq; quidem membrum quod primum affectionem percepit, affligentem humorem à se repellit: cum ipsum uero suscipit aliquod ex uicinis membris ac subiectis. Itaq; quum fortiora membra eum depellant, & imbecilliora suscipiant, id adeo citra intermissionem contingit, donec id quod propellitur ad omnium debilissimum membrum pertenerit, & in ipso permanferit. Vna quidem igitur fluidarum affectionum generatio hæc est, membris uidelicet fortioribus superfluum demittentibus, suscipientibus autem imbecillioribus. Cæterum articuli ipsi ex assiduo motu debiliores redduntur.

Membra fortiora humores ad imbecillia delegant ac propellunt

Quare in quibusdam magnus sit morbus, in alijs uero paruus.

Caput viii

Magnitudo morborum ex fluxionibus obortorum ad humorum influentium multitudinem cõsequitur. Si enim plures humores fuerint, maior etiam affectio contigit: si pauciores, minor. Cæterum multorum recrementorum influxus ob multas causas accidit. Etenim & copiam humorum multam esse oportet, & uias latas per quas feruntur, & partem quæ à fluxu infestatur raram, & facultatem in ipsa debilem, & membrorum eum delegantium uires fortes, quo magna affectio fiat. Verum si paruus futurus est morbus, prædictis contraria omnia concurrere oportet.

Membra suscipientia humores rara sunt & debilia

Quare multo tempore aut paucò morbus duret. Cap. ix

Porro ut multo tempore aut paucò morbus duret, etiam prædictæ sunt causæ, tenacitasq; insuper & crassitudo humorum. Etenim sanguis multus & crassus, densa pellicula conclusus, & à uiribus debilibus segniter correctus, tempus auget & producit. Qui uero contrario modo habet, minuit & breuius facit. Cæterum & in alijs corporis affectionibus, siue in superficie sint, uelut erysipelates: siue sub cuticula, ut herpes: siue in carnosiss

carnosis partibus, uelut inflammationes, recrementa ut plurimum feruntur. In podagricis autem & arthriticis appellatis, usque ad iuncturas per altum repletio ex fluxione contingit, unā cum hoc quod nerui permadescunt & distenduntur, itemque ligamenta & pellicule, omniaque circum circa sita: atque ob id saepe usque ad quadragesimum diem morbus extēditur. Etenim quum etiam cessauerit fluxus, neque amplius ex supernis feratur, repletae adhuc multo humore existentes iuncturae, cum ad circum sita membra delegant. At uero si tenuior sit fluxus celerrime aegri sanantur, nisi male omnino curentur. Quod si uero quis ex medicis ueram methodum ignorantibus per resolutia semper omnes inflammationes curet, non in quadraginta tantum dies, sed & in quadringētos, & in omnem reliquam aegri uitam inflammationes extendet. A mala enim curatione podagricis pleraque mala accidunt, maxime uero calli & artuum duricies, & articularum curuities, propter medicorum ignorantiam fiunt, qui neque per uenae sectionem, aut purgationem euacuant, neque redundantem in uniuerso corpore humorem, quicque ad iuncturas defertur, & proinde articularum morbos producit, per ea quae moderate adstringant, repellunt. Quidam enim ex ipsis inflammationes immodice resoluunt, tum per aquae & olei mixtionem, tum per cataplasmata ex cruda ordeacea farina apparata, attrahuntque per cataplasmatum caliditatem humorum copiam ex subiectis locis. Quin & ob hanc ipsam inductam laxitatem, affectas partes debiliores, & ad recrementorum susceptionem aptiores reddunt.

Quae sit incuruatorum articularum causa.

Cap. x

AT uero alij medici immodice refrigerant, alij autem uehementer discutiunt, Ex quo sanē nervosas partes inspissari contingit, incuruarique & distorqueri, ob redundantium uidelicet humorum susceptionem, Contingit item callosas & calculosas coactiones in ipsis emergere, & nervos spontaneo motu se mouentes congelari, ligamēta item & neruos qui *Tendines* *nerui* apellantur, qui sanē aptissimi ad hoc perferendum censentur, propterea quod substantia ipsorum densa & solida existat.

Quae causa generationis toforum in artubus.

Cap. xi

Generatio quidem igitur toforum siue callorum in artubus induratorū, materiam quidem habet crassos humores, Causam autem efficiētem, qualitatem calidam & siccam, Quemadmodum uidere est & in tofis, qui in arceis uasis ex limosae aquae incoctione generantur. At uero pharmaca quae ualde refrigerant, si assidue adhibeantur non solum crassos humores congelant, sed & tennes, Quemadmodum uehementissimum frigus congelat aquam. Quae uero acuatim & immodice discutit, id quidem quod tenue in ipso fluxu est, euanescere faciunt: quod uero reliquū est, inspissant & conglutinant: atque id eo amplius si ad hoc quod discutunt, etiam immoderate calefactoriam habeant facultatem.

Quae

Quæ caussa sit cur inflammationes in podagricis non facile suppurentur.

Cap. XII

Causa cur podagricæ inflammationes non facile suppurentur, primum quidem est affectarum partium substantia, tum natura, tum pro more ægre permutabilis existens. Ad hoc enim quod natura duræ sunt nervosæ partes, etiam tolerandi cura anguntur ea quæ molestiam inferre possunt, præsertim tamen pedum & manuum extrema. quin & carne nudatæ magis hæc sunt partes minusq; calidæ & humectæ, & ob id etiam reliquis partibus frigidiores: imò & influentes in podagricis inflammationibus humores corruptioni minus sunt obnoxij: & pharmaca similiter adhibita inepta sunt ad putrefactionem ac suppurationem. Etenim alia ex eis refrigerant & repellunt, alia uero discutiunt, alia autem resiccant. Contingit tamen aliquando in quibusdam inflammationem aut suppurari, aut erodi. Quum enim crassus humor uehementer fuerit condensatus, & deinde non ita uehementer, sed moderate calefactus, necesse est ipsum suppurari. Acri uero & erosiuo humore influente, erosio contingit. quemadmodum & marcor in quibusdam succedit, irruente uidelicet in membrum humore qui putrefacere potest: quanquam raro hæc in podagricis contingant.

*Suppurationē
impedientia*

Quomodo ex inflammationibus & consequentibus accessioneibus, siue symptomatis, affligens humor cognoscatur.

Caput XIII

Quomodo quidem uniuersi corporis intemperiem cognoscere & curare oporteat, iam ante in quarto Sermone est præscriptum, huius uidelicet tractationis. Quomodo uero quis inflammationes in partibus inflammatis consistentes cognoscere possit, necessarium & hic paucis referre. Apparet autem id ex eis quæ accidunt & consequuntur: quæ si quidem frigida fuerint, frigefaciunt: calida uero calefaciunt: mixta autem mixtas etiam signorum species inducunt. Quo uero manifestior fiat hic sermo, quæ iam dixi, repetam, singulatimq; retractabo.

Sanguinei humoris influentis signa.

Cap. XIII

Humor sanguineus si multus fuerit, & circa summā caliditatem moderatus, repletionem efficit, & tumorem ingentem: nō uenarum modo, sed totius membri adfecti circa cutem: cumq; calidū quidem moderate, uehementer autem rubente in pulsu autē adest in alto inflammationis medio. Qui hoc modo sunt affecti, neq; refrigerantia neq; calfactoria ualde præsidia adhiberi sustinent, & assidue ac cōtinue exacerbantur, quādoquidem assidue & æqualiter sanguinis allatio contingit, quanquam & per circuitum quidam irritatione uexentur, quum non cōtinue sanguis defertur, & exacerbationū accessiones omnino quotidie fiunt, uerum non ita durant ueluti hæc quæ ex pituita oboriuntur. Vrinæ uero eius qui sanguine redundant, fuluæ

sunt

sunt, & mediocri crassitudine præditæ, aliquando etiam subsidentiam habent, aut nubem, aut tale quiddam in medio pendens quasi suspensum habentes. Quod si magis ad pituitam dedinet sanguis, albiore & crassiores aliquando uero & conturbatæ reperiuntur urinæ, & multum est quod in eis subsidet. Venæ autem in his ampliore sanguine suscepto replentur, & in tumorem attolluntur. Ætas uero ab adolescentia usque ad ætatem uigoris apta fiet ad multitudinem sanguinis producendam. Edulia item boni succi & quæ maxime alunt, & exercitia moderata. Ex temporibus uero, uer, & regio temperata.

Bilioꝝ fluxus signa.

Cap. xv

Quod si uero biliosus sit fluxus, color cutis inflammati loci aliquando quidem flauior quàm secundum naturam apparebit, aliquando uero rubore cum flauo permixto, quando uidelicet flaua bilis sanguini est permixta. Caliditas autem uehementissima & feruentissima adest, quæ amplius refrigerantibus pharmacis gaudet. Qui enim ita habent, uehementer à refrigerantibus iuuantur medicamentis siue acty siue potentia talia existant. Exacerbationes uero his per tertium quenq; diem mouentur, & præcipites quidem irruunt, citius uero uigorem remittunt. per uentrem enim & per urinamcrementa superflua his euacuantur: per cutem etiam transpirant, utpote quæ tenuium partium existant. Loria eorum subflua sunt, & subflaua: quandoq; etiam acria, ut in mictione urinarium arrodant meatum. Curæ autem ingentes, & iræ, & uigiliæ, & illuies multæ, & fatigationes, & diæta omnis bilem gignens & attenuatoria: ex acribus uidelicet & salis edulij, huius humoris influxum præcedunt. Ætas uero & temperies corporis calida & sicca ad eum apta est. Hora autem siue anni tempus æstiuum: consimilis item regio.

Pituitosæ fluxionis signa.

Cap. xvi

At uero si pituitosa sit fluxio, ad digitorum appressionem cauus fit tumor sublaxus existens & moderatus, & color dolentis membri albus. Dolores uero aliquando quidem fortes, aliquando uero mediocres: & exacerbationes quotidie paulatim irruunt & augentur, & per plures horas durant, & breuem intercapedinem habent: imò neque unquam integre remittunt. Ætas autem hoc modo amplius afficitur senilis, & temperamentum humidum & frigidum, & consimilis ambientis nos aeris status, & tempus hybernum. Aliquando autem & frigoris sensum in alto locorum affectorum ægri perceptant. Vita uero ociosa & socordia ad pituitosi humoris generationem plurimum conferunt. Edulia item refrigerantis & humectantis ac inspissantis facultatis, & balnea à cibo: unde & urinæ crassissimæ ab eis prodeunt, & sæpe conturbatæ reperiuntur. Atque hæc quidem signa sunt pituitæ natura frigidæ prædominantis. Nam & hæc ipsa proprie pituita appellatur.

Ocium & socordia pituitam gignunt.

Salsæ

Salſæ pituitæ ſigna.

Cæterum ſi ſalſæ pituitæ fuerit influxus: color membri affecti & tumor eodem modo habent, ueluti de pituita eſt prædictum. Pruritus autem maximus & mordacitas infeſtat locos. Urinæ uero tum his tum prædictis, æquæ quando quidem tenuēs & aquoſæ, aliquando uero craſſam in eis eſt quod ſubſidet, ſuntq; conturbatæ.

Bilis atræ influentis ſigna.

Cap. xvi

Quod ſi ex atra bile ſit fluxus, qui ſanè potentia frigidus eſt & ſiccus, quod raro tamen contingit, frigoris ſenſus quandoq; affectis adeſt, & corpora in profundo uelut atterantur aut ſcalpantur afficiuntur. Colores uero tumorum nigriores ſunt, & circuitus exacerbationum per quantum quemq; diem redeunt. Sunt autem exacerbationes tum magnitudine tum impetu mediocres. Ætas uero quæ magis hunc fluxum generat, eſt uigore inclinatio, & uergente temperies autem frigida & ſicca. & naturæ quidem ſuperfluitates pituitoſas generat, non autem atræ bilis. Quæ uero ex degenerante & mutata caliditate ſit, ſua uile ſuperaffata & nigram generante oboritur. Præcedit porro hunc fluxum diæta ex edulijs atram bilem gignentibus, & laſitudines immodicæ. Regio autem ei apta eſt frigida & ſicca. Tempus autumnus, & conſimilis aeris ſtatus. Urinæ uero ut plurimum in principio tenuēs eis ſunt & aquoſæ propter obturationes: poſtea uerò quàm ſecundum naturam atriores, & modice craſſæ, & quod ſubſidet in eis aliquando ſuſcum eſt, aliquando uero mixtum ſubcruentum uidelicet & ſuſcum reperiuntur.

Atræ bilis generatio

Serofarum fluxionum ſigna.

Cap. xviii

In uero ſeroſa recrementa influant, dolores non ita magnos inferunt, ſquemadmodum etiam neq; fluxu infeſtatas partes in tumorem ualde excitant. Secundum ſpeciem uero conſimilia perficiunt, qualia humores ſolent, qui cum eis eiſdem generis exiſtunt. Pituitoſo enim ſanguine demanante, ſeroſa in ipſa pituita recrementa, conſimiles quidem ſecundum ſpeciem dolores inferunt, ſecundum magnitudinem uero multo minores. Vbi uero alij humores deſluxerint, conſimiles etiam illis ſeroſæ ipſorum ſuperfluitates inferunt dolores.

Serofas ſuperfluitates omnium humorum eſſe

De his qui ex humorum complexu ſuore inferantur.

Cap. xix

Noffe porro operæ præcium eſt, quod aliquando fluxus fluxui commiſcetur, aut calidus frigido, aut uiciſſim frigidus calido, & ſecundum utriuſque horum qualitate exacerbationes ſiunt, & continget quandoq; ægrum bis in die exacerbationum acceſſionem ſentire.

Diæta & cura podagricos præſeruans.

Cap. xx

Qualis quidem igitur diæta unicuiq; prædictarum temperierum conueniens ſit, iam ante prædictum eſt in quarto huius tractationis ſermonem: ſuperfluum uero eſt eadem bis ſcribere. Cæterum ad ea quæ iſthic

Drelata

relata sunt, uomitus in uniuersum ferè omnibus qui podagricam affectionem defugere uolunt, commodi sunt, præterquàm eis qui thotacem & caput quæ facile læduntur habent. Quibuscunq; igitur ex exercitijs, aut alijs quibuscunq; motibus, recrementa in uentrem confluunt, his uomitus ante cibum prodest. Qui uero sanguinis copiam aggregarunt aut humores pituitosos, post acceptum cibum uomant per aliquot horas. Venus uero omnes podagricos extreme lædit, & præsertim si assidue aut intempestiue ea utantur. Etenim uoluptas per se neruorum corporum robur & firmitatem dissoluit, multo uero magis si cum uehementi motu perficiatur, & ob id membra affecta longe imbecilliora fiunt, & prompte ac expedite confluentia recrementa suscipiunt. Adhibetur tamen eius usus aliquando, propter consuetudinem uiciolam semine plurimum irritante, quum uidelicet multi & noxii fuerit humoris. Generatur autem tale in naturis proprie multiseminis appellatis, & oportet sanè quo molestiam eius uitemus, prohibere ne eius copia in seminarijs uasis generetur. Quomodo uero seminis generationem prohibere oporteat, iam prædictum est in eo qui hunc præcelsi sermone.

De olei & salis affricu in podagricis, Cap. XXI

Operæpretium porro est nosse, quod omnes qui se, ne in podagricam affectionem incidant, adseruare uolunt, & præsertim eos qui humecta & frigida natura sunt, magnifice iuuant sales cum oleo quàm tenuissime triti & affricati, non quidem tempore inflammationis & doloribus instantibus, sed quum hæc remittunt: nisi uehementer sicca temperie ægri sint prædicti. Omnibus enim qui hoc modo fricantur insitius calor augetur, & quod præter naturam est discutitur, recrementaq; consumuntur, & affecta membra fiunt robustiora, ac aduersus affectionem firmantur, minimeq; ei obnoxia redduntur, maxime si diligenter singulis diebus mane & uespere: ubi dolores, quemadmodum dictum est, remiserint: per omnem uitam hoc præsidio utantur. De quo sanè ausim confidenter pronunciare, inquit Philagrius, quod etiam solum sufficiat his, qui uel maxime circa dietam delinquant, aut immodice refrigerantur, aut ægrotant ex labore, aut re uenerea nimium sunt usi, aut quemcunq; alium fortem excessum admiserunt: quare omnino postquam inflammationes quieuerint & dolores eo utendum est.

Vniuersalis methodus curationis podagricorum. Cap. XXII

ITaq; prius dictis rursus in memoriam reuocatis, pronunciamus & membrorum debilitatem, & humorum copiam, primas causas omnium fluidarum affectionum esse, præcipue tamè podagræ & articularis morbi. Quare duplex etià sanationis scopus nobis præfigetur, Euacuatio redundantis humoris, & corroboratio partium debilitatarum. Euacuatio itaque fiet aut per uenesectionem, aut purgationem. Post uniuersalem autem euacuationem, calidi quidem fluxus refrigerationem amant, frigidi uero calefactionem: humidi resicari, sicci humectari gaudent. Et tenaces quidem ac uiscosos discin-

dentibus

dentibus & extergentib. curare conuenit, crassos uero tum eisdem, tum quæ amplius attenuatoriam uim habent, Acres uero per ea quæ mordacitatem obtundere possunt. Amplius autem ea quæ assidue influunt, per repellentia prohibenda sunt itemq; per ea quæ resiccant, Quæ uero per circuitum irritant, quum quidem influunt impedienda, quum uero non deferuntur, tum sanè ea quæ iam illata sunt euacuationem requirunt, ad quam itidem debili tatarum partium corroboratio accedat.

Cura eorum qui ex sanguinis copia ægrotant.

Cap. XXXIII

QUum igitur sanguinei humoris fuerit influxus, & dolor mediocritas qui neq; calore suo neq; frigore manifeste infestet, locus inflammatus pharmaco quidem fortiter adstringente, modice autem resiccante illinatur, eiusmodi autem est id quod ex acacia & utroq; ueratro apparatus. Abstineat autem æger ab omni cibo & motu, & uini etiam potu, Et si fluxionis impetus non ualde magnus fuerit, & pharmacum adhibitum commoditatem suam ostenderit, rursus cum passo tenuis substantiæ aut posca large dilutum quo strigmentosum reddatur, illinatur. Cæterum neq; aqua neque oleum pedibus adhibeatur, sed & si illicitum abluere oporteat, quo uidelicet aliud illinatur, posca mediocriter tepesfacta abluatur, aut cum plantæ alicuius austeræ decocto, usq; quo id quod influxit sedetur. Cataplasma ob id etiam imponendum ex malis maxime cotoneis, aut mespilîs, sorbis, cornis, hippuri, sanguinariæ, aut folijs quercus tenerioribus, singulis pane permixtis & uino ueteri maceratis. Idem uero ipsum & per alia quædā eiusdem materiæ existentiâ confieri potest, De quib. rursus postea sermone repetemus. Porro si sanguinis motus in uniuerso corpore uehementèr inualuerit, ut edū nihilominus prædictis pharmacis, ne uidelicet particula repleatur, & dolores fortes ac diuturnos inducat. Euacuatur autē id quod ex sanguine redundat, quantum sanè id uires & affectio permittunt, & maxime si quod continetur bene sit temperatum, & homo ipse ad sanguineas euacuationes sit adsuæfactus. Cognosces uero sanguinis impetum tum ex tumore præter naturam, tum ex doloris magnitudine & uelocitate: proportionabiliter enim tū ad copiam sanguinis, tum ad allationis eius modum, impetus ipse cōtingit.

Cataplasma
fluxiones
repellens

De sectione uenæ.

Eos igitur qui multo sanguine abundant necessatio secta uena fortiter euacuabis, non solum semel sed iterum atq; iterum & pluries detractione paulatim repetita. Si enim uenæ sectione omîssa, repulsois pharmacis fueris confusus, magni mali autor eris. Ex ignobilibus enim membris ad principalia & uitæ necessaria sanguis repulsus, deinde in aliquod horum irruens, uelut in hepar, aut septum transuersum, aut thoracem, aut pulmonem, aut in ipsum deniq; cor, pro morbo mortem inducit. Quapropter maxime necessaria est sanguinis ac reliquorum humorū in sanguineis influxionibus euacuatio, præsertim in his qui sanguine redundant, itemq; reliquis humorum

D 2 recre

recrementis, ac lautiorē diēta utuntur. In his enim antequam dolores oboriantur, uenam secare oportet, bis in anno sanguinem largē detrahendo, & purgare quoq; eisdem, si licet modo per singulos menses. Cāterum in omnibus diēi horis uenam secare conuenit his qui uehementibus dolorib; sunt apprehensi, adeo ut etiā si quis contentiosius tempora obseruet, nihil uerius tamen uenam secare possit, atque id maxime si ex uentris locis cibus ad intestina fuerit dilapsus. Vbi uero in uentre adhuc cibus detineatur, euacuatione prius per uomitum facta, ita paulatim sanguinem detrahes. Secunda est autem ē directo cruris fluxione infestati uena praesertim in brachio inferna, ita tamen ut obseruemus in eius sectione subiacentem neruum. Quod si uero manus dextra dolore infestetur uenam in dextro crure secamus, iuxta talos aut poplitem, aut plantam pedis: post sectam uero uenam si dolores adhuc perseuerent, & fortis tensio sit in affecto membro, saepe in ipso inflāmato crure uena incisa, & multo sanguine detracto, hominem ab omni dolore liberaui. Memini itaque, inquit Philagrius, cuidam in quo humores aequaliter omnes & multus imprimis sanguis redūdabat, bis sanguinem ex secta uena detractum, in quo manifeste cognoui quantam uim habeat uena ē directo membri affecti secta. Quum enim dexter pes ei fluxione infestaretur, uena dextrae manus incisa, cōfestim à molestijs est liberatus: quūq; tribus interpositis diebus alterum item crus fluxus infestaret, uena sinistrae manus secta, similiter à dolore liber euasit, & quum inde pharmaco ex cōcuraretur, perfectam sanitatem recepit. Verum hic quemadmodum praedictum est, multo sanguine redundabat, & uniuersum corporis habitum eiusmodi habebat, qui non facile posset exolui. In his uero qui contrariam huic corporis dispositionem habent, parce sanguinem detrahē oportet.

Quod eleuatas & incuruas uenas ex membris fluxione infestatis, ueluti in uaricibus, auferre oporteat.

Caput xxiiii

OPerapretium est, inquit Rufus, etiā alios auxiliorū modos excogitare. Ego quidem igitur articulis pedum fluxu infestatis, laudo si quis uenas quae ex supernis in pedes deferuntur excindat, ueluti uaricosa in suris excindi solent. Etenim partes hae tempore praesertim inflammationum apparerent in tumorem eleuatae, & uenae circum circa rubent, & sanguine repletae conspiciuntur, atque qui ita affecti sunt, magis à dolore uruntur, & frigidis gaudent. Si igitur quis uenas ueluti in uaricibus excindat, multitudo sanguinis non amplius influere & inflammationem facere, quemadmodum antea consuevit potest, atq; id praesertim in sanguinea podagra conducet. In alijs uero articulis utpote coxendicibus ac cubitibus & similibus fluxu infestatis uenae non ualde apparent. Quod si contra contingat, etiā in his casibus alius eleuatae sunt excidere oportet.

De perustione.

De perustione in morbo articulari.

Cap. xxv

CRustas igitur inurere oportet, aliquas quidem paulo altius loco fluore infestato, aliquas uero propius, atq; id cauterijs facere præstat, aut si id æger ferre recuset, cum medicamentis. Longe autem præstantior est cauteriorum usus, nam & citius & siccius perurunt. In uniuersum uero pedibus ex fluxu infestatis, loci circa utrumq; talum forinsecus & intrinsecus inurendi sunt, cauterijs iuxta magnas ibidem sitas uenas admotis, paulo altius supratolorum locum. Inurendus item locus inter magnum pedis digitum & eum qui ei proximus est, medius, ubi sanè uenæ magis tumefactæ conspiciuntur, præsertim ex eis maxime. Quibusdam autem & articulos ipsos perurere expedit, quum submucidi ualde cōspiciuntur, priusquàm durities ad modum toforum in eis generetur. Sciendum tamen, inquit Rufus, quod in articulo- rum submucidorum perustione, ulcera ægre curabilia oboriūtur, uerum ubi cicatrices coaluerint maximum robur ipsis articulis præbent, ut non amplius ad suscipiendum influentia recrementa sint apti. Et de his quidem hæcenus. Oportunum autem & iam reliquam curam post sanguinis euacuatio- nem aptam describere.

Articuli quæ-
do perurendi,

Cura in fluxibus sanguineis post sanguinem euacuatum.

Caput xxvi

Post sanguinem euacuatum affectam partem aceto ueteri tenuium par- tium cum rosaceo rigare oportet, & præsertim si in alto herere dolorum, caussa uideatur. Etenim acetum propria sua tenuitate usque in altum pro- gressum, expeditam rosaceo uiam exhibet, quod natura sua dolores lenire potest. Caterum si in superficie dolor cōsistat, per uini & olei usum magno- pere iuueris, estate quidem tepidorū, hyeme uero talidorum. Deinde etiam, cataplasmatibus utendum quæ inflammationes lenire possunt, propterea quod, prouocent & prolecent fluxiones. Talia autem sunt, farinæ sceni græci & hordei, fabarumq; & ciccrum tritæ uino coctæ. potest etiam aqua modica, affundi, ubi uinum nimis forte extet. Quin & passo ac modico rosaceo una, quæq; ex prædictis farinis cocta dolorem mitigare consueuit. Oportet au- tem cataplasmata omnino semper calida esse: quod commodè fieri potest, si assidue permutantur, & lana forinsecus contegantur.

Acti & olei
uires

De pharmaco ex croco.

Quum itaq; prædictis præsidijs adhibitis uehementes compescuerimus do- lores, parum quiddam de pharmaco ex croco ammiscbimus & præsertim ad cataplasma ex fabis apparatus, ne uidelicet coaceruatim transitus fiat, postremum uero pharmacum ipsum cum rosaceo dissolutum & ad bonam compagem redactum imponemus: diffluit enim celerime si liquidius fiat. Hoc itaq; pharmaco sæpe post euacuatum sanguinem, doloribus ualde im- minutis statim usus sum, loco prius ex aceto rosaceo persuso: multam enim utilitatem & breui ostendit: quare ipso assidue ad podagricos utimur, ut po-

te quod laude dignum experimentum nobis exhibuit, inquit Philagrius. in pluribus enim solum hoc sufficit ad perfectam curationem semper quidem cum rosaceo dissolutum, aliquando uero uino tenui & fuluo ammixto, quantum sane eius conquaſtando & excipiendo pharmaco satis fuit. Cæterum hoc ipsum in his faciendū est, quibus adhuc aliquid ex fluxione ad inflammationem locum defertur. Quandoq; autem pro uino acetum addimus, maxime ubi tum quod infertur repellere uolumus, tum discutere iam in loco contentum. Passum etiam aliquando pro uino additum mollibus corporibus profuit. Verum enim uero & ad pastillum ex acacijs & ueratrjs apparatus, adiectum hoc pharmacum sæpe quod influit prohibendo, & quod adest euacuando, & membrum confortando, non parum iuuat. Solum item post sedatos dolores durius impositum robur partibus addit, ut adstricta & recrementorum influxui minime obnoxia, ac breui fortia reddantur. Hoc quidem igitur medicamento uarie & multiformiter usi sumus, multosq; iuimus, tum instante dolore, tum etiam eo sedato. Habet enim repulſoriam uim paucam quidem illam propter acetum & crocum. Habet & concoſtoriam & discussoriam ac moderate resiccantem, rursus ob crocum & galbani thurisq; & ammoniaci thymiamatis ammixtionē. Discussoria autem tum in his ipsis sita est facultas, tum in pice & aceto. Merito itaq; podagricis inflammationibus conuenientissimum censetur. Nam & fluxum moderate repellit, & calfaciendo sensim concoquit, & contentum discutit, & debilitatis membris firmitatem inducit. Compositio autem hoc modo habet.

Pharmaci ex
croco emolur
menta

ex croco emolur
menta

17

Galbani drachmas xxxii, thuris drachmas xxxii, croci drachmas sedecim, ammoniaci thymiamatis drachmas quadraginta octo, cere drachmas nonaginta octo, picis aride drachmas cccclxxv, olei rosacei drachmas quadraginta octo, aceti albi acerrimi heminam unam. Ceram, picem, rosaceum lento igne liquefacta excolato: galbanum autem & crocum, ammoniacum, thus, cum aceto terito, & ad liquefacta & ab igne ablata in cacabum adijcito: unitaq; in mortarium quod modicam aquam frigidam habet, diffundito, & sufficiēter emollita extrahito, ac quemadmodum prædictum est. utitur. Hoc quidem modo Philagrius apparare pharmacum ipsum præcipit. Quidam uero post eum etiam opij unciam unam ad hanc compositionem adiecerunt, eoq; ad uehementes dolores sedandos usi sunt. Alij autem usus tempore instante parum quiddam opij addunt ad maximos cruciatus compescendos.

Pastillus ex acacijs & ueratrjs.

Porro ex acacia & ueratrjs pharmacum hocce est. Pastillus podagricus admirabilis ad podagricos & morbum articulare, inflammationesq; & omnia pruriginosa: in principio enim illitus manifestam utilitatem exhibet, ut eadem etiam die lotus aeger deambulet. Vbi uero dolor in uigore est incommodè adhibetur. Quidam enim in uigore affectionis eo usus, confestim quidem

quidem sibi inde iuari uisus est: paulo uero post concalesceto & resiccato loco, à maximis doloribus æger apprehensus ad nos scripsit:quare quum accessissemus & didicissemus factum, cognouimus quod membra in superficie posita contusionis modo affecta essent, tum ob inflammationem, tum ob exortam ex pharmaco adstrictionem & distensionem. Distense autem erant & in profundo sitæ partes ex cuticulæ exterioris ad interna impulsu. Abluto igitur prius cū aqua calida illito pastillo, cataplasma ei imponi iussi ex aqua multa dilutiore apparatus, & ex oleo modico dulcissimo, farinisq; sceni græci & fabarum. atq; hoc ipsum feci propter eam quæ ex ipso pharmaco ei contigit oppilationemq; & cōstrictionem: quum uero dolores euestigio essent sedati à resoluentibus discessi: etenim cataplasmata & irrigationes in fluidis dispositionibus adhibitæ incurabilem reddunt morbum. Verum pastilli ipsius compositio hoc modo habet. Acaciæ nigrae drachmas triginta duas, acaciæ flauæ tantundem, glutinis fabrilis pellucidi, aut quod magis expedit, glutinis piscium drachmas triginta duas, ammoniaci thymiamatis drachmas sedecim, glaucij drachmas sedecim, aloes drachmas sedecim, thuris masculi drachmas octo, ueratri albi & nigri cuiusque drachmas octo. Aceto scillitico trita cogito in pastillos. Vfus uero tempore eosdem in aceto eodem liquefactos illinito, & exicare permittito, ægrumq; in balneum demittito, & ubi inde redierit similiter utitor. Totū pastilli pondus drachmarum centum & sexaginta octo est, hoc est unciarum x x i. Hoc pharmacum podagricis inflammationibus inchoantibus conuenit, & solum sufficit, si non multitudo fluxus redundet: & multo amplius, si per plumbi succum fuerit dissolutum & liquefactum. Fit autem plumbi succus hoc modo. In mortarium plumbeum succum aliquem refrigerantem simul & adstringentem inijcito, & cum pistillo plumbeo in sole donec crassior reddatur terito, atque ita iniectum pastillum & contritum illinito. Sit autem succus ipse plantaginis, aut oxylapathi, aut sanguinarie, aut uuæ acerbæ immaturæ, aut semperuiui, aut aliquarum consimilium herbarum, quæ & ipsæ commodæ sunt in principijs inflammationum. Hoc ipsum itaque pharmacum ex plumbi succo, non solum in principijs & progressu, sed & in uigore mali aliquando commodum existit. Et Philagrius quidem hoc modo de pastilli usu scripsit. Quidam uero pastilli ex croco ad dysenteriam descripti, atque huius ipsius pares partes aceto aut plumbi succo terunt, & duabus ante balneum horis illinunt, atque ubi lauerint à balneo rursus similiter illinunt, & egregium testimonium huic usui præbent.

*Plumbi succum
quomodo fiat*

Dixta eorum qui ob sanguineum fluxum ægrotant.

Inflammationes ex sanguinis influxu obortas quemadmodum dictum est curare oportet. Cæterum cibos eis exhibere oportet qui minus nutriunt, Quales sunt holera, & spinosæ plantæ: & ex uolucris, montanæ: ex piscibus uero, qui in petrosis aquis degunt. Alium uero facile subeum

tem habere oportet, & si quidem officio suo non sua sponte fungatur, simpliciori aliquo dysteri seu infuso eluatur.

Cura eorum qui neque uenæ sectionem, neq; purgationem sustinere possunt.

Cap. xxxvii

Quandoquidem uero quidam adeo formidolosi sunt & mollicie fracti, ut neq; nomen uenæ sectionis aut purgationis audire sustineant, non melius tamen sed & fortunatius est nullum talem contingere. Et tamen si ad curandos eos cogamur, prædicere oportet diuturnos dolores eis affuturos, & uigilias, articulorumq; torturas & claudicationes, præsertim si crassus & mulcus sit sanguinis influxus. Abstinencia quidem igitur ciborum illis constituenda est, & dysteres moderate fortes iniiciendi, & pharmaca umbilicaria imponenda epomphalia Græcis appellata, quæ sanè umbilico imposita aluum ducunt. Utendum etiam his quæ sedi apponuntur glandulis uidelicet, uelut est cyclamini succus, & elaterium, & similia, quorum in Tertia sermone feci mentionem. Utendum & post aluum exolutam, unguentis discussorijs, & fricationibus eiusdem generis, & omnibus quæ superfluum euacuare possunt ex locis fluxu infestatis. Etenim repulsoria, si non prius uniuerso corpore euacuato, assumantur, periculum inducunt. Cataplasmata igitur eis imponere oportet ex pane, fabaceaq; & fœni græci, ac cicerum farina, cum aqua multa aut adipe suillo non ualde ueteri. Scarificationibus item iuxta affectum locum utendum. Irrigare autem assidue oportet ex aqua & oleo, & aliquando cataplasmata ex lixiui apparare, quod per erosam cutem, ueluti per riuos malum euehatur. Huiusmodi hominibus conueniunt item ceratorum formam habentia medicamenta, ex oleo sicyonio, nitroq; & cera apparatus, quæ humorem ad locum delatum discutere possunt.

Pharmacum ex lixiui & spuma nitri erosiuum. est autem pharmacum ipsis commodissimum & facile parabile: excitat bullas, & cutem erodit.

Spumæ nitri albæ quam achelesiam appellant drachmas uiginti quinque, terebinthinæ drachmas triginta sex, olei drachmas cccc. xxx, lixiui ficulnei, hoc est exustis lignis & aqua extinctis, loturæ eorum percolatæ drachmas octoginta quatuor, ceræ drachmas ccxl. Oleum, ceram, terebinthinam, & lixiuium, hoc est aquam ipsam, ut prædixi, coquito, & quum pars maxima aquæ fuerit consumpta, spumam nitri prius tenuissimè tritam adijcito, unito, ac utitor. Huiusmodi sanè sunt inflammationum podagricarum ex sanguine curationes.

De his qui ob bilis influxum ægrotant. Cap. xxxviii

Quod si uero inflammationes ob biliosum influxum fiant, tum & in his communis scopus euacuationis adstringentis humoris existit. Fiant autem euacuationes tum per uomitum, tum per uentrem. Danda

da itaque pharmaca bilem eductentia, ex quorum numero aliqua per utramque uiam bilem exigunt, uelut est thlaspi: hoc enim acetabuli mensura potatum & superne & inferne purgat. atque tantum sanè de eo semine ad summum datur. Constat autem quod & purgatoria medicamenta ex scammonia apparata flauam exagitant & euacuant bilem: horum uero compositiones iam ante retulimus in tertio sermone. Facimus tamen & in hoc sermone quorundam mentionem, sed paucorum, & paulo post. Purgare igitur eos oportet confidenter, & secundaria uice si res ita postularit: confestim enim in euacuationibus subsistunt & sedantur. Quod si tamen neque hi purgari uelint, neque sustineant ob quamcunque tandem causam, Tum sanè & his quemadmodum dictum est, mederi conuenit per umbiliciorum purgatiuorum impositionem, & per ea quæ sedi subduntur. Per infusum item aluus ipforum eluatur, Et cataplasmata adhibeantur ex fabacea & hordeacea farina, adipe suillo recenti & infuso, tenuique chamæmeli farina ac aqua. At uero hæc ipsa postcrius imponenda sunt: in principio autem usque ad uirgorem ea quæ ex semperuuo apparantur, & ros is uiridibus, perdicij herba, anchusa, sanguinaria, helxine, si deriide, portulaca, rumice acuto, atriplice, solano, plantagine, uiola purpurea, faba, lenticula, & stratiote palustribus, blito, lactuca, seride, malua satiuæ, ramentis cucurbitæ, umbilico ueneris, flore uiolarum, mali punici conio. Horum unumquodque cum pane ex farina polentæ impositum dolorem tollit, & maxime psyllij semen aqua feruenti maceratum, & postquam succulentum factum fuerit pro cataplasmate impositum. Vnguentum item ex plumbi succo ad sanguineas influxiones præscriptum his commodissimum existit. Commoda sunt & mala cum pane trita imposita, & quæ his sunt similia, Et cerata hippiones & ambrosiæ nomine insignita, & quæcunque ex cera, chamæmelo, & rosaceo apparantur adricitur autem succus quispiam ex prædictis refrigerantibus, & ouorum candidum, & aqua cum modico aceto, quorum compositiones paulo post subnectemus. Optimum autem pharmacum pro eis est ceratum ex rosaceo betæ succo quantum satis est adiecto. Vidi etiam quendam hac affectione occupatum, qui immisisit in frigidam aquam pedibus & aliquandiu in ea detentis præclaram opem tulit. Alium item uidi qui ostreorum carnibus cum argenti spuma & uiridibus hyoscyami folijs ac oleo ueteri diligenter tritis utebatur, & tum illinendo eas, tum imponendo probe restitutus est. Licetbit autem per ostreorum penuriam, carnibus concharum fluuiialium uti. Atque hæc quidem conueniunt, si mediocris inflammatio & ardor adsit, Nam si magna fuerit ad erysipelatorum modum curationem instituemus. Cicutæ nimirum folijs & papaueris ac mandragoræ & hyoscyami adhibitis: quibusdamque medicamentis compositis stuporem inducentibus, quæ ex papaueris succo & similibus constant. In horum tamen medicamentorum usu immodici caloris deletionem pro scopo habere oportet, quæ sæpe

in una

in una cōtingit hora: post quam statim stupefactiuo ablato, cataplasma ex fabacea farina, adipēq; & aqua imponatur. Exenim ubi ea quę uehementer refrigerant diutius adhaferint, stuporem ægrumq; ac languidum sensum corpori inducunt. Quapropter quum in feruentibus doloribus fuerimus ad stupefacientium usum coacti, postea resoueimus partes per ea quę calefacere possunt.

Parabilia remedia ad inflammationes non ualde feruentes. Cap. xxix

Maluæ medicæ,
citrium,
aurea mala

Reliqua ex eorum numero quę facile parantur, quęq; doloribus non ualde magnis profunt, Palmularum glandulę sunt, & mali medicę ramuli, citrium autem ipsam appellant & aureum malum. Quin & fructus ipsius medulla sapore acris, pani aut pollini ammixta in cataplasmatibus commodissima est. Quemadmodum etiam si oleo coquatur & cera sufficienti ad oleum adiecta pedibus imponatur. Commodū est & symphytum per se pro cataplasmate impositum, & cum pane aut cerato permixtum. Et mali corium aceto incoctum, aut aridum tritum cum pane subactum. His ergo utaris. Optimum autem cataplasma podagricum & hoc est. Cupressi uirgula teneriora & pilulas in ollam coniecta cum aqua marina donec flaccescant coquito. Deinde in mortarium culinarium transumpta, ad cerati formam terendo redigito: & lintcolo excepta, dolentibus locis imponito. Hoc cataplasmate quotidie ante somnum uitot, etiam si non adsit dolor, per integrum annum, Nam perfecte ægrum sanat. Mirifice etiam facit cupressi decoctum, si ex eo æger sæpe perfundatur. Aliud. Cyperi folia uiridia trita in pastillos digerito, usus uero tempore aceto dilutos illinito. Barbari autem Indi arida ipsa folia contusa & cribrata reponunt, usu uero expetente aqua feruenti subigunt, modico etiam aceto adperso, aut rhois culinarij decocto, atque hoc modo inflammato loco imponunt, folijs ricini aut carpasi superstratis, aut si hæc haberi nequeant, brasicę. Reperies autem mane cataplasma aqua plenum, Sensibilis enim discussio & exhaustio contingit, adeo ut æger exuctionem sensu perceptet, & maxime iuxta ungues. Vitiat tamen colorem, cum ad fuscedinem corrumpens, quapropter aliqui cerato liquido ungues prælinunt.

Indorum barbarorum mor

Aliud cataplasma, quod eadem hora dolores sedat.

Cerebrum porci cum amylo & rosaceo tritum, & panniculo infarctum imponito, & confestim liberabitur eger, ut deambulare possit. Optime faciunt item maluæ aqua coctæ & tritæ impositæ, celerime enim dolores sedant.

De stupefacientibus medicamentis. Cap. xxx

Stupefacientiæ
periculosa

Composuerunt medici quemadmodū prædictū est, ob excellentes dolores, aut etiā ob ægrorum molliciem quos curare cogimur & neq; minimū dolorē tolerare possunt, medicamentā stupefacientiā appellata. Hęc enim nequaquā affectiones ipsas in quibus dolores fiunt, curat: uerū stuporē & sensus

fus hebetationem membris inducēdo, quietem quandam doloribus obducunt. quapropter si ad huiusmodi pharmacorum usum, aut ob excellentem dolorum magnitudinem, aut ob immodicam caliditatem erysipelas consilium, cogamur, uremur quidem modice, quo feruor immodicus refrigeretur, aut sensus oblatio deleatur. Ad hoc etiam animaduersione habita diluctiuo pharmaco in membro permaneat. Sunt autem medicamenta stupescitiua huiusmodi.

Asclepiadæ epithema dolorem leuans, podagricis & articulari morbo commodum. usus eius est in ipsius exacerbationibus & excellentibus feruoribus inflammationum.

Opij drach. iij, croci drac. i, panis siliginis quantum satis est: unumquodque per se lacte bubulo maceratum terito, & unita imposito. Aut hæc ipsa cum lacte trita cerato rosaceo excipimus & utimur.

Aliud, quod confestim à doloribus liberatio oportet autem ante pharmaci impositionē ægrū lauare, atque ita exteris locis statim adhibere.

Succi absinthij trientem, croci trientem, ceræ tantundem, opij unc. i, irini sex uncem. Opium & crocum in passo diluito, & affuso cerato unito, ac uiton.

Asclepiadæ pastillus podagricus, dolorem leuans.

Vfus eius competit tempore exacerbationum.

Aloes lib. i, centaureæ sextantem, thuris trientem, myrrhæ trientem, lapidis asij, opij, succi mandragoræ, styracis, aluminis scissi, cuiusque sextantem. excipe ac subige passo & ad pastillorum formam reducito. Vfu uero expetentē lacte dissolutos cum pinnulis illinito, supra illitum locum linteolo imposito passo imbuto.

Vnguenta recalcfactoria quæ post stupescitiuorum usum adhibentur.

Cap. xxxi

Q Vum itaque stupescitiuis usque ad feruoris inflammationum deletio nem fuerimus usi, post calefacere membra conuenit cataplasmatibus ex castorio & thapsia compositis: si enim hoc non fecerimus, debilia & intemperata reddita membra perpetuo fluori obnoxia reddemus, & quæ in actionibus facile offenduntur. quapropter unam atque alteram unguetorum recalcfactoriorum compositionem apponam. Ex quorum numero & hæc est.

Succi thapsiæ drach. viiij, piperis drac. xxiij, adarces, canchryos, euphorbij recens, cuiusque drac. xx xii. Si uero recens euphorbium desit, duplum eius sume: staphidis syluestris drach. xii, pyretri drach. xii, terebinthinæ drach. xvi, ceræ drach. xxiij, olei cyprini libras vi.

Altera, eiusdem usus.

Pyretri, castorij, elenij, adarces, piperis, euphorbij, zingiberis, nitri, ceræ, singulorum drach. viiij, irini quantum sufficit. Pro pauperibus autem satis faciunt, allia, thymus, origanum, saturcia, sinapi, & similia.

pauperum
pharmaca

Pharmaca

Pharmaca & edulia eorum, qui flauæ bilis influxu infestantur. Cap. xxxii

EXhibenda est autem & cyclaminus à flauæ bilis influxu infestatis. Huius enim radix quam tenuissime trita cum aqua mulsâ aut passio pota, biliosum humorem per sudores excludit. Dandæ autem ex ea drachmæ quatuor corporibus magnis & robustis, reliquis uero pro uirium tolerantia. Adiuuare uero oportet sudorum exclusionem corpus calefaciēdo & fricando, ita tamen ne affectos locos contingamus. Præbenda quoque in potu ea quæ urinam cient, talia enim bilem per lotium euacuare consueuerunt: pastillus item ex seminibus soporifer, & qui à triangulari forma Trigonus appellatur, & consimiles, doloribus infestantibus commode à flaua bile affectis exhibentur. Nam & somnus alti soporis inde oboritur, & fluxiones ab ipsis resiccantur, atque id maxime si post corporis per purgatiuum euacuationem exhibeantur. Edulia autem eis apta quæ refrigerant, non tamen humectant: humiditas enim auget fluxiones. Dandum item eis lactuæ semen ob somnum conciliandum, & papaueris semen tum in cibo tum in potu. Mala etiam & sorba & mespila præbenda, & quæcunque ad hoc quod refrigerant, fluxus cohibent allationem. Cæterum à uino omnino exacerbationis tempore abstinendum est. Intercapedine autem pura reddita parum ex eo concedendum. Porro inedia ab amara bile infestatos extreme lædit: nam bilem acriorem reddit.

Cura eorum qui ob pituitæ influxum ægrotant. Cap. xxxiii

Horum item curationem à pituitæ euacuatione principiū sumere oportet. Euacuatur autem humor pituitosus per uomitus quidem, nihilominus tamen & inferne per uentrem. Vtilis est autem in hac affectione per inferna purgatio, siue iuxta manus siue iuxta pedes hæreat morbus, & multo adhuc magis si iuxta omnes corporis articulos fluxus fuerit dispersus, familiarior enim pituitæ uia & minus periculosa per intestina existit. Si enim in superioriorem uentrem uiolenter adtracta non euacuetur, periculum inducit. Quapropter tutius est ut ad infernam excretionem ducatur. Euacuata enim in una die morbi utcumque inueterati robur contundit. quare in podagra innatum ex pituitoso humore fluxum, & mediocriter affligentem, & qui tum potentia tum actu calidis remedijs delectatur, purgare oportet. Ante purgationem uero modice adstringentibus utendum, atque id magis adeo circa initium fluxionum. Arqui si euacuatio per purgationes fieri non possit, quæ sanè uel sola sæpe sufficit ad affectionum fluidarum curationem: tum inedia & fame utendum est ad plures dies. natura enim pituitosi eam bene tolerare possunt. Utendum etiam ordinationibus discussorijs ampliusque efficacioribus infusis, & pharmacis cientibus urinam. Cæterum quæ ratione nutrimenti præbentur edulia, natura sicciora sint & minus nutriant: ueluti

A uino abstinendum.

*Fames biliofit
nocina*

*Pituitæ uia
per intestina*

*Fames pituiti
tam curat*

luti est oryzae succus & bromi, qui inter frumentacea refertur, Nuces iuglandis paucae, pistaciae & nux thafia, & Vuae passae, & capparis ex aceto mulso. Quandoque etiam parui pisciculi in petrosis aquis coaliti, & passeruli montani assati praebeantur. Vinum autem praebeatur quam minimum interualli tempore, tenue, fuluum & uetus. Cataplasmata autem quae frigidis fluxibus conueniunt imponenda. In principio quidem terebinthi folia uiridia & tenera cum adipe suillo receti, & rosaceo, modica cera adiecta. Apta sunt ipsi & cupressi folia & pilulae uino cocta. Et cyperi radices, & rhamni folia. Post principium uero pituitosis conuenit ex eruo & lolio ac sceno Graeco cataplasma. Quemadmodum etiam ea quae ex ciceribus constant, aristolochiae radice trita ammixta, centaurea & gentiana, & pconia, & bryoniae radice ac fructu. Ex amaraci item coma, & artemisia, abrotoni folijs & adianto, uiride, lauro, pulegio, samfuo, menta, brassica, sisymbrio, serpylo, filice, sceniculo, cruca, & reliquis quae saporis acris, aut falsi, aut amari sunt, & maxime si dolores citra ardorem ex refrigerationis sensu sint oborti. Singula uero ex his cum pane & adipe recetia pro cataplasmate imponito, quantae nihil uetet unumquodque per se adhibere. Optimum est etiam fomentum ex passo mari mixto apparatus. At uero quinq; folij radicum & malicorij aequalibus partibus decoctis perfudi ac foui, inquit Archigenes, circundolentes partes. Imò & tritis ipsis magis inflammata loca cataplasmatibus modo contexti, atque hoc ipsum multis uelut obluens & resistens remedium dolores expulit, aliquibus autem ut pharmacum nulli inferius ipsos mitigauit, rarissime uero citra commoditatem apparuit.

Manusuetissimum uero & hoc est.

Althaeae folia cocta trita tum per se, tum cum polline, aut ordeacea farina imponantur. Ceratum item ex radice eius, quae hibiscum appellatur, cocta in aqua multa trita. constet autem ceratum ex gleucino aut irino. Imponatur uero his qui tum uehementer calida, tum ualide frigida auersantur, meridiocribus autem delectantur. Pharmacum porro conueniens noui, inquit Philagrius, podagricis qui unà cum doloribus frigoris sensu percelluntur, id quod ex laurino componitur. Quum enim & alia eiusdem generis sint cum ipso, tantam tamen commoditatem à nullo exhibitam scio. Compositio autem hoc modo habet.

Pharmacum ex oleo laurino.

Cerae, adipis suilli ueteris, resinae pinus siccae, terebinthinae liquidae, cuiusque drach. xvi. cyprini, laurini, hyssopi, butyri, cuiusque drach. xlviii. galbani, medullae ceruinæ, cuiusque drach. xvi. Hoc quidem igitur medicamentum confestim à dolore liberat eos qui in dolore frigoris sensum perceptant. Admirandum etiam in his pharmacum est, quod ex croco constat & galbano, supraque ad sanguineum influxum praescriptum est, & in omni tempore adhibetur. Sunt autem & alia pharmaca his apta, Quemadmodum ea

E quae

Pituitosorum
cibi

Radix dibeae
hibiscum

Pharmacum
ex oleo lau-
rino

Myracopa quæ Myracopa appellantur, & quæ ex ipsis componuntur cerata. fiunt autem hæc commensurata & proportionata cera ad unguenta ipsa ammixta.

Pharmacum ex Metallicis.

*Pharmacum
ex metallicis*

Optimum uero & ipsis pharmacum est ex Metallicis ad sauciatores nervos à Galeno apparatus, cuius & nos admirabile periculum fecimus, inquit Philagrius. Quî enim partium quàm tenuissimarum sit, ad profundû corporum puscutorum progreditur, & attenuat, & discutit. Commodum igitur existit in prædicta dispositione post sedatos dolores admotum, aut quum medio cres existunt. non solum enim discutit ut dictum est, sed & repellit. Compositio uero hæc est. Chalcitidis, drach. VIII. misyos, drach. XVI. Squamæ æris, drach. XXIII. thuris, drach. XXIII. galbani, drach. XII. colophoniz drach. XCVI. ceræ, drach. XCVI. olei, drach. CXXVIII. acetî acerrimi quantum satis est. Metallica cum aceto in sole æstiuo terito ad plures omnino horas, Deinde thus adijci, rursusq; diu terito, & liquefiscibilib. liquefactis, refrigeratis, & perpolitis admixtis uniro ac utitor.

Pharmacum ex uino & oleo, Galeni.

*Pharmacum
ex uino &
oleo*

Aliud pharmacum ex oleo & uino Galenicum, conueniens in declinationibus inflammationum, & post easdem omnibus podagricis. Spumæ argenti, drach. XCVI. olei ueteris drach. CXCII. ad podagricos uero sufficit si anniculum sit oleum. uini ueteris fului pellucidi atque leniter dulcis, drach. CXCII. Coquito simul ad compagem manus non inquinantem. Hic enim est optimus eius apparatus, Nam qui triplum olei accipit diutius coquitur & magis resiccans red dicitur. Porro in his qui post dolores uehemens frigus percipiunt, aliud Galenicum pharmacum ex Euphorbio ad sauciatores nervos descriptum cōducit. At uero adhuc pharmacum podagricis cōmodum, tum in inflammationum remissione, tum post easdem existit, quod Aegyptiū appellatur, & ex lanis succidis uitis apparatus, Habetur autem inter multæ commoditatis emplastra iuxta xv. sermonem huius tractationis.

*Pharmacum
Galenicū
euphorbio
Pharmacum
Aegyptium*

Cura eorum qui ex atræ bilis influxu
ægotant. Cap. XXXIII.

Dicatur autem ex ordine & de atræ bilis influxionibus quæ & ipsæ omnino uniuersali euacuatione præcedente opus habent, hoc est uenæ sectione, aut purgatione. Quando quidem igitur ad atram uergunt bilem, euacuatione per ea quæ ipsam repurgant, quando uero ad sanguinem atrabile infectum declinant, per uenæ sectionem. Si uero ambo hæc simul per totum hominem redundarint, non unum aliquod ex prædictis adhibere suffecerit, sed præfecta uena, deinde depurgare cogimur, quod ipsum & in alijs affectionibus duplici euacuatione indigentibus erit faciendum. Priusq; igitur totum corpus euacuamus, atq; in ipso etiam euacuacionis tempore, dico sanè in principijs, repulsijs & sensim simul calefacientibus utendū est. Post euacuationē uero his quæ sensim calefacere, & attenuare, & discutere possunt

possunt utemur. Sunt autem Repulsoria quidem simulcꝫ leniter calefacientia, cerebinthi folia & cupressi, cyperi radices, & similia. Calfactoria autem simulcꝫ attenuatoria & discussoria, bryoniae radix & cyclamini, syluestrisꝫ cucumeris, & raphani, lauri item folia mollia, & pastinacæ, & caucalidis, sinapis, nasturtij, conyzæ, brassicæ, iridisꝫ & ocymi & aliorū innumerorū folia. Ammiscenda aut sunt hæc pani cuiuspiā ex prædictis iam sæpe farinis, & ad pipi anserino aut gallinaceo, butyroꝫ & hyssopo, atq; id maxime in humectis & nigris corporibꝫ quo leniora reddatur. Quin & post huiusmodi phar macorū impositionē, præscripto ex croco pharmaco, & eo quod ex metallicis constat uti conuenit, ampliusꝫ quod Macherioni inscribitur, & quod Isis appellatur, similibusꝫ, quorum compositiones in xv. sermone traditas reperies. Exenim huiusmodi pharmaca relictum in membris humorem concoquunt, eundemꝫ attenuant & discutiunt, ampliusꝫ membra debilitata corroborant. Commodissimum autem pharmacum per interualla exacerbationū dolore non infestante, ad atræ bilis fluxiones est Corax, quem admodum etiam pastilli Andronius inquam, & Musæ, & qui ex cetauræa, itemꝫ qui ex lanis succidis apparatur & consimiles in xiiii. sermone descripti. illinuntur autem cum uino dulci. Miscetur etiam ad præscriptum ex croco pharmacū, & ad id quod ex metallicis constat, ita tamen ut parum quid ex pastillis ad multā pharmaci partem commisceamus, ut uidelicet pastilli xii. pars ad unam pharmaci partem addatur, hoc est ad pharmaci lib. i. pastilli uncia una. Aliquando autem minus. Quum enim euacuare & discutere uoluerimus, minus de pastillo adijcimus, corroborare autem & firmatē m addere, plus. Quod si neq; perfecta neq; absq; dolore sint exacerbatio num interualla, panem uino maceratum & sufficienter emollitum ad prædicta medicamenta per interualla ammiscere expedit. Præstans autem est & in his discussoria fricationum species uniuersi corporis, præter affectas partes, tum per interualla, tum tempore exacerbationum uehementius & diutius facta, & maxime si non fuerint præuacuat.

*Repulsoria
calefacientia*

*Pharmacum
Macheronis
Isis emplastrū*

De his qui ob tenuem fluxum ægrotant.

Cap. xxxv

Si serosi sint humores qui ad articulos influunt, non paruum signum tenuitatis ipforum est, quod neq; tumorem magnum habeant inflammationes, neq; diutius durent. Imò neq; molestiam aliquam in motibus perpe tiuntur ægri postquam quieuerint inflammationes. Eorum igitur qui ob tenuem influxum ægrotant remedium quod eadem die opem eis fert purgatio est per ea quæ serosos humores euacuare possunt facta. Fluxiones autē quæ non ita ualidum dolorem inferunt, sæpe in solo irrigationum fotu sub stiterunt, ex oleo uidelicet rosaceo & uino dulci suppressæ, modica cera amixta, isdemꝫ lanis succidis exceptis, additur etiam aliquando nitri spuma. Quin & quod ex corte naxia ex ferri affricu deteritur & in ea congre

*Cortis naxig
us*

E 2 sphragis

sit relata, nulla difficultas amplius est, etiam mixtarum curam inuenire. Satis enim manifestum est quod ad humorum complexum, consequenter etiam curationes oporteat mixtas esse. Cognitiones autem mixtarum fluxionum ex prædictis simplicibus affectionibus sunt sumendæ.

Cura affectionum ex sanguinis & bilis complexu.

Cap. xxxvii.

S I igitur sanguineæ & biliosæ affectiones concurrant, & propterea tumor magnus & ruber, & quodam modo flauus ac feruidus, membrū fluxione infestatum apprehendat, & dolores nunc remittentes incumbāt, & ex acerbatio uehementer quidem alternis & tertio quoque die fiat, benignior autem singulis diebus omnino sanè manifestum puto, quod medicationis initium à uenæ sectione primum fiet, consequente exinde biliosi humoris purgatione. Satis constat autem quod & euacuationum tempore repulsorij utemur, quæ uidelicet frigida & adstringentis sunt facultatis. Et deinde primum mitigatorijs & refrigerantibus quidem utendum, non autem amplius adstringentibus. Adstrictio enim tumorem inspissat ac cogit, ut ægre discuti & resolui possit, si diutius ea utamur. postremum uero etiam his quæ concoquere & discutere tumorem possint utendum est. In principio igitur iuxta euacuationū, in quā, tempus, uide phararmacum eiusmodi affectionibus est ex acacia & ueratrīs pastillus in mortario plumbeo cum semperuiui, aut plantaginīs, aut sanguinariæ, aut senecionīs, aut umbilici ueneris, aut rumicis acuti, aut solani, aut uirgæ acerbæ, aut hyoscyami, aut lactuæ succo dilutus. Atqui iuxta augmētā & uigores affectionum, etiam ea quæ ad sanguineas affectiones dicta sunt, in cataplasmata ammiscere expedit. Succosque item iam relatarū herbarū, & ipsas adeo herbas tritas. Postquam uero feruor inflammationis cessarit, consequentibus cataplasmatibus & medicamentis utemur: parte etiā affecta uulnusculis impactis scarificata, præsertim si appareat tumefacta.

*Adstringētia
quādo nocēt*

Cura bilis ad pituitam permixta.

Cap. xxxviii.

A T uero si pituitosi humores biliosis fluxionibus ammiscantur, si qui dem unio & permixtio ipsorum eodem tempore hominem infestet miscere etiā remedia oportet, eorumque multitudinē purgare per ea quæ bilem simul & pituitā educere possunt: forinsecus autē cataplasmata imponēda pari aut impari modo permixtis his quæ pituitosum & biliosum euacuant fluxū. Ex pari quidē modo utraq; cōficiemus, quū affligentiū humorū mixtura æqualis fuerit. Impari uero si alter humorū reduārit. Neque uero obliuioni tradendū quod aliqua ipsorū in principio recte adhibētur. Aliqua uero iuxta mali progressum & uigorē. Quædā uero eo remittēte & circa declinationē.

*Quædā uero
temporē
morborum*

Cura humorum atræ bilis alijs permixtorum.

Cap. xxxix.

E Adem etiam methodo uteris si atræ bilis fluxiones reliquis fuerint ammixtae, tum iuxta exacerbationum circuitus, tum iuxta continuitatem. Neque enim solum ad affectionum complexum est respiciendū, sed & num

E 3 assidue

assidue & citra remissionem, an iuxta circuitum infestent. Primum quidem igitur & in illis euacuationibus conuenientibus utendū est, Deinde ubi quidem assidue infestarint, cataplasmatibus dolores sedantibus uti expedit, Vbi uero per circuitum moueantur, instantibus quidem doloribus mitigatoria cura, per interualla uero corroboratoria membrorum utemur. Manifestum autem quod quæ magis feruent maiori refrigeratione opus habet. Quæ minus, minori. Omnia tamen feruentia refrigerare oportet. Quæcunque aut fluxiones pruriginosæ fuerint, obtundentibus & discussorijs curabuntur. Quæcunque uero mordaces, obtundentibus folijs. Et quæ in alto sitæ sunt, per ea quæ tenuiū partiū existunt, quæ uero in superficie, per simpliciora. Omnium aut horum syluā in fine secundi huius tractationis sermonis præscriptā habes.

Cura durorum tumorum qui post inflammationes relinquuntur. Cap. XL

Tumores duri & relictantes
Duri & reluctantes aliquando tumores post inflammationes relinquuntur, qui ex crassis humoribus generationē habent, in corporibus præsertim durioribus, & quæ ægre per discussoria exoluantur, & male curatis. Huiusmodi enim non curati statim seipsis peiores fiunt ad uitæ actiones obcundas. Cæterū huiusmodi tumores sedant, pharmacū Machætionis, & piscatoris, & Aegyptiū, & cōsimilia de quibus dicetur xv. sermone in pharmacorum multæ comoditatis relatione. Dicitur aut & hic ubi ex ordine de tumoribus qui ægre concoquuntur tractabimus. Sunt etiā parabilia pharmacæ ad hanc affectionem si ruri uiuamus, satiuæ fici fructus, & syluestris quoque grossi cocti, tritici & impositi, tum soli, tum cum quadā ex prædictis farina & adipe. Cyclamini item & cucumeris syluestris radix, & althæa bis cocta, & caricæ pingues, adianton, auena, urtica, bryoniæ radix, bulbi, anethi, abrotoni, buphthalmi, iridis folia itemque marrubij, ita ut singula prædicta cum uisco, pice, & sulphure uiuo permisceantur.

De tumorum crudorum & inconcoctilium cura. Cap. XLII

CRudi tumores ex materia albidiorē congregantur, diuque durant, neque concoquuntur, neque discuti possunt, Quandoque uero primis quidem discussis loci statim fluxione infestant, & inæquali magnitudine semper permanet tumores. & in quibusdā sanè penitus absque dolore fiunt, in alijs uero dolore quodā comitante. Quandoquidē igitur diuturnos uideris tumores citra dolorem, per discussoria curato, diligenti animaduersione habita ne quid relinquatur induratum, quod incurabile aut ægre ualde curabile redatur, & maxime ubi callosarum duricierū generationem uideris in articulis futuram. Si igitur citra dolorem uideris crudos tumores, e mollientibus ad discussoria ammixtis curato, ne quid penitus induratum relinquatur. Si uero cum dolore contingant tumores, non modo discussorijs, sed etiam quæ unā cum hoc quod discutiunt, lenire possunt, expedit uti. Manifestum autē est quod si fluxus tenuis & modicus cum doloribus quibusdā deferatur, inde tumores

tumores post inflammationum remissiones oboriantur & infestent, atq; id maxime in his euenit qui delicatius uiuūt, aut frequenter lauuantur aut plus q̃ oporteat inambulant, uel etiā rebus uenericis utūtur. Oportet igitur in his ad tumefacta imponere pharmacū ex salicibus, ita ut adglutinari possit apparatus aut quod ex aspidibus constat ad strumosos destinātū, aut aliquod cōsimile: præsertim quū sensus ægris adest iuxta coxendicē aut femur, tanq̃ aliquid ad inferiora deferatur: quūq; dicunt se affici uelut formicas repētes sentiant, doletq; & iam refrigeratur, iam calefcit membrū. Quin & lauantes per smegmata ex adārcē, alcyonio, & pipere defricare oportet. Adstringētia igitur sunt simulq; discussoria pharmaca, quibus necessario utimur ad crudos & dolentes tumores, uelut symphytū petræum, terebinthi uirgulta, scopolendri uiride, cyperos, & similia de quibus sepe dictū est, cū pane multo & rosaceo permixta, præsertim in his qui humido & albo corporis habitu sunt præditi. Ex cōpositis aut̃ conuenit eis pharmacū ex succis quod cū uino flauo & subadstringente est emollitū, & Galeni phœnicinū cum multo rosaceo liquefactū, & locis liquidius impositū. Cæterum in tumoribus citra dolorē conueniunt adiantū uiride, folia urticæ, althææ, chamæmelū, uua palsa pinguis, fertula cāpana, melissophilon, lauer, citrij exterior cortex, & similia. Ad quæ singula cicetū & lupinorū farinæ, & panis, & olei ueteris ac sicyonij, & adipis suilli ueteris, tantum ammiscendū est, ut mollis ad tactum compositio reddatur, & morsum nullū ad membrū accedere permittat. Ex compositis aut̃ pharmacis conueniunt his, id quod ex croco & galbano constat, & quod ex liquecibilibus apparatur ac mox referetur. Et Machæionis, & piscatoris, cum cerato ex oleo Sicyonio aut aliquo cōsimili liquefacta. Atq; hæc quidem in mollioribus corporibus adhibentur. In durioribus autem & quibus tumores non dolitant, conueniunt uiticis folia, præsertim arida, & amaracū, amarātum, ari & arisari radix, smyrnium, althææ radix, claphoboscum, ericæ folia, sceniculi folia: filix, sifymbrium, scandix, cruce folia & sinapis uiridis. Cōposita aut̃ conueniūt tum prædicta citra cerati ammixtionē, tum Isis, & Aphrodite appellatæ, & alia infinita iisdē uiribus prædita. Huiusmodi autem pharmaca unā cum hoc quod tumores exolunt, etiā fluxiones naturæ suę aptitudine repellunt, Quod ipsum etiā probe faciunt cupressi pilulæ uirides cum uino coctæ, prædictorum leguminum farinis & suillo adipe ammixtis, quandoq; uero & lauri ramuli, & rubi folia, & similia ammiscuntur. Efficaciora autem prædictis sunt, & agrestioribus corporibus ac tumoribus qui æger time concoquantur cōuenientissima, abrotonum, ammoniacum thymiana, ancemonarū radices & hastulæ regiæ, bryonia radix, pulegium, dracunculi radix, bdellium, buphthalmum, gentianæ radix, & myrobalanus. His autem adhuc fortiora sunt capparis folia, glastum, betonica, cyclamini radix, brassicæ ustæ cinis, ruta, panaces uiride, peucedani radix, scilla, fici syluestris fructus, trifolium asphalites, trixago, sul-

Pharmacum
ex salicibus.
ex aspidibus

Formicas
quasi repen-
tes sentire

phur, pix, Addatur autem singulis prædictis panis & adeps, aut prædictorum leguminum farinæ, quandoq; etiam carica. In quibus omnibus scopum tibi propositum habeas, ut citra partis affectæ commotionem & afflictionem curam facias: quapropter etiam necessaria est prædictarum farinarum, itemq; adipum admixtio. Tamen autem cōmiscere ex eis oportet, quantum uehementē uniuscuiusq; uim obtundere uolumus. Ammiscendus autem est non solum adeps suillus, sed & caprinus, & uilulinus, & taurinus, ceruinus & anserinus, Medullæ item omnes ammiscendæ habito naturæ curandi corporis respectu. Et cochleæ unā cū testis tritæ, & sine alterius rei admixtiōe, aut caprino & ceruore cū aceto trito ammixto, tumores laxos & molles destruit & adstringūt, qui sanē ex lentis & crassis humoribus oboriuntur. Porro operæ precium duxi admonere, diligenti animaduersione opus esse, ne clam te indurata aliqua tumoris pars relinquatur, quod sanē ubi uideris factum, his quæ fortiter emollire possunt uteris, respectu simul ad habitum corporis habito. Ex malagmatibus autem fortissimum est Leucio inscriptum ad articulos distortos.

Malagmata diuersa, in quibus etiam Leucij malagma est, ad articulorum distortionem destinatum.

Cap. XLII.

Malagma Leucij **M**alagma Leucij ad articulos distortos inscriptum, facit ad thoracis affectiones & abscessus in profundo, ad neruos contractos, & articulos stupore occupatos. Latini distortionem & Græce ancylas appellamus. facit opisthotonicis, & ad omnem neruorum per consensum affectionem, Ad neruorum item lassitudinem acopon egregium est irino aut cyprino dissolutum. Bdellij, adipis uilulini, ammoniaci thymiamatis, iridis, cuiusq; sextantem, opopanax, galbani, canchryos, thuris, styracis, cuiusque drach. VIII. piperis grana CLX. ceræ sexuncem, terebinthinæ sexuncem, fecis ungenti irini aut cyprini sextantem & uncia dimidiū, uini quantum sufficit. Ammoniacum, opopanax, thus, terito cum aceto, liquefabilia uero liquefacito, & ab igne ablatis sicca inspergito: deinde etiam trita ipsis adijcitur, & unita in mortariū diffundiro, ac fortiter emollito, extractisq; utitor. Optimum est etiam eis ex pice brutia Galenicum pharmacum ad rabidi canis morsum descriptum. Habet autē hoc modo. Picis brutiæ, libram I. opopanax, quadrantem, aceti acerrimi drach. I. apparato quemadmodum de rabidi canis morsu prædictum est sermone sexto.

Aliud Pharmacum ex liquefibilibus, Galenicum.

Quod concoquit simul & attenuat tumores. Quo sanē in mollibus corporibus uel solo utendū. In fortioribus uero ammiscendū est ei id quod ex metallis constat ad fauciatos neruos destinatū, ita ut mixtura uilibet iuxta corporū & affectionū naturam fiat. Habet autē hoc modo. Opopanax, unc. I. terebinthinæ chiæ, unc. I. propolis teneræ, quadratē. Si uero propolis tenera nō sit, admiscebis terebinthinę trientē: quod si neq; in totū propolis haberi

haberi possit, coniuncto picis brutiæ sexuncæ. Opopanaca *in acetq* albo contere. Hoc pharmacū prædictos tumores cōcoquit, & humores in alto sitos adtrahit, dissecat, & repurgat. Ceterū quod ex metallicis constat item Galenicum ad fauciatos neruos destinatū hoc modo habet. Chalcitidis, misyos, æruginis usta, cuiusq; drach. VIII. colophonix, bessē, squamæ aris, drach. XXIII. ceræ, drachmas XC VI. olei, drach. CXXV III. resinæ, drach. XVI. galbani drach. XII. acetī quantum sufficit. Chalcitin, misy, æruginē, aris squamam cum acetō in sole æstiuo contere ad plures horas, & liquefiscibilibus liquefactis & affusis, uni, emolli, ac utere. Aliud Galenicum.

Pharmacum
ex metallicis
aliud

Ad eos qui tenerū corpus habent & neruis faucij sunt descriptum. Chalcitidis usta, misyos usta, cuiusq; drach. VIII. Squamæ aris, drach. XXXII. thuris, drach. XXXII. ceræ, drach. XC VI. olei, drach. CXXV III. resinæ, drach. XVI. galbani drach. XII. acetī quod satis est, Apparato ut dictū est. His itaq; pharmacis utemur p se ubi dolores ex profundo dissoluere uelimus, Miscebimus aut pharmacū ex liquefiscibilibus. constās ubi tumores fuerint obdurati.

Malagma ad podagricos & articulorum morbos ualde generosum. Liberat à tota affectione, usus eius est per exacerbationum interualla. Ceræ, lib. I. terebinthinæ lib. I. spumæ nitri sexuncem. floris lapidis asij, sexuncem. Thuris sexuncem, olei cyprini lib. I. lixiuij ex cinere lignorū uitis, quantum sufficit. Arida contundito, cribrato, & cum lixiuio ad liquidi cerati crassitudinem terito, & liquefiscibilia liquefacta tritis affundito, unito ac utitor.

Aliud. Calcis uiuæ, thuris, cuiusq; drach. IIII. terebinthinæ drach. IIII. ammoniaci thymiamatis drach. IIII. spumæ nitri drach. IIII. adipis taurini drach. V III. floris lapidis asij drach. II. ceræ trientem. olei trientem. liquefiscibilia liquefacito & cum siccis unito ac utitor. Valde prædarium est. Resorbet collectiones circa articulos congregatas, & à doloribus uindicat.

Aliud, quod in totum ab omni affectione liberat. Seminis cicutæ, comæ centaureæ, iridis illyricæ, agarici, cardamomi, sceni Græci, corticis radicis mandragoræ, singulorum sextantem, terebinthinæ lib. I. olei ueteris, sexuncem, ungenti syriaci aut salca appellati, sexuncem. Terebinthinā cum oleo ueteri modice coquito. deinde unguentum addito, & ablatis ab igne arida trica inspergito & unito, emollitaq; in uas æreum aut stanneū reponito, uase tamē prius ex ungento malabathrino siue foliato illito. Hoc pharmacum crassos & mucosos humores trahit per obscuros meatus.

Unguentum
Syriacum
Salca

Aliud ad eos qui à natiuitate articulare morbum contraxerunt. Vt pote quibus genua, humeri, cubiti, & reliqui articuli dolitant. Ceræ, colophonix, resinæ pinus, cuiusq; sexuncem. terebinthinæ unc. I. sceni græci sicci contusi & cribrati trientem. Cyprini trientem aut quantum satis est. Elixauis liquefiscibilibus scenum græcum insperge, & utere.

Aliud Ceratum ad articulare morbum pulchrum. Ceræ, adipis porcini, colophonix, resinæ pinus, cuiusq; lib. II. butyri, lib. I. terebinthinæ

terebinthina lib. i. galbani, trientem. adipis taurini, lib. ii. hyssopi, lib. i. Li-
quefac, percola & adserua. Vfus uero tempore ungento nardino dissolue
aut etiam gleucino, & linteolo exceptum impone.

Aliud ad articularum morbum & podagricos.

Vt præ admiratione consterneris. Ceræ, drach. C. rosaci, drach. CC. folio-
rum sideritidis tenerorum drach. C. styracis, drach. XX. thuris, drach. vii. i.
nitri, drach. viii. manna, drach. X. Liquefacta cum reliquis tritis unito, ac uti
ror. Sūt autē & alia q̄ plurima pharmaca quę tumores tollere possunt post

*Ceratum ex
aspidibus*

inflammationes adhibita, Maxime uero omnium quod ex aspidibus con-
stat ad strumas descriptū facit ad eos quibus laxi tumoris magnitudinem
detrahere uolumus, Subuertit enim quā plurimū tumores laxos itemq̄
duros eosq̄ simul diffundit. Constringit autem & condensat articulos præ-

Ex salicibus

clare omnino si quod ex salicibus constat ei ammisceatur. Ego autē, inquit,
Philagrius penuria pharmacorum ex metallicis præscriptorum, id quod ex
salicibus apparatur ammiscui & maximopere profeci articulis inde constri-
ctis, densatisq̄ ac corroboratis, obfirmato uidelicet fluxionū humore prius
euacuato. Licebit autem si quis ruri uiuat & prædictis pharmacis careat, ex
adipe qui ad manum sit, & arida pice, cum resina pinus, aut etiam alia resina
quæ haberi possit, pharmacum in cerati formam apparare, ipsiq̄ chalcanti
quantum ubilibet recte habere uidebitur ammiscere, Salem item ac My-
si, auripigmentum, & similia, Quin & uiscum & irin, aristolochias, pæoniā
peucedanum, gentianā, centaureā, artemisiā, thymum, origanum, ni-
trum, nitri spumam, thus, myrrham, styracem, propolin, mastichen, ac alia
innumera his consimilia licebit reperire, indeq̄ pharmaca tumores cōstrin-
gentia componere, quemadmodum nos fecimus nō paucies communibus
ad podagricos & articularum morbos pharmacis inde apparatis.

Philagrii pharmacum ex nitro & oleo.

Nitrum accipito friabile & nihil calculosum in se habens, idq̄ ipsum quā
tenuissime terito, olei tantum ad ipsum in mortarium affundens quo trita
simul ad mellis crassitudinem redigantur: atq̄ ubi satis diu contriueris caca-
bo excepta, ad lentum ignem non fumantem coquito, assidue agitando do-
nec ad bonam compagem reducantur, animaduersione tamen habita quo
liquidius pharmacum relinquatur. Hoc enim modo tractatum liquidum
euadit, neq̄ in posterū inspissatur nisi multam aliam sustineat coctionem,
quæ uim eius sicciores, & ob id affectis dolore membris inutilem reddat.
Probare autem eius compagem tempore coctionis oportet, ad testam ari-
dam ipsum destillando, testa non prius humectata, quemadmodū in alijs
pharmacis facere solemus. Resoluitur enim nitrum per aquæ contactū. Sit
autem oleum quod nitro affunditur dulcissimum, peruenium partium aut ro-
laceum, aut chamæmelinum, aut anethinum, aut uetus, aut cicinum, aut si-
cyonium. Quandoq̄ etiā chamæmeli humidæ siue aridæ, aut in diis tenuissi-
me trita

nie tritæ, aut aristolochiæ, aut alicuius confimilis partem ammiscere prodest. Si quidem autem repellere simul ac discutere uelimus, aut etiã calidos dolores curare, cum rosaceo ipsum pharmacum coquemus, aceto quãdoq; in coctione aut modico passo affuso. Si uero amplius discutere uelimus cū aliquo alio oleo coquemus, ammixtis etiam quibusdam præscriptorum aridorum, iuxta habitum uidelicet curãdi corporis & compagem ipsius tumoris. Hoc sanè pharmacum dolores in alto obortos quàm celerrime sanat, atq; id eo magis si non biliosum sit, neq; multum calidū quod influit, Neq; uero solum podagricos dolores ex professo iuuat, uerumetiã eos qui tales non sunt, sed ex fluxionibus congregati & discussioni alias resistentes. Vt mur itaq; ipso si post sedatas inflammationes dolores in alto permanent.

Pharmacum ex urina Bordonis hoc est Muli apparatus.

Attrahit quidem hoc priore præstantius, Conuenit autem magis crassis & crudis fluxionibus, præsertim si cum chamæmelo uiridi uel sola, uel cum adipe porcino recenti, fuerint prius cataplasmatibus modo contextæ: cum arida uero itidem eodem adipe ammixto, ampliusq; farina fabacea, aqua & oleo, ac modico passo adiectis. Quin & ipsa anthemis, quæ & chamæmelon dicitur, ualde calidos dolores & inflammationes maximopere ex natura sua iuuat, statim post uigotem adhibita. Exenim cutem rarefacit & attenuat moderate, & biliosos humores transpirare facit, adeo ut huiusmodi inflammationes etiam sola, nihil ex attenuatorijs & incisorijs, ueluti est artemisia, & aristolochia, & calaminthe, & alia infinita, admixtū habens, curet. Hoc itaq; pharmacum ex argenti spuma & urina apparatus, de quo sanè sermonem institui, scio quosdam circa totius affectionis uigorem, nō modo iuxta particulares exacerbationes, aliquando uero & augmenti tempore, ad dolentes locos pro cataplasmate imposuisse, humoresq; forinsecus extraxisse: & tumores quidem maiores reddidisse, dolores tamen omnino sedasse ac extirpassse. Caterum odor ipsius intolerabilis est eis qui tenero olfactus sensu præditi sunt. Compositio uero talis est. Urinæ muli masculi non castrati, sextarios Italicos IIII. Spumæ argenti, lib. II. Spumã argenti tenuissime tritam in mortario habeto, eiq; urinã affundito, Ad solem uidelicet æstiuum expositæ paulatim urinam instillato, & postq; ad mellis spissitudinem peruenerit, urina scilicet consumpta, olei unc. XXIII. addito, adipis porcini ueteris unc. XVI. & usq; quo non amplius inquinari manus coquito. Vtus uero tempore linteolo exceptum imposito. Oribasius autem axungię lib. I. coniecit, & medullæ ceruinæ non falsæ, bessem. & mellis, lib. III. reliqua uero eodem modo. Scribunt porro quidã proprij muli urinam accipiendam esse. Resistit enim & obluatur morbo ex natura sua accipiendam esse. Efficacius autem aiunt, reddetur si quis dum coquitur, ipsam semel in cacabum expuat, & semel in terram. Atq; hæc cum quibusdam barbaris nominibus inuenire licet adscripta, quæ sanè curiosam penitus habent scripturam, atq; ob id suum perfluum

Muli natura

perfluum & indecorum mihi uisum est, inquit Philagrius, ea adscribere. Etenim citra eorum nominum intentionem ipsum pharmacum apparatus, eodem modo efficax est, sicut id quod cum nominibus præparatur.

Hippione Philagrii.

Hippione uero hoc modo apparatus. Anethi uiridis, unc. XVI. scillæ recentis sexuncem, olei omphacini septuncem ac uncia dimidium, aquæ sextarios. III. Anethum & scillam in aqua & oleo ad triduum macerato, deinde donec aqua consumatur coquito, & percolato oleo ceræ nouæ lib. II. adijcito, medullæ ceruinæ lib. I. aut si hæc non adsit, adipis ceruini libram unam. adparato & utitor. •

Cerata podagrica.

Cap. XLIII.

Ceratum ex succo senecionis ualde pulchrum. Ceræ, libram I. olei chamæmelini, do drantem. adipis porcini recentis, sexuncem. croci, drach. IIII. Crocum cum succo senecionis terito, liquefabilia autem liquefacto, percolato, & succi quantum expedit paulatim instillato, fortiterq; agitato, atq; ubi refrigerint, ad crocum tritum adijcito, & subacta unito, ac utitor.

Ceratum dolorem leuans, ad inflammationes in uigore constitutas. appellatur autem Manus Asclepiadæ.

Facit ad excellenter inflàmata, eadem hora liberans citra dilationem. Succihastulæ regiæ, cyathos IIII. succi solani, cyath. II. succi buphtalmi, cyath. III. succi perdicij, cyath. III. ceræ, butyri recentis, axungie, medullæ uitulinæ, calcis uiuæ, cuiusq; quadrantē. terræ cimoliæ, drach. XII. terræ samia, drach. XII. sandarachæ, drach. XII. nitri bernicarij, spumæ nitri, cuiusq; drach. XII. fecis uini ustæ, drach. XII. glutinis chartarum, hoc est pollinis cocti, drach. XII. olei boni lib. III. appara & utere.

Aliud ad præscripta item efficax.

Ceræ, colophonix, adipis anserini, cerusæ, cuiusq; drach. xvi. picis, drach. IIII. succi brassicæ, cyathi dimidium. succi fœni græci, cyathi dimidium. succi seminis lini, cyathi dimidiū. succi stratiotæ, cyathi dimidiū. succi fertulæ campanæ, cyathi dimidium. lactis bubuli, cyathi dimidium, oua gallinarum, numero. IIII. olei, libras II. Ex his cerata duo facito, eaq; unā cum eis quæ Aegyptia inscribuntur in promptu habeto, quæ pauci adeo homines habent, apparato cōfidenter, nulliq; reuelato & plus q̄ hominis nomen assequeris.

*Aegyptia
cerata*

Podagricum aliud ceratum approbatissimum.

Facit ad inflammationes & dolores, etiam in principijs impositum celeritme sanat, & neruos arfactos emollit, adeo ut quidam ei hanc facultatem inesse non credant, dissoluit & pedum nodosos tumores condylomata græcis appellata. Olei cicini, lib. II. succi mandragoræ, drach. xx. XII. succi artemisiæ, drach. xx. IIII. succi rumicis, drach. xx. IIII. resine pinus, drachmas XLV. III. terebinthinæ, drach. XLV. III. adipis anserini, drach. XLV. III. succi rubi, drach. xvi. butyri recentis drach. XLV. III. lycij indici, drach. xx. IIII. sanguinis

Languinis hircini sicci drachmas xvi , lachrymę hederę drachmas xxxii , galbani drachmas xlviii , opopanax drachmas xxxi . Lycium & sanguinem hircinum & panacis succum cum modico uino terito, & affusis succis, si quidem liquidi affuerint, aut siccis, si illi haberi nequeant, unito. liquefabilia autem liquefacito ciscę trita adijcito, & ad lentum ignem coquito spatula assidue agitando donec cogantur. Ceterum ligna quę ad coctionem eorum suburuntur arida uitis sarmenta esse oportet.

Ceratum podagricum ex bryonia. Egregie facit ad omnes inflammationes & dolores articulorum. Hac usus & in uigore & in remissione succisum & gloriam reperi. Reperies enim inflammatas partes corrugas & citra dolorem. Frequenti experimento nobis cognitum est nam multo eo seruauimus. Radicis cucumeris syluestris drachmas ccccxxxvi , scillę mundę drachmas ccccxxx , radicis hastulę regię drachmas cxliiii , olei raphanini drachmas ccccccxcvii , cerę drachmas cxliiii , galbani drachmas xlviii . Herbas omnes in aqua sufficienti per triduum madescit, singulis diebus bis ipsas sensim agitando. Deinde affuso oleo, coquito donec oleum solum relinquatur ad lentum omnino ignem. percolato deinde, & ceram ac galbanũ in mortario diligenter trita & emollita addito. Quibus omnibus postremum liquefactis, & ab igne ablatis utitor ad omnes doloris affectiones. Hoc etiam ad uiscerum diurnas inflammationes sum usus.

Ceratum in multis approbatum, ad inflammationes pedum, discutiens citra dolorem. Vtere eo in uigoribus, & magis in declinationibus.

Olei anethini quincuncem, chamęmelini quincuncem, butyri quincuncem, adipis anserini quadrantem, farinę lupinorum sextantem & dimidium uncia. Liquefacito & agitando refrigerato, in mortariumque infundito, terito, & ouorum quinque crocea singulatim inijcito. Deinde & lupinorum farinam inspergito: unito, utitor.

Ceratum Iacobi Psychristę, ad feruentes pedum inflammationes.

Cerę albę sexuncem, rosacei recentis uncias quindecim, ouorum quinque candida, aquę septuncem & uncia dimidium. Ceratum ad prunas liquefacito, & diligenter agitando refrigerato, deinde in mortarium fundito, & adiectis singulatim ouorum cãdidis terito, postremum instillata sensim aqua omnia rite unito, & noua olla sufficiēter prælota excipito, & infusa aqua pura finito, quotidie aquam permutando.

Vnguenta, & acopa diuersa ad podagricos, articulorum dolores, ischiadicos, membris exolutos, & tremeñtes. Cap. xliiii

Vnguentum Asclepiadę. Facit podagricis, articulorum doloribus, & ad omnem neruorum per consensum affectionem. Vini ueteris sextarios duos, lanarum succidarum ex locis sub alis libram unam, spumę nitri libram unam. Lanas succidas in uino per triduum madescit, deinde ex-

F pressio

Iacobi Psys-
christę ce-
ratum

presso liquore, spumam nitri tenuissime tritam inijcito, dissoluitoq; ac olei libras duas addito, & conqassata in uitreum uas reponito, & utitor, quoti-
die agitans & ex eo illiniens locos affectos à somno, & ante balneum, &
post balneum, & à cœna.

Aliud unguentum ex sale: podagricos à tota affectione liberat.

Salis fordini, hoc est ipsius terræ libram unam, aluminis scissi libram unam,
fecis uini ueteris sextarium unum, floris lapidis asij trientem. Arida sigilla-
tim unūquodq; per se diligenter terito, deinde etiam fecem adijcito, simulq;
terito, & ad trita demum olei ueteris sextarios duos affundito, cōquassato,
reponito, ac utitor. Quidam etiam mellis libram unam addunt.

Aliud inidem, Asclepiadæ.

Thuris quadrantem, ammoniaci thymiamatis, zingiberis, piperis, salis for-
didi, floris lapidis asij, aluminis scissi, cuiusq; unciam unam, galbani unciam
unam, opopanax sesquunciam, terebinthinæ quadrantem, olei cyprini, lau-
rini, samfucini, & ceræ, singulorum sexuncem, aceti quantum satis est ad ea
quæ dissoluere oportet. Vtere in frigidioribus.

Aliud optimum. Spumam nitri albam cum oleo ueteri terito,
eoq; locos affricato, & miraberis.

Aliud, Asclepiadæ.

Vini ueteris sextarios tres, olei ueteris sextarios duos, uingulorum lauri li-
bram unam, foliorum tenerorum aut pilularum cupressi teneriorum li-
bram unam, ceræ libram unam, galbani unciam unam, sanguinis testudinis
terrestris satis largam copiam. Herbas in aceto macerato, deinde coquito,
& ad decoctum liquefacta reliqua addito ac unio, & sanguinem testudinis
recenti affuso, conqassato, & utitor.

Olei gleucini præparatio.

Oleum gleucinum dolores & lassitudines neruorum quàm maxime sedât.
Habet enim uim calefactoriam relaxantem: facit ad affectiones uulvæ, &
ad omnem neruorum per consensum affectionem. Facit ad rigores per cir-
cuitum repetentes, quotidianæ præsertim & quartanæ febris. Omni enim
acopo præstantius est. Maxime autem facit ad eos qui tum retro tum ante
distenduntur, opisthotonicos & emprosthotonicos Græcis appellatos, si
calidum puris lanis exceptum locis imponatur. Compositio eius hoc
modo habet. Olei omphacini primarij libras ccl., uini falceni ueteris
odorati sextarios quinquaginta italicos: musti ex uua aminæa, hoc est ad-
stringente alba sextarios italicos centum quinquaginta, olei libras duode-
cim, aspalathi libras quinque, spathæ unguentariæ quam palmam elatam
appellant libras quinque, hedydari hoc est seminis pelecini sesquilibram, arte-
misie libras duas & semissem, piperis sesquilibram, musci qui splanchnon
& hypnon & bryon Græcis appellatur libras duas & semissem, asari libras
& bryon duas & semissem, calsiæ nigre libras duas & semissem, carpopalsami, scenæ

*Spatha un-
guentaria, pal-
ma elate.
Musci, splan-
chnon, hypnō*

græci

graci, cuiusq; libras duas & semissem, foliorum myrti aridorum dextatē, rosmarini siccae libras quinq;, calami aromatici libras quinque, iunci odorati floris libras quinque, thuris libras quinque, crocomagmatis primarij libras quinq;, nardi celtici libras quinq;, zingiberis libras tres, quidam uero libram unam & quadrantem, aristolochia longe libram unam & quadrantem, sty racis pinguis libram unam & quadrantē, casia fulua libram unam & quadrantem, ladanij, seminis cardamomi, amomi, radices panacis, meliloti, samfuci, cuiusq; libram unam & quadrantem, bdellij sesquilibram, croci libram unam & bessē, costi librā unam & bessē, rosarum siccarum libram unam & quadrantem, opobalsami uascula parua quinque, hoc est bessē, hoc est heminae tertias partes duas, ungueti malabathrini libram unam. Arida contundito, & rariore cribro excutito, omniaq; uino ueteri macerato. Bdellium autem & ladanum premacerata in pila terito, & ad arida prius macerata ad ijcito. Sit autem uas unguentarium stanneum, quod diligenter opertum ad dies & noctes duas finito. Deinde uuum flaccidam, ita ut nihil rotis ei adhæreat accipito, ac pure exprimito, & ex acinis excolato, incip aliud uas stanneo illustratum ipsum mustum infundito. Sit autem magnū uas & capax: quo etiam ad ebullitionem musti locus amplius superfit. Deinde omnia in ueteri uino macerata, itemq; oleum ipsum in mustum inijcito, & spatha unguentaria bis per diem agitato. uerum spatham diligenter detergere oportet, ne quod adhæret ei acidum factum pharmacum corrumpat. Cæterum uas ipsum operculo & pallijs pluribus superne contegatur, & diligenter obligetur, supponaturq; uasi circulus ex quacunq; materia qui ipsum sustentet. Quum uero dies quindecim præterierint, amomum contusum iniiciatur, rursumq; ut dictum est agitetur. Trigesima autem die in diplomate coquito, atq; ubi ter uel quater efferbuerint ab igne ablatis statim opobalsamum indito, agitataq; & probe cōtecta tepesceri finito. Deinde totū oleum testa excipito: fecem autem, hoc est calida per sportulas primum manibus, postea etiā prælo exprimito, & abiectis rebus instar focni exiccatis, unguentum per se curato: malabathrinum uidelicet unguentum in diplomate in aqua calida prætepefactum ei adijcito, cum spatha agitato, & probe unito, & per biduum consistere finito, ac mundis testulis excipito: indeq; in uasa uitrea transferēs reponito. Quidam etiam ammoniaci thymiamatis libram unam & quadrantem adijciunt.

Acopon ex abiete apparatus.

Abietis semen maxime maturum circa Septembrem est mensē. Verum quocunq; anni tempore libuerit, ipsum semen oleo iniocere oportet: præstat tamen si prius contusum iniicias, & per dies octuaginta sinas. Nos autem, inquit Galenus, etiam ad tres & quatuor menses permisimus maccari: dein de liquore seminis expresso, ipsum quidem semen abiecimus, oleum uero per linteolum excolauimus. Sit autem oleum dukissimum, & ad libras olei

uiginti quinq; feminis modius italicus unus iniiciatur. Itaq; ubi oleum ut dictum est, excolaueris, ac semē segregaueris, terebinthinę chię bessem ei adijcito, & modice quo uniantur calefacto, excipito, ac utitor. Hoc pharmacum conuenientissimum est ad omnes spontaneas lassitudines, itemq; non spontaneas, & ad neruorum per consensum affectiones. Eo uti conuenit ad eos qui iuxta carnem atq; omnem corporis tumorem crudos humores congregarunt, siue concoctione siue disculsione opus habeant.

Acopon ex populo nigra.

Bonum est etiam acopum, quod ex populi nigrae floribus componitur. Estq; huiusmodi. Ad florum populi nigrae iam iam prodeuntium modium unum, olei dulcissimi librae uiginti iniiciuntur. Melius tamen fuerit, si flos moderate confusus oleo iniiciatur. Exponatur autem ad solem & singulis per biduum horis agitur, & in domum calidam deponatur. Post menses autem tres florem exprimito, ipsumq; abijcito. Oleum uero ut acrimoniam arcens, & lenissimum, & disculorum adseruato: ueluti id quod ex abietis semine est apparatus. At uero & terebinthinę sexuncem injicere licet, aut minus, aliquid quando item parum cerae. quidam enim maxime liquidorum medicaminum usu gaudent. quidam uero crassiorum. Hæc autem pharmaca crudos iuxta carnem & cutem humores discutere possunt, præsertim non ualde crassos, neq; uiscosos. Quod si quis confestim & necessitate moram omnem excludente apparare cogatur, semen ipsum in oleum conijcere oportet, & in diplomate coquere. Infundere autem ad oleum in decoquendo tantum aque aut uini quantum consumi potest, ut tamen quadruplum aut quintuplum oleum extet.

Oleum samfucinum.

Samfucinum etiam oleum eodem modo apparatus. Conuenit autem tempore hyberno, & in regione frigida, & constitutione aeris frigida. Potest & ad hoc ceræ & resinæ quippiam addi, si corporibus ex eo illitis, diutius ipsum adhærere uelis.

Acopon, unguentum Marciaton.

Unguentum Marciaton præparatum ad articularum morbos & corporis languores. Styracis primarij flauij trientem, medullæ ceruinæ sextantem, ceræ albissimæ quadrantem, mastiches puræ quadrantem, terebinthinę chię unctiam unam, hyssopi unctiam unam, opobalsami unctiam unam, olei omphacini, unguenti nardini, cuiusque sexuncem. Styracem in pila contunde, opobalsamo paulatim instillato. deinde liquefabilia liquefacto & percolato, eisq; styracem iniicito: quo liquefacto in mortarium omnia transferro, & pistillo donec quàm albissimum fiat terito, ac utitor.

Unguentum Orchestæ, siue Saltatoris, dolores remittens ac relaxans, ischiadicis ac arthriticis commodum, multo experimento cognitum. Hoc Saltator quum gymnasiarum consuetudinem reliquisset, & in articulare morbum incidisset, usus sanatus est. Cuius item periculum in multis alijs factum

etum est. Habet autem hoc modo. Althææ, seminis lini, fœni græci, rutæ, fabæ, singulorum libras duas. Hæc in aqua madefacta, & tertio die post cocta, ut quàm crassissimus eorū liquor fiat, percolato: & succi quidem excolati libras quatuor coniuncto, olei uero ueteris, medullæ ceruinæ, opobalsami, adipis anserini, unguenti nardini, singulorum libras duas, ceræ colorphonix, & resinæ pinus, singulorum libras tres, euphorbij, opopanacis, terebinthinæ, singulorum libram unam, castorij sexuncem, addito, ac uitior confidenter. Pentamæron, hoc est quinquimembre unguentum.

Styracis unciam unam, mastiches sextantem, ceræ albæ quadrantem, opobalsami trientem, unguenti nardini quincūcem. Ceram cum nardino super prunas liquefacito, styracem uero cum opobalsamo tērito, & ad ceratū unā cum mastiche iniuncto. Liquefactaq; percolato ac in mortario diligenter terito donec quàm albisima fiant. Vitor.

Decamæron, hoc est decumanum, Oribasij.

Spicæ nardi, folij euphorbij, piperis, costi, adarces, singulorū unciam unam, mastiches sesquunciam, opobalsami quadrātem, ceræ sexuncem, unguenti nardini libram unam. Alia uaria unguenta.

Vnguentum ad morbum articulare, & omnem neruorum per consensum affectionem, approbatum.

Styracis pinguis unciam unam, ladani pinguis unciam unam, mastiches unciam unam, ceræ sextantem, olei sicyonij quadrātem, adipis anserini libram unam. Vitor. Aliud mirabile.

Aphodeli radicem in superficie detasam accipito, & cōtusam cum oleo sufficiente coquito, percolato, & ad oleum modicum styracis coniuncto, quo equato sycomori succum addito, & unitis uitior. pedes autem si inde illeueris confestim dolorem sedabis.

Aliud, per multam experientiam constans, celerrime dolores mitigans. Adipis hircini recentis lib. i. r, heliotropij tria grana habentis foliorum uiridum libram unam, ouorum assatorū lutea quinq; rosacei optimi trientem. Vtere. Aliud. Olei dulcis sextarios quinq; fœni græci sextarios iii, radicum althææ maxime uiridium, uerbenacæ foliorum, singulorum fasciculum manipulem, galbani drach. iiii. fœnum græcum mundatum & lotum cum uerbenaca & althæa ad biduū in aqua madefacito. tertia uero die infusum oleum ad lentum ignem coquito, assidueq; agitato, ne fœnū græcum adharescat cacabo. postquā uero herbæ omnem liquorē emisserint, eas extrahito ac oleum percolato, seorsim uero cum modica olei parte galbanum præmollicum liquefacito, percolato, & ad reliquum oleum adiuncto. Vitor sensim & quàm plurimum inungendo. facit ad omnem neruorum per consensum affectionem, & dolores à frigore obortos.

Aliud ad idem. Medullæ è medio scellæ quadrantem, seminis cucumeris syluestris quadrantem, fœni græci repurgati sextarium italicum r,

F 3 anethi

anethi uiridis sexuncem, farnuci sextarium italicum 1, baccarum lauri sextarium 1, ferulae campanae lib. 1, ceræ lib. 1, bulborum cibatorum quadratæ, adipis porcini recentis lib. x, uini ueteris odorati sextarios vii. Omnia in uino ad triduum præmacerato, & deinde adipe liquefacto ad macerata infuso, omnia ad uini consumptionem coquito, exprimito, ac percolato: & reliquis ablatis, ceram ad adipem liquefacto ac ammisce: atque hoc ipso, ut præter opinionem præstanti utitor.

Smegma podagricum.

Ceræ sexuncem, colophoniz sexuncem, succi feminis lini trientem, adipis anserini sextantem, terebinthinæ quadrantem & unciz dimidium, olei omphacini dextantem, ammoniaci thymiamatis unciam unam, thuris quadrantem, lactis bubuli quadrantem & unciz dimidiū, candida ouorum nouem. Ammoniacū, & thus, cum lacte & succo feminis lini terito, deinde candida ouorū adijcito: liquefabilia autē liquefacito, & refrigerato, atq; ad trita ammisce, & pyxide lignea excipito. Utitor aut tum pro emplastro, tum pro unguento.

Vnguentum Castini, ad podagricos & arthriticos, eo lauari quendam uniuerso corpore langufactum & exolutum, unice tamen articulorum morbo prodest.

Adipis leonini unciam 1, adipis ursini lib. 1, adipis equini lib. 1, adipis uulpis lib. 1, castorei sextantem, medullæ taurinæ sexuncem, medullæ ceruinæ quadrantem, adipis struthocameli quadrantem, adipis phasiani saginati quadrantem, euphorbiæ sexuncem, opopanax trientem, mastiches lib. 1, styraeis trientem, myrtinæ trientem, thuris sexuncem, ammoniaci thymiamatis sexuncem, heliotropij tria grana habentis unc. 1, præoniæ sextantem, artemisinæ unc. 1, phylli sextantem, nardi celticæ sextantem, radicis althææ contusæ & cribratæ unciam unam, rutæ uiridis drachmas quatuor, radicis cucumeris syluestris unciam unam, hippuris herbæ unciam unam, aristolochiæ drachmas quatuor, aloes libram unam, sanguinis dracunculi libram unam, ceræ sexuncem, colophoniz sexuncem, unguenti nardini libras octo, olei suffumigabilis lib. 1, opobalsami septuncem. Arida quàm tenuissime trita in mortarium ad styracē cū opobalsamo & ruta tritū indito, unito, ac utitor sedulo.

Vnguentum ex hedera, ad arthriticos, ac omnem musculorum aut neruorum per consensum affectionem. Mirabiliter etiam ischiadicis prodest.

Fœni græci libram unam, baccarū lauri numero centum, pilularum cupressi numero xx, sabinæ librā unam, rosmarini lib. 1, olei dulcis ac ueteris libram unam, ceræ libram unam, resinæ pinus lib. 1, terebinthinæ sexuncem, succi hederæ trientem, aquæ sextarios tres. Herbas in crassiores partes contusas ad triduum in aqua macerato, deinde adiecto oleo sufficienter coquito, & percolato, liquefabilia q̄ liquefacta adfundito. Hederae autem succum cum aceto diluito. Refrigeratis deinde liquefactis omnia in mortarium diffundito, & quàm plurimum diligenter terito, reponito, ac utitor.

• Acopon

Acopon ad molestias ex laboribus & fatigationibus obortas, facit & ad nervorum per consensum affectiones, uehementer commodum est. Hoc utor, inquit Asclepiades ad fatigatos.

Sambucini sextarium 1, rosmarini contusi sextarii 1, sceni greci sextarium 1, cardamomi sextarii dimidium, sabinae sextarii dimidium, uini dulcis sextarios v 1, olei optimi sextarios 111, ceræ lib. 11. Arida in uinum coniecta per tri duum macerato, deinde adfuso oleo ad prunas assidue agitando coquito, & quum sæpe ebullierint percolato, ceramq; in eis eliquato, refrigerato, reposito ac utor quandoq; quidem immixto, aliquando uero cum quodam unguento diluto & liquefacto.

Aliud arthriticum, Asclepiadæ: pharmacum prolipei successus Baso inscribitur: quo usus quum antea multo tempore paralyticus fuisset, ab illa affectione liberatus conualuit.

Pharmacum
Basi

Olei melini, olei cyprini, cuiusq; trientem, olei ueteris sesquilibram, ceræ libram 1, terebinthinæ sex uncem, galbani quadrantem, manne trientem, opopanax sextantem, castorij sextantem, radices bryoniae trientem, æruginis sextantem, spumæ nitri albæ trientem, piperis sextantem, pyretri sextantem, euphorbij sextantem, adipis hedini sex uncem, acetum quantum satis est. Bryoniam & pyrettrum cum aceto coquito & percolato, eorū decocto arida terito, & reliqua liquefacta eis infundito ac unito. Vtitor aliquando immixto, aliquando liquefacto cum quopiam unguento.

Anthi uiride acopon, ad podagricos & arthricos multo experimento cognitum: utere & ad ischiadicis confidenter.

Anthi uiride
acopon

Phu sesquiunciam, mannæ sesquiunciam, hyssopi sesquiunciam, ammoniaci thymiamatis sextantem, aluminis scissi drach. v, æruginis drach. v, terebinthinæ quincuncem, spumæ nitri albæ trientem, opopanax drach. v, galbani drach. 11, medullæ ceruinæ drach. v, olei cyprini trientem, olei melini trientem, ceræ quincuncem, mellis quincuncem, olei ueteris lib. 1. Ac ruginem, ammonia cum, alumen, mannam, opopanax, cum modico aceto tere, eisq; liquefacta affunde, ac utere ad omnes cum oleo melino eliquato. In inueteratis uero affectionibus etiam adarces & euphorbij, cuiusq; unc. 1, adde.

Aliud eiusdem. Opopanax quadrantem & drach. 1111, terebinthinæ drach. 1111, ammoniaci thymiamatis scrupulos x v, hyssopi scrup. x v 111, æruginis scrup. x v 1, propolis scrup. x v, aluminis scissi, ladani, aristolochiæ rotundæ, lachrimæ hederae, singulorum scrup. v 1, spumæ argenti scrup. 111, salis ammoniaci scrup. 11, camphoræ unc. 1, colophonæ quadrantem, ceræ quadrantem, olei quadrantem: utere cum unguento quopiam dissoluto.

Aliud acopon unguentum ad paralyticos in principio.

Olei gleucini, cyprini, irini, laurini, singulorum lib. 1, ceræ trientem, terebinthinæ sextantem, hyssopi sextantem, castorij unc. 1, euphorbij drach. 1111, ex hoc tum affectæ partes, tum eæ quæ facile affectioni obnoxie sunt illinuntur.

F 4 Aliud

Aliud acopon ad coxendicum morbum inueteratum, distoriones & resolutiones paralyticas. Est autem, inquit Asclepiades, ualde efficax.

Olei ueteris libras duas, irini sexuncem, styracini sexuncem, baccarum lauri sexuncem, terebinthinæ, euphorbij, amomi, thymiamatis, castorij, piperis, opopanax, galbani, cuiusque sextanrem, medullæ ceruinæ trientem, & drachmas quatuor. Liquefabilia liquefacito, & ad arida affundito, unito, ac uti-
ror. Aliquando quidem immixta, quandoq; uero cum rosaceo aut alio quo-
piam unguento liquefacta. Arida uero uino terantur.

Vnguentum ad opisthotonicos, & quibus canino more
os distorquetur: ex melle apparatus.

Olei irini, rosacei, gleucini, cyprini, cuiusque sexuncem, ceræ quadrantem,
mellis unciam unam.

Aliud, ad eadem.

Ceræ drachmas quinquaginta, terebinthinæ drachmas uiginti quinque, hy-
sopi, medullæ ceruinæ, galbani, ammoniaci thymiamatis, spumæ niri albæ,
baccarum lauri aridarum, singulorum drachmas sex, olei ueteris sextarios
sex, uini cotulam unam. Vtitor.

Vnguentum ad resolutiones: ualde pulchrum.

Sphæritidis Sphæritidis, hoc est pilularum cupressi sextantem, marrubij sextantem, her-
bæ caucalidis quæ bulborum figuram habet sextantem, stercoreum cameli
unciam unam, ampeloprasi unciam unam, eryngij unciam unam, cyclamini
unciam unam, bituminis unciam unam, peucedani drachmas quatuor, ter-
ræ ampelidis unciam unam, seminis apij, cyperi, lapidis gagatæ, dictamni,
cuiusque unciam unam, sulphuris drachmas quatuor, lactis asinini sextan-
tem, unguenti fusini quadrantem, medullæ cameli quadrantem, adipis asini
ni unciam unam, pilorum ex cauda simiæ drachmas quatuor, olei ueteris
sextantem, aceti dodrantem. Apparatum reponito: usus uero tempore cum
unguento aliquo diluto utitor.

*Eras Capr
padox*

Acopon Eræ Cappadocis, ad resolutos, & in uniuersum
ad omnem dolorem musculorum & neruorum.

Ptisanæ uiridis, pulegij, cyperi, sceni græci, mercurialis, marrubij, rosmarini,
aristolochiæ, amygdalarum amararum repurgatarum, singulorum libram
unam, niri sextantem, iridis, terebinthinæ, baccarum lauri, radicis cucume-
ris syluestris, ammoniaci thymiamatis, sabina, cuiusque libras duas, myrti
uiridis libras tres, foliorum lauri aridorum libras tres, ueratri albi sexuncem,
ceræ libras duas, bdellij libras quatuor, uini congios quatuor, olei congios
tres. Quæ confusione opus habent crassas in partes contūdiro, ac modicam
aquam, qua confusa tantum humectentur, affundito: deinde uinum &
oleum adjcito, & per diem unum finito. Sequenti uero frequenter agitan-
do coquito ac percolato. Postremū ceram & terebinthinam addito, itemq;
bdellium in modico uino prius tritum.

Acopon

Acopon ex rubetis, quod omnem affectionem tollit.

Radicis cucumeris agrestis uiridis libras sex, olei dulcis libras sex, medullæ ceruinæ, terebinthinæ, ceræ, cuiusque sex uncem, ranas rubetas appellatas uiuas numero sex. rubetas traiecto per pedis plantam filo in oleum demissas donec flaccescant coquimus: deinde extractis per plantas filo traiectis ranis, syluestris cucumeris radicem uiridem concisam injicimus, atq; donec uires suas in oleum transmittat coquimus & excolamus: postremum liquefacta, itidem percolata, ad oleum addimus, & in uitro reponimus. Vtere mane & uespere ad podagricos, arthricos, ischiadicos & resolutos. Per huius usum nouimus homines à podagra & chiragra toto corpore distortos post lauacrum in tantum conualuisse, ut citra omnem offensionem obambulant. Quandoq; apparauimus, inquit Asclepiades, hoc pharmacum additis ad hanc descriptionem samfuci libra una, unguenti crocini libra una, opobalsami quadrante, sanguine testudinum numero decem.

Aliud, ad podagram & articulare morbum mirabile.

Facit & ad diurnum capitis dolorem, materiam ad superficiem ducens, & ad frontem ac sinciput.

Canicula paruum probe saginata uiuam, & mustelam uiuam in olei sextarios nouem, ac butyri libras tres, conficito: atq; donec uicta fiant animalia coquito: deinde in percolatū oleum calidum pedes aut manus per totam diem imposito. Galenus autem ait. Quidam uulpeculas & hyenas oleo incoquunt, eoq; articularum morbos curant: atque alij quidem ipsas uiuas in maximum lebetem injiciunt: alij uero mortuas, ac deinde unā cum oleo quā diutissime coquunt. Solia deinde ac urnas ex oleo calido explent, atque deinde arthricos inscindere, ac multo tempore in eo morari iubent. Porro oleum hoc maxime discussorium redditur, adeo ut etiam ad superficiem extrahat ea quæ in profundo corporum continentur, quæ ex te magna commoditas consequitur. Quin & herinacei terrestres uiui oleo incocti ipsū discussorium reddunt. Etenim oleum hoc dolores sedat, tum affectis articulis in ipsum demissis, tum etiam ipsidem ex eo illitis.

Alia unguenta podagrica.

Terram nigram quæ præsertim in lenticula reperitur, aut etiam aliam nigram cum aceto terito, ac illinito. Sedat dolores & inflammationes etiam in his qui multa prius experti nihil profecerunt.

Aliud. Cypri folia uiridia trita in pastillos redigito, eosq; usu expetente cum aceto terito ac illinito.

Aliud. Croci unciam unam, salis usti unciam unam, spumas nitri numero decem, oui luteū unius: in spinæ decocto ad tertias redacto, terito.

Aliud. Vitrum in aceto probe tritum confidenter illinito.

Aliud. Alumen aceto tritum illinito.

Aliud, quod

Aliud, quod ad genuū fluxionē solū profuit, multis antea frustra ad moris. Marmor, hoc est crustulam non ustam, contusam, & cum rosaceo tritam illinito. Ego autem scobem & ramenta marmoris lota & rescicata in promptu habui. Vfu uero expetente cum rosaceo trita adhibui.

Aliud, ualde bonum.

Tecolithi, glaucij, myrrhæ, cuiusq; unciam unam, aloes drachmas quatuor. Terito, ac siccum adseruato. Vfu uero exigente, luteum oui & uinum austerrum ammisceto ac illinito, & si circumtendat cum solo uino adhibeto.

Aliud. Aëxiten lapidem cum ouo ac modico rosaceo illinito.

Aliud. Vrticæ semen & hirundinis nidum cum sapa terito ac illinito.

Aliud mirabile, pro diuitibus.

Mannam aqua macerato, deinde tritam illinito, & miraberis.

Aliud, multa experientia cognitum, inueterata etiam affectioni accommodatum.

Stercus ciconiæ Stercoris ciconiæ quadrantem, cum pari axungia tritam illinito. Vtere, inquit, neq; cuiquam patefacito. Multos enim seruauit. Aliud.

Caninum stercus album cum aqua calida tritum, atq; ita tepesactū quā crassissime illinito, & folia oleris alicuius supra illitionem imponito.

Ad durities in artubus instar toforum. Cap. XLV

Pharmacum Philagrii ad tofos

Est & hoc optimum pharmacum ad durities artuum in tofos coactas. Sunt præterea & alia quædam, maxime uero Galenicum, quod ex casseo componitur. Ac nostrum itidem ex huiusmodi rebus apparatus, inquit Philagrius. Radicis peucedani drachmas duas, ammoniaci thymiamatis drachmas duas, myrrhæ drachmas xxiii , aristolochiæ drachmas sex, pumicis drachmas sex, castorij drachmas quatuor, lanarum succidarum ustarum drachmas octo, floris lapidis asij drachmas sex, si uero non adsit, salis ammoniaci usti drachmas sex, propolis teneræ drachmas sedecim, stercoreis canini sicci drachmas sex, uisci drachmas sedecim, æruginis drachmas sedecim, squamæ æris drachmas sedecim, atramenti sutorij drachmas sex, misyos drachmas sex, ceræ drachmas centum, resinæ pinus drachmas cl , picis drachmas cl , olei ueteris quantum sufficit, aceti quod satis est. Hoc quidem igitur nostrum pharmacum spissitudine auctum, & imminutum ac liquefactum prout probe habere uidebitur, iuxta curadorum corporum differentias, extrahit ac efficit tofos in artubus coactos.

Aliud Galenicum, quod omnibus ferè corporibus adhibitum congruit. Est autem tale.

Pharmacum Galeni ex casseo

Caseus bubulus uetustissimus, adeo ut ob æritudinem edi non possit, cum porcine carnis inueteratæ ac salis decocto teritur, & probe emollitus ad durities artuum imponitur. Est & aliud ab eodem compositum. Pinguedinis perne porcine ueteris libram unam, casei caprini uetustissimi libr. i , adipis taurini libram i , apochymatis hoc est resinæ cum cera ex nauigijs derasæ lique-

liquefactæ libram unam, medullæ cervinæ bessem, hyssopi quadrantem, cyprini sexuncem, vini ægyptij heminæ dimidium. Liquefabilia liquefacito, & reliqua ammisce.

Aliter apparatus emplastrum ex perna.

Iusculi pernæ veteris porcinae libram unam, hyssopi trientem, ammoniaci thymiamatis libram unam, medullæ cervinæ septuncem, adipis taurini libram unam, ceræ sexuncem, apochymatis è naubus derafi sesquilibræ, cyprini libram unam, casei caprini veteris libram unam, opopanax unciam unam.

Aliud, ad tofos artuum.

Granum cnidium desquamatum internum cum myrrha & aceto terito ac illinito, usque ad excessum mirabile est.

Aliud, ad durities artuum muliebrum, & eorum qui teneras carnes habent, experimento cognitum.

Cadmiam quàm tenuissime tritam ac myrteo cerato exceptam imponito.

Aliud. Spumam nitri cum oleo veteri & modico croco ac aceto tritam illinito. Præstat tamen si nitri spuma cum croco & aceto teratur, & cum cerato liquido illinatur.

Aliud, ad tofos pedum, quod contentum pertumpit & euacuat eadem ferme hora, sanatus idem ut ne cicatrix quidem relinquatur.

Mala mandragoræ accipito, semenque euacuato, ac tenuissimam squamam eis obductam detrahit, atque carnem ipsam probe terito. Et ceratum ex adipe sullo & cera factum adfundito, unito, ac utor. Hæc tria pari pondere sumuntur, aut adipis plus additur. Vtere, experimento constat.

Aliud. Calcem uiuam, & nitrum, pari pondere axungia excipito ac imponito. Aliud, Dioscoridis. Ammoniacum cum pice arida ad ignem emollitum imponito. Aliud. Styracem cum ieiuni hominis salina emollitum imponito, hoc est manducando attritum adhibeto. Facit & sesamum non lotum tritum impositum.

De medicamentis purgatiuis ad articulare morbum accommodatis.

Cap. XLVI

Quum plurima sint & uaria medicamenta purgantia à nobis in tertio huius tractationis sermone tradita: inde sane repetere oportet quod cuique sit accommodatum. Proprie tamen in podagricis & morbo articuli hæc exhibentur.

Vniuersale ex hermodactylis, quo assidue utor.

Hermodactyli sici recentis unciam unam, anisi, cumini, piperis communis, croci, piperis longi, seminis cnici interni cuiusque scrupulos duos, myrrhæ drachmam unam, euphorbij recentis scrupulos IIII, mastiches scrup. VI, cassiæ scrupulum I, moschi siliquam unam. Dantur ex eo scrupuli quatuor cum aqua mulla, confestim minuit dolores. Quandoquidè autem huiusce-

modi

modi medicamenta fortem euacuationem facere non possunt : & quod ex ipsis intus relinquitur, condensatum & resiccatum tofos in artubus generare consuevit : conuenit usus tempore ad singulos exhibitionis modos scammonia: siliquas tres addere. In pituitosis uero lathyridas numero quinque, & agarici scrupulum unum. Si uero humoribus redundet æger, post dolores sublatos cum rursus cum hiera aut alio forti purgatiuo, temperamento corporis apto, purgato.

Aliud purgatiuum podagricum, ad dolore affectos prædaram. Calsiæ scrupulum unum, euphorbiæ sesquiscrupulum, isij hoc est chamæleonis nigri scrupulos quatuor, radicis alypiadis hoc est chamelææ scrupulos quatuor, radicis pæoniæ scrupulos quatuor, anisi, zingiberis, cumini, mastiches, floris cnic, piperis, cuiusque scrupulos octo, hermodactyli sextantem. Dantur ex eo scrupuli quatuor, cum uino mulso.

Antidotus purgatoria ex betonica finiens febrem. Facit summe ad podagricos, ter in mense data : facit ad elephanticos & hydropicos, maxime aqua subter cutem laborantes. Est ex ualde laudatis.

Comæ absinthij drachmas x x l i i i , betonicae drachmas x x l i i i , seminis rutæ syluestris drachmas sedecim, centaureæ minoris drachmas sedecim, calsiæ drach. x x l i i i , corticis ueratri nigri drachmas octo, contundito, cribrato, ac cochlearis unius mensura dato ex aqua calida, animaduersione habita ne pharmacum ultra modum purget. Est enim inexuperabile. Apud alios etiam laudatum reperi, si gentianæ, & chamæpitios, ac aristolochiæ, cuiusque drachmæ octo addantur, chamædryos item drachmæ uiginti quatuor. Omnia, inquit, hæc melle excipio, indeq; ad summum cochlearium unum exhibeo.

Antidoti podagricæ.

Cap. XLVII

Pharmaque podagricis & morbo articulari correptis per os exhibentur, plurima quidem sunt, & uaria ac diuersa. Cognita itaque à me ipsorum multitudine, tum eo quod tetrapharmacū à quatuor rebus ipsum constitutibus appellatur, tum quod ex hyperico constat, itemq; quod ex gentiana paratur, & similibus, quibus pro consuetudine medici ad simpliciter podagricos utuntur, ipse sane proprium pharmacum composui, inquit Philagrius, quale iudicauī sufficienter exalfacere posse, non tamen expers facultatis moderate humectandi, & attenuandi crassos ac uiscosos humores, & quod præclare omnino potest excretionum uias dilatare, unā cum hoc quod uim subducendæ alui & mouendæ urinæ complectitur. Quin & naturales actiones excitat, & transpirationem insensilem ac obscuram procurat. Compositio autem hæc est. Radicis pæoniæ recentis drachmam unam, croci alij drachmas quatuor, rhei pontici drachmas quatuor, calaminthæ montanæ, comæ saluæ, cacuminum stœchadis, seminis thlaspeos, epithymi

Antidotus
Philagrii

epithymi, centaureæ maioris radicis, cuiusq; drach. IIII. cetaureæ minoris succi, drach. IIII. succum accipito quum in summo uigore herba est ac florib. prægnâs. iridis illyricæ, seminis rutæ syluestris, piperis longi, seminis anethi, cuiusq; drach. IIII. ligustici, seminis aprij, petroselinî macedonici, seselis massiliensis incorrupti, origani, cacuminum thymi, seminis trifolij bitumen olen-
cis, seminis cardamomi medulla priuati, seminis dauci, piperis albi, cuiusque drach. III. mei athamantici drach. II. asari drach. II. spicæ nardi, adianti, calisæ polypodij, thuris albi, galbani puri, terebinthinæ chiæ, bdellij scythici nigri, pinguis, ac resinosi, ammoniaci thymiamatis, cuiusq; drach. VI. radicis sym-
phyti recentis siccæ, sabina, radicis rubiæ, helenij, agryci, herbæ scordij, se-
minis paliuri, farxiphagi, betonicæ, radicis cyclamini siccæ, seminis uiticis to-
sti, cuiusq; drach. VIII. mastiches chiæ, radicis bryoniæ recentis siccæ, terræ
lemniæ quæ sphragis appellatur, opobalsami, cuiusq; drach. XVI. succi pe-
ucedani, drach. XVI. qui si nō adsit, coniiciendæ sagapeni drach. VIII. & radi-
cis peucedani recentis siccæ drach. XVI. pastilli theriaci, drach. XVI. habent
autem pastilli carium partes duas, panis partem unam. cōpositio autem
ipsorum in sermone de theriaca dicta est. styracis si quidem adsit calamitæ,
si uero non, flauus & pinguis drach. XXIII. niger enim ut uitiosus reproban-
dus est. aristolochiæ rotundæ nō rugosæ & plenæ drach. L. osium ceruino-
rum aut bubulorum ex furis recentium, & ut probe conteri queat, ustorum
drach. L. mellis atici despumati quantum satis est, quo ad bonam edegma-
tis compagem pharmacum reducatur. Arida omnia contundito & cribra-
to: mastichem autem & thus unumquodq; per se sensim, ne in latas crustu-
las abeant, terito & cribrato, deinde prædictum pondus ex eis expendito,
& reliquis aridis tritis ammisceto. Bdellium autem & ammoniacū ac galba-
num & peucedani succum aut sagapeni, in mortarium coniecta tundito: de
inde ad ignem emollito, & postea cum modico melle liquefacito, & in pila
optime terito. Similiter autem & terebinthinam per se cum modico melle
dissolutam ad reliqua in pilam coniicito. Styracem uero in mortario con-
stanter tundito, opobalsamo paulatim ad eum infuso ac melle calido, dein-
de similiter in pila terito. Expedi etiam cum modico melle styracem lique-
facere ac deinde terere. Cæterum ubi hæc sufficienter fuerint unita & disso-
luta, paulatim arida trita addito, Melle itidem sensim affuso. Ad finem uero
centaureæ succum per se cum opobalsamo terito ac reliquis unito. His uero
omnibus probe cōmissis, mellis despumati tantum addatur quantum suffe-
cerit ad pharmacum delingibile futurum, & quo per dulcorem ægro com-
mēdetur. Quare si gustu pharmacum iudicaueris, nihil peccaris etiam si pi-
peris augeas modum. Noui namq; ego ipse quendam qui eo usus plus sibi
de pipere ammiscere iussit, itaq; ammiscui saepe tantū ex ipso post reliquo-
rum omnium mixturam, quantum quisq; pro gustus sui modo expetiuit.
Satis uero manifestum est quod quando quidem præseruare aliquem à po-

*Sagapenum
& peucedano*

*Piperis usus
quando au-
gendus*

G dagrico

dagrico malo uelimus, tunc sanè plurimum piperis iniicere non ab re est, & præsertim in hyeme, & si humores frigidi fuerint ac diuturni. Porro centaureæ succus tempore ueris quum in uigore herba est ac florem fert, ex ea uiridi ac contusa exprimitur, deinde percolatus, usq; ad mellis solidioris spissitudinem in sole resiccatur. Cæterum in compositione pharmaci, si is qui eo usus est amaris delectetur, amplius quàm drachmas III. ex succo centaureæ ammiscere expedit, atq; id maxime si distortionem dissoluere uelimus. si uero æger amara auerset, quatuor omnino succi drachmas iniicere oportet. Ex hac uero antidoto ad edegmatis cõpagem redacta ad summum cochlearium unum exhibetur. Dupliciter insuper pharmacum hoc apparatus. Vno quidem modo pastillis theriacis ut dictum est ammixtis, itemq; ossibus ustis. Alio autem modo citra pastillorum & ossium admixtionem præparatur. Licet etiam si quis uelit post sufficientem mellis mixturam, mel ipsum in duas ex æquo partes diuidere, Deinde ad unam partem, dimidium præscripti ponderis tum pastillorum theriacorum, tum ossium ustorum infarcire, Est autem dimidia pars pastillorum theriacorũ drachmæ VIII. Ossium uero ustorum dimidia pars est drach. xxv. Quando quidem uero pastillos theriacos impossibile est per se contundi, si non cum alijs aridis tundantur, oportet eos quantum possibile est in mortario tunde re, ac modico uino ueteri dulci madefacere, deinde in pila terere ac cum largo melle dissoluere, atq; demum ad reliquam mixturam diligenter coaptare. Cæterum quum humectare oportet & mollire, attenuareq; & crassa dissocare, repurgare item ac euacuare infartos humores, itemq; uias dilatare, nihil ex pastillis theriacis, neq; ex ossium cinere ammiscere oportet. Uiperarum enim caro quàm celerime ad cutem ac superficiẽ digeri ac distribui solet. Quapropter ubi rectementorum copia adfuerit, & uia fuerint obturata, minime tuto uiperarum caro exhibetur: sed postea quum coniectauerimus humores attenuatos esse, & dilatatas uias. Ossium uero substantia facultatem habet consumendi ac resiccandi, adeo ut etiam sola assidue & oportune exhibita inueteratum articulare morbum curet. Ut uero ne quid ex humoribus resiccet ac lapidescat, incurabileq; aut ægre medicabile red datur, tempore præseruationis eam minime miscebimus, sed postea si ita uidebitur. Consumit enim & resiccat humores in ipsis articulorum iuncturis relictos. Forinsecus etiam quando discutere animus est, pharmacũ hoc oleo ueteri aut sicyonio dilutũ maxime profuit, maxime si citra ossium ad ditionem est apparatus. Tunc enim non modo discussoriam, sed etiam co actoriam facultatem acquirit. Quare eis qui non discussione solum, sed & exterarum corporis partium corroboratione opus habent, commodissime hoc modo adhibetur. Hoc pharmaco si & arthriticis & podagricis medebe ris, minime poenitearis. Hepaticos item ex obturatiõe affectos itemq; splenicos curabis, & à uipera morsos & qui uenenũ hauerunt, & comitiali morbo appre

Ossium cerui
corum & bu
bulorum usus

bo apprehensos si eo oportune utaris, Quin & aliorū morborū per ipsum curationē fieri reperias sufficientē. de quib. sermonē producere minime oportet. Theriaca item ex viperis, quæ Andromacho inscripta est, de qua plurima tradidit Galenus, utiliter exhibetur frigidioribus & magis humectis corporibus, forinsecus etiam commode illinitur cum oleo ueteri aut sicyonio dissoluta ut dictum est. Sales quoq; Theriaci, & ex generiana pastillus, & qui ex hyperico constat: & similia, his qui ex multo & crasso fluxu ægrotāt utilia existunt. Verum his qui ex biliola fluxione afficiuntur, & ut simpliciter dicam omnibus calidiori temperamento præditis hæc ipsa nocentissima sunt, & quod supra relatum est nostrum pharmacum. Ex horum enim pharmacorū potu non solum nihil opis ferunt hi qui calidiori temperatura præditi sunt, sed & resolutionibus immedicabilibus apprehenduntur, sæpe nimium resiccati, & in uitiosos humores dilabuntur qui eos erodunt, & in quibus aliquādo pessime intereūt. Porro in huiusmodi pharmacorum usu etiam raritatem & densitatē curandi corporis respicere oportet. Ampliusq; ætatem, & anni tempus, & regionem. Ad hæc itaq; respectu habito minus aut plus de eo dabis, Neq; uero minus & ad magnitudinem aut paruitatem corporis respiciendum.

De Viperarum esu.

Viperarum esus omnibus podagricis & arthriticis plurimum commoditatis affert, quemadmodum etiam anhelosis, & elephantiasi correptis, Exigit enim per cutē oīa redundātia recemēta, siue calida siue frigida fuerint, quæ morbi ipsius sunt causa. Oportet aut crassa & uiscosa ex ipsis prius attenuare ac euacuare: quod ubi factum est, reliqua facile per uiperarum esum euacuantur, nimirum ad cutem delata atq; exclusa. Quapropter etiā in sole ipsarum ferarum comestione facere iubet, utpote quod inde iuuentur, atq; uic caloris humorum delatio foras feratur: curandū tamen ne caput probe contingere ab æstu negligamus. Cæterū ex uisera ipsa tum caput tum caudam excoriare atq; amputare oportet, itemq; interanea omnia abijcere, ac ex tribus aquis lauare, deinde cum aqua & anetho maxime uiridi, & modi congruentis oleo coquere, & post sufficientem coctionē congruenti sale condire, ac uiperam ueluti anguillam comedendam exhibere. Porro quidam ex harum comestione plurimum exudant, & pediculorū copiam generant, Omnes tamen qui eas comederunt maxime se alleuatos sentiunt. Quapropter his qui corpus recementis exundans habent etiam bis ac ter in anno exhibere conducit, Bis quidem ueris tempore, Semel autem in autumnō. Quod si uero sint quibus corpus per insensibilem & obscuram transpirationem, aut etiam per sudores naturales euacuetur, his omnino uiperarum esu interdicemus. Periculosa enim sit huiusmodi ipsarum comestio propter immodicam per cutem exhalationem. Dicemus autem ex ordine & de alijs antidotis.

Theriace
Andromachi

Quanti i calidior
mors calida
munda.

Antidotus ex quatuor rebus constans.

Tetraphar-
macum My-
sterium Tetrapharmacum igitur ex quatuor rebus apparatus & à quibusdā My-
sterium appellatum, ex gentiana componitur & aristolochia, baccis lauri,
& myrrha, æquali pondere coniectis. Datur autem singulis diebus ex ea
cochliarij dimidium ex aqua calida ad præseruationem. Prodest pituito-
sis, Biliosos autem lædit.

Antidotus ex hyperico.

Antidotus ex hyperico à quibusdā hoc modo descripta est. Antidotus sa-
nans podagras, coxendicum morbum, & ut in uniuersum dicam, omnes iun-
cturarum & articularum morbis implicatos per annum potata. Firmat sto-
machum, & uisum acutiorē reddit, reliquosq; item sensus clariore & illu-
stiores facit euacuans leniter per urinā: unde etiam neq; aliud ullum mem-
brum offensionem sensit. Neq; enim materiam ex affectis locis ad aliam
corporis regionem depellit, quemadmodum epithemata forinsecus contra
hientia & cohibentia facere solent: sed causas morborū tum per uesicā tum
per alui locos expellit, atq; uniuersum corpus sanius reddit. Quare etiam co-
initiali correptis morbo auxiliatur in potu. Alios item à diuturnis & uehe-
menter grauib; capitis doloribus liberauit, qui etiam de sanitate sua iam
desperauerant. Splenem uero & hepar in scirrhum indurata moderatur ac
demulcet. Articularem autem morbum adeo efficaciter sanat, ut etiam du-
ricies instar toforum in articulis quibusdam per uim morbi coactas dissol-
uat. Compositio autem hoc modo habet. Trixaginis, dodrantem, ceru-
tauræ, bellæ, aristolochiæ rotundæ septuncem, radicis gētiænæ sexuncem,
comæ hyperici quincuncem, petroselinī trientem, mei athamātiæ quadrā-
tem, phu pontici sextantem, agarici sextantem. Mellis despumati lib. iij.
Hoc aut modo parato. Vnūquodq; p se cōtundito & cribrato: deinde pon-
derata simul misce, ac rursus tundiro quo accurata permixtio fiat. Deinde
melli despumato ammisce, ac pastillos formato pondere drachmę i. atq;
ex eis unum pro uice exhibeto. Vfus eius est circa tertiam horam diei ubi
uenter onus suum pro cōsuetudine deposuit: pharmacum uero ipsum cum
aqua calidā sesquicyatho liquefacito. Oportet autē eum qui bibit: si nihil
prohibeat: deambulare, quo ex motu cunctis pharmacum inferna cōtingat.
Porro pharmacū hoc aliā quidem præclare efficax est, utpote ex fortibus
simplicibus compositum, Amplius autem efficacius redditur per aristolo-
chiam quæ natura sua articularibus morbis auxiliari solet, & duris corpori-
bus imprimis prodest. Ex canceris autem pharmacum etiam mollibus cor-
poribus cōducit. Habet autem Antidoti ex canceris compositio hoc modo.
Cancrorum magnorum uiuorum uistorum in aereo uase, trientem, gentianę
incorruptæ quincuncem. Thuris integri & indiuidui albi, unc. i. Datur in
de cochlearium unum. Ad cancerorum uero exustionem ligna uitis adu-
runtur.

Pharmacum

Pharmacum ex fluuiialibus cancris uſtis.

Deſcribam porro & aliud pharmacum corporibus rectementis abundanti-
bus & mollibus cōducens, Eſt autem id quod à rabido cane morſis datur,
cuius compoſitionem in ſermone de rabidi canis morſu tradidimus, huius
inquam operis ſexto. Adieci autem ego, inquit Philagrius, ad huius phar-
maci apparatus, etiam petroſelini drach. V. III. ut plurimum uero X. quo u-
rinæ ciendæ uim acquirat. & multos ſane arthriticos iuuat, præſertim quibus
tenerum & album corpus fuit, mediocriſ myſtri meſura ex eo data aliquan-
do ex aqua ſola, aliquando ex aqua mulſa. Quin & melle deſpumato ſæpe
ipſum excepi, quo ualidum & citra tranſpirationem adſeruarem, Deinde
uero ueluti prædictum eſt bibendum exhibui.

Antidotus ex centaureis.

Antidotus podagrica ex duobus centaureæ generibus eſt ex uehementer
laudatis & præter opinionem auxiliantibus, quod ipſum experientia teſta-
tur. Nam multos eius uſu ſeruatos noui. Eſt enim adeo ſalutaris podagricis
ut quosdam per XV. annos podagra correptos, eius uſus ad iter pedibus ſa-
ciendū præparauerit. Eſt autem ſtomacho grata, aluo conferens, & urinam
ciens. Habet autem hoc modo. Centaureæ minoris comæ, centaureæ ma-
ioris radicis, trixaginis, gentianæ, ariſtolochiæ rotundæ, ſingulorum æquale
pondus, puta lib. I. conuulſito & cribrato, & drach. I. præbeto per dies XL
ex aqua calida. Inſequentibus autem ex ordine anni diebus CCCXXV
drachmæ dimidium eodem modo præbe.

Alia antidotus podagrica uſu cognita.

Aniſi, cumini æthiopici, piperis cois, piperis longi, ſeminis urticæ interioris
cuiuſq; drach. II. euphorbij drach. III. maſtiches drach. VI. zingiberis,
drach. III. moſchi, ſiliquam unam. caudæ ſcinci unius extremum. Mellis
quantum ſatis eſt. Datur nucis auellanae magnitudine ex aqua mulſa. Hac
amicus quiſpiam uſus, bis in hebdomade ex ipſa bibendum præbuit, & aſſe-
ctos locos ex uiridi unguento Antho inſcripto cum roſacco aut melino ſin-
gulis diebus illeuit, multosq; ſeruauit.

Meliſtus

Qui podagrica lauandi ſint & quomodo. Cap. XLVIII.

Manifeſtum quidem exiſtimo quod poſt inflammationum remiſſio-
nem omnibus podagricis Balneum commodiſſimum exiſtit. Quan-
doq; autem & in uigore utiliter adhibetur, ſi æger prurigine aut uigiſis ue-
xetur, aut aliâs labore ſit fatigatus. Lauare autem oportet tempore remiſſio-
nis, ita ut ſpongiâs aceto & ſale permixtis madefactas locis affectis circun-
ponamus, ut à fluxione immunes permaneant. Amplius autem lincis ſiccis
& plurimo nitro totum corpus perfricare, & ut acri diutius immorentur iu-
bere, & moderate non ſolum calidam ſed frigidam adhibere. Vtile autem
eſt balneum natura ſiccioribus, & gracilibus, & colore nigrioribus, & qui à
tumore in totum ſunt liberati. In huiusmodi enim affecta particula non ipſi

*Balneum qui-
bus cōmodum*

G 3 tumefcit

tumescit adeo magno tumore excitato, uerum distrahis: uelut à cane apprehensas: in profundo sitas corporis partes aiunt, & inopinabili tensione distendi. Et inhorrescunt saepe, pellicula quæ os ambit à fluxione salsa aut acri & tenui ualde ac erodente uellicata. Hi à balneis opem ferunt, quapropter non semel tantum sed iterum atque iterum eos lauare oportet, & in aere per omnia moderato, citra aliquam pinguedinem adhibitam immorari, hoc enim modo magis euacuabuntur. Deinde oleo dulci cum aqua conquassato illitos in aquam calidam demittere, & in eo aliquandiu morari præcipere. In frigidam uero minime demittantur, nisi immodici caloris sensus infestet. Vt plurimum uero tepida aut lactei temperamenti aqua perfundatur in prima balnei domo. Si uero cum tumore quodam post euacuationes suborto aliqui dolore uexentur, conueniet in aere balnei reliquum corpus per siccā lineā usque ad rubefactionem perficere. Utendum autē & exterioris smeigmatis ex adarce, nitro, pipere, euphorbio, staphide agrestis, equali pondere coniectis, apparatis. Atque his quidem reliquum corpus contente defricatum excitetur. Pedes uero eorum muria moderate perfundendi sunt, & in calida aqua non morandum, frigida uero ne contingenda quidem. Quod si balneum non adfit, eos qui ab acrioribus fluxionibus uellicantur, aqua dulcissima calida perfusos fouere oportet, & totum corpus ex oleo chamæmelino in ieiunio illinire. Alios uero temperamento non calidos, & qui tamen tumorem habeant post euacuationes relictum, si balneum non adfit, cucurbitulis admotis curabimus, initio a lumbis factis, sursum usque ad scapulas progrediendo, fricabimus etiam per siccā lintheolā & per exterioria smeigmata iam dicta. A talibus enim hi tum in balneo, tum citra balneum opem sentiunt, Quale & hoc est ex profundo humores euocans ac transferens, quod metalyncriticon Græci uocant. Eo itaque in balneo utantur, aut si balneum non admittant, post exercitia ex eo defricentur, deinde spongiis extergatur id quod ex hac arida insperione corporibus adhæret. Compositio eius hæc est. Nitri rubei lib. i. sinapis sicci lib. ii. sabinae libras ii. ueratri albi lib. i. sulphuris uiui lib. i.

*Metalsyncriticon
smeigma
siccum*

Aliud Andreae comitis. Nitri, ueratri nigri, piperis, æqualibus partibus utere. Præter opinionem autē eis conducit Siccum Magnum ipsius affectis locis in balneo inspersum. Estque hoc. Recrementi siue scorie ferri, spumæ nitri albae, cuiusque æquales partes misce, & odoris gratia parum phylli & costi adde.

*Siccum
Magnum*

Siccum quod psilothro podagricorum inspergitur.

Mastiches, thuris, lapidis asini, pumicis asinati, alcyonij, staphidis agrestis, cymolæ, ueratri albi, samuci, spumæ argenti, amyli, careophylli, spicæ nardi, cyperi, floris iunci odorati, buglossi, singulorum lib. i. auripigmenti unc. x. sandarachæ unc. x. saponis quantum satis est. Prædicta omnia, excepto auripigmento, sandaracha & sapone, cōtundito, cribrato, & sicca in promptu habeto

Careophyllon

habeto. Vfus vero tempore calcis viuæ unc. i. in oryza aut pisanæ succo
dissoluito, & auripigmenti unc. i. sandarachæ unc. i. saponis drach. iiii. & præ
dicti sicci cochlearia ii. magna, omnia quàm tenuissime trita inspergito, ac
unito: eoq; pedes aut etiã alios locos fluxione infestatos illinito. Caterum
qui hoc sicco inspergimine utitur hoc modo dietam suã instituant. Thoth
hoc est septembri, lac & edant & bibant. Phaophi hoc est Octobri, allia
edant. Athyr hoc est nouembri, in totum nõ lauent. Choiac, hoc est decem
bri, brassicam ne edât. Tybi. i. Ianuario, Mane meracum bibant. Mechir id
est Februario, betam ne edant. Phamenoth hoc est Martio, dulcia tum in
cibo, tum in potu sumant. Pharmuthi id est Aprili, raphanum ne gustent.
Pachon, id est Maio, polypū ne edant. Pauni hoc est Iunio, mane frigidam
aquam sumant. Epiphi hoc est Iulio, à uenereis abstineant. Mefori id est
Augusto, Maluam ne edant.

Siccum Maioriani.

Aluminis, sextantem. pumicis unc. i. terito & in vitro reposito. Vsu uero ex
petente, uino adstringente locos prælauato, & quodammodo extergito, ac
siccum ipsum inspergito, tenerisq; manibus affricato, & sicari finito. Rur
susq; idem per diem octies facito, & toties similiter si possibile sit in nocte.
Et uidebis tumores quàm celerrime discussos & resolutos. Ego utriusq; &
aluminis & pumicis æquale pondus conieci, & magis sane successit.

Finis XII. sermonis

G 4

AETII ANTIOCHENI MEDICI DE

NOXIORVM ANIMALIVM MORSV, ET DE BESTIIS
uirus eiulantibus. Et de Elephantiasi, pruritu, scabie, alpho, le-
pra, leuce. Et de antidotis multæ utilitatis Sermo
tertiusdecimus

Iano Cornario Zuiccauicn. Interprete.

QV AE in XIII Aetij sermone contineantur.

De his qui ab homine morfi sunt.	Caput I
De his quos canis inbimordit.	Cap. II
Ad leonum pantherarum ac urforum morsus.	Cap. III
De suum morsu.	Cap. IIII
De his qui à felle morfi sunt.	Cap. V
De morfis à crocodilo.	Cap. VI
De bestiis uirus eiulantibus & primum quibus arti- bus adhibitis ea tollantur.	Cap. VII
Illiciones præseruatiuæ.	Cap. VIII
Quæ apposita uenenata animalia occidunt.	Cap. IX
Communia remedia ad omnes uenenum iaculatum fe- rarum plagas.	Cap. X
De uespis & apibus.	Cap. XI
Ad stellionis morsum.	Cap. XII
Ad salamandræ morsum & lacertæ chalcidæ.	Cap. XIII
De mure araneo.	Cap. XIII
Ad scolopendræ plagam.	Cap. XV
Ad araneæ ictum.	Cap. XVI
De tetragnathis.	Cap. XVII
De percussis à phalangio.	Cap. XVIII
De his quos Scorpio percussit.	Cap. XIX
De morfis ab aspidē.	Cap. XX
De uiperæ maris & fœminæ morsu.	Cap. XXI
De dipsadē.	Cap. XXII
De hæmorrhō & hæmorrhōide.	Cap. XXIII
Præparatio sanguinis testudinis marinæ & usus.	Cap. XXIII
De ammodyte aut cenchria.	Cap. XXV
De sepe.	Cap. XXVI
De cenchrite siue Acontio.	Cap. XXVII
De ceraste.	Cap. XXVIII
De dryino.	Cap. XXIX
De amphibæna & scytala.	Cap. XXX

De pareæ

De parea & spathiuro.	Cap. XXXI
De peliade & Elape.	Cap. XXXII
De Basilisco.	Cap. XXXIII
De draconibus.	Cap. XXXIII
De chersydtro.	Cap. XXXV
De rana rubeta.	Cap. XXXVI
De turture seu pastinaca marina.	Cap. XXXVII
De Murena.	Cap. XXXVIII
De dracone Marino.	Cap. XXXIX
De Scorpio marino.	Cap. XL
De culicibus.	Cap. XLI
De muscis.	Cap. XLII
Ad pulices.	Cap. XLIII
Ad cimices.	Cap. XLIII
De uenenis.	Cap. XLV
Methodus praeferuatua nequis à uenenoſo pharmaco ledatur.	Cap. XLVI
Quomodo cognoscantur qui uenenum ſumpſerunt.	Cap. XLVII
Communia remedia & cura omnis ueneni.	Cap. XLVIII
Ad eos qui cantharidas hauſerunt.	Cap. XLIX
De bupreſti.	Cap. L
De Eruca pini.	Cap. LI
De ſalamandra.	Cap. LII
De lepore marino.	Cap. LIII
De rana rubeta.	Cap. LIII
De rana paluſtri.	Cap. LV
De hirudinibus.	Cap. LVI
De ephemero.	Cap. LVII
De dorycnio aut ſolano furioſo.	Cap. LVIII
De Aconito.	Cap. LIX
De melle quod in heraclea ponti naſcitur.	Cap. LX
De Coriandro.	Cap. LXI
De pſyllio.	Cap. LXII
De cicuta.	Cap. LXIII
De ſmilace.	Cap. LXIII
De ſucco carpaſi.	Cap. LXV
De herba ſardonis.	Cap. LXVI
De hyoſcyamo.	Cap. LXVII
De mandragora.	Cap. LXVIII
De ſucco papaueris.	Cap. LXIX
De toxico.	Cap. LXX
	De his qui

De his qui iuxta hauserunt.	Cap. LXXI
De chameleone.	Cap. LXXII
De fungis.	Cap. LXXIII
De sanguine tauri.	Cap. LXXIII
De lacte in grumos coacto.	Cap. LXXV
De gypso.	Cap. LXXVI
De cerusa.	Cap. LXXVII
De argenti spuma.	Cap. LXXVIII
De argento uiuo.	Cap. LXXIX
De calce, sandaracha, & Auripigmento.	Cap. LXXX
De thapsia, ueratro, elaterio, & agarico.	Cap. LXXXI
De ruta syluestris & melanthij nocumentis.	Cap. LXXXII
De acruato frigida aqua potu.	Cap. LXXXIII
De strangularis.	Cap. LXXXIII
De his qui ex alto ceciderunt.	Cap. LXXXV
De praeservantibus & praesagis animalibus.	Cap. LXXXVI
De Theriaca ex uiperis Andromachi.	Cap. LXXXVII
Pastillorum scilliticorum preparatio.	Cap. LXXXVIII
Hedychroi confectio.	Cap. LXXXIX
Pastillorum theriacorum preparatio.	Cap. XC
De reliquis quae in antidotum consociuntur.	Cap. XCI
Modus conficiendi.	Cap. XCII
Post quantum tempus ea sit utendum.	Cap. XCIII
Quanto tempore efficax sit.	Cap. XCIII
Modus probandi theriacen.	Cap. XCV
De exhibitionis mensura, & utendi modo & quibus con uepiat morbis.	Cap. XCVI
Sales Theriaci ex libris Martiani, cum quibus consentit Galenus.	Cap. XCVII
Antidotus Mithridatica.	Cap. XCVIII
Confectio Cypheas.	Cap. XCIX
De Antidoti Mithridaticae usu.	Cap. C
Antidotus Esdrae aut prophetae doctoris	Cap. CI
Antidotus praxonia.	Cap. CII
Antidotus aromatica optima, Galli.	Cap. CIII
Antidotus ex duobus pipetis generibus.	Cap. CIII
Antidotus Athanasia.	Cap. CV
Oribasij theriaca qua Marcus Imperator usus est.	Cap. CVI
Oribasij theriaca ex Bryonia.	Cap. CVII
Antidotus Hadriani.	Cap. CVIII
Antidotus Eucharistus.	Cap. CIX

Philagrii antidotus ex sulphure uiuo.	Cap. CX
Theriaca Democratis.	Cap. CXI
Antidotus Theodoretus ex anacardijs.	Cap. CXII
Theodoretus aliter apparatus.	Cap. CXIII
Theodoretus per acetum mulsum apparatus.	Cap. CXIII
Picra siue amara per acetum mulsum apparatus, Oribasij.	Cap. CXV
Cyphi ex rebus. XXXVI.	Cap. CXVI
Cyphi ex rebus. XXVIII.	Cap. CXVII
Musuaphij confectio.	Cap. CXVIII
Thymiana siue suffimentum Berenices.	Cap. CXIX
De Elephantiasi, ex libris Archigenis.	Cap. CXX
Cura Elephantiasi affectorum.	Cap. CXXI
De his qui castrantur.	Cap. CXXII
De uiperarum esu, & de pruritibus, Archigenis.	Cap. CXXIII
Illusiones ad tumentes corporis eminentias.	Cap. CXXIII
Dieta Elephantiasi correptorum.	Cap. CXXV
De pruritu, Archigenis.	Cap. CXXVI
Ad pruriginosas papularum eruptiones.	Cap. CXXVII
Ad pustulas psydracas Græcis appellatas, & ad papulas ex seruore aut sudore obortas.	Cap. CXXVIII
Oribasij ad nigras cicatrices inalbandas.	Cap. CXXIX
Ad ulcerosas papularum eruptiones, tum in tibijs, tum in toto crure obortas.	Cap. CXXX
Ad cicatrices nigras ex ulceribus relictas.	Cap. CXXXI
De Vitiligine seu alphi.	Cap. CXXXII
De luce uirilagine altius insidente, Galeni.	Cap. CXXXIII

F I N I S

ps. ps. d. d. d.
 159
 159

De his qui ab homine morfi sunt.

Caput I

*Homini
morfi**Spongia
Aphricana*

Le noxiorum animalium moribus scribere auspicantes, initium ab his qui ab homine morfi sunt faciemus, ut Archigenes inquit. in his igitur quos homo momordit, loco ex oleo prælito, scenicoli radicem tritam cum melle cataplasmaris modo ulceri imposito usque quo repurgetur, deinde his quæ explere possunt utitor. Cuius generis & hocce est. Mellis, terebinthinæ, butyri, adipis asferini, medullæ cerui, aut si non adsit, vituli, æqualibus partibus liquefactis utitor. Si uero sinus statim in principio fiat, cum aqua mulsa diligenter eluito, & spongiam nouam aphricanam melle cocto imbutam imposito, & ligamento quod ad sinus referetur obligato, ac tertio die soluito. Aut myrrham terebinthina exceptam ut malagma imposito. Aut æs tritum mellē cocto exceptum ueluti collyrium indito, & postquam repurgatis conglutinato: uel ossa uittu lina ad albedinem uista, & pice liquida siue cocto melle, aut utrisque ex æquo simul excepta, in sinum indito, Vel mannā aut ipsūm adeo thus cum myrrhā terito, & cum uino ac oleo imposito. Emplastra autem cruentis uulneribus destinata & adglutinatoria eis conueniunt, In expassis quidem & planis ulceribus, Viride ex atractylide. In sinibus uero cruentis, emplastrum pioscoris, ex aceto apparatus, & Athena, & Nigrum appellatum.

De his quos Canis momordit.

Cap. II.

Canis morfi

In his uero quos Canis momordit statim acetum irrorato, & expassa palmaria morsum percutito. Deinde nitrum cum aceto tritum ex alto supra morsum destillato, & spongiam nouam posca aut aceto imbutam imposito, & ad tres dies obligato, ligamentoque superne ex posca aut aceto prout uisum fuerit madefacito. Egregie enim auxiliatur. Post hæc uero ut commune ulcus curato, Aut perdicium herbam cum sale tritam imposito, quotidie eam alterando donec excidat crusta. Deinde ubi ad cicatricem perducere uolueris ipsam per se tritam imposito. Quod si magnus sit morsus quem admodum à magnis canibus infligi solet, præscripta in sexto sermone methodo curato, ueluti eos qui à rabido cane sunt fauciati. Si uero cauus & angustus appareat morsus, in principio cum aceto ut dictum est, irrorato. Deinde nitrum itidē cum aceto tritum ex alto superstillato, & anetho sicco usto morsum expleto, & linteolum conuolutum ex aceto madefactum indito, & obligato. Post triduum uero soluito & reperies morsum repurgatum. Idem facit & cuminum tritum morfi inditum. Postquam uero ulcera fuerint repurgata, prædicto pharmaco utere liquefacto ad hominis morsum relato. Si uero inflammatio succedat, lenticulam cum mali corio coctam & tritam imposito, internūque betæ succum cum modico rosaceo pro cataplasmate adhibeto. Ad uulnera uero iam suppurata tuui farinam cum melle subigito

Lib. 6. cap. 29.
de morfi a uero
rabido.

subigito & morsum expleto. Summe enim auxiliatur. Aut irin cum melle & linamentis indito, ac superne lenticulam coctam tritam cum modico melle & rosaceo pauco imposito. Repurgatis uero iam ipsis cum prædicto liquido pharmaco expleto, ac deinde his quæ cicatricem inducere possunt, uti tor. Emplastra autem ad demorfos à cane uel urso aut similibus animalibus statim à principio commode adhibentur ex sale & cerusa apparata. Etenim uenenosum humorem in morsibus ex dentibus relictum expurgant, & callosam ex impactis dentibus concretionem explanant.

Ad leonum, pantherarum, ac urforum morsus. Cap. iiii

Horum animalium consimiles sunt morsus: nam robusta sunt hæc & huncingua, implicantq; quicquid contigerunt unguibus penetrantia, & corpora ipsa dilaniant. Perseuerando autem in mādicatione non solum carnes dilaniant, sed & ossa aliquando ad farinæ similitudinem cōfringunt: indeq; & uicini stimulis afficiuntur nerui. Satis uero manifestum est, quod corpora quæ in eiusmodi ac tantas calamitates inciderūt, non effugiant periculum abalienationis: nam etsi maneant putrefactionem suscipiunt, & ulcera serpennia inducunt. Huiusmodi igitur uulnera cum aceto elota & circūrasa, solutis item corporibus ac ossibus extractis, emplastris integere oportet, & post suppurationem partium dilaniatarum, repurgantibus linamentis curare: & cicatricem inducere, quemadmodum in communibus ulecribus solemus. Emplastra autem his conuenientia sunt, id quod ex salibus cōstat, & similia, cuiusmodi etiam hoc est.

Ab alienatio
membrorum

Asclepiadæ pharmacum, ad cruenta uulnera accommodatum, & ad intercosos neruos, & ad urforum ac leonum morsus.

Æruginis rasæ drachmas octo, aluminis rotundi drachmas octo, squamæ æris drachmas xii, mannæ, galbani, cuiusque drach. xii, ceræ uncias xv, resinæ pinus aridæ uncias xx, olei libram unam. Arida & galbanum aceto terito & liquecibilia liquefacta adfundito.

Aliud, emplastrum uenatorum appellatum, admirabile.

Radicis synphyti, comæ dictamni, iridis illyricæ, atramenti indici, aluminis scissi, misyos, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, cuiusque sextantem, salis cappadoci quincuncem, æris usti trientem, aristolochiæ rotundæ, iridis, astragalitidis, gallarum, rosarum siccarum, squamæ æris, singulorum unciam unam, æruginis quadrantem, picis sesquilibram, resinæ pinus siccæ libras quatuor, olei trientem & dimidium ungiæ unius. Metallica in aceto terito. Habeat autem & ceræ sesquilibram. Quod si marcedo subsequatur & ulcus serpendo depascens, optime facit subscriptum uiride emplastrum, carnem atrodens. exest usque ad os, & crustas tollit, ac ulcus serpens compefcit, & in uniuersum utile est ad omnia inueterata eiusmodi actionis, & maxime in quibus ueneni corruptio est, & corpora sunt abalienata: quibus etiam immixtum pharmacum adhibere oportet. In alijs uero dissolutum. Habet au-

H tem

rem hoc modo. Sputæ argenti, unc. i. squamæ aris, unc. i. nitri, atramenti sicut torij, salis ammoniaci, æruginis, singulorum sextantem. cyperi quadrantem. olei sexuncem. Aceti scillitici quârum sufficit. Arida aceto terito ut strigmentium spissitudinem acquirât, & liquefacta adfundito, & in vitro reposito, aceto acri affuso, ut pharmaco ipsi innatet. Ad consecrationem autem & præparationem si acetum scilliticum haberi non possit, scillam cum aceto coquo ac utitor.

De suum morsu.

Cap. III

Q Vandoquidè uero & in uenationibus à syluestribus suis læduntur quidam, operæ præciū est & de his facere mentionē. Vulnèra itaq; ab ipsis incussa grauiā sunt, propterea quod non solum profunda sed & magna existant, Adglutinatorio autem medicationis ductu ea curare impossibile est. Nam una cum contusione labia uulnèrum discindunt imò & adurunt. Mutuo enim dentium inter se attritu, ac ueluti ad cotem affrictu utuntur, ad uindictam eorum qui eis obueniunt currentes. Adusta itaque corpora crustam quandam iuxta uulnèrum labia inducūt, Quare suppuratorium & non adglutinatorium curationis modum in eis adhibere oportet.

*Suis dentes
mutuo affri-
ctu exarunt*

De his qui à sefe morsu sunt.

Cap. V

O Mnia ferè quæ ad canis morsum dicta sunt, etiā à sefe morsu conducunt. Proprie autè eis conuenit, Mel, terebinthina, oleum rosaceum, simul eliquato ac utitor. Aut centauream tritam cum melle imposito. Aut galli stercus liquidum cum adipe gallinæ subigito & imposito.

De Morsu à crocodilo.

Cap. VI

P Rimum quidem eos quos crocodilus momordit quàm tutissime custodire oportet, in domo conclusos fenestras non habente, Etenim ob contrariam quādam affectionem ferè in totum syluestres maxime seles ad demorsos accedere consueuerunt. Remedia autem his eadem quæ ad morsos à cane ac ad reliquos relata sunt conueniant. Proprie autem humanū stercus & misy simul trita & imposita ad eos faciunt. Aut piscium garum, aut carniū salarum iusculum morsui infunde, aut salem & myrrham æquali pondere in acerrimo aceto quæ tenuissime contere, & cerato excepta impone.

*Stercus
byenæ* Aliud Stercoris hyenæ, drach. iiii. æruginis, drach. ix. adipis anserini, drach. vi. galbani, drach. i. ceræ, drach. v. iii. olei drach. xii. Aeruginem & stercus aceto terito, & liquefacta affundito. Quod si hyenæ stercus non adfit, porcino utitor. Apollonius autem inquit, demorsos locos acri muria aut piscinū garo perfusus ac fotos, adipe crocodili eliquato illinito, & linamentis inditis obligato. aut carniū salarum pinguioribus partibus tufas indito, aut melanthium cum aceti fece tritum imposito. Hæc enim & ulcus seepens compescunt, & morsus è uestigio ab inflammatione uindictant. Post hæc autem lenticulam coctam cum melle tritam cataplasmatibus modo adhibeto. Erui uero farina cum melle subacta, aut iride cum melle morsum ex-

pleto

pleto. De cætero uero ulcera renutrito, & per communia auxilia ad cicatricem perducito.

De bestijs uirus eiaculantibus, & primum quibus artibus adhibitis uenenata animalia tollantur. Cap. VII

DE uenenatis animalibus scripturi, primum præsidia quædam indicabimus, quibus ea tollantur & perimantur. Perimuntur itaq; ex sylvarum exustione, in quibus uitam degunt. Verum in his quæ intra domos reperiuntur, feruentem aquam in eorum lustra ac latebras infundere expedit, & acidam muriam feruentem per instrumentum fusorium, siphona Græci uocant, immittere. Vespiis uero oleum infundatur, & assiduus fumus ipsarum tentorijs ac habitaculis obfundatur.

Siphon, instrumentū fusoriū

Quæ substrata ab omni uenenata bestia præferunt.

Iuxta uias quidem igitur & in domibus ab omni uenenato animali præferuant substrata: abrotonum, conyza, dictamnium, uitex, echion, calaminthe, solanum, hastula regia, saluia, peucedanum, hypericum, polium, samfucus, gentiana, origanus, ruta syluestris, serpillum, laurus, pulegium, cupressi; aut cedri coma, aut ramenta, cardamomum, lysimachion, melanthium, bitumen: his addatur & gagates lapis.

Suffitiones præseruantes, quæ incensa uapore suo uenenatas bestias abigunt.

Viticis folia, bitumen, castorium, melanthium, cornu ceruinum aut caprinū, nasturtium, cardamomum, galbanum, propolis, peucedanum, panax, opopanax, conyza, cupressi aut cedri ramenta oleo imbuta, gagates lapis, lagapenum, polium, canchryos radix, filix, baccae lauri, & similia graueolentia. Quum enim uenenata animalia omnia angustos habeant meatus, quàm cellerrime replentur, & ab huiusmodi odoribus obturantur ac suffocantur. Referturetiā de stercore crocodili, quod per infundibulum suffitum, feras ipsas uenenosas ex latibulis suis exigat. Archigenes autem, ungula caprarum & pili, inquit, suffitu fugant bestias uenenosas: procul enim per ipsorum odorem relegantur.

Stratonis suffumigium.

Galbani, radices canchryos, cornu cerui, melanthij, cuiusque unciam unam. Omnia terito, & in pastillos cum aceto redigito: atq; ubi uti uelis, oleo madefacito, ac incensa per mediam domum suffito, aut in ipsum ferarum latibulum per infundibulum uaporem immittito.

Aliud suffimentum.

Scorpios deturbans, & omne reptile ex ædibus exigens: galbani, sandarachæ, butyri, adipis caprini, æquales omnium partes in pilulas redigito, & ut dictum est suffito. Probe facit & pyretrum cum sulphure suffitum. Mirifice item Beronices suffimentum facit, quod in hoc ipso sermone descriptum est, ubi ipsum cyphi etiam reperitur.

Illitiones præseruatiuæ.

Cap. viii

Apollonius

Illita autem ferarum accessum prohibent, easq; fugant, althææ semen & lactum cum oleo, baccae lauri & galbanum oleo trita. Panacis semen & flos & succus cum oleo: uehementer efficax est oleum, in quo cedrina ligna uiridia incoquantur. baccae iuniperi cum oleo, conyza, peucedanum, silphium, salvia, hastula regia, abrotonum, galbanum. Horum unumquodq; ex cellenter facit aceto & oleo dilutum, aut etiam quædam ex his, aut omnia mixta & illita. Aut castorium cum medulla ceruina & unguento narcisino illitum uehementer efficax est. Apollonius autem inquit: Qui ex syluestris rutæ succo oblinuntur, omnibus uenenatis bestiis manus admovent, & non mordentur. Dracunculi item succo manibus illitis qui uiperam tenuerit non mordebitur. Semen autem dracunculi aqua tritum & latibulis ferarum iniectum, ipsas in terram fugat. Probe facit & solani succus illitus. In uniuersum autem omnem feram cuiusq; eorum adeps illitus fugat.

Quæ apposita uenenata animalia occidunt, & de his quæ in edulia & potiones incidunt.

Cap. ix

Venenatas bestias occidit galbanū cum spondylis & oleo appositum. Cancris appositi scorpio, ipsum occidunt. Lynxis syluestris scorpiones fugat: quod item facit pastinacæ semen. Cæterum & aquarum quas in potu accipimus animaduersionem habere oportet. Non pauci enim perierunt ex quibusdam bestiis in edulia & aquas dum coquantur collapsis: atq; id maxime in peregrinationibus euenire solet. Quapropter tunc culinæ procul ab arboribus extruendæ sunt, propter feras in eis latibula habentes. quoniam & salamandræ quandoq; & erucæ calefactæ obsonijs incidunt. Præcipue ita quæ pinus & picea arbor fugienda: in his enim letales sunt erucæ. In obsonia quidem igitur dum coquantur, illabi consueuerunt serpens, & salamandra, & erucæ: in uinum uero uiperæ.

Communia remedia ad omnes uenenum eiacularantium ferarum plagas.

Cap. x

Cinis pro cataplasmate

Per prædicta quidem igitur præcauere oportet, ne in malignas bestias incidamus. Si uero contingat ab animante quopiam uenenum iacente percuti, huiusmodi remedijs communiter utemur. Si quidem leuior sit plaga aut morsus, posca calida cum proluemus, deinde uero locum ipsum exugemus. Verum qui exucturus est, prius os oleo colluat, ne inde lædatur, atque ita ore ad morsum admoto exugat, & expuat uenenum. Cauere etiam oportet, ne exulceratam aliquam internam oris partem habeat exucturus. Post hæc uero cinis aceto subactus pro cataplasmate imponatur. Maxime autem ad hanc rem conducit, ex ficulneis lignis exustus, aut laurinis, aut lignis uitis: qui si non adsint, eo qui haberi potest utendum est, diligentia ad hoc potissimum adhibita, ut inflammatio in loco excutetur, & materiæ ad morsum prouocentur. Quod si minus mobile sit membrum, & uehementior

tior morfus, cucurbitam cum plurima flamma ad morfum adhibe, & uici-
nos locos circumcirca impactis uulnufculis fcarificato: attrahetur enim una
cum fanguinis & flatus attractione ipfius beftiæ uenenum. Deinde à tepi-
dæ largæ haufu uomere iube: & fic deinceps pharmaca exhibe. Vigilans
etiam æger adferuandus eft, ac defidens per totum curationis tempus, do-
nec euidentem remiffionē acceperint moleftiæ concomitantes. Venter item
adstrictus citra dilationem per infufum eluatur, & ueficæ quoq; cura habea-
tur, quo citra impedimentum locum excernat. Optime autem auxiliantur,
fi ftatim in principio poft cucurbitas plagæ imponatur animalia parua dif-
cerpta, & adhuc intus calentia, uelut funt gallinæ, hœdi, agni, porcelli. Vene-
num enim exugunt, & dolores leniunt. Aptæ funt etiā his cataplafmata di-
laniantia, uelut funt allia cum melle, cepæ cum fale, ruta cum melle, filphium
tritum infperfum, later, pifcis falſus maxime uetuftus, allium uftum, planta-
go cum fale, meliſſophilon, uirgulta ficum melle, ſuillum recrementū ace-
to coctum, calaminthe, ſtercus caprinum cum aceto. Summe autem facit ad
omnem beftiæ uenenatæ plagam, præterquā aſpidis, calx uiua cum oleo
& melle craſſitudine cerati impoſita. At uero & inurere morfus ipſos expe-
dit uſq; ad cruſtæ productionem. Aut ſinapi largum cum rumice acuto im-
ponere, aut ſalem tritum liquida pice exceptum. Præter opinionem autem
facit ex uiperis theriace Andromachi emplaſtri modo impoſita. Emplaſtra
uero ad omnem uenenofum animalis ictum conueniunt, ex dictamno appa-
ratum, omniaq; quæ attrahendi uim habent, qualia funt & quæ ex fale, &
quæ ex chamaeleonis radice conſtant, & aphroditæ appellata. Egregie au-
tem hoc auxiliatur. Spumæ argenti lib. i, ceruſæ lib. i, refinæ pinus lib. i, olei
ueteris lib. iii, ceræ ſexuncem, ammoniæ thymiamatis trientem, galbani tri-
entem. Ceruſam, argenti ſpumam, & oleum coquito, donec non inquinent
manus: deinde liquefacta adijcito, unito, & utitor reposito ad omnem mor-
ſum, & ad abſceſſus, & tubercula mamillarum, panos, ſinus, fiſtulas, paroti-
das. ad miraculum enim uſq; diſcutit ipſas. Viſitor & ad carbunculos. Arce-
uehementer inflammationem, & raro citra magnam commoditatem & effi-
caciā adhibetur.

*Animalium
diſcerptorum
impoſitio*

*Cataplaſmata
dilaniantia*

placet ſuſpicio.

Potiones communes.

In potu aut citra dilationem in omni uirulenti animalis morſu, theriace An-
dromachi præbeatur, aut Mithridatica, & coſimiles compoſitiones. Ex ſim-
plicibus uero, uiticis ſemen cum uino tritum bibendum præbeto: rutæ ſylue
ſtris ſemen cum uino ſimiliter tritum dato, platani pilulas, poliū, polemonij
quod & philetærium appellatur drac. i, leporis coagulum aut cerui, allium,
trixaginem, dictamnū, ſaluīam, caſtorium: ex unoquoq; drach. i, bryoniæ
radicem drachmæ pondere: ſeminis trifolij bjiſumen olentis drac. i. Prodeſt
& conyza & chamaepitys & ſcordium, cuiuſq; drach. i. ex uino. Auxiliantur
autem omnino cancer fluuiales cocti aut aſſati comēſti. Rana item elixa &
comēſta. Verum ſi qui earum eſum auerſentur, ranas donec uictæ reddan-

H ; tur

tur coquito, & iusculum ipsum ignaris absorbendum præbeto.

De uespis & apibus.

Cap. xi

Quod si quis ab apibus & uespis illæsus permanere uelit, cum maluarum folia cum oleo illita, & etuca siue bruchus cum oleo illitus adseruabunt. Quandoquidem uero quidam ab his clanculum percussi, ob dolorem perturbantur, putantque se à maligno aliquo animante petitos esse, necessarii existimo prius ostendere quæ signa ad horum plagas comitentur. Hos itaque qui ab apibus punguntur, dolor ictus consequitur, & rubor loci, cum tumorque partium in ambitu sitarum: stimulus autem omnino in percusso loco reperiatur. Eadem etiam hos quos uespa pupugit concomitantur, sed intensiora: uerum stimulus uespa in percusso loco non relinquit. Auxilium autem utrique ferunt, luto aut stercore bubulo eis illito cum posca, aut maluarum folijs impositis cum posca, aut cimolia cum malua & posca, aut sesamo cum posca. Naturaliter autem opitulatur ueneranda & uiuifica Strombi conchylij imago in sigillo ferreo exculpta, & plagæ appressa. Non enim permittit amplius inflammationem generari. In potu præterea ipsis foliorum lauri terectorum drach. ii. cum uino austero præbeto.

Ad stellionis morsum.

Cap. xii

Qui à stellione morfi sunt, assidue & contente dolitant, morsusque loricatus cum liuidum habent. Iuuantur autem euestigio si capæ & allia cataplasmatis modo eis imponantur. Auxiliatur amplius eadem comesta, uino meraco post eorum acceptionem absorpto. Vtiliter etiam sesamum eis imponitur, aut melanthium aqua multa affatim affusa.

Ad salamandræ morsum, & lacertæ chalcidæ.

Cap. xiii

Qui a salamandra percussus, eos dolor uehemens & crustæ productio consequitur. Adhibeatur autem eis communis cura iam prædicta. Qui uero a lacerta chalcide appellata percussus sunt, eos tumor pellucidus consequitur, ueluti nigrore in ambitu plagæ relucente. Consequitur autem & putrefactio. Curatio uero eadem illis accommodanda est, quæ ad muris aranei morsum referetur.

De mure araneo.

Cap. xiiii

Mygale **M**us araneus colore quidem mustelæ similis est, magnitudine autem muri, unde & mygales apud Græcos obtinuit nomen. Os autem sublongum habet, & exiguum caudam. Dentes uero tenues, atque eos duplici ordine sitos in utraque maxilla, quo fit ut quatuor dentium ordines habeat. Qui igitur ab eo morfi sunt, his uulnera manifesta fiunt, quadrifido enim ordine uulnera conspiciuntur. Et sanguis quidem primum purus promanat, paulo post uero saniosus. Animal enim ipsum putrefactione occidit. Consequuntur etiam bullæ insurgere, quas si quis dirumpat, carnem subiacentem feculentam uidebit, & fissuris disparatâ. Inflatio autem sequitur demorfos. Cæterum hoc animal frequentius ad testes insilire solet, eosque uerbere impetere.

re

re non hominis solum, sed cuiusq; etiam bruti animantis. Auxiliū autem fecerunt quum ob putrefactionē periclitantur, post prædicta communia remedia adhibita, ab huiusmodi rebus. Lauri foliorum tenerorum drach. 1, aut 11 cum uino tritas bibendas præbeto. Conueniunt etiam ipsis omnia prædicta communia remedia in potu accepta ex uino dulci. In pecoribus uero & iumentis illa ipsa cum aqua trita naribus infunde. Est enim ipsis præsens remedium: unde etiam hominibus similiter in potu præbeto. Morsum porro cum cumino integito & allio, putamine extrinsecò nō abiectò: eadem etiam cum oleo trita afsidue & diligenter locis circūstis illinito. Si uero ruptæ fuerint bullæ, & ulcera oborta, acida muria proluet, & ordeum ustum tritum impone: uerum non rumpetur, nisi prægnans fuerit mus araneus, qui morsum inflixit. Quod si exulcerentur, mali punici dulcis corium coctum tritum impone, ulceraq; ex eodem decocto, aut magis myrti decocto, perfusa fouet. Strato uero inquit, In muris aranei morfu locū scarificato, ac ipsum murem araneum ustum cum aceto cataplasmatis uice imposito, aut sinapi tritum itemdem ex aceto. In potu uero panacea exhibeto, crucæ, capparis corticem, gentianæ radicem: & uerbenacam rectam tum cum uino bibendam præbe, tum pro cataplasmate impone: maluæ item folia impone: & antidotos magnas bibendas exhibe.

Strato

Ad scolopendræ plagam.

Cap. xv

His qui à scolopendra icti sunt, eadem remedia conueniunt quæ ad muris aranei morsum sunt prædicta: & sales cum liquida pice impositi: & cedria cum melle: & allium cum folijs fici, & cumino, cruoq; ac uino. In potu uero etiam ea commodant, quæ à mure araneo morsis. Amplius autem & absinthium & menta cum uino.

Ad araneæ ictum.

Cap. xvi

Est & araneæ genus, quod ictu continentes dolores inducit: rubor uero circa præcordia, & urinæ emittendæ difficultas ægros concomitatur: alii quando uero & suffocationes. Ab eo percussis rutam syluestrem, & uiticis albæ semen aut folia bibenda præbe. Allium etiam large edendū, ac uinum insuper meracum absorbendum exhibeto.

De tetragathis.

Cap. xvii

Tetragathus, species est phalangij subalbida, pedes scabros habens, & iuxta caput eminentias duas, unam rectam, alteram latam, ut existimes eum ora quidem habere duo, maxillas aut quatuor, & lineam per os æqualem. His qui ab eo percussi sunt, communiter quidem eadem accedunt quæ à scorpio percussis. Proprie autem in ipsis plaga contente dolet, & percussus locus subalbicat: tumor uero faciem & caput occupat, & percussæ partes usq; ad articulos graciles: cibū item non sentiunt mēbra, & post adeptam sanitatem uigiliæ intensæ succedunt. Opem aut ferunt ex calaminthæ potu, aut trifolij, rutæ, panacis, polij, & his quæ ad percussos à phalagio referuntur.

H 4 De

De percussis à phalangio.

Cap. XVIII

Phalangiorum
genera

Phalangiorum genera quidem plura sunt: quæ uero apud eos qui de no-
xijs beltijs scripserunt referuntur, ut plurimū sex numero existunt: unum
quidem ex eis rhagium, alterum lupus, tertium formicariū, quartum cranoc-
olaptes, quintum scletocephalon, sextum scolecium appellatū. Ac primum
quidem rhagium, id est acinum, figura rotundum est, colore uero nigrum,
acini uuē nigre similitudine, unde etiam appellationē accepit. Et os quidem
iuxta mediū uentrem habet, pedes uero ex utraq; parte quā breuissimos.
Alterum uero lupus appellatum muscas perdit, eisq; pascitur: ac corpus qui-
dem habet latum ac uolubile: partes uero circa collum ipsius incisæ sunt. am-
plius autem & os eius eminentias tres habet. Tertium autē myrmecium, hoc
est formicarium dictum, formicæ maximæ assimilatur: colore est fuliginos-
um: corpus uero eius uelut astris quibusdā insignitū est, maxime circa dor-
sum. Quartum deinde cranocolaptes, sublongum est, & uiride: stimulumq;
iuxta collum habet, atq; si in quem irruat, locos circa caput petit. Quintū sle-
tocephalū dictum, caput habet saxeam & obduratum: lineamenta uero per
omne corpus similia animalibus illis, quæ circūuolitant noctu lucernas. Sex-
tum autem scolecium siue uermicariū appellatum, sublongum est & subma-
culosum, maxime circa caput. Atq; hæc quidem species phalangiorū enu-
merantur, quas sanè obseruare oportet. Quæ uero percussos ab eis concomitan-
tur, communia sunt iuxta magnitudinē & paruitatē discreta. Morfus porro
tenuis est ut uix conspici possit: tumor autē liuidus, quibusdam etiam rubicu-
dus: frigiditas adest circa genua & lumbos ac scapulas: quādoq; uero totum
corpus aggrauatur, amplius & dolor asiduus adest, tremor, pallor, uigiliae:
quibusdā uero pudendi tentigo, & circa caput prunitus, aliquando etiā circa
suras: oculi humecti & lachrymantes ac caui, & uenter inæqualiter eleuatur.
Intumescit autē uniuersum corpus, faciesq;, & maxime circa linguā partes ut
impeditū habeant sermonem: quibusdā uero & urinæ emittendæ difficultas
adest cū pudendi tentigine & dolore. Si uero minxerint, aquosæ ipsorū sunt
urinæ, quædam aranearū textis similia in se habentes: & uomitus quoq; con-
similis est. aliquādo uero & per lotium, & per uentrē talia excernuntur. Cæ-
terum in calidā aquam demissi à dolore leuati sibi uidentur, post uero conten-
te dolent pudendū. Seniorib; uero pudendū plurimū laxatur, ac minime in-
tenditur. Atq; hæc quidem cōmuniter ad omniū iētus sequuntur. Si uero cra-
nocolaptes aliquē percusserit, caput magis dolet, & uertigines consequuntur:
frigus cōtinēs, deliriū, corporis iactatio, & stomachi pūcturæ. Oēs autē à pha-
langijs percussi asiduis balneis iuuantur. plaga etiā ipsa ex trifolij bituminosi
decocto cū oleo proluat. totū uero corpus ex cerato liquidis pinguefiat. lu-
uantur etiā fomento spongiarū in calido aceto tinctarū, & sepe ad plagā ad-
hibitarū. Cataplasmata autē eis conueniūt, bulbi, sanguinaria, porrū, surfures
aceto cocti, ordacea farina folijs lauri cū ea in uino aut melle incoctis, ruta,
grosfi

grosſi ficus, caprinū ſtercus cum uino, ſamſucus cū aceto, ſylueſtris ruta cum aceto, itemq; cyperum. Aſclepiades autem hoc inquit, utere ualde laudato, Seminis rutæ ſylueſtris, ſeminis erucæ, ſtaphidis ſylueſtris, canchryos, ſeminis uiticis, pilularum aut foliorum cupreſſi, æquales omnium partes aceto terito, & melle exceptas imponito. Idem & in potu acceptum auxiliatur.

Aliud laudatum, quod ſimiliter & potatum & impoſitum iuuat.

Sulphuris uiui drach. 1111, galbani drach. 1111, ſucci cyrenaici drach. 11, aut ſi non adſit, laſeris drach. 1111, amygdalarum amararum repurgatarū drac. 11. in uino diluito, & melle excepta imponito. Bibendum etiam, ut dictum eſt, præbeto. Amplius uero & cupreſſi folia aut pilulas tritas cum uini & olei hemina una à phalangio percuſſis dato. Aut aniſum, aut daucum, aut cuminum, aut melanthium, aut piper, aut agaricum, ſingula drachmæ pondere præbeto. Aut ammij drach. 11, aut iridis drach. 1, aut hyperici drach. 1, aut triſolij bituminoſi quantum tribus digitis apprehendi poteſt. Conueniunt etiam lauri baccae, ſcorpion, ſerpillum, ſilphium, calamintha, chamæpitys per ſe & cum ruta ac pipere, ſingula uero ex uino. Aut mente faſciculum poſca meraciore coquito, & decocti cyathos 11 præbeto. Idem & ſamſuci, & radicis ſpinæ albæ decoctum, ac trixaginis, & pulegij præſtat. Lixiuium item & radicis hederæ ſuccus cum aceto. Vtere etiam ad eos remedijs à ſcorpio percuſſorum, & ex uiperis theriaca, & conſimilibus.

Aſclepiadæ, ad percuſſos à phalangio: hac Chariton utebatur, & per hominum conuentus oberrans à phalangijs percuſſis auxilia promittebat.

Chariton
medicus

Seminis ſpondyli ſicci, calaminthæ, æquale pondus ſimul terito, & ex uini cyathis 11 præbeto, atq; id ſæpe per diem facito. Aliud eiſdem.

Succi cyrenaici, ſeminis dauci, mentæ ſiccæ, ſpicæ nardi, ſingulorum æquale pondus coagmentato, & ægrum in calidam aquam demittito. Quod ſi ſuccus cyrenæicus non adſit, pro eo laſer purum conijcito.

Aliud ualde præclarum. Canchryos, ſeminis rutæ, piperis, myrrhæ, ſtaphidis agreſtis, ſingulorum drach. 1, radicis cypeti drach. 1, coagmentato, & drachmam 1, cum uini odorati cyathis 1111, ac mellis cyatho 1, exhibeto. Auxiliatur item eis allij eſus, balneum, & uinum.

De his quos ſcorpio percuſſit.

Cap. xix

A Scorpio percuſſos uehementiſſimus plagæ dolor confequitur, frigiditasque, ac tenſio, & ſtupor, circæque plagam & totum corpus frigidus ſudor: & his qui iuxta infernas partes percuſſi ſunt, inguina excitantur, ac intumeſcunt: qui uero circa ſupernas, locus ſub alis. & hæc quidem leuiter percuſſis adſunt. Validius autem ic̃tis, ardor circa plagam adest, quemadmodum in ambuſtis, & uerrucarum inſtar formicarum eruptio, circa labra & totum corpus, ut grandine ſe impeti putent: facies diſtorquetur: fordes circa oculos adſunt glutinoſæ, & lachrymæ uiſcoſæ: du

Nuces ponti-
ce contra
scorpium

ſædurities articularum: anusq; procidit cum egerendi cupiditate: ſpuma circa os eſt, & uomitus largus, ſingultus, conuulſiones opiſthotonics ſimiles. His igitur ſerpillum, althææ radicem, & elaphoboſcum bibendum præbet. Præter opinionem autem facit elaphoboſcus tum uiridis comeſta, tum ſicca potata. Paſtinacæ item ſylueſtris ſemen, & nuces ponticæ: hæ enim in zona geſtatæ non permittunt aliquem à ſcorpio lædi. Aliud.

Cochleam hortulanā maxime accipito, eamq; unā cum teſta tritam plagæ imponito, & conſeſtim ſedabis dolorem. Idem etiam uermes terreni facere dicuntur. Aliud. Cancrum fluuialem cum uino & laſere terito, ac bibendum dato. Aliud. Verbenacam rectam aut uiridem pro cata-

plafmate impone, aut ſiccā tritam bibendam præbe. Aliud.

Cumini, melanthij, ſeminis uiicis, ſingulorū par pondus tere, ac drachmam unam inde ex uino exhibe. Poteris etiam omnibus cōmunibus auxilijs prædictis uti. Aliud. hoc & ad phalangij & ſcorpij ictum facit.

Stryacis drachmas ſex, ſulphuris uiui drachmas ſex, pyretri drachmas quatuor, ſeminis rutæ ſylueſtris drachmas tres, caſtorij drachmas duas, ſeminis eruor drachmas duas, cum ſanguine marinæ maxime teſtudinis ſubige, aut ſi non adſit, terreſtris, & nucis pōticæ magnitudine præbe cum poſca aut ex aceto.

Alia antidotus, excellenter ad ſcorpij ictum conducens: qua etiam ad meiſum ægre affectum uſus ſum, & ſeruat. Habet autem hoc modo.

{ Caſtorij, ſucci cyrenai, piperis, cuiuſq; drachmas quatuor, coſti, ſpicæ nardi, croci, ſucci centaureæ, cuiuſq; drachmas duas, mellis deſpumati quantum ſufficit. Datur nucis ponticæ magnitudine. Datur autem à ſcorpio ictis cum uino diluto: ab aſpide morſis cum aceto diluto. Detrahendi uim habet, ad eo ut digeſtos etiam in membra ueneni ſuccos eruat: & ob id etiam ad uul-

uæ ſtrangulationem utiliter cum hydromelite exhibetur. Aliud. Anſtolochiæ longæ, melanthij, radicis panacis, ſeminis rutæ ſylueſtris, æquales omnium partes committe. Dantur inde drachmæ duæ cum uini meraci hemina una. Optime aut ad eos facit, ſimiliterq; ad phalangij morſum antidotus ex quatuor rebus ad podagricos deſcripta, ex anſtolochia uidelicet, gentiana, myrrha, & baccis lauri. Dato etiam ſi abūdes ex theriaca. Ad plagam autem ſcorpionē ipſum qui percufſit, ſi inueniri queat, imponito. Aut ſtellationem diſſectum plagæ adhibeto. Calaminthe etiam quæ iuxta aquas naſcitur impoſita, conſeſtim dolores remittit & tollit. Allium quoq; aut per ſe aut cum ſale tritum imponatur, aut ſylueſtris ruta, aut ſcorpipurus herba. Ego uero ſylueſtris rutæ drac. i in aceto tero, & ceræ unc. i, refinæ pinus quādrantem liquefacio, & parum olei affundo, unio, ac impono. Et eſt mirabile pharmacum. Quin & ouillum ſtercus uino coctum & impoſitum, cōſeſtim dolore liberat. Vtere item præſcriptis cōmunibus emplaſtris: & eo quod ex dictamno apparatur, & quæ ex ſalibus, quæq; ex chamaeleone conſtant.

De morſis

De morſis ab aſpide.

Cap. xx

Aſpidum apud ſerarum ſcriptores tres ſpecies reperiuntur. Quædam enim ex eis terreſtres appellantur. Quædam uero chelidoniæ & circa fluuulorum ripas, præſertim Nili, latibula habent. Aliæ uero Ptyades nomenantur. Terreſtres quidem igitur maiores ſunt, & quandoq; uſq; ad quinque cubitorum longitudinem reperiuntur. Maximæ uero ptyades cinereo ſunt colore uiridiq; & ad auri colorem declinante. Terreſtres uero ut plurimum & ipſæ cinerei ſunt coloris, quanquam & ſubuirides reperiuntur. Caterum acceſſiones & ſigna communia ſunt in his quos aſpides momorderūt. Vulneta enim in demorſo loco ueluti ab acu puncta inueniuntur. Bina quidem ex maſculi morſu, ex ſcæmellæ uero quatuor, citra magnum dolorem à quibus niſil effluit, niſi uiolentum animal ſit quod morſum infixit. Conſequitur autem ſtupor, pallor frõtis, refrigeratio, aſſidui hiatus, palpebrarum nictatiões, colli inclinatio, capitis grauitas, ſegnities, & collapſio in ſomnum profundū. Ad finem uero & conuulſio. Mors autem in tribus ad ſummum horis ex terreſtris morſu ſequitur. In chelidoniæ uero ictu præſentiſſima adeſt. Porro his qui à ptyade conſpuuntur, caligo oculorū ſuccedit, & cordis dolor, faciei tumor, ac auditus corruptio. Tardius autem mors conſequitur. Auxilium autem ab aſpide morſi ferunt, & præſertim quos ptyas morſus mordit, ex acerrimi aceti potu. dandum autem eſt quouſq; aceti qualitatem circa dextram præcordiorum partem perceptent. Hepar enim in morſi ab aſpide primum aiunt ſenſu priuari. Caterum ad prænotionem an uictus ſit percullus, centauream cum uino tritam bibendam præbeto. Si quidem enim euomet pharmacum, morietur, Si non, uiuet. Quo uero malignitas ueneni diſtributi & in corpus digeſti probe euomatur, alia trita cum zytho exhibeto, donec nauſeabundus reddatur. Aut opopanax cum uino diluto dato, & conſeſtim uomitionem operabitur. Numius autem inquit, Origanū uiridem aut aridam pro ægri uiribus cum uino dato. Poſt uomitum antidotis theriacis utendum & cõmunibus remedijs prædictis. Vuliter aut ad plagā imponuntur, poſt cucurbitarū adhibitiõẽ & ſcarificationem, centaurea cum myrrha & modico opio. Rumex aut ſi cataplaſmatis modo imponatur, niſil lædetur. Præter opinionẽ uero auxiliatur theriace tum plaga impoſita, tũ potata. Proſunt aut & aſſiduę excitatiões cū euulſionibus & plagis, & uniuerſi corporis motus, & aqua marina calida p ſomẽto aſpſa.

De Viperæ maris & ſcæminæ morſu.

Cap. xxi

Vipera ſcæmina colore quidem eſt ſubflauo, multis inſtar rotarū notis exornata, magnitudine cubitali, longiſſima uero palmas tres æquat, Caudam autem habet æcruatim in tenuitatem deſinentem, non paulatim imminutam, eſtq; omnino carne nuda caudā & aſpera. Oculi uero ſub rubri, & caput latius, & anguſtius collū. Ventrem autem ſinuoſiorem habet, & in grefſu ad ſummū caudę nititur, ſenſim uero inambulat, & quatuor

*Aſpidom
ſpecies*

*Aſpides terreſtres
Ptyades*

his hanc morietur.

acerrimi aceti

*Numius
medicus*

plaga in potu

habet

habet caninos dentes. Vipera uero mas eiusdem est coloris: uerum caput angustius, & collum crassius habet, & uniuersum corpus tenuius & quodam modo prolixius: gressum autem superne circa uentrem firmat, & alacrius mouetur: dentes autem caninos solum duos habet: paulatim uero cauda ei imminuta est, quemadmodum & reliquo serpentium generi, non acruatim uelut in uipera foemina dixi: & per hoc sanè à foemina differt. Reperiuntur igitur in eis quos uipera mas momordit uulnera in plaga bina: in his uero qui à foemina demorsi sunt uulnera quatuor. Primum autè ex eis excernitur sanguis, deinde sanies sanguinolenta & oleosa: adest tumor biliosus, feruidus, bullosus, subruber, deinde liuidus & denigratus & proterpens. Os adest exsiccatum, ardor, exolsio, & frigidi horrois insulsus, aliquando & bilis uomitus, tormina, capitis grauitas, uertigo, pallor, singultus, febris, spiritus & anhelitus celer, color plumbeus, sudor frigidus. Mors in horis septè, aut ut longissime absit tertia die, in his qui non seruantur, & maxime his qui à uipera foemina sunt icti. Conuenit igitur priusquam cruenta prodeat lora, alij plurimum edere, & uinum meracum multum bibere, ac uomere. Efficacissimum enim in eis remedium est alij elus, ac meracior uini potio, inquit Archigenes: adeo ut si quis multum eius sustineat usum, itemq; meri potum, nullo alio auxilio habeat opus. Dato autem citra dilationem theriacen ex uiperis bibendam, eandemq; plagæ superponito, Quin & ipsam uiperam excoriatam & coctam, capite ac cauda & interaneis uisceribus omnibus reiectis, ueluti anguillam edendam præbeto. Caput autem uolsella amputatum diligenter adseruat morsui imponito ea parte adhuc calente qua contigit collum: id enim extrahet uenenum. Aut quempiam qui ore plagam exugat adhibeto, qui ut supra dictum est in comunibus remedijs, os prius habeat ex oleo collutum. Aut gallinam dissecato, & interne adhuc calentem morsui imponito, atque hoc remedium frequenter ac assidue repetito. Scarificare autem per ambitum oportet demorsum locum & cucurbitas admouere. Postea uero fraxini folia tundito & exuccato, & succum quidem in potu exhibeto, quod uero ab expresso succo reliquum est ad morsum imponito. Est autem fraxinus arbor ex qua fraxinea appellata ligna cæduntur: est enim ualde efficax ad uiperarum morsus hæc arbor. Melisophylli item folia & succus cum uino potatus, & uulneri impositus euident auxilium confert, etiam si iam moriatur æger. Aiunt autè si quis melanthij drachmas quatuor edat non moriturum. Similiter etiam melaphroditos herba efficax est, & cancri flumiales cum lacte triti & potati & plagæ adhibiti. Magnifice etiam profunt ranæ coctæ comestæ, & iusculum earum bibitum. Præstat & nasturtium plurimum edere, ac tritum quoq; cum uino bibendum exhibere. Facit autem mirabiliter testudinis sanguis exsiccatus cum syluestri camino potatus. Utendum etiam omnibus communibus remedijs supra relatis: superuacuaneum autem fuerit eadem sepe scribendo repetere. Maxime uero utendum est

*Ally elus
emolumentum*

*Fraxinus
quædam arbor*

est anchusæ radice, & heliotropio cum uino. Dandus & hamarites lapis. Auxiliantur & raphani large in cibo accepti, deindeq; uomitu reiecti. Statim uero à uomitu theriacæ Andromachi exhibeatur. Post scarificationē & galinarum impositionem plaga ex trifolij bituminosi decocto calido per multum tempus proluatur ac foueatur. Nam si pauco id tempore facias, peius afficiuntur. Deinde porrum & panem cum sale imponito, aut alliū cum aceto, aut cinerem ipsius exustum, aut fraxini cinerem, aut aliam quamuis cum aceto, aut hastulæ regię folia, aut lycomorī folia cū pane, aut lauri folijs teneris coctis & cum oleo tritis locos integre prius quā claudantur, aut caprinum sterces imponito cum uino.

Asclepiadæ epithema, ad uiperæ morsum.

Sagapeni, piperis, laseris maxime cyrenaici, opopanax, cuiusq; unc. i, galbani sextantem, sulphuris uiui sextantem. Succos aceto dissoluito, & arida trita inspergito: & ad emplastri formam redacta plagæ imponito. Forinsecus autem folijs fici aut urticæ contegito. Aliud. Centauræ, aristolochiæ, radici peucedani, æquales partes contundito, cribrato, & aceto subigito, adiectoq; galbano in emplastri formam reducito. Aliud.

Canchryos, staphidis syluestris, aristolochiæ, radici bryoniæ, singulorum partem unam, opopanax partes duas. aceto subige, & utere ut dictum est. Utendum & prædictis communibus cataplasmatibus & epithematibus, maxime uero Andromachi theriaca. Aliud ualde bonum.

Cancrorum fluuiialium carnes terito, & adiecta iride & calaminthe rursus sufficienter terito, idemq; rursus modico sale addito facito, & pastillos in formato, quibus in umbra exiccatis utitor: in potu quidem ex aqua mulla, aut uino: in cataplasmata uero cum lacte dissoluito.

De diplade.

Cap. xxii

Diplas à quibusdam causis appellatur, estq; uiperæ species quæ in maritimis magis locis reperitur, magnitudine cubitali, ex crassa in tenuem definens. Notas autem habet per omne corpus fuluas & nigras: caput uero angustius. Sequitur autem ab ea morsos, præter ea quæ de uipera dicta sunt, & sitis intolerabilis planè, adeo ut etiam si multus eis potus exhibeatur, sitis non sedetur. Et tamen neq; per urinas, neq; per uomitum, neq; per sudores quicquam excernitur. Duobus igitur pereūt modis, aut ob multam sitim exusti, si potum non sumant: aut ob multam expletionem distensus rumpitur uenter, uel inferne circa inguina uel circa imum uentrem, quemadmodum in hydropicis fieri consuevit. Cæterum & his ueluti à uipera morlis auxiliamur, proprie autem in his potiones magis urinam cientes exhibeantur. Aluus item per infusum eluatur. & oleo cum decoctionibus exhibitoad uomitum cogantur. Ad plagæ uero locum post exuccionem, & scarificationem, & cucurbitularum affixionem, & dissectas gallinas, calcem uiuam cum oleo imponito, & emplastra adtractoria, & theriacen.

I De

De hæmorrhæ & hæmorrhoidæ.

Cap. xxiiii

A Nimalia hæc colore quidem sunt arenoso, magnitudine autem tres palmos æquant, & in tenuem ac angustam figuram caudam paulatim desinunt. Sunt autem igneo oculorum fulgore, rectæque & tarde proreptant. Per corpus uero multis notis albis & nigris uariiegata sunt, & asperioribus squamis obsita, quapropter dum serpunt sonus auditur. Et scæmina quidem uentri incumbens per terram reptat, & gressum inferne circa caudam firmat. Mas uero circa uentrem in gressu nititur, & collum in serpendo extendit. Consequitur horum morsum color icti loci cruentus, mali coloris & nigricans: ex quo nihil in principio effluit, præterquam paucum quippiam aquosum. Stomachi adest dolor, & spirandi difficultas. Deinde sanguis ex naribus profluit, & ex foraminibus ipsius morsus. Et quicquid est in toto corpore cicatricum, id rumpitur & sanguinem profundit: hæc quidem in maris hæmorrhæi morsu contingunt. A scæminæ uero hæmorrhoidis morsu ad hæc & anguli oculorum sanguine manant, & gingivæ dentium, & unguium radices: ut simpliciter dicam, per omne corpus sanguinem effertur cotingit. Dentes præterea excidunt, & gingivæ putrefiunt. Horum porro curam facere oportet, primum quidem sanguinis eruptioni obluendo ac resistendo per ea quæ apte sanguinem sistere possunt: deinde cataplasmata plagæ imponendo ex folijs uitis coctis tritis cum melle, & portulacæ folijs cum polenta. Antea uero quàm cuncta prodeat urina, allium multum edant, & uinum multum dilutum bibant, & ad uomitum cogantur: deinde confectum theriace exhibeatur: & postea pisces multos, alijs tritis cum oleo tinctos, edant. Sumant item in cibo panem & uuam passam dulcem, & deinde uino diluto large hausto uomant. Plaga uero aqua frigida proluatur. Vesica autem spongijs calidis foueatur.

Preparatio sanguinis testudinis marinæ, & usus. Cap. xxiiii

T Estudinem super ligneum aut fictile uas supinam reclinam, eiusque caput statim amputato, & leuata ipsa sanguinem supposito uase excipito, & congelatum deinde per harūdinem in multas partes secato, atque operculi uice cribrum uasi superponito, & ad solem locato: siccatum uero reponito, ac utitor ad uiperæ morsum drachmis duabus exhibitis, ex poscæ cyatho uno: sequenti deinde die siccæ sanguinis drachmas quatuor cum aceti cyathis duobus dato: & tertia deinceps, sanguinis drach. octo, ex aceti cyathis iiii.

De ammodite, aut cenchria.

Cap. xxv

A Mmodites magnitudine quidem cubitalis est: maior enim non pingitur, neque scribitur: colore uero arenosus: per corpus autem maculis nigris insignitur. Caudam autem habet præduram superne discissam. A quibusdam uero cenchrias, hoc est miliaris, ob caudæ instar milij duntiem appellatus est. Latiores autem maxillas quàm uipera habet, quumque in multis alijs ei similis sit, colore magis discerni potest. Vipera enim subflaua est.

Cæterum

Cenchrias, miliaris, à milij duntie

Cæterum ab Ammodite percussos festina ut plurimū mors sequitur. Qui uero breui nō percunt, his sanguis ex uulnere promanat, & uulnus intumescit, paulopost aut sanies effertur: sequiturq; capitis grauitas, & animi deliquium. Qui uero optime dispositi sunt, in triduo intereunt: quanquam alii qui usq; ad septimū diem durarint. Celerius uero mors adest his qui à foemina fauciantur. Auxilium porro & hi ferunt, primum quidem à communi bus remedijs, utpote à cucurbitularū appositione cum scarificatione per ambitum uulneris locorum, & superiorum partium constrictione, & ad ipsam plagam scalpelli admotione. Proprie autem eis auxiliatur menta cum aqua multa potata, castorium, casia, & artemisiæ succus cum aqua. Danda etiam in potu theriace, eadem quoq; plagæ imponenda. Utendum & emplastris attractorijs: postea uero cataplasinata, quæ ad nomas siue ulcera serpentia conducunt, imponenda.

De sepe.

Cap. xxvi

Serpens qui seps appellatur, longitudine quidem duorum cubitorum respicitur: ex crasso autem in tenuem abit: recta uero ac tarde proserpit: caput habet latum, os acutum: uniuersum autem corpus multis albis notis respersum. Cæterum his qui ab eo percussi sunt, ex uulnere manifestus sanguis excernitur, paulo post uero sanies graucolens: tumor & dolor segnis est: affectæ partes putrefactæ dealbantur, ac totum corpus uiriligni (quæ alphas appellatur) simili colore inficitur: defluunt capilli toto corpore, atq; intra tres aut quatuor dies pereunt. Porro opem & hi sentiunt ex eisdem rebus, quæ in uiperæ & cerasæ & ammodite morsu relatæ sunt. Exhibenda est præterea portulaca multa in cibo, & uinum bibendū myrtites meracius. Conueniet item spongiam calido aceto imbutā morsui imponere, & ex butyro cum melle locum illinire: aut milium cum melle, aut paleas unā cum terra eis adhaerente exustas illinito.

De cenchrite siue acontia.

Cap. xxvii

Cenchrites serpens est magnitudine duorum cubitorum, figura autem crassa in tenuem abeunt, colore uiridi maxime iuxta alium, ut milium colore referat: unde & cenchrias, hoc est miliaris appellatur. Aiunt etiā hunc seipso fortiorem fieri, quum milium floret. Cæterum ubi se ad lædendū parat, extendit seipsum, ac ueluti iaculum uibratum corporibus inuolat, atque hoc modo uerberat. Ab huius morsu omnia quæ de uipera dicta sunt sequuntur, atq; etiam grauiora, adeo ut etiam putrefactiones & carniū defluxus consequantur, ac grauior item mors succedat. Cæterum remedia similiter eadem quæ ad uiperæ morsum his conducunt.

Cenchrias, miliaris, à milij colore

De cerasæ.

Cap. xxviii

Cerastes magnitudine cubitalis est, longissimus cubitorum est duorum: corpore uero arenosus est, & iuxta caudam desquamatus: eminentias habet in capite duas, cornuum similitudine. Partes uero circa uentrem ex ordine squamis oblitæ sunt, quapropter in serpendo sonum sibilo similē edit:

I 2 per

per obliquum autem nō rectā proreptat. Cæterum percussis ab eo eleuatio ac tumor plagæ capitis clauī similitudine insurgit, & sanies profluit uini colore aut nigricans, & maxime per ambitum, uelut in cruentatis aliās fieri cōsueuit. Reliqua item quæ in uiperæ morfu dicta sunt, etiā his succedunt, cum intensiōe uehementiori. Vt plurimum uero usq; ad nonum diem supersunt. Remedia autem eadem quæ morsis à uipera conferunt.

De dryino.

Cap. xxix

Serpentes dryini appellati abundant magis iuxta Hellepontum, latibula autem habent in quercuum radicibus. Est autem dryinus fœtidus: unde & si quis cum non uideat, fœtore loci cognoscatur. Est autem cubitorum duorum longitudine, & obesus, ac asperimis squamis circa uniuersum corpus munitus. In his ipsis squamis muscæ pennis æreis latibula sua habere dicuntur, quæ tandem ipsos serpentes occidunt. Adeo autē malignæ ac nocentis naturæ est, ut si quis eum calcet modo, illius pedes excoriet, & tumorem ingentem circa crura inducat. Et quod magis mirū uideri potest, aiunt etiam medici curantis ægrum manus excorari. Si quis autem, inquiunt, animal ipsum occidat, omnia quæ odorat ab eius fœtore corrupta putat. Porro qui ab eo percutiuntur, his tumor insurgit nigricans, dolor uehemens, nome, delirium, corporis siccitas, singulus, uomitus biliosus aut omnino uomitus simplex, urinæ suppressio, tremor, interceptio uocis, stupor, scissura & mortificatio percussorum locorum. Plurimi etiā intereunt. Porro & hi ipsi quoq; ex his quæ in uiperæ morfu dicta sunt, opem sentiunt, itemq; ex communibus remedijs iuxta consequentium accessionum proportionem adhibitis.

De amphibæna & scytala.

Cap. xxx

Animalia hæc inter se similia sunt, non enim ex crassis in caudam terminem abeunt, sed æqualis crassitudinis per totum existunt, ut neq; cognoscant uidentes ea, iuxta utram partem caput aut cauda sint sita. Differt autem amphibæna à scytala, in eo quod ex utraq; parte progrediatur: unde & amphibæna Græcis est appellata. Galenus autem amphibænam animal biceps esse dicit. De hac bestia ferunt, quod si fœmina uterum ferrens ipsam transgrediatur, conceptum male pariat ac abortiat. Cæterum ab utroq; animante demorsis, contingit morsum obscurum esse, ac uix apparere, ueluti sunt muscarum puncturæ: quapropter etiam si mordeant, non enecant tamen, uerum inflammationes inducunt, ueluti contingunt etiam ab apum ac uesparum stimulis. Quare transferantur ad hos quoq; quæ de illis sunt relata, uerum facultate intensiore. Aiunt autem scytalam chalcidicam eiusmodi accessiones sequi, quales à uipera morfos. Vnde & ijsdem remedijs ad eius morsum utendum: & ut compendio dicam, ad omnem uenentæ feræ morsum: cuius speciei hic non reperis nomenclaturam, auxilia eadem quæ ad uiperæ morsum conducunt.

scytala
chalcidica

De parea

De parca & spathiuro.

Cap. xxxi

PArcas serpens in Syriæ locis reperitur, colore autem alij quidem æs reserunt, alij uero nigricant. Morsum autem etiam si inflixerint non enecant: uerum quemadmodum amphibæna & scytala, ita & hic plaga sua tantum inflammationem inducit. Quare ex ipsdẽ etiam curentur, & ex his quæ de chersy dro referentur. Cæterum spathiurus in locis iuxta Chalcidem magis inuenitur. Est autem animal ex crasso in caudam abiens tenuemilatum habens caput, ac mures comedens. Neque uero hic morfu enecat, sed inflammationes tantum inducit. Quapropter ab eis percussis itidem consimilibus remedijs curentur.

De peliade & elape.

Cap. xxxii

Signa quidẽ horum animalium apud ueteres non sunt descripta, ut potest quæ omnibus sunt manifesta. Contingit à peliade morsus dolor circa locum, & putrefactio, non periculosa tamen, & uexatio ac obfuscatio oculo rum, ex ueneni nimirum ad ipsos distributione. Curantur autem succo pti sanæ cum oleo in potu exhibito, & oxylapathi decocto, & simplicioribus remedijs ad ictericos descriptis. Oculi uero lotio pueri uenerem nondum experti proluantur tum per se, tum muria ammixta. Caput item similiter ex eisdem perfundatur. Post purgationem deinde corporis opobalsamũ cum melle illine, aut collyrium aliquod uisum acuens quod meatus rarefacere potest. Simul enim cum lachrymarum profusione & uenenum excernetur. Si uero dolor cõsequatur oculorũ, eum lenibus collyrijs mitigare oportet, quæ tamen non stupefacient. Elapis porrò morsum tormen uolulofum con sequitur. Alias communibus auxilijs curantur. Maxime uero his quæ tormi na leniunt, & urinam cient.

De basilisco.

Cap. xxxiii

Hocce animal magnitudine est palmorum trium, subflauum & capite lacuto. In capite autem eminentias tres habet. Vim uero super alia omnia reptilia maximam acquisiuit, ut nulla ex eis queant uel sibilum saltem ipsius sustinere. Quin & si quod ex reliquis animalibus uenenum iaculãtibz ad cibum aut potum capiendum properet, & basilisci iuxta locum præsentiam perfentiscat, retro cedit, necessarij etiam ad uitam nutrimenti negligẽs. Cæterum percussos ab eo totius corporis ardor comitatur, itemq; liuor: defluunt capilli è corpore confestim, & in instanti omnino tempore mors sequitur. Neq; uero corpus ipsius mortui ullum aliquod animal carniuorum attingit: si uero fame coactum ipsum contingat, tum & ipsi illico eodem loci mors instat. Aiunt autem quod conspectus modo, & sibilans auditus, eos qui ipsum audierunt tollat, similiterq; ab ipso conspectos. Quare uanum & superfluum duximus auxilia contra eum referre.

De draconibus.

Cap. xxxiiii

AAnimal quidẽ hoc, uenenu non iacit, attractione autem & ui sua ene

cat. Abundant quidem igitur dracones in Æthiopia & Lycia colore autem differunt: alij enim nigri sunt, alij rufi, alij cinerei coloris: & rursus alij quidem cubitorum v sunt, alij uero x. sunt & qui ad xxx cubitos se extendant: quidam etiam maiores narratur. Squamis autem obfiti sunt per totum corpus asperissimis: magnos oculos habent, & supra oculos præeminetias quasdam similitudine pellium flexibiliū superciliorum. In mento autem excreſcētiam quandam habent, quam barbam appellant: maxime hiantes sunt oris rictu, lingua exserta, & dentibus magnis similitudine syluestrium suum: cum quib. etiam fracturas & collisiones corporū inferunt. Quare curationes ueluti ad mordentia animalia sunt, non ut in his quæ uenenum iaciunt.

De cherfydro.

Cap. xxxv

Serpens hic cherfydri appellationem inde habet, quod in principio quidam in aquosis degit locis, & hydus appellatur ab ipsis aquis, hoc est natix: postea uero siccos incolit locos: & ex compositione locorum, cherfydri, id est natricis terrestris nomen inuenit. In terra itaq; degens, cherfydrus appellatur: & tamen sanè seipso seuior redditur. Equidem in humectis locis ex humido uictu exsatiatus, non parum uenenum habet. Quum uero terrestris fit, maxime merum & nocentius id acquirit. Cæterum similitudine est aspidis terrestris parua, præterquàm quod ceruicem non ita latam habet. Hoc enim insigne solū aspides præ his habent. Qui igitur ab his morsus sunt eis communiter eadem accedunt que in aliorum serpentium morsu: ueluti est tumor, continuus dolor arsius, liuidus locus & seculentus, uertigo oculorum, exolutio, uomitus biliosi foetidi. Proprie autem motus totius corporis inordinatus, ut & per uetrem quædam inordinate ferantur. Mors autem intra tres dies. Porro ex cōmunibus remedijs etiam hi opem ferunt, & ex theriacis antidotis. Priuatim uero cupressi pilularum drac. i, & myrti baccarum itidem i drach. terito, & cum melle rosaceo aut uino mulso in potu exhibeto. Iuxta affectū autem locum calcem uiuam & similia cum oleo imponito.

De rana rubeta.

Cap. xxxvi

Rubeta, ranæ species est, quæ palustris uitæ conditionem in terrestrem mutauit, unde & rubeta appellatur: hac autem mutatione, similiter ut cherfydrus, ægre curabilem afflictionem eis qui in eam inciderunt, inducit. Est enim animal magnitudine nihilo minus testudine parua: exasperat autem & uibrat terga dum spiritu expletur, atq; ob id ipsum audentius euadit. Ad lædendum itaq; & manifeste insurgit, & saltibus interpositum spatium contrahit: raro quidem morsum infligens, uerum anhelitu consueuit uehementer uiulentum inducere, adeo ut etiam si anhelitu contingat tantum, eos qui prope sunt lædat. Plura autem de hoc animante historijs relata relinquimus, his tantum quæ cognitu utiliora iudicauimus, appositis. Cæterum qui ab eis læsi sunt, his omne corpus intumescit, & diffunditur, ac cito omnino percutunt. Porro quæ opem auxiliarem his ferre possunt, ex uniuerſalibus

salibus & communibus antidotis ac epithematis huc transferantur, item c̃p̃ & reliquis quæ ad curationem pertinere uidebuntur.

De turtura, seu pastinaca marina. Cap. xxxvii

Qui à marina pastinaca percussus sunt, his uulneris locus manifeste apparet: sequitur autem dolor pertinax, & totius corporis stupor: acutum enim & firmum habet aculeum, quo uehementissima ui in alium impulsus nerui fauciantur. Quapropter in aliquibus mors derepente totum conuellens corpus comitatur. Mirum Narrant quidam, si quis caudam pastinacæ quæ ictum intulit, auferat, & in arborem, maxime quercum, suspendat ac figat, ipsam quidem arborem arefcere, agrum autem sanari: atque id iuxta contrariæ affectionis & remedij rationem contingere. Cæterum auxilium ferunt percussus ab ea, ubi stupor & refrigeratio totius corporis consequatur; ex calidis illitionibus & consimilibus cataplasmatibus. Proprie autem furesces aceto cocti & pro cataplasmate impositi eis auxiliantur: & ipsum adeo acetum affusum pro fotu ualde prodest. Magis autem conueniunt eis attractoria, & quæ tenuium partium sunt, ac calida: quo nimirum per attractoriam facultatem uenenum ex profundo attrahatur: & per calorem frigiditas mitigetur: & quæ tenuium sunt partium in altum prorepent. Ad hanc igitur rem in promptu habebis apta. Sulphur uiuum urina ueteri rigatum, marubium, lauri folia, echium, radicem panacis, saluiam, & similia. at uero si his careas, fermentum acidum cum liquida pice emollitum imponito, mirabiliter enim auxiliatur. Cum his concordat emplastrum piscatoris, & ex bryonia pastillus tum impositus, tum ex uino calido potatus: cuestigio autem utilitatem suam demonstrat: describetur autem in fine huius sermonis. Dato item & lauri decoctum: aut succum cyrenaicum cum myrrha magnitudine fabæ, ac modico pipere terito, ac dato cum uino: aut silphium, aut laser ex uino: aut succi fici guttas quinque cum tribus serpilli granis bibendas præbe.

De murena.

Caput xxxviii

Morsis à murena eadem accidunt quæ morsis à uipera: quapropter etiam similia remedia eis adhibenda. Dato autem & fici succum cum serpillio, ut prædictum est.

De dracone marino.

Cap. xxxix

Ad marini draconis plagam, locum percussum cum plumbo fricato, ipsumque draconem dissectum plagæ imponito. Serpillum item tritum aut lenticulam coctam pro cataplasmate imponito. In potu uero absinthium cum uino diluto præbeto, aut saluiam cum passo. Mire etiam his conducit ex bryonia & eruo pastillus cum uino potatus.

De scorpio marino.

Cap. xl

Scorpionis marini plagam sanat nullus dissectus & impositus, sulphur uiuum cum aceto illitum. Lauri bacca tres trita in potu acceptæ.

De culicibus.

Cap. xli

Q Vandoquidem & hi hominum corpora lædunt, etiam de ipsis pauca dicemus. Culices fugantur cedrinorum lignorum scobe cum atramento futorio suffito. Idem faciunt cupressi pilulae, aut coma, aut ramenta: & uini fex sicca, & conyza, & bubulum stercus postquam contraxerit nigrorem. Aut melanthium uel absinthium oleo coctum illine, & culices non appropinquabunt. Aut melathium cum absinthio, aut cerusam cum atramento futorio in bubulo stercore suffito.

De muscis.

Cap. xlii

M Vscas necat, ueruatrum album tritum, lacti, aut aquae mulsae inspersum. Aliud. Semen hyoscyami, & ueruatrum nigrum, & argenti spuma simul trita, & cum polenta irrigata & subacta, butyroque aut adipe nidorosa facta, & in massas coacta, & muscis exposita; ipsas occidunt.

Ad pulices.

Cap. xliii

P Vlices necat, orodaphnes, aut cumini decoctum respersum. Idem & aqua marina facit.

Ad cimices.

Cap. xliiii

V T ne cimices gignantur, chamæleonis nigri decoctum facit, si ex eo lectus proluatur. Deinde futorium atramentum cum felle tauri terito, ex coq̃ lectum illinito. Aut etiam oleum per se, aut cum atramento futorio inungito.

De uenenis.

Cap. xlv

E X animalibus exitiosa & letaliter corruptentia, sunt cantharis, buprestis, salamandra, cruce pinorum, rana rubeta, lepus marinus, rana palustris muta, hiruðines. Ex seminibus autem, hyoscyamum, coriandrum, cicuta, psyllium. Ex succis, papaueris succus, opocarpasum, succus thapsiae, elaterium, succus mandragoræ. Ex radicibus, thapsia, aconitum, ixiæ, ueruatrum nigrum, agaricum, ephemerum. Ex olcribus autem, taxus, solanum futorium, herba sardonis, papauer cornutum, ruta syluestris. In his etiam fungorum genera connumerantur. Ex animalibus uero, sanguis tauri. Mel, Heraclea Ponti urbe natum: lac coagulatum. Ex metallicis, gypsum, cerusa, calx, auripigmentum, sandarachia, spuma argenti, argentum uiuum. Ex his uero quæ nobis familiaria sunt, uinum multum acuatim à balneo potum: similiter & aqua frigida acuatim à balneo aut cursu ingesta.

Methodus præseruatua, ne quis à uenenoſo pharmaco lædatur.

Cap. xlvi

Q Uod si quis uenenum habeat suspectum præcauere omnino oportet, prima cura ad hoc adhibita, ut corpus ita appareatur, quo læsioni ac ueneni impressioni minime obnoxium reddatur: quam ad rem bona conſectio

Etio uel imprimis conducit. Cibi autem ea gratia sumendi sunt boni succi & magis carnosii: animaduersione habita, ne quod obsonium consuetum non referat colorem, aut odorem, aut gustum, aut qualitatem. Multa enim uenena etiam prouidis sunt ignota, & cognitu difficilia. Qui igitur in potu aut ci bo uenenum suspectum habet, is signis certis quale sit id deprehendat. Ex odore namque & amaritudine potus & cibi, opium cognoscatur. Ex colore autem, cerusa, gypsum, calx. Ex his uero quæ in cibo & potu innatant, lac coagulatum, & recens mactati tauri sanguis. Ex foetore autem & qualitate ac odore, rana rubeta, & lepus marinus. Quin & reliqua ex alijs quibusdam signis noscuntur, de quibus sigillatim amplius dicitur. Cæterum præseruatia sunt, quæ si quis præsumat, & post sumere uenenum contingat, minime ab ipso lædatur: suntque huiusmodi. Calaminthe quotidie accepta ex natura sua omni letali pharmaco resistit: & si in ueneni suspitione exhibeatur, destruit iam acceptam exitiosam facultatem. Theodorus autem ita inquit: An-

Theodorus
medicus

Strato
medicus

Alia antidotus Asclepiadæ, ad exitialia uenena, quæ ante data adseruat: si uero ab accepto ueneno detur, ipsum cognobile facit.

Baccarum iuniperi drachmas 11, terræ lemnix quæ sphragis dicitur drachmas 11, conterere, & melle aut oleo excipe. Vsu uero expetente ad nucis ponticæ magnitudinem ex aquæ mulsæ cyathis 11, à balneo bibendum præbere. Hoc quidem igitur pharmacum si nulla letalis adsit uis sumptum manet, neque per uomitum rejicitur. Si uero quippiam letale haustum sit, nauseam mouet & uomere cogit, ut acceptum uenenum unâ cum antidoto excernatur. Quisdam dimidiâ tantum partem lemnix terræ, ex iuniperi baccis coniungunt, & cum oleo omphacino subactis similiter utuntur.

Quomodo cognoscantur qui uenenum sumpserunt. Cap. XLVII

Cognoscere autem & discernere oportet eos qui tale quippiam sumpserunt ex signis quæ coincidunt & consequuntur. Vbi enim in aliquâ placidâ & bene cõpositâ prius mentis, & bonæ itidem habitudinis, accedente etiâ iusta ciborum cõcoctione, statim & derepente uariæ accessiões irruunt, præsertim ab accepto statim cibo aut potu, ueluti si accedat tussis, aut foetida sanguinis per os reiectio, aut molesta & ægra lotij excretio, aut dolor in alto uentre, aut

ardor

ardor iuuenilis, aut sensus erosiois, aut stuporis pulsio, punctura itē, tremor, singultus, contractio, eruptio bullarum, liuor, tumor, coarctatio, quarūdam partiū putrefactio, uomitus foetidus & plenus, manifesta alicuius uenenosae qualitatis apparitio & demonstratio. Ex his omnib. si quid repēte ab accepto cibo sano homini acciderit ueneno infectū esse hunc ipsum existimandū est.

Communia remedia & cura omnis ueneni. Cap. XLVIII

IN his igitur qui ignari uenenum sumpserunt, aut quibus circūiectum exhibitum est, communibus remedijs est utendum. Itaq; ubi adhuc datum uenenum in uētre est, & ob id morsum & nauseam infert, aut etiam alias accessiones, euestigio ad uomitum infectus cogendus est, aut mox inde à ueneno uidelicet accepto, aut aqua & oleo tepidis in potu datis, aut butyro si oleum non adsit, cum aqua calida dato. Licebit & maluae decoctū exhibere cum oleo, aut fœni græci, aut seminis lini, aut fursurum, aut pisanæ succum, aut seminis urticę decoctum: unumquodq; ex his oleo ammixto. A uomitu autem raphanos multos edēdos dato, aut cum aqua tepida tritos absorbendos: aut si hæc non adsint, nitrum cum aqua præbeto, rursumq; uomere iubeto. Post sufficientem uero uomitum cōmunia remedia paulo mox dicenda in potu exhibeto. Dato etiam id quod ex iuniperi baccis & terra lemnia est præscriptum. Quod si uenenum antea ad intestina descenderit, & tormina circa umbilicū induxerit, clysteri efficacissimo aluum euacuare oportet, ex maluae uidelicet, althææ, fœni græci, fursurum, centaureæ, aristolochiæ, & similium decocto, melleq; & nitro largo, itemq; oleo ammixto. In cibo uero exhibeatur raphanus, & salsamentum, alliaq; & cepæ. At in potu, uinum recens mari mixtum. Si uero in uescicam impetum fecerit uenenum, in aquam & oleum utere defessura: ut in aqua ipsa fœnum græcum, ac lini semen, malua syluestris & satiaua, ammixq; semen sint decocta. In potu etiam idem ammix semen præbendum, aut apium, aut fœniculum: aut spicam nardi, & similia odorata & simpliciora urinam cientia. Si uero uescicam rodāt uenenum, cucumeris semen desquamatum & tritum cochlearij mēsurā ex passo diluto præbeto. Similiter autem & si uentrem uehementē exurat, idem semen dato, ab omni calidiorum rerum adhibitione abstinedo: & his quæ ad cantharidem & buprestim referuntur utendo. Cæterū ad curam iam delato ueneno, irrigationē adhibeto, & illitionem ex oleo modico calido, in oleum item aut aquam & oleum in folio defessum. Cibos autē facile digestibiles & sorbitiones cum melle exhibeto: piscibus item recentib. teneris, & uolucris facile cōcoctilib. utitor. In potu deinde uinum albū & rufum, uetus & quā odoratis. præbeto. Quod si ad caput decurrat uenenu, ut grauitas & sopor consequatur, primum quidem aluus per infusum ex fœni græci, seminis lini, althææ & cucumeris syluestris maxime radices decocto subducatur. Deinde sternutatorum ex struthio & pipere adhibeatur, & cydamini succus aut elaterij naribus infundatur: odora menta item ad moueantur castoriū, & similia cum

Clyster
efficacijs.

cum aceto diluta. Præterea & præseruantibus præsidijũs utendum est, eoq̃
quod ex nucibus & caricis cõstat, & quod ex iuniperi baccis ac lemnia sphra
gide apparet, & theriaca Andromachi ex uiperis, & Mithridatis antidoto,
& consimilibus. At uero si composita non adsint, parabilibus utaris, & com- *Parabilia*
muniter ad omnia ferme uenena destinatis. Communiter autem ad omnia *ueneni*
letalia uenena facit irionis semen cum uino & oleo. Lemnia sphragis cum *remedia*
uino, egregie enim & quàm celerrime uomitum procurat. Aut nuces iuglan
des cum caricis & ruta edat: aut hæc ipsa decoquito, & decocto accepto uo
mataut seminis lini, aut malua, aut fœni graci decoctum cum oleo sumat.
Porro ad accersions quæ cum frigore incidunt, abrotonum in aceto mulso
cum sale datositem irionis semen, eryngij radicem, spicæ celticæ radicem, ser
pillum, bryoniæ radicem, castorium, porri succum, laser, sagapenum, opopa
naca, succum cyrenaicum, rutæ syluestris semen. Polij etiam ac scordij & be
tonicæ, cuiusq̃ drachmam unam cum uino aut aceto mulso.

Ad eos qui cantharidas hauserunt.

Cap. XLIX

Qui cantharidas acceperunt in corpus, his statim uirus eorum in nares
distribuitur odore picis. Picis item aut cedriæ qualitas linguæ inferri
uidetur. Sequitur autem & stomachi morsus, uentrisq̃ ac renum, & maxi
me uesicæ. Quandoq̃ & sanguinis excretio per utinã & aluum fortes mor
sus concomitatur. Vnde sanè locus circa os uentris uehementer dolet, adeo
ut ipsum pectoris os, quod chondrũ xiphoidea à capitis gladij figura Græ
ci appellant, dolore affici putetur. Inflamatur autem & dextrum ilium: dein
de urinæ ejiciendæ difficultas, imo & suppressio consequit̃. Amplius autem
& uis uisua oculorum consumitur, delirantq̃, & à loco in locum iactantur.
Cæterum auxilium sentiunt, si quàm celerrime uinum dulce eis præbeatur,
nucleis pineis recentibus aqua calida præmaceratis ac probe tritis ei ammix
tis, aut cucumeris semine decorticato similiter ammixto. Lac etiam assidue
cum melle modico primum exhibendum, postea & per se recens mulctum.
Aliquando & adipem anserinum aut gallinacũ liquefactum potui adfun
dito: aut terref samia drach. i, aut rosmarini drac. i, ex aqua mulla dato. Dan
da etiam iura pingua porcina aut quilla aut anserina: carnes etiam agnina,
gallarum, porcellorum recens natorum pingues ac probe coctæ, & cere
bella porcina. amplius autem de iure absorbendum præbeatur, donec affe
ctus ad uomitum cõcitetur. Bibat insuper uinum dulce tepidum plurimum
dilutum: ubi biberit autem unũquodq̃ uomitu rejiciat, rursumq̃ bibens uo
mat, idemq̃ sepe repetitis uicibus faciat. Post uomitum uero lac recẽs mul
ctum, aut pitanae succus, uel halicæ, aut oryzae, aut malua, aut seminis lini
succus cum adipe anserino uel gallinaco per dysterem infundatur. Quod
si exolutiones & morsus oboriantur, lac bubulum recens mulctum assidue
bibendum & cito remouendum exhibeto. Aut uitis germina contusa cum
passo diluto dato. At uero contrariæ affectionis ratione quantũ nihil aliud
his

*Chondrũ
xiphoidea,
os pectoris*

his auxiliantur cantharidum alē & pedes cum passo potata, & scorpionū radice trita ex passo potata. quæ itidem optime ad buprestim facit. Dandum & ex uiperarum theriaca parum quid, aut ex Mithridatis antidoto. Porro ubi accessiones fuerint sedata, farina hordeacea cum aqua mulla illo imponatur, & uniuerso corpore ex oleo gleucino aut cyprino illito, eger in balneum deducatur, & in folio diutius moretur. Cibis autem facile concoctilibus, & acrimoniam lenientibus multo tempore utatur. Vinis item dulcibus & laetis potu.

De bupresti.

Caput I.

Buprestis species quidem est cantharidis, uerum uirosi tum gustus, tum odoris. Ab eius autem hauustu uehemens stomachi & alui dolor consequitur. Intumescit item os uentris, uenterque ipse ac totum corpus attollitur, quemadmodum in hydropicis fieri consuevit, & lotium cohibetur. Cæterum eadem remedia quæ ad cantharidas dicta sunt, etiam ad buprestis summionem exhibentur. Proprie autem post uomitum à iusculis pinguibus & passo concitatum, & post euacuationes per dysterem, sicut arida pingues in cibo conueniunt, & decoctum ipsarum in potu cum uino. Commodissimum autem tum his, tum qui cantharidas acceperunt, est muliebre lac ex ipsis mamillis assidue exuctum.

De eruca pini.

Cap. LI

Eruca pinus potata, statim dolor circa os & palatum oboritur, & lingue inflammatio fortis, & stomachi aluique ac intestinorum adfectio uehemens, cum pruriginoso circa interna sensu. Ardor item per totum corpus, & stomachi fastidium. Cæterum eadem his auxiliantur quæ ad cantharidas sunt relata. Proprie autem oleum melinum pro simplici oleo exhibitum, & uomitu reiectum.

De salamandra.

Cap. LII

Salamandra animal simile est stellioni, asperius & scabrum magis quam Lacerta uenenata. Penetrat autem hoc animal per ignem ardentem, nihilque læditur dissecta & discedente ab ipso flamma. Si uero per tempus aliquod in igne immoretur, consumpto frigido in eo humore, exurit. Committatur autem salamandræ acceptionem, inflammatio linguæ: mens impedita & turbata: tremorque cum stupore quodam & exolutione. Quædam etiam corporis partes per ambitum liuescunt, adeo ut etiam decidat sæpius putrefacta. primum equidem maculae albæ per corpus apparent, deinde rubra, postea nigra cum putrefactione & defluuio capillorum. Danda uero & his quæ in cantharide sunt relata, ut inde uomant. Proprie autem resina pinus cum melle tritam delingendam præbe, aut etiam galbanum cum melle, aut nucas pineas tritas cum chamaepityos decocto: aut urticae folia liijs incocta cum oleo. Præter opinionem autem eis auxiliatur ranarum iusculum, si eryngij radices in eo coquantur.

De lepore

De lepore marino.

Cap. LIII.

Lepus marinus reperitur fermè in totum in loligines, animal paruum, luitosum odorem habens. Cõcomitatur autè eos qui cum in corpus ingesserunt, sapor in ore similis piscib. uitosus: paulo uero post aluū dolitāt, & color corporis ad arquati similitudinē permutatur, deinde plumbeus redditur, cum faciei tumore. Incenduntur autem pedis plantæ, & pudendū tumefactum cohibet urinæ effusionē. progrediente uero malo etiam mare olens lotum emingunt, quandoq; etiam sanguinolentum. Deinde nauseabundi facti biliosa uomunt sanguine permixta, & pisciū loturam olentia. Exudant item graueolentia, & omne piscis genus auersantur ac odio habent præter cancrum. His igitur lac asinum recens multum cum passo assidue præbeatur, aut si hoc non adsit, bubulum, aut malæ decoctum. Inde q; confestim uomant, deinde radicis cydamini tritæ drach. iiii. cū uino diluto dent. Aut ueratri nigri drach. i. aut scammoniæ scrupuli duo cū bubulo lacte aut aqua mulsā. Aut mali punici acini, uel cedrides, hoc est cedri fructus triti ex uino. Aut picem liquidam aut cedriam modicam cū passo delingendam dato. Anseris item sanguinem adhuc calentem cum passo bibendum præbeto. Edat & canculos assidue, piscem enim nullum admittit. Signum porro salutis iudicabis, si piscem edere possit.

Piscium odium

De rana rubeta.

Cap. LIIII.

Ranæ rubetæ duæ sunt species, Altera quidem surda est, altera uero nō. Surda autem exitiosa censetur. Pascitur autem in arundinibus toris lectu uiuens, ex ea sanè uenenum apparatur. Quod qui acceperint febris comitatur, Extremæ partes incenduntur, frequentiq; anhelatione ac difficili spiratione anguntur. Tumor autè sequitur corporis cum pallore buxo intenso, fœtorq; oris & singultus. Quandoq; etiam seminis inuoluntarium profluuium contingit. Cæterum facile opem reperiunt, si post aquæ & olei uomitum, uinum meracum multum sumant, aut picem cum uino. Radicem etiam harundinum in quibus ranæ rubetæ pascuntur contusam ex uino bibendam dato, aut cyperum ibidem enatam pondere drachmarū duarum ex uino. Aut marinæ testudinis sanguinem cum leporis coagulo & cumino ex uino præbeto. Porro dolium insuper aut furnum igne seruefacito, ignēque extracto laterem imposito, & ægrū immitti, multumq; ac diu exudare iubeto. Cogatur autem & ad continentem inambulationem, cursumq; ac exercitationem, propter cõtentum in ipsis stuporem. Vehementer enim efficax exercitatio in ipsis existit. Quotidie etiam lauetur.

Ranæ rubetæ

Dolium exudatorium

De Rana palustri.

Cap. LV

Qui ranam palustrē acceperūt appetitione priuantur, sequiturq; oris huicetatio, nauſea, uomitus, & oris stomachi leuior morsus. Curatur autem uini multi potu cum omnibus quæ calfactoriam uim habent: uelut est Cyrenaicus succus, laser, silphium, cuminum, piper, & similia.

K De

De Hirudinibus.

Cap. LVI

Hirudines cum aqua deuorata faucibus adhærent, aut iuxta quempiam stomachi locum, aut ipsi ori uentris. & primum quidem sensim exugunt sanguinem, expletæ autem his quæ deglutimus uiam obstruunt. Superexpletæ uero etiã sanguinem quem exuxerunt foras profundunt, ut imaginatione inducant tanquam sanguis ex internis locis reieceretur. Ceterum qui affectis contingit exuctionis sensus, is signum sit tibi hirudinem deglutitam esse. Excutit autem ipsas muria continue & paulatim absorpta, atq; id eo magis si acida muria ei ammisceatur. Idẽ facit & nix aceto dissoluta & assidue absorpta. Gargarisset insuper nitrũ cum aqua, aut aquam marinam, aut atramentum sutorium cum aceto, aut sinapi, aut hyssopum, aut organũ. Si uero inferne circa os uentris hirudo adhæreat, prædicta iidem omnia bibenda dato, præter sutorium atramentum. utendũ etiam his quæ aluum soluere possunt, aut medicamento purgatiuo. Cũ excrementis enim exire consueuerunt. Nos autem per alij multi esum has eicientes, nullo ex prædictis opus habemus. Quæ postremum gutturi affixæ sunt hoc modo excutere oportet. Aegrum in solium calida expletum usq; ad collum immitto, & frigidissimã aquam ore tenendam exhibeto, catq; frequenter permutato. Egredietur enim inde hirudo frigida appetentia prolecta.

De Ephemero.

Cap. LVII

Qui Ephemerũ quod aliqui colchicũ aut bulbũ syluestrem adpellant, in corpus adsumperũt, hos pruritus totius corporis cõcomitatur, nõ dissimilis ei qui urticæ aut scillæ irritamentis lacessitus excitat. Circa stomachum insuper acrimoniam sentiunt & uruntur cum multo grauitate. Inualecente aut malo, per aluũ cruentũ quiddam ramentosam admixtionẽ habens effert. His ueluti Salamandra accepta auxiliari oportet, per uomitus uidelicet assiduos & infusorũ immissione. Cæterũ ut ne inualescat uenenũ, mali punici, aut putaminis, aut foliorum eiusdem mali decoctum cum uino præbeto, aut organum cum lixiuio, aut uuas passas pingues tritas cum lacte exhibeto. Mirabiliter autẽ auxiliatur lac recens multũ assidue potatum, & in ore detentum, ut alio auxilio non sit opus.

De Dorycnio aut solano furioso.

Cap. LVIII

Dorycnio siue solano, ut alij appellauerunt, furioso potato, in gustu ueluti lactis quædam qualitas sentitur, singultus adeit continuus, humectatio linguæ, & sanguis acruatim reijcitur, atq; per aluum ramentosa quædam feruntur quemadmodum in dysentericis fieri consuevit. Ante quã uero quid tale cõsequatur, post uomitũ & clysterem, aqua multa aut lac asininum recens multũ assidue potatum axiliatur: passum item tepidum cum aniso potatũ & amygdalis amaris tribus: pectuscula etiam gallinarum probe cocta, & omne conchyliorum genus crudum & assatum in cibo acceptum, & locustæ & gammarum, & iusculum ipsorum in potu.

De

*De mali punici uis
contra ephemerũ*

De Aconito.

Cap. LIX

AConitum uero quod quidam irim syluestrem appellant, statim dum potatur linguam edulcorat cum quadam adstrictione: deinde paulo post in lingua amarefcit, & constrictio mandibularū concomitatur, & oris stomachi morsus, & laterum dolor, pectorisq; grauitas ac praecordiorum, materia enim quæpiam circa umbilicū innititur, & cum multis flatibus consequentibus corruptio contingit, grauatür item caput & tempora contremiscunt, oculi uero turbatiores fiunt & subcruenti ac lachrymas profundunt. Quod si diutius perseueret malum, etiam tremor & concussio ac tumor totius corporis sequitur. Cæterū his post uomitus & insula, origani potu succurrendum est, & rutæ, marrubij, absinthij, erucæ, abrotoni, chamelææ ac trixaginis cū uino. Aut coaguli ceruini aut hedi aut leporis potu ex aceto. Aut ferri recrementū, aut ipsum ferrum, aut aurum siue argentum, aut lapidem molarē omnia igne candefacta in uino extinguito, ipsūq; uinū calidum bibendum præbeto, aut lixiuium cum uino dato. Aut pullum gallinacū tænerum & pinguisimum coquito & decoquendo eliquato donec ossa sola relinquant, & iusculū per se uel cū uino bibendū exhibeto. facit & uitalinū pingue ius potatū & uomitu reiectum. Maxime uero proprie facit trixago potata & castoriū, & iris ac ruta. Quantū aliqui à nullo horū se auxiliū scivisse asserant. De melle quod in Heraclea ponti nascitur. Ca. LX.

Hoc mel siue in potu siue in cibo acceptum easdem adstrictiones inferre quas aconitum in Heraclea enim ponti urbe aconitū gignitur, ex quo colligitur ibidem istud mellis genus. Conueniunt igitur eadē auxilia in aconito iam relata, & magis utiq; rutæ folia ex uino mulso potata.

De Coriandro.

Cap. LXI

Coriandrum potū ualidam uocem facit, & delirium furiosum nō dissimile illi quod ab ebrietate proficiscit inducit, hoc accedente etiam qd turpia dictū infecti loquant, & p omne corpus odor coriandri transspiret. Auxiliatur aut eis uomitus ex oleo irino, & uinū meracum cum per se, tum cū absinthio potatū. Oua item in unum uasculum euacuata conuassata & tepesacta ex muriaq; absorpta: ius itidem pingue salsum tū anserinū, tum gallinaceum. passum etiam, Ex anisum in uino acido siue uappa sumptum.

De Psyllo.

Cap. LXII

Psyllion potatum totius corporis frigiditatē inducit, & stuporē cū exsolutione & mœrore. Auxiliantur autem his eadem quæ coriandro hausto.

De Cicuta.

Cap. LXIII

Cicuta potata uertiginem & caliginem oculorū inducit, adeo ut neq; minime cernere possint, singultum insuper acmentis percussione & frigiditatem. sequitur deinde suffocatio, & segnicies ac liuor. postremū conuulsū spiritum in respiratione suppresso strangulantur. In principio igitur per uomitum ex aqua & oleo cicutam excutere oportet. quod uero ad intesti-

num delapsū est, per euacuationē expurgetur. Deinde tanq̃ ad maximū remediū ad passi meraci potū perueniendū, ita ut in interuallis meraci potus, bubulū lac aut asininū recēs mulctū, aut absinthiū cū pipere in potu exhibeamus. Rutam itē & castoriū ac mentam cum uino. Aut amomi drach. i aut styracis drach. i cū semine urticae ex uino. Aut lauri folia, aut silphiū, aut laser, aut succū cyrenaicū, aut apij semē, aut iridis radicē, aut sceli massiliense, omnia ex uino dulci. Aut nitrum cum aqua larga. Totum praeterea corpus calefacere cōducit & praesertim praecordia. Ad uehementiorē item motum, ac cursum ager cogatur. De Smilace seu taxo. **Cap. LXIII**

Smilax quae & Thymion, atq; apud Rhomanos taxus appellatur, pota-
ta frigus totius corporis & suffocationē inducit, & celerē omnino mortē.
Ceterū remedia eadem quae ad cicutę haustum relata sunt, eis auxiliantur

De succo carpasi.

Cap. LXV

Carpasi succus potatus soporē grauiorē inducit & sensus hebetat absq̃
dolore, exudationem etiā facit & repentinam suffocationē cum exi-
tiosa saniei reiectione. Opem uero sentiunt ex his quibus curantur qui ci-
cutam hauserunt, & toxicum, atq; item Ephemerum.

De herba Sardonīa.

Cap. LXVI

Herba quae Sardonīa appellatē, & ranunculi species est, potata furorem
& conuulsiones inducit, malasq; contrahit, ut risus imaginē de se pra-
beat q̃ eam hausit, à qua dispositione etiā sardonius risus nō admodū boni
nominis adagio uulgo circumferē. Est em̃ accessio grauis omnino quae falsi
risus pretextu praesentē & insperatā mortē inducit. Ceterū q̃ eam hauserūt,
post uomitum, aquae mulsae ac lactis potu iuuantur, totūq; ac irrigatione &
pinguefactione totius corporis, per calefactoria unguenta. Immittendi etiā
sunt in aquā & oleū calidū inungēdiq; ac fricandi plurima post egressū ex
folio perfricatione: in uniuersum em̃ uelut ad cōuulsinē curā moliri oportet:
castorio itē cū passo & per se in potu dato, & si qua ei cōsimilia existunt.

De Hyoscyamo.

Cap. LXVII

Hyoscyamus acceptus delirium quali ebrj obnoxij sunt, inducit, & ia-
ctationē corporis cū distortionē. his succedit exolutio animi deliquio
similis, & oculorum rubor, pruritus, deinde tremor, suntq; omnino deliri &
putant se flagit. corpore cadi. Ceterū facile curantur aque mulsae largo & la-
ctis potu si haberi possit, asininū. Id uero si nō adsit caprinū aut bubulū ex-
hibendū. Facit autē & ad eos uinū falsum, & urticae semē, similiter & folia co-
cta ex uino falso. sinapi p̃terea, & raphanus, nasturtiū, cepe, & alia eis con-
ueniūt, unumquodq; ex uino falso. At uero quiescere eos cōuenit ut uinum
eo melius concoquatur. Auxiliatur etiā eis muliebris lactis exuētio.

De Mandragora.

Cap. LXVIII

Mandragorę radicē nemo latenter exhibere potest, etenim trita quidē
liquida grauē quendam & nauseabundū odorem exhibet, & gustui
etiam

etiam amarulēta est & iniucunda. Certa itidem copia & mensura ad lēdēdum exhibetur: de cētero uero molestias quidē facit, interitū autē serius inducit. Cēterū ex his qui radicē hanc hausērunt, Alij quidē segnes & languidi tristēsq; ac exoluti fiūt, & refrigerati in grauē ueternosum soporē delabuntur, & si quis eos excitet uix audiunt, & excitati cito rursus recidūt. Alij uero calidi quidē minime fiunt, uerū mente perturbati tarde in obliuiosum soporem incidunt. Cura itaq; adhuc perturbatis adhibenda est post uomitū, cōriandri semine aut pulegio tenuissime trito in potu cū aqua calida dato, aut his quē uentrē inferne exoluere possūt. Eis uero q; graui sopore pressi sunt, post uomitū, origanū ex aqua frigida exhibendū est: ualde em̄ inde iuuatur. Dandū etiam absinthiū in passo diluto. Caput uero ex aceto rosaceo irrigandum est: aegro assidue excitato. Odoramenta etiam narib. admouenda, castoriū, ruta, pulegiū cū aceto. Porro Mandragorā mala perfectē matūra à quibusdam comedunt citra noxam, semine tamē reiecto: & si plura q̄ oporteat edant, plus somni q̄ iuxta naturā cōuenit inducūt. Immaturā uero & crudiorā & p̄sertim cū semine comesta, maximū periculū inferunt. Sequit̄ ab eorū acceptiōe ardor circa superficiē corporis. Lingua uero & os exiccant usq; eo, ut neq; salua hāc partes humectent. Hiant semp, ore citra intermissionē aerē attrahentes, Et si nō statim auxiliū ferat, cōuulsū pereūt. At uero si remedia afferant, facile curabiles existūt. aquā namq; cū theriaca ex uiperis andromachi potantes ab omnib. molestijs liberant. Vchemētē aut iuuant in aqua frigida natatiōe, maxime si aliquādiu in ipsa immorent̄.

De succo papaueris.

Cap. LXVIII

Quemadmodum de Mandragorā radice prādictum est, ita neq; papaueris succum quispiam latenter sano homini exhibere possit, propter saporis proprietatē & amaritudinē ac graueolentiam odoris, & q; certa copia ad interitū inferendū exhibeatur. Quando igitur aliqui uoluntarie hoc pharmacū biberint, siue id manifestare noluerint, siue uolentes dicere nō possint, per huiusmodi accessiones cognoscentur. Sequitur enim eos qui eum acceperunt in somnū grauē collapsio, cū frigiditate & pruritu inteso, ut aliquando ob ipsum excitentur, odorq; opij per totum corpus effertur & exhalat. Inferior maxilla laxatur, tumescunt labra, irruit singultus, distorquetur nasus, adest pallor, liuor unguium, prācordiorum diuulsio, respiratio parua & frigida, & per interualla hīsurā, ad finem etiam cōuulsio. Auxiliatur aut his post uomitionē ex oleo, & actionis clysteris in infusionē, acetū mulsum potatū, & acetū calidū per se, & uinū uetus, rufum, meracū, largum cū absinthio & calia, & nitrum cum aqua. Et origanus cum lixiuio, ruta syluestris semē, piper & castoriū ex aceto mulso, saturiciā & origani decoctū cum uino. Oportet autē & hos odoramentis excitare, & in calidū solū immittere & fouere ob pruritū. post balneū aut pinguiā iuscula, & medulla ceruina exhibenda. Manifestū aut q; & his & omnib. qui etiam aliud uenenū

K 3 sumperunt

sumpserunt dari debeat theriace tum ante tum post uomitum.

De toxico.

Cap. LXX

TOxicum inde appellatū uidetur, q̄ Barbari sagittas, quas toxemata gr̄ci uocant, ex eo illinirent. Concomitatur autē eos qui toxicū biberunt labiorū & linguę inflammatio, furor adeo uehemēs ut ægri uarijs imaginationibus obuerfantibus coerceri nō possint, atq; ob id adeo etiam egrecurentur, & raro aliquem seruari cōtingat. Vinculis igitur eos constringere oportet, & cogere ad passū cū rosaceo potū, & uomitū p̄ immiſsionē pinnularum. Deinde iusculum pulli gallinacei pinguis absorbendū dato. Auxiliatur autē eis rapi semē potatū, magis proprie autē quinquefolij radix, & sanguis hirci uel capræ, & cortex quercinus cū lacte tritus, & mala coronea comesta, aut decoctū ipsoꝝ potatum, & pulegium potatum, amomum q̄ & carpobalsamum ex uino. Quod si quis periculū effugiat, multo tamen tempore in lecto decumbet, Stupidus autem & dubiæ ac uacillantis rationis per reliquum uitæ tempus manebit.

De his qui ixiā hauscrunt.

Cap. LXXI

IXia quę & ulophonon appellat̄ potata sapore & odorem ocymo similē habet, linguę autē inflammationē fortem infert & furorē: recrementorū uias omnes obstruit, murmura q̄ ac rugitus intestinorū cū animi deliquio inducit, quū tamē interim nihil excernat. Auxiliatur autē eis post largam uomitionē & uentris per dysterē subductionē, absinthij cremor cū uino multo aut aceto, aut aceto mulso potatus, aut syluestris rutę semē aut silphij radix, aut tragorigani decoctū cū aliquo ex prædictis, uel cū lacte. Aut resinę terebinthinę & nardi & silphij cuiusq; obolus i. ex uino. Aut castorij & rutę & terebinthinę singulorū drac. i. De Chamæleone. Cap. LXXII.

A Chamæleonis potu, morsus uentris & linguę tumor cum rugitibus intestinorū sequitur, facies distorquetur, & uomitus spumofus, & tremores, & concussiones, & totius corporis conuulsiones, ac uocis interceptio concomitantur. qui uero album Chamæleonem hauserunt etiam strangulantur. Caterū curant̄ ex his q̄ ad fungos sunt relata. Datur cis & thlaspios & betę succus, & triticeę psisanę succus ex passo, absinthij cremor, & nitrū cū aceto mulso. ubi uero uomuerint lac recens mulctū sæpe exhibeto, & aliū cū lubricis infusus eluito, uelut est fecni gr̄ci & altheę decoctū. Præcor dijs etiā fomēta ac calfactoria adhibeto. De fungis Ca. LXXIII.

FVngorum aliqui genere, aliqui copia noxi sunt. inferunt autē suffocationes strangulationib. nō absimiles, quibus cōfestim prius q̄ penitus uincantur auxiliari oportet, per raphani aut rutę foliorū largam comestitionem. Dandū & nitrū bibendū ex posca tepida aut aceto mulso, ita ut his liquoribus hyssopū, organū, thymum q̄ sint incocta, atq; inde ad uomitum cogantur. mirabiliter autē iuuantur lixiuij ex sarmentorū cinere excolati potu, atq; eo amplius si ex pirastri ligno lixiuium sit factum, aceto ac nitro ad cinerem

cinerem eius adiecto. syluestria uero pira, aut arboris ipsorum pirastri uidelicet, folia cum fungis cocta strangulandi uim ex eis tollunt, insuperque ab eorum acceptance, comesta, auxiliantur. Bibitur & comode anistolochiae dracma, aut absinthij ex uino, Melisophilon cum nitro, radix panacis cum uino. Nasturtium item uiride edat aut semen bibat. Cæterum Philagrius gallinaceum sterces album inquit, nitum exhibemus ex posca aut aceto mulso, huius enim manifestum habemus experimentum quod ad fungorum strangulationes auxiliatur. Oportet autem & acri infuso aluum euacuare. Quando uero quidam fungi à feris uenenum iaculantibus atrofi aut infecti, aut etiam in locis ubi eiusmodi bestiae latibula sua habent, enati, non modo suffocationem inducunt, sed & intestina exulcerant, absinthij & ficuum decoctum large in potu exhibendum est, & organum cum melle, indeque uomendum, deinde uero theriacen bibat, & in calidam aquam demittatur.

De sanguine tauri.

Cap. LXXXIII

Sanguis tauri recens mactati potatus in aluo in grumos cogitur, egraque spiratione inducit ac suffocatione: comprimit etiam os uentris & continuas couulsionones infert. Inuenit autem horum lingua rubra & gingiuae corrosae, & sanguinis grumi inter dentes. in his itaque uomitum uitamus, etenim grumi in ore uentris coadunati uomitum impediunt. Damus autem eis quaecumque grumos dissoluere possunt, grossos igitur ex fico maxime syluestri succi plenos cum posca & nitro dato, aut fici succum eodem modo, aut lixiuium ex cinere lignorum uitis, aut ramulos fici tritos cum nitro & posca præbeto. at uero syluestris fici fructus etiam siccus comestus euestigio grumos dissoluit. Datur & silphij radix utiliter ex aceto, & amarantū, & brassicae semē, & conyzæ folia cum pipere & lixiuium. Aluus autem pinguis & lubricis infusis eluatur.

De lacte in grumos coacto.

Cap. LXXXV

Lactis coagulatum multum aut aceruatim haustum, suffocatione aliquando infert in grumos coactum. Auxiliatur autem his coagulum omne maxime uero leporinum ex aceto potatum. Etenim coagulum recenti lacti iniectum ipsum cogit & inspissat, id uero quod iam coactum est, ex natura sua dissoluit. Datur eis & calaminthe uiridis, & baccae iuniperi succus aut folia arida trita, item ea quae ad sanguinem in grumos densatum sunt prædicta. Vomitus uero etiam in his recusamus, neque quicquam omnino salsum exhibemus.

De Gypso.

Cap. LXXXVI

Gypsum potatum in lapide indurat ac strangulatione inducit: quapropter eadem auxilia quae ad fungos relata sunt huc transferre oportet, ita tamen ut in his pro oleo, malua, aut foeni graeci, aut ficum decoctum exhibeamus, aut oleum cum aqua mulsam. His ite eadem decocta per clysteres infundenda.

De Cerusa.

Cap. LXXXVII

Cerusa ob colorem suum latere non potest, accepta enim palatum inalbat, linguamque ac gingiuas, in quibus etiam pars aliqua cerusae reperietur.

K 4 Inferit

Infert autem singultus & tusses, linguæq; ac faucium ariditatem: frigescent corporis extrema cū delirio & mentis percussione, & difficili motu siue torpore. His potrē aqua multa exhibenda est, aut ficuū & maluar decoctum, aut lac calidum aut semamū tritū ex passo, aut lixiuiū ex cinere sarmentitio, aut oleum irinum. Omnibus enim oleum large ammiscere oportet, ab uno quoq; uero uomant. facit & scammonia cum aqua multa potata.

De argenti spuma.

Cap. LXXVIII

Argenti spuma potata grauitatē stomachi inducit, aluiq; ac intestinorum, cū torminibus uoluoosis intensis, quæ citra umbilicum maxime innituntur. Lotium supprimitur, corpus intumescit, liuescit ac plumbi colorē induit, & articuli incendantur, ac ardent. Ad finē uero & suffocatio sequit̃. Confert igitur post uomitū à decoctionib. lubricis factū, hormini semē, & myrrhē oboli tres ex uino, aut apij semē, aut hyssopū, aut piper. Et columbinū sterces cū uino & oleo, aut cū uino mulso & oleo. Si uero nimium profusa sit aluus, lauacra calida, & carnes suillæ pingues assatæ cōueniūt, & aquæ potus, & olcū similiter in potu.

De Argento uiuo. Ca. LXXIX

Argentum uiuū hydrargyros græcis appellatū eadē infert quæ argenti spuma. Consimilem etiam curam expostulat, Auxiliatur aut̃ imprimis lac asininum recens multum potatum ac uomitu reiectum.

De calce, sandaracha & auripigmento.

Cap. LXXX

Calx, sandaracha & auripigmentū potata dolorē uentris & intestinorum cum uehementi morſu inducunt. Iuuantur autem succi maluæ potu, aut seminis lini, aut oryzae aut haliç pinguib. iusculis potatis, aquaq; multa, & lacte calido, si ea assiduo uomitu reiectent.

De thapsia, ueratro, elaterio & agarico.

Cap. LXXXI

Ex his quæ homini ob comoditatem in usum ueniunt, aliquando uero pericula inducunt, est thapsia, ueratrum album & nigrum, elaterium, agaricum. Quandoq; enim & hæc suffocationem inferunt & purgationem ultra quàm oportet, Agaricum uero in quibusdam per aluum non subductum, tremorem & resolutionem produxit. Suffocationibus igitur ueluti in fungis dictum est nos opponemus, aut uelut de albo ueratro relatum est in tertio sermone. Purgationes autem ultra modum factas per ea quæ cohibere possunt sedabimus, & per ea iidem quæ firmitatem corpori addunt, de quibus similiter in tertio sermone est prædictum.

De ruta syluestris & Melanthij nocuentis.

Cap. LXXXII

Libricorum & acrimoniam hebetantiū decoctorum potu cum largo olco opus habent, qui ea hauserunt.

De acruato frigide aquæ potu.

Cap. LXXXIII

Frigida aqua acruatim pota, aut etiā uinū meracū, aut passū, à balneo maxime, aut cursu, aut cōcitatioribus exercitamentis morſus & dolores inducūt. Verū in his statim uenam secare oportet, & per clysterē euacuare.

De

De Strangulatis.

Cap. LXXXIII

Strangulatis, adhuc tamē inspirantibus & aerem attrahentib. sternuta-
torium naribus admotum auxiliatur, & uenā in cubito sectio. Acetum
autē siue poscam bibendam dato, & ad uomitum cogito. coartatis deinde
colli locis aquam & oleum calidū adhibeto, aut anethinū calidum, aut adu-
pem anserinū. lanis insuper mollibus collum amplectendū est ac fouendū.

De his qui ex alto ceciderunt.

Cap. LXXXV

Ex alto præcipitatis euestigio auxiliantur uitis sarmenta aquæ incocta,
si aqua in poru sumatur. Quod si æger potam aquā nō ferat sed uomī-
tu reiiciat, morietur. Si uero is qui cecidit sanguinem exspuit, & uenarū ruptu-
ra sit suspecta, sarmenta ipsa urito & aqua restinguito, ipsamq; aquā perco-
latam bibendam dato, quo inde sanguinis grumi dissoluantur. at uero sar-
mentis nō præsentibus cinetē quicunq; pelluito, & lixiuo inde utitor.

De præseruantibus & prælagis animalibus.

Cap. LXXXVI

Quando uero & præseruatiua quædam ac prælaga animalia descri-
pta sunt ueteribus, quæ iuxta contrariæ affectionis rationem uenena
produunt, ex his etiā magis probata eligemus atq; hic apponemus, quo uni-
uersus sermo huius tractatiōis pfectior fiat. Piso itaq; in libro de animalib.
ait perdicē qui domi nostræ connutrit uociferari ac clamare circumplicareq;
ac lacerare cortem in qua perdicæ connutriuntur, ubi cognouerit medica-
mentum quodpiam intra ædes parari aut aliud uenenū. Menelbus autem
aquila inquit, intra ædes connutrita insilit & arcet eos qui talia moliant. Si-
monides uero pauonē tradit, cognito apparato medicamento, ad locū pro-
dire & clamare, scq; expandere & medicamentum ex uasis dispergere, aut
etiā effodere siquidem sit sub terram defossū. Aristodemus porro Ich-
neumonem domi nutritū medicamenta sub terram defossa prælagire scri-
bit. Pherecydes autem narrat psittacum marem obseruare & arguere ac no-
minatim deferre eos qui talia faciunt aut in domum important. Caterum
post præscripta uenena, etiā antidotos multi usus & commoditatis, expe-
rimentoq; cognitās ex ordine subnectemus.

De theriaca ex uiperis Andromachi.

Cap. LXXXVII

Ordiemur autē à theriaca Andromachi ex uiperis, Cuius admiratione
ductus Galenus hæc de ea scribit. Quā multa discordia sit circa the-
riacæ descriptiōes, nos Andromachi descriptiōe ut longe optima utimur,
quæ etiā in regum usus apparatus. Fit autē apparatus eius hoc modo. pri-
mum quidem scilliticos pastillos apparare oportet, propterea quod resicca-
tione per multos dies opus habent. Apparantur autē hoc modo.

Pastilorum scilliticorum præparatio.

Cap. LXXXVIII

Scillam accipere oportet recentem, probe coactā, rufam & nō ualde ma-
gnam, eamq; non ut quidam faciunt luto, sed fermento mundo integre-
re, & in cacabos in quibus panes assantur inditam in furnum ut assetur im-
mittere

mittere. Deinde extractam per ambitum purgare, & acceptis internis partibus tenerioribus eas ipsas probe terere, & farinæ truinæ ex eruo rufo recedenti factæ, duas tertias scillæ partes inspergere, ita ut erui quidē libræ sint duę, scillæ uero tres. Quanquam aliquando ex æquo ambo cōmisceantur. Hæc ipsa inquam, unire ac committere oportet, indeq; paruos orbiculos formare, rosaceo oleo in his cōformandis adhibito, deinde in umbra reficcare, atque bis per singulos dies uersare.

Hedychroi confectio.

Cap. LXXXIX

ARi, asari, amaraci, aspalati, opobalsami, floris iunci odorati, calami aromatici, phu pontici, singulorū drac. x. xylobalsami, cinamomi, costi, cuiusq; drac. xii. myrrhæ troglodyticę, phylli, spicæ nardi, croci, casia, cuiusq; drach. xxx. amomi, drach. vii. mastiches drach. v. uini ueteris odorati dulcis quantum fatis est. Arida contundito & cribrato, crocum uero cum uino in pila diligenter terito, deinde myrrha & mastiche adiectis ac probe tritis, opobalsamum adjecto, ac arida inspergiro, simulq; commissis omnibus pastillos tenuiores formato, uino in his conformandis adhibito: ipsos deinde pastillos in umbra refrigerato, singulisq; diebus uersato.

Pastillorum theriacorum præparatio.

Cap. xc.

CAeterum pastillos theriacos hoc modo apparato. uiperas fœminas accipito nō quocunq; tempore captas, sed desinente uere, nondū uero inchoata æstare. si uero uer diutius hybernium sit, iuxta æstatis principium; nō ita diu post uergiliarū ortū. Quæcunq; enim uiperę prægnantes sūt, eas uitare oportet neq; ad cōfectionē pastillorū adhibere. Magis enim exasperatæ se ipsis redduntur prægnantes. Ipsas igitur accipito quū in latibulis suis delitescere cessant, & de cætero in locos sub diuo egrediunt, & nō adeo malignū habēt uenenū. intus enim delitescencia animalia, & calentis aeris uim nime per cutis meatus resoluta, nocentiorē & magis exitiosam ueneni uim in se coacruant. Sunt autē animalia ipsa subflaua, ingentia, & agilia: oculos subrubros habent, collū angustū, & latius caput, & caudam acruatim in tenuitatem abeuntem ac carne penitus nudam, uentrē autē sinuosiorē habēt, & gressum circa caudæ summū firmanē, caudam ipsam nō circunuoluentia, sed magis contorquentia, & lentius inambulantia. His enim signis fœminia, à mare dinoscitur, insuperq; quod quatuor habet caninos dentes, quū masculinū duos habeat, & angustius caput, ac crassius collum, & totū corpus tenuius, caudamq; paulatim in tenuem desinentē, nō acruatim ut fœminas, neq; omnino carne nudatā. Cauere enim oportet ne mares uiperas in antidoti cōfectionē assumamus. Neq; uero minus etiā reliqua serpentū genera uiperę similia uitanda sūt. Similis est autē uiperæ maxime quidē Amymodytes, imò & Hæmorrhus, & cenchrias, & seps. Quos omnes ex prædictis in eorum tractatu signis dinoscere oportet, & præcipue ex colore. flaua enī & subfuluo colore uipera est, alia uero genera arenosi sunt coloris, aut fusca

Viperarum
descriptio

fusca, aut nigricantia. Verū nō oportet etiam prædicta de unoquoq; signa alia negligere. Has sanē uiperas prædicto tempore eadem die aut præcedente omnino captas accipito. ac primū quidē ipsarū capita ac caudas amputa-
 to, in tantū sanē quantū uideris in eis carne nudatū. At uero nō amputatio
 nis tantum respectū habere oportet, sed & num statim exanguia & immo-
 bilia ac omnino mortua animalia appareāt: talia enim ut inutilia ad antido-
 ti compositionē censenda. Si uero prædictis partib. amputatis, motū quen-
 dam uideris in reliquo corpore superstitem, & animalia ipsa cruorē aliquā-
 diu in se conseruent, hæc ipsa ut optima in antidoti confectionem sunt am-
 miscenda. Post hoc uero ipsorū pellem totam diligenter excoriato, adipeq;
 ac omnibus pectori insitis ut inutilibus reiectis, carnes ipsas ex duabus aut
 tribus aquis lauaro, posteaq; in ollam puram injicito, & cōgruentem aquæ
 mensuram affundito, ac anethi uiridis fasciculum addito, subiectisq; lignis
 uitis coquito. Quod si efferveat olla, solet enim assidue in decoquēdo aqua
 ebullire & ex olla effundi, quotiescunq; hoc ipsum cōtigerit frigidam aquā
 irrorato. Modum autem decoctionis sufficientem iudicabis, ubi carnes à spi-
 nis discessisse uidebis, penitusq; separatas, ut ne quid ex ipsis spinis in hæ-
 reis carnibus te fallat. Ad manum deinde peluim appositam habere opor-
 tet mundam, & ex iusculo cocturæ aliquid continerem, atq; in eam ipsam
 depuratas carnes injicere. facile enim resiccantur, & proinde difficulter con-
 teri possunt. At uero ubi carnes ipsas puras feceris ac manibus diligenter
 expresseris, eas ponderato, & in pilam culinariam asperiores conijcito, ac
 fortiter aliquandiu terito, paulatimq; iusculum instillaro. Vbi autem quā-
 tenuissime fuerint trita, panis purissimi recentis aridi nō ex ueteri farina ap-
 parati contusi & cribrati, quartam carniū partem addito, aliquando autem
 quintam solū: & rursus paulatim iusculi quod satis est affundito, ac in con-
 terendo q̄p diligentissime unito: atq; ita pastillos mediocres tenues forma-
 to, modico opobalsamo in his formandis adhibito. eosq; deinde in umbra
 siccato in domo supra terram ædificata, ad meridiē aut omnino ad septen-
 trionem sita. Versare autē ipsos assidue oportet quo æqualiter resiccantur,
 & ne aliqua pars diutius humecta permanens, putrefactioni obnoxia fiat
 & periclitetur. Postquam uero sicciores fuerint facti, eos opobalsamo opti-
 mo oblinito, & in uitreo uase adseruato, ac quicquid puluerulenti & albi ex
 eis per situm productum est post dies aliquot linteo extergito. perforan-
 tur enim si id ipsum eis diutius adhærescat.

Vipera am-
putatioVipera co-
ctura

De reliquis quæ in antidotum conijciuntur.

Cap. xci

CAeterum simplicia pharmaca quæ cum tribus antea præparatis pastil-
 lis in antidoti confectionem conijciuntur hæc sunt. Pastillorum scilliti-
 corū, drach. xlviii. pastillorū theriacorū, drach. xxiiii. massæ hedychoi,
 dra. xxiiii. piperis nigri drach. xxiiii. opij Thebaici recentis, dra. xxiiii.
 rosarum siccarum repurgatarū, drach. xxii. scordij cretici, seminis buniadis
 agrestis

agrestis, cuiusq; drach. XII. iridis illyricæ nõ corrosæ, dra. XII. agarici pontici albi, drach. XII. cinamomi, drac. XII. aut casia duplū: succi glycyrrhizæ siccī, drac. XII. opobalsami optimi, dra. XII. myrrhæ troglodyticæ, drac. VI. croci cilicij drach. VI. zingiberis nõ perforati, dra. VI. Rhei pontici recentis, dra. VI. radices quinquefolij, dra. VI. calaminthæ montanæ, drach. VI. comæ marrubij in uigore consistentis, drac. VI. cacuminum & foliorū stœchadis, drach. VI. petroselinī macedonici, drach. VI. costi recentis, drac. VI. piperis albi, drac. VI. aut nigri loco eius drach. IX. piperis longi non corrosi, drach. VI. dictamni cretici, drach. VI. thuris masculi integri & in partes nõ cōminuti, drach. VI. floris iunci odorati, drac. VI. terebinthinæ chiæ, drach. VI. casia fistulæ, dra. VI. spicē nardi, drach. VI. radices gentianæ, drach. IIII. comæ polij, drach. IIII. styracis calamitæ, drac. IIII. felis massiliensis, abrotoni, cuiusq; drach. IIII. seminis thlaspios, drach. IIII. seminis ammiij, drac. IIII. comæ chamædryos drach. IIII. chamæpityos, drac. IIII. succi hypocyttidis siccī, drach. IIII. foliorum malabathri, drach. IIII. spicæ celticæ, drach. IIII. anisi helladici, drach. IIII. mei athamantici, drach. IIII. seminis fœniculi, drach. IIII. lemnia terre quæ sphragis appellatur, drach. IIII. chalcididis semiaslatæ, drach. IIII. amomiracemi, drach. IIII. radices acori, drach. IIII. phu pontici, drach. IIII. carpo balsami, drach. IIII. hyperici in uigore consistentis, drach. IIII. acaciæ liquidæ, drach. IIII. gummi uermiculati, drach. IIII. dauci cretici, drach. II. galbani puri, drach. II. opopanax, drach. II. sagapeni persici, drach. II. bituminis iudaici, drac. II. comæ centaureæ minoris, drach. II. castorij, drach. II. aristolochiæ tenuis, drach. II. uini ueteris dulcis quantum sufficit, mellis attici despumati libras X. aut quod satis est.

Modus conficiendi.

Cap. XCII.

Apparatur autē antidotus hoc modo. Sex drachmas casia, & alias etiam XXIIII. quæ cinamomi loco sunt coniectæ, per se tundito ac cribrato. deinde crocum primum in pilam coniectum cum uino probe terito. atq; ubi quàm tenuissimus factus fuerit ei cribratam casiam addito, ac rursus infuso uino terito. ubi uero casia sufficienter fuerit trita lemniam terram cum uino modico in alia parua pila per se terito, & asphaltum siue bitumen simili liter dissolutum ad crocū & casiam injicito, ac rursus aliquandiu terito. Reliqua uero omnia herbacei generis cum tribus pastillis & cum castoreo tundito & per tenuissimū cribrū excutito. succulenta autē omnia, acaciā inquam, myrrhā, opiū, thus, hypocyttidis succum, & glycyrrizam, opopanax, sagapenum, galbanū & gummi confusa, in competenti uini mensura una die ante macerato. Stryracem uero in pilam magnam ac amplam coniectū cū opobalsamo terito, & priuatim unito. deinde & præmacerata succulenta in pilam injicito ac probe terito, atq; si opus fuerit uinum paulatim affundito. postquam autem & hæc sufficienter fuerint trita, styracem antea tritum, & casiam, & crocū & quæ cum eis sunt adijcito & diligenter unito. Chalcididis deinde

deinde bonæ sexuncem aut amplius in ollulam paruam nouam ampli oris iniijcto, & supra carbones ardētes imposito, ac chalcitidem assidue cum pura rudicula agitato. Quum uero liquefieri cœperit, & lutosam subiectam acquisierit, statim ab igne auferro, positaq; in terram ollula quo uniatur diligenter agitato, coagmentatamq; paulisper finito. Deinde ablato & abiecto eo quod in superficie siccus & rufum apparet, ex medio quod uiridius est & molle apparet accipito, ac quatuor drachmas pōderato, easq; in mediam pilam iniijcto, in qua reliqua prius trita habes, cum modicoq; uino in uno aliquo pile loco dissolutas, cum reliquis committito, ac modico addito melle despumato unito. Postq; uero chalcitis ad reliqua trita fuerit admixta, omniaq; nigrū acceperint colorem, tunc addito etiam terebinthinam cum modico melle prius dissolutam. Qua deinde ammixta, arida etiā confusa & cribrata adijcto, & reliquū item mellis paulatim ammisceto. postea cū magno pistillo omnibus q; diligentissime unitis, antidotū ipsam in mortarium trāsfundito, & pistillis ligneis ex grauissimo ligno & politissimo fabrefactis, eā ad solē expositā in mortario tundito. deinde probe contextam finito, & rursus post triduum aut quadriduum ad horas tres tundito, atq; id donec quadraginta trāserint dies facito: deinde uasis uitreis modico melle despumato prius imbutis excipito. neq; uero uasa ualde expleto, sed locum quendam quo trāspirare pharmacum possit relinquito. probeq; contextum ac obligatū adseruato. Hæc quidem igitur omnia ad pharmaci conseruationem sunt descripta. Vt autē nigrum fiat, non scio quomodo in consuetudinem uenerit, & sanē quisquis hunc colorem in eius apparatu non adsequitur, is irridetur. Modus uero adseruandi omnibus in promptu est. Nosse tamen operæ precium est ex colore pharmaci, uim ipsius minime permutari. Quod uero circa colorem pharmaci offendamus & delinquamus, ob chalcitidē est plus iusto uisam. si em̄ parum superaturatur rubicundiorē antidoti colorem reddit. Si uero amplius, non rubicundiorē sed à naturali parum immutatum facit colorem. Per mensem porro Antidotū ipsam uisitare oportet & rudicula munda agitare, ne id quod in superficie est & quod uasi contiguum adhæret exarescat. Cæterum tempore ad concoctionem non modico opus habet, quo matura usui antidotus fiat, & iuste concoquatur. Vt plurimum uero per duodecim ^{mensium} ^{tempus} ^{coadunatur.} ^{Singul.}

Post quantum tempus ea sit utendum.

Cap. xciii

Qui uero ipsa magis uigente & ualidiorē uti uolunt, etiam post unum ^{menſem} ea utuntur, præsertim ad eos qui à uenenatis bestiis demorſi sunt, & à uenenosis pharmacis infecti. hi enim quum grauiore malo urgantur, potentiore etiam ab antidoto auxilio opus habent.

Quanto tempore efficax sit.

Cap. xciiii

Est autem pharmacum ualidum inquit Galenus, usq; ad xxx. annum in his affectionibus in quibus non tanta est nocentis causa. Quod si

L. uero per

Tberiacæ cur
nigra fiat

Hæc loca ex Gal. in
capitulis 716. d. 1. et
ad pisonē fol. 21. l. 1. et 2.

æx. rna. usq; ad sex. xxiij.
annos usui est. sed usq;
ad 100. et pōt. pugnare
et. in ualidioribus opus.

uero per tempus sicciior fiat antidotus, eam in mortarium coniectam & pistillo tritam, optimo melle despumato affuso, rursus unire ac excipere oportet, atq; id quotiescunq; aridior facta fuerit faciendum est.

Modus probandi theriacen.

Cap. xcv

Multi igitur ipsius potentie probande ac cognoscende gratia, aliquod purgatiuum pharmacum prius exhibent, deinde ab eius acceptione antidotum bibendam præbent, atq; hoc modo eius iudicationem per cõparationem quandã faciunt. Si enim ualida & uigore efficax fuerit, purgationem fieri minime permittit, sua uel exuperans pharmaci purgatiui facultatem. Si uero æque purgetur homo ueluti si antidotum non accepisset, manifestum sit eam inualidam & exilem esse, ut quæ retinere non potuit purgatiui medicinali fluxum. Quidam uero papaueris succum duorum scrupulorum pondere aqua dissoluunt, eumq; cani aut gallinæ uel columbæ bibendum præbent. Deinde etiam confestim antidotum dissoluunt, ex eaq; nucis ponticæ magnitudinem ori animalis infundunt, neq; quicq; mali inde comitatur.

De exhibitionis mensura, & utendi modo, & in quibus conueniat morbis.

Cap. xcvi

Cacterum facultatis eius mensura non eadem in omnibus hominibus existit. Sicut neq; liquor idem est, in quo dissoluta ipsam exhibemus. In uenenatis namq; pharmacis, aut uenenum iaculantis animalis plaga, nucis ponticæ magnitudine in uini cyathis tribus dissolutam bibendam præbemus. In alijs aut affectionibus tum mensura, tum liquore iuxta naturam utimur. Secundum affectionum enim diuersitatem, etiam pharmacorum quantitatem competenter metimur, & conuenienter similiter liquorem eligimus. Non enim solum ad bestiarum morsus & uenena à natura sua auxiliatur, sed & ad alias magnas affectiones auxiliare pharmacum per usus experientiam à nobis inuentum est. Capitis igitur dolores diuturnos & uertigines sanat, Auditum grauem & uisum obtusum potu sedat, quandoq; & gustus organum debilitatum emendat, & comitiali morbo auxiliari consueuit. Auxiliatur & suspensiosis & qui orthopnoici dicuntur ex aqua mulsa potata, dissecans & attenuans ac facile eductiles reddens coactos & uiscosos humores. Commodat ueteri ac recenti tussi, & quibus pectoris aut laterum partes dolent, magnitudine fabæ, febre carentibus, ex uino mulso, febricitantibus ex aqua mulsa. Conuenit & sanguinem per sputum reicientibus, siue ex pectore, siue ex pulmone eductio fiat, siquidē recens sit elatio cum posca, inueterato aut malo ex aqua cyathis tribus præstiterit aut aqua ipsam radicis symphyti decoctum esse. Datur aut fabæ ægyptiæ magnitudo ad noctem & mane. Sape uero & sto machi uitia curauit, & fastidium eius, ciborumq; inappetentiam in eorum delirium & appetentiam suauiter commutauit. Quin & uentriculi difficilem cõcoctionem & imbecillitatem corrigit. Similiterq; & stomacho inflatos, & intestinalis tortos, aut colum dolentes placat. Aliquando aut & cholericæ affectioni prædare

præclare auxiliatur, corporis miscellam corroborans & plerâsq; cohibens fluxiones. Maxima uero eius efficacia in his qui ex oris stomachi morfu animo linquntur, cardiacos græci appellant, apparet. præ multus enim & assiduus sudoribus corpore diffluente, & uiribus exoluto, quum ex uini potu sepe nihil opis sentiant, Antidotus ipsa potu sudores sistit, & uires cõcidentes uelut erigit ac fortiores reddit. Lumbricorũ etiam omne genus mirabiliter ex intestinis exigit, Et hepaticas oẽsçq; inueteratas affectiões sæpe curat, Ar quatum item morbum ex aliqua hepatis affectiõne obortum strennue sanat. Quandoq; & induratos lienes liquefacit, sordibus eorum & superflua substantia paulatim consumptis, atq; hoc cũ aceto mulso data præstabilius facit. Deterit & lapides rhenum, omneq; terrenum & sordidũ ex illis repurgat cum decocto petroselini, difficilem item mictionem uesciq; compescit, & in ipsa ulceratione quandoq; per sanat. Laudatur & ob id quod omnem insultum diurni rigoris & algorem tollat, bilisq; uomitum accessionis exacerbationum tempore aliquando concomitantẽ sedet, Maxime uero quartanis conducit si quis ea ingeniose utatur. Ego igitur inquit Galenus, multos quartanarios hoc ductu usus facillime liberaui. primum quidem eos per uomitum a cœna euacuauì, Deinde sequenti die mane absinthij cremorem exhibui, atq; ita duabus horis ante accessionem antidotum ipsam dedi: & mirabiliter adeo sæpe successisse noui, ut confestim nulla accessione quacessisset impeteretur. Verum utendi tempus non in principio morbi est, sed quũ perfecta concoctio in urinis apparet, Etenim si in principio morborum siue ipsa siue aliud pharmacum præbeat, congeminat morbum. Datur & hydropicis cum sitari decocto & similibus, & eam præsertim quæ aqua inter cutem & Græcis leucophlegmatias appellatur, generose iuuare cõsuevit, per totum corpus digesta & distributa, atq; undiquaq; ex carnibus exprimens humorem. Quapropter etiam his qui malo corporis habitu præditi sunt optimum pharmacum existit, & elephantiasin sæpe curare solet, corruptionem corporis fieri prohibens. Et rigore neruorũ conuulsis plurimum auxiliatur, Et membrorũ resolutiones in potu accepta sæpe per sanauit. Credita est & scemini mensruas purgationes ciere, & immortuos fœtus eijcere, quos natura propter debilitatẽ expellere non potest. Danda itaq; eis ex passo aut a qua multa magnitudine sabæ, ruta tamen aut dictamno in prædictis liquoribus decoctis. Podagra etiam affectis & articularum omnium fluxione infestatis opitulatur, maxime quum augmenti tempus præterierit, & status acuminis institerit, Doloribus enim sedatis per ea quæ eos mitigare possunt, antidotũ in potu præbere oportet. Illatos enim fluores consumit, & alios inferri impedit. Maxime autem profuerit si sani adhuc ipsam accipiant. Superfluos enim humores expedit & totam corporis miscellam permutat, Multi igitur in principio podagræ per assiduum eius potum perfecte ab affectiõne sunt liberati. Admirari porro subit antidotũ, quũ ipsam

Quartana
cura

non modo corpori medentem uidemus, sed & ipsum animum saepe ab affectibus male dispositū iuuare potentē, Ex atra bile enim obortos animi affectus ipsa sedat, Etenim assidue exhibitū pharmacū ex uenis & uicinis partibus atrā bilē uelut exhaurit & cōsumit, quēadmodū etiā ex ferarū ictu illatum uenenū, Quin & aquae formidinē pessimū morbum quo à cane morsū laborāt, saepe tollere cōsuevit, atq; ita mirifice tantorū malorū cōcursum impugnat. Cognita est praeterea nobis antidotus ut quae in pestilentib. constitutionib. peste apprehensis unice auxiliari potest, Eos uero qui eā praebuerint pestilēti affectiōne apprehendi prohibet, Ipsa em̄ uelut temperamentū quoddā & sanā cōstitutionē corporib. inducit, redūdantes humores cōsummēdo, & refrigeratas partes cōcalefaciēdo, insuper & innatā facultatē corroborās, ad naturales actiones probe obeūdas. Cāterū in peregrinādō maxime cōsulo ut ea utaris quā frigido existēte aere per hyemē iter facis. Est em̄ ueluti bonū uiscerū indumentū, quod plurimā caliditatē ipsis exhibere potest. De Mithridate sanē magno illo belli duce referūt, quod theriacē quidē nō biberit, neq; enim adhuc in usu erat: uerū ex alterius antidoti, quae postea

*Mithridatis
historia* Mithridatica ab illo appellata est, usu, ita corpus apparauerit, ut nulla ueneni uilecti possit, & quā etiā letale pharmacū accepisset, mori nō possit. Quam enim ab hostibus uinceret scipsū interficere urgebatur, quādo plurimo ueneni haustu mortē sibi cōsciscere nequisset, Quapropter uocato quopiā ex amicis ei iugulū praebuit. Quare uides multae mixturae pharmaca multā uim habere, q̄ corpora ex eorū usu corroborata, nullis ueneni affectibus uel raro & difficulter admodū obnoxia reddātur, atq; hac facultate uel imprimis theriacē praeditā esse cōstat. Porro tēpus exhibitionis cōmodū est, quā probe cōcoxerit, ipsam accepturus, neq; ciborū copia sit oneratus, Bibat autē ieiunus, quo sufficiens tēporis interuallū supersit ad ipsius pharmaci cōcoctionē. Anni praeterea tēpus simulq; regionē inspicio, in quib. ipsum es exhibiturus. Aestate enim neq; in totū dabis. Quapropter etiā eis qui in aetate uigoris sunt, & plurimū habent naturalē calorē, neq; multū, neq; saepe pharmacū ipsum exhibere moneo, Quēadmodū contra eis qui iā uergente & adfecta aetate sunt, tum plurimū, tū saepe cū aqua, quantū potius cōlulam ut cum uino accipiatur. In pueris uero pharmaci exhibitionē omnino uitare oportet, Maior est em̄ pharmaci facultas q̄ uires eorū tolerare possunt, & corpus sanē facile dissoluit, & insitū spiritū cito extinguit, Quēadmodū & lucernae flāmā oleū ipsum, si ignē superet, facile extinguit. Atq; ego uere id narrare possum, inquit Galenus, puerū quendā ab intēpestiuo antidoti usu exolutū esse. Omne nāq; ipsius habitū pharmacū ipsum dissoluit, & uentrē fluere cōmouit, atq; ita noctu puer expirauit. Quod si aliquādo calidiore regionē inhabites, uitare oportet antidoti usum, sufficiēte tibi illius loci aeris, calore. Vnde neq; hominib. qui sub primo solis ortu habitātes calidissimi sunt, & multū habēt illius regionis calorē, antidotū theriacē cōuenire puro.

Sales

Sales theriaci ex libris Marciani, cum quibus con-
sentit Galenus. Cap. XCVII

*Sales theriaci
ex uiperis*

Sales ex uiperis hoc modo apparantur. faciunt autem & ipsi ad omnia
prædicta moderate, per assiduū usum cōmoditatē exhibentes: quan-
tū sint qui eorum auxiliarem potentiam penitus negent, per exustionem dissi-
pari affirmantes ferarum facultatem. Ego uero dicere ausim, eandē quidem
potentiā cum theriaca sales non habere, non tamen eorum uim per ignem
perire, quum multa sint quæ per ignis familiaritatē meliora reddita conspi-
ciantur, uelut est aurum, & calx, & similia. Viperæ enim integræ ustæ intensio-
rem & malignam uim per exustionem deponunt, Temperamentū autē auxi-
liare & symmetriā ab igne sumunt. Proprie autē in affectionibus cutis curan-
dis sales cōmendantur, cuius generis sunt leuce, lepra, Impetigo agrestis, ele-
phantiasis, alphas, scabies agrestis, & raritas capillorum. huiusmodi enim
cutis uitia confestim delent, & acria recrementa subter cutem redundantia
optime discutiunt, Plurimq; enim ex eorum usu sudor prolicitur, atq; ita per
exudationem corrupta substantia euacuatur, adeo ut quidā in principio pe-
diculos exduferint intra XIII. ad summū dies: post hos enim nullus in cor-
pore pedūculus appareat. Quidā uero pro pediculis sputa pituitosa reieciāt
a salium reiectione initiū faciētes, deinde paulo post etiā sputa repurgata si-
stuntur. Licet autē tum in prandio tum in cœna eis uti, cum quibuscunq; edu-
lijs eos accipere uelis, tūq; ultra ad eorum acceptionem prouocare oportet.
Tanta enim ipsis insita suauitas est, ut magis uoluptatis gratia eos cōfectos
quis dicere possit. licet igitur usq; ad XIII. cochlearia per diem ex eis sumere,
maxime si cibus prius in uentre sit probe concoctus. Qui enim eos accipiūt
concoquunt melius & cibi appetentiores fiunt, floridius etiā corpus habent,
& sensus omnes uegetiores. Suffusiones igitur incipientes & nondū conge-
latas egregie dissoluunt, neq; plane quis suffusionē incurrat qui eos quoti-
die accipiat. purgationes item lunares propter obturationem aliquā aut san-
guinis coactionē suppressas cient. Iidem etiā largum & impetuosum men-
struum defluxū sistunt. Quisquis autē eos præsumpserit omnes uenenorū, & ui-
rus iaculantium bestiarū insidias euincet: tūq; etiā quum infectus fuerit, &
postea statim sales acceperit, periculū incurret, maxime si corporis sui tem-
peramentū per horum salū usum multo tempore appararit ac ueluti con-
dierit, quemadmodū Michridatē fecisse dixi. Præstat & pestilenti cōstitutio-
ne instante ad auxiliare hoc & mali depulsorū pharmacū cōfugere, præter-
tim si ei myricæ herbā ammisueris. Morborum præterea omnium medici sa-
les existunt, maxime tamen eorum qui in rhenibus cōsistunt: lapides enim
in eis atterunt, & plane marcidos rhenes restituunt. uertigini uero & dolori
capitis inueterato, morboq; comitali nulla alia consimilis medela exhiberi
queat, si quis eos per integrū annū ex ordine large sumat. Noui & arquatos
diuturnos, & splenicos, ac colicos qui frequenter hanc affectionē inciderūt

L ; pet eos

per eos sanatos, hydropem etiā maxime subter cutem per eorum usum resiccai, & ingentem famem bulimon grāci dicunt, dissolui. Vt quis etiā per frigidum aerem iter faciens minus frigore lædatur, comesti faciunt. Rigores aut per circuitum repetētes diuturnos cohibent, & tusses humectas resiccāt. Tabidos uero iā mirabiliter ad bonā corporis habitudinē reduxerunt paulatim edulijs adpersi, Exolutos aut à languore perfecte reuiuiscere faciunt. Scio nanq; plurimos mēbris penitus resolutos per ipsos sanatos. Ad podagrā demū maxime incipientē, & omnino ad oēs articulari morbo affectos unicum hoc eduliū constructū esse uidetur. Adhortor igitur eos qui à podagra liberati sunt ut eis cōtinue utātur. Quidā uero uiperas totas extendunt & sicāt, posteaq; terunt ac eas in potu cōtra morbū articulorum exhibent. Ceterū uix satis dignis uerbis assequi queas, quātū diuturnas quartanas & deliria ex atra bile oborta dilatent & remorētur, si ante accessiones & in interuallis quoq; sumātur. Enecāt itē omne lūbricorū genus. Optimū est etiā per ipsos maxime crassiores, dentes cōfricare. Non enim albiores tantū eos reddunt, sed neq; dens postea laxior factus mouebitur, neq; eroditur, neq; stuporē incurrit. Extrahunt etiā per caput recrementorū copiā, ac caput purgāt, & oculos leuiore reddunt. Apparātur aut hoc modo. Viperas accipere oportet magnas, eiusmodi qualē prædiximus specie eodēq; tpe captas, numero quatuor, nō ultra biduū postq; capte sunt adseruatas: sed si fieri potest eadē qua captæ sunt die, easdē in ollam figulinā purā magnā cōijcere oportet, statimq; supra ipsas pro sale ammoniacō, salē cōmunē lotū & exiccātū iniicere. præstiterit quidē ammoniacū salē esse, si uero haberi non possit, cōmunis & albi italici modij dimidiū hoc est lib. xx. iniicito, atq; id nō in meri die facito sed mane. Tunc em̄ rigētes adhuc bestix ad motū tardiores sunt. Qued si phagi etiā arboris ramulo uiperas cædas, ad motū ipsas tardiores reddes, & mirabilē eis soporē induces. Est aut phagus species quercus. Quū igitur uelut dictum est, uiperas salibus grauari & oppresseris, pastillos insuper ad sales adijce hoc modo apparatus. Radicis gentianæ, sesquilibrā. aristolochiæ rotundæ, sesquilibrā. centauræ minoris lib. ii. feminis catadamomi lib. ii. marrubij, scordiij, apij, chamædryos, singulorū lib. i. Hæc oīa in crassas partes cōtundito, & cū attico melle subacta in v. aut v ii. pastillos latiores & bene tēperatos reducito. Hos equidē pastillos eo quo dixi modo præparatos habens, ad sales uiperis uiuis iniectos imponito. Deinde scillas electas, magnitudine sua manū explentes, recentes v. in tenues partes dissectas pastillis superindito, aliumq; dimidiū modij Italicū hoc est xxx. libras alias salis supra scillā & pastillos iniicito, & deinde ollam operculo tria foramina habēte obturato, eāq; forinfecus totā luto figulino, ut si rumpatur nihil pereat, oblinito. Inde q; sensim igni adhibeto paulatimq; circuitum lutum torreto, deinde aucta flāma per ficulneorū aut uitis lignorū ollæ subiectorū exustionē, uaporē inde per foramina elatū obseruato. primū enim

Phagus arbor

fumus

fumus mutus caliginosus & turbatus ualde exiens apparebit, significatio-
 nem perhibens quod ignis iam feras ipsas cōtingit. Quo tpe diligēter caue-
 re iubeo, ne quid ex illo fumo per respiratiōē haurias, aerē nimirū per se-
 rarū exhalationem infecto. deinde ubi cessauerit uapor, & flāmā quandam
 exilem per foramina cōspexeris egredientē, tunc sanē q̄ optime assatas pu-
 tato, atq; ita olla ab igne ablata, perq; diem ac noctē refrigerata, uita per
 apertā ollā eximito, & cū subscriptis tūdito. Sunt autē hæc. Seminis rutæ syl-
 uestris, dodrantē, hyssopi dodrantē, nardi celticæ sexuncē, stachyos sexun-
 cem. Est autē marrubio similis nō tamen spinosa plāta seu frutex. feminis foe-
 niculi mōtani sexuncē, petroselini macedonici trientē, comē origani dodran-
 tem, feminis hormini tosti dodrantē, racemi amomi quadrantē, cacuminum
 thymi dodrantē. Foliorū malabathri trientē. carnū iuniperorū baccharū lib.
 II. feminis coriādrī sexuncē, piperis lōgi lib. II. radices silphij unc. XVII. zing-
 beris nō corrosi lib. II. feminis satyrii quadrantē. Quidā uero radices satyrii
 cōiūciunt sexuncē, pulegij montani sexuncē, feminis mentæ sexuncē. Aut si
 haberi non possit, herbæ siccæ sexuncē. tordyli & casia cuiusq; quadratē
 seselis massiliensis sexuncē. Maximopere autē conandū est ut crassiora uelu-
 ti sunt lignosa omnia contundendo attenuentur, neq; quicquam ex eis reij-
 ciatur. Tusa autem per angustissimum cribrum excutito, bis & ter per eā-
 dem cribella excutendo, quo quā optime uniantur. atque ita omnia in ui-
 treis uasculis reponito, neq; statim utitor, sed post quadragesimum tandem
 diem. Inueteratum enim pharmacum maiorem cōmoditatem de se præbet,
 maxime si extra omnem humiditatem ipsum siccum adseruatis. Cæterum
 colore nō ualde nigrescit. Ego uero inquit Galenus, bestias ipsas nō exuro,
 sed pastillos ex eis, quorū confectiōē in theriaca docui, reliquis quæ cum
 bestiis uruntur ammisceo & simul exuro, quo eam quam in se habent ama-
 ritudinē per exustionem abijciant. tantā autē pastillorum mensurā addicio,
 quantā cōiectura assequi possum quatuor numero uiperas habere. & sanē
 sales uere optimi euaserunt, utpote qui neq; ex ustione cinerum retulerint
 saporem, neq; nigrū colorem, sed qualitatis usui gratissimi sint facti, & qui
 uim qua eos proprie præstare prædicaui efficaciorē haberent. Efficiūt au-
 tem quatuor uiperæ magnæ, pastillorū siccorū sextantē & uncia dimidium.
 Atq; hic quidē est totius confectiōis salū theriacorū modus. Oportet autē
 medicū uarie ipsis uti: utpote si sanguinē spuentibus sales hos exhibiturus
 sit, radices symphyti cōtulæ & cribratæ sextā partē ad salis modū addet, ue-
 luti si quinq; cochlearijs pharmaci unā symphyti addat. In phthisicis autē si
 ut tabefactis & pectore suppuratis, iridis tenuissime trita, aut dictāni sextā
 partē salis pōderi adjiciet. Hepaticis uero chamepityn, spleneticis cyclamini
 radicem aut capparis corticē, aut piperis addet sextam partem. Quod si ad
 podagricos apparare uelis, dimidium præscripti ponderis satyrii auferto,
 uitando ne rabiofas & membra exoluentes in ipsis excites uoluptates. Cæ-

terum in rhenibus lapides q̄ maxime atterunt sales, si carpobalsamum aut lithosperma appellatum habuerint ammixtū. Si uero uim cōtra uenena intensiorem facere uelis, in salium confectione scordium & marrubiū duplicabis. insuperq̄ anatū sanguinē siccū adijcies. Eis uero qui à rabido cane morfi sunt amplius conferent, si pæoniæ radicē addas aut canculos exustos, Opi sthotonicis aut qui retro neruis conuelluntur, maxime profuerūt, si castorij & opopanax parum habeant admixtū, in eis sanē qui id tolerare possunt. Visum porro exacuit malabathri foliū duplato pondere in confectione additum. Concoctionē uero ciborum iuuant si casia & costi eis sufficiens modus addatur. Ad inflammationes aut cuminū adijcito. Vrinā amplius ciet dauci semen additum. Quartanas uero amplius soluūt si uerberenacā rectam, & eupatorium, & succum cyrenaicū aut ipsum laser adsumāt. Verum ut summatim dicā, Omne quod cōmodū & habile noueris affecto mēbro, id ipsum ad sales, siue in ipsorum confectione, siue exhibitionis modo ammisceto. Quin & amariore scio sales apparatus, Ex his enim quæ cū uiperis uruntur aristolochiā, & scordiū, & cardamomū, & dimidium centaureæ detraho, eademq̄ postea cū reliquis que tundūtur misceo, imō & stœchadis parē scordij mensurā addo, atq̄ ita gustu amariore sales euaserūt, & in usu sanē ad multa mihi cōmodiores sunt experti. Porro cauendum est ne eos prægnantibus & ab ubere lactantibus exhibeamus. Et ne pueris, ac temperamento calidioribus, & præsertim tempore æstiuo, & regione calida, & qui acuta & sicca febre laborant, eos quoquo modo præbeamus.

Antidotus Mithridatica.

Cap. xcviii

Hæc ut Antipater & Cleopater tradunt, ista capit, Myrrhæ drach. vii. obolos iiii. spicē nardī tantū dē, crōci drach. vii. obolos iii. opij drach. iiii. obolos ii. & dimidium. styracis drach. v. castorij drach. vi. obol. i. cinamomi drach. xvii. polij drach. v. scordij drach. xvii. zingiberis tantū dē, costi drach. xvi. piperis albi drach. v. obol. i. piperis longi drach. xvi. scelis, abrotoni, cuiusq̄ drach. v. obol. ii. petroselinī drach. xiiii. seminis dauci drach. xvi. casia drach. xv. thuris drach. xvi. succi hypocistidis drach. vi. & scquibolum. nardi celtici drach. iiii. seminis fœniculi drach. iiii. phylli drach. iiii. acori, abrotoni, phu, sagapeni, carpobalsami, hyperici, iridis illyricæ, acaciæ, gummi, seminis cardamomi citra medullam, seminis pelecini, singulorum drach. ii. Lemnæ sphragidis, confectionis cypheos, partium scinci iuxta rhenes sitarū, singulorū drach. ii. seminis thlaspios drach. xvi. gentianæ drach. iiii. anisi drach. iiii. rosarū siccarum mundarū drach. iiii. Mei drac. iiii. florū iuicī odorati drac. vi. opopanax drac. vi. galbani drac. vi. obol. iiii. opobalsami drach. v. i. obol. iiii. aristolochias drach. i. hyssopi drach. iiii. marrubij drach. i. chamaepityos drach. iiii. rosmarini drach. v. terrebinthinæ chix drach. vi. obol. iiii. Mellis atticī despumati quantū sufficit. Vinum ne addas, sed prædissolutis melle calido succis, indeq̄ tritis ac adie-

cta tere

sta terebinthina, inſpergito ſicca contuſa & anguſtiſſimo cribro excuſſa, Vnitoq; & reponito omnia. Datur drachmæ pondere, aut ad ſummuſ ſi-
liquæ xxiij. ex ea exhibentur.

Confectio Cypheos.

XCIX

Cæterum Cypheos quæ in antidotû cõſicitur deſcriptio hæc eſt. Vuæ
paſſæ tenuis ac pinguiſſimæ detracta pellicula & acinis, hoc eſt ipſius
carnis drach. xxiij. terebinthinæ uſtæ drach. xxiij. myrrhæ drach. xij.
cinamomi drach. ij. floris iunci odorati drach. xiiij. croci drach. i. bdellij
drach. v. onychos hoc eſt unguis aromatici drach. i. aſpalathi drach. ij. &
dimidiâ, ſpicæ nardi drach. ij. caſiæ drach. ij. cypeti drach. ij. & dimidiâ.
baccarû luniperi magnarû drach. ij. & dimidiâ. calami aromatici drach. i. x
Mellis quantû ſatis eſt, Vini odorati parû. Myrrhâ, bdelliû, & terebinthinâ
uſtâ contere cû uino ut mellis craſſitudinē induant deinde uuâ paſſam per
ſe probe tritâ adijce, ſimulq; tritis mellis ſufficiētē modû infunde, ac reliqua
inſperge, paſtillisq; inde formatis utere. Vritur aut terebinthina hoc modo
Terebinthinâ conſice in ollâ, & triplû aut etiâ amplius aquæ infunde, & ad
ignē adhibe, nihilq; omnino mouēdo coque, ubi uero cõſumpta fuerit aqua
& terebinthina attenuata ac inualida reddita, ut digitis cõfringi poſſit, eâ tol-
le atq; in antidoti cõfectionē aſſume. Si uero inſumpta aqua adhuc mollior
appareat terebinthina, aliâ aquâ ſupfunde ruſſuſq; ad ignē adhibe, donec
friabilis reddat. Datur aut cyphi ipſum & per ſe cõmode his qui hepar aut
pulmonē, aut rhenes, aut aliqd aliud uiſcus exulceratû uel obturatû habēt.

Terebinthina
quomodo uro-
tur

De Antidoti Mithridaticæ uſu,

Cap. c

Datur itaq; ad ſummuſ ex præſcripta antidoto Mithridatica nucis por-
ticæ magnitudo. Eis uero qui ad integrâ ætatē perueniunt græcæ fabæ.
Augetur aut & minuiſ hæc magnitudo in medijs ætatib. Atq; his quidē qui
febre carent ex uino dâda eſt, aut uino mulſo, aut cõdito, ſiquidē hepar ha-
beant obturatum. febricitantibus uero ex aqua, aut aqua mulſa. Facit enim
ad antiquas ſtomachi fluxiones itemq; thoracis, & ad omnes inueteratas
in profundo corporis exulcerationes aut abſceſſus: facit ad tabidos, & ad
uentris inflationes, Et Cœliacis medetur, Emendat & reducit obtuſum ap-
petitum, & bonû colorē corpori addit. Frangit lapides, ſanat urinæ difficul-
tatē, & atrâ bilē cõgregari uetat: foetus immortuos expellit, & ad alias item
affectiones cõueniens eſt. Acuit uiſum eorum qui eâ accipiunt. plurimâ aut
præſertim præſumpta uim habet, quod non permittat quempiam à letali
ueneno lædi, qua gratia etiam à Mithridate compoſita eſt & appellata.

Antidotus Eſdræ aut prophetæ doctoris.

Cap. ci

A Momi ſcrup. xii. floris iunci odorati drach. i. x. pyrethri drach. vi. cro-
ci ſcrup. xxxv. cinamomi ſcrup. v. i. aut caſiæ duplû. myrrhæ troglor-
dyticæ ſcrup. x. ii. ſtyracis calamitæ ſcrup. x. v. petroſellini ſcrup. iij. ſeminis
dauci ſcrup. iij. tragacathi ſcrup. vi. ſucci hypociſthidis ſcrup. ix. iridis illyricæ,
abrotoni

abrotoni cuiusq; scrup. xv. feminis foeniculi scrup. vi. bdellij scrup. ix. thuris drach. i. sulphuris uiui scrup. vi. feminis hyoscyami albi scrup. xxvii. castæ scrup. ix. feminis papaueris scrup. xxx. spicæ nardi scrup. xii. feminis rutæ scrup. iii. feminis ocymi scrup. iii. rhois culinarij scrup. lv. feminis anethi scrup. vi. asari drach. i. feminis cardamomi reiecta medulla scrup. vi. opij scrup. xxvii. euphorbij scrup. vi. piperis scrup. xxx. rosarum siccarū scrup. ix. phylli scrup. xii. opobalsami scrup. xxiii. uentris mergi scrup. vi. lactæ scrup. xii. lycij indicij scrup. xii. caryophylli scrup. xii. stercoreis reperti in aluo mergi scrup. v. l. Rhei pontici scrup. xii. mei athamantici scrup. vi. floris nerij scrup. iii. & dimidium, terræ cimoliæ scrup. xii. succi artemisiæ scrup. xx. foliorum seridis scrup. ix. spicæ celticæ scrup. xii. rosarū rhododaphnes scrup. vi. Alij etiam castorij scrup. xii. uetum tu castorij scrup. iii. coniuncto. costi scrup. xii. gentianæ scrup. xii. confectionis hedychroi scrup. ix. anisi scrup. vi. sisonis scrup. x. viii. ammoniaci thymiamatis scrup. xii. Quādoq; & foliorum citri scrup. xii. uini ueteris odorati quantum satis est, Mellis de spumati primarij libras v. uel vi. Apparatur aut hoc modo. Arida omnia cum croco & castorio ac hedychroo tundito & per angustissimum cribrum excutito. Opium uero, myrrhā, hypocisthidē, bdellium, lycium, ammoniacum in uino macerato. Tragacanthum autem per se macerato. Sequenti deinde die rosas rododaphnes & serin terito ac unito, & tragacantho similiter probe tritæ reliqua trita adijcito, & cū succo artemisię unito, mel quoq; despumatum & tepesactum saepe instillato ne tragacanthus exarescat, Deinde & arida tusa inspergito, sufficienterq; unita probe contegito: in sequentibus uero diebus septem aut nouem in sole terito, & uasis utreis excipito, Neq; tamē uasa expleto, sed locum respirationi reliquum facito. Vfus eius est ad uenenum iaculantium animalium plagas, datur autem fabæ magnitudine ex uini cyathis ii. mane & ante somnū eodem modo. Illinitur & plagæ camcūq; à periculo uindicat. Eis uero qui letale uenenu hauserunt post uomitum & ante, nucis ponticæ magnitudine datur, mane & ad somnum cum uino. Præsumpta etiam ueneno uim lædendi adimit. Ad capitis porrò dolorem cam in sapa dilutam fronti illinito. Dato & ad somnum phasioli magnitudine modica aqua & sapa dissolutam. Furiosis uero ante somnum datur fabæ magnitudine ex sapa diluta: dissoluitur etiā cum sapa, & toti fronti & inter supercilia illinitur, per omnem item foris nasum ante somnum, Maxime enim somnum inducit. Caterum ad oculorum inueteratas fluxiones sapa liquefactā ad frontē usq; ad supercilia illinito. Ad molares dentes erosos, itemq; ad dentium dolores cum sapa liquefactam & calefactā ote detinendam præbe, & cōfestim quiescet dolor. Ad tussim uero diuturnam & spirandi difficultatē ac orthopnoeā datur nucis ponticę magnitudine non febricitantib. cū aqua frigida, febricitantib. cū aqua mulla. Datur aut ex ordine per dies v. ii. ante somnū. Ad tabidos uero subcruenta expuētes & eos qui abscessum

*estram foris
illinitri*

qui abcessum internum habent, fabæ magnitudine dato cum sapa modica frigida aqua diluta, Dato autem ad plures dies mane & ante somnum, & sanabitur affectio quantumvis sit diuturna. utere igitur neq; eam cõternito. Porro ad diuturnos stomachi dolores ex frigiditate obortos cū sapa cyathis.iiii. magnitudinē fabæ dato ante somnū: si uero febricitent, cum aqua mulsa. Ad singultū uero ob repletionē aut frigiditatē datur fabæ magnitudine ex aqua mulsa ante somnū. Ad hepatis obturationes fabæ magnitudine cū cõdito, Ad duricies uero cū aqua mulsa. Ad splenicos ex aceto aut aceto mulso. Arquato infectis ex uino mulso, hydropicis ex aceto mulso aut uino mulso. illinito etiā cū antidoto tumefactas partes & tymorē resicabit. ē lapi de laborantib. datur cū sapa ad urinæ difficultatē cum apij decocto aut petroselinū aut aliquo cõsimili. Ad profluuiū uentris & cœliacis & dysenteriae maxime incipienti, nucis pōticæ magnitudine dato, mane & ad somnū ex uino, in febrientib. ex posca diluta cõsidēter utitor. Ad podagrā fabæ magnitudine præbeto cū aqua mulsa, Eliquatā etiā cū sapa affectis locis illinito, Et siquidē principiū fuerit affectionis, liberabitur ac euadet. Si uero diuturnū fuerit malum magnopere iuuabitur. Ad coxendices affectos & reliquos articulos corporis fluxione infestatos, eā cum ungento aliquo, gleucino puta, aut irino aut sicyonio eliquato, ac articulis illinito. Ad Elephātiāsim in principio præsertim, imō & his qui iam malo oppressi sunt, nucis pōticæ magnitudine ex aqua mulsa bis per diem dato, eliquatā etiam cum uino toto corpore per nouē ex ordine dies in sole illinito. discedit enim paulatim à corpore cutis & ueluti squamulæ decidunt, & tota cõcretio & corporis miscella renouatur. Ad æg're parientes mulierculas ipsam per se ad iunum uentrem illinito, & facile partus prodibit. Ad ulcera postremū maligna & diuturna in cutis superficie oborta, uestis detritæ panniculo exceptam imposito.

Antidotus pæonia.

Cap. cii

Antidotus Pæonia uere pæonium pharmacū multo usu iudicatū & approbatū. Amomi scrup. xviii. croci scrup. xl. radices pæoniæ scrup. xii. seminis pæoniæ scrup. xii. piperis albi scrup. ix. piperis cois scrup. xii. phylli scrup. ix. euphorbij scrup. ix. spicæ nardi unc. i. Rhei pōtici scrup. xii. costi scrup. xii. petroselinū scrup. xlii. opij scrup. xv. seminis hyoscyami albi scrup. xii. alij scrup. xviii. habēt. styracis primarij scrup. ix. myrrhæ troglodytice scrup. xli. casie unc. i. pyreti scrup. xii. thuris scrup. xviii. castorij scrup. vi. calaminthæ scrup. ix. mellis despumati qd satis est, itēq; uini. Opiū, myrrham, thus, cū uino terito: styracē uero cū modico melle liquefactū similiter probe terito, atq; eis unito: adiectisq; aridis tritis melle excipito ac utitor. Dantur ex ea siliquæ ii. cū aqua calida ieiunis, frequēter etiā ante somnū se cundū quos res urget. Facit aut ad destillationes ē capite, & tussis, purisq; reiectiones, tabidos, peripneumonicos, pleuriticos, præter opinionē em̃ thōracē extra periculū sistit, nū quod à destillationib. nū quod ab ulcerationib. imminet

imminet, etiāsi sanguinē reiecerent. Ad anginā uero uino mulso diluta utere assidue gargariſſando, pinnulaq; etiā cum melle illini. Ad colicos autem & ex rhenum lapide affectos excellenter efficax exiſtit. In exacerbationibus enim colicorum febre carentium exhibita eueſtigio dolores ſedat. Si uero febriant remiſſiones febriles obſeruato, atq; ita exhibeto. Frangit enim calculos, & ab urinæ difficultate liberat ea præſertim quæ ex craſſis humoribus & propter obturationē eſt oborta. Infunditur etiam & maxime in iſtis colicis uehementiſſimis urgenſibus doloribus cum oleo rutaceo, & ſtatim à periculo liberat. Longas autem febres maxime quotidianam & quartanam facile ſoluit duabus ante acceſſionem horis data. Quin & ægros ad reficienda corpora optime paratos fecit. Datur autem non in principio morborum ſed quum perfectæ concoctio apparuerit in urinis. Cæterum ad peſtilentēs & populariter graſſantes morbos ex uitiatō aere obortos in corporib; ſumme auxiliatur, & in principio ſanè data peſtilentem prohibuit ſæpe diſpoſitionem. Præſeruat etiam à dyſenterijs & torminibus inteſtinorum. Inducit & ſomnos dolori minime obnoxios, neq; ſtuporem inferit, ueluti reliqua ad leuandos dolores apparatus, uerum ſomnum tam diu detinet, quouſq; pharmacum penetrare, & cauſas dolorum diſſoluerit, Et ſanè multi ex ægris à ſomno ſurrexerunt adeo concoquendi facultate præſtantes ut obliui ſint an unquam aliquid à principio doluerint. Plura autem his & ultra promiſſa ei conſidere potes. At uero ſi uiſceris alicuius inflammatio adſit, cauere oportet ne exhibeamus eam priuſquā inflammatio laxetur. Quod ſi tamen periculum maximum inſtet, id iſpum præſatus ac præteſtatus dato, quo ſuccelluræ curationi per iſſam æger adſeruetur, eaq; tandem uictoriam obtineat morbi.

Antidotus aromatica optima, Galli.

Cap. ciiii.

Facit ad omnes maxime tamen inueteratas circa os uentris, atq; iſpum adeo uentrem affectiones, & ad Hepaticos. Eſt ſtomacho uehementer grata & efficax. Cinamomi drach. i. aut caſiæ duplum, amomi dextantem, ſpicæ nardi tridentem, phylli tridentem, myrrhæ troglodyticæ drach. i. caſiæ beſſem, croci unc. i. floris iunci odorati unc. i. coſti unc. i. piperis ſexuncem. Mellis attici deſpumati quātum ſatis eſt. Ego autem inquit Cinamomi modum conduplico, meliorq; antidotus redditur. Datur nucis ponticæ magnitudine cum uino, aut uino mulſo, aut etiam cum aqua mulſa ſi adſit febris.

Antidotus ex duobus piperis generibus.

Cap. ciiii.

Antidotus ex duobus piperis generibus quemadmodum eam deſcribit Archigenes, leuans dolorem, finiens febrem, reſiccans & concoquēs. Facit ad colicos. Hæc etiam Crito apparauit hoc modo. Croci drach. vi. caſiæ drach. iiii. cinamomi drach. ii. coſti drach. iiii. ſtyracis drach. v. piperis longi drach. iiii. piperis albi drach. iiii. galbani drach. iiii. myrrhæ drach. iiii. quidam uero x. ſumunt. opij drach. iiii. caſtorij drach. v. Succu lenta cum

lenta cum uino uetere terito. Reliqua uero contundito & cribrato ac tritis adspergito, & mellis despumati quantum sufficit adijcito, uniroq; ac adfectuato. Darur quibusdam magnitudine fabæ, alijs magnitudine crui. Colicis uero in cibo præbeto cum uini austeri cyatho uno. In affectionibus autem circa hepar & uescicam ex passo dato. Tabidis & pectore suppuratis fluxio neq; infestatis ex aqua mulsa. Vitor & ad quartanas & ad alios diuturnos & per circuitum repetentes rigores, duabus ante accessionem horis.

Antidotus Athanasia.

Cap. cv

Athanasia ut nunc apparatur, est autem Ægyptiorū inuentum. Croci, spicæ nardi, phylli, costi, sceni græci, glycyrrhizæ, radices cupatorij, petroselinij, styracis, casia, opij, singulorum æquales partes, mellis quod satis est. Darur ad summum nucis auellanae magnitudine, hepaticis quidem si nō febriant cum uino mulso, febrientibus uero cum aqua mulsa, datur ad dies ex ordine septem. In angina cum melle delingendam dato, in affectionibus pulmonis & pleuriticis cum aqua mulsa. Stomachicis & qui nō cōcoquant cibum cum posca. In fluxionibus uero stomachi ac alui in catapotia informatam dato, quibus deglutitis aquam frigidam præbe bibendam. Ad exulceratam uescicam & uuluam cum tepida aqua. In morbo arquato, hydropē, & rhenum morbo cum uino mulso exhibeto. Ad febres diuturnas per circuitum redeuntē summe auxiliatur ante accessionē accepta, his qui diuturna oculorum fluxione laborant ad noctem dato, & frontē ex ea illinito. Hæmoptoicis & dysentericis ex posca ante somnum exhibeto.

Oribasij theriaca, qua Marcus Imperator usus est, quæ ante & post infectionem sumitur.

Cap. cvi

Trisolij bitumen olentis seminis, rutæ syluestris, farinæ erui rufi, aristolochiæ rotundæ, æquales omnium partes in pastillos redige, & ex eis drachmam unam cum uino & oleo præbe.

Alia confectio ualde bona, Farinæ erui rufi, drach. XLVIII. amfi, seminis fœniculi, ammi, seminis apij, singulorum drach. V. mei drac. IIII seminis trifolij, opopanax, serpilli, cuiusq; drach. IIII. cū uino redige in pastillos, & cum uino ter præbe bibendos.

Oribasij theriaca ex Bryonia.

Cap. cvii

Theriaca ex Bryonia ad uenenatorū animalium morsus & ueneni haustum, ad morsos à uipera & à scorpio percussos. Radicis bryoniæ, opopanax, iridis, rosmarini, opij, myrrhæ, singulorū drach. IIII. aristolochiæ, drach. V. thuris, drach. VI. seminis rutæ syluestris, drach. VI. cumini, drac. XVI. Alij tres tantum drachmas habent. farinæ erui, drach. XVI. Alij. IIII. habēt cum uino pastillos informato, atq; ter cum uino præbeto.

Philonis antidotus ad colicos præscripta est.

Isotheos antidotus ad tussim relata est.

M Antidotus

Antidotus Hadriani.

Cap. cviii

Piperis drach. xx. seminis hyoscyami albi drach. xx. opij drach. x. croci drach. v. spice nardi, euphorbij, amomi, pyretri, cyperi, cardamomi, phylli, rutæ sicæ, castorij, seminis dauci, myrrhæ, petroselinij, cuiusque drach. i. rosarum siccarum sesquidrachmæ: seminis aprij, sesquidrachmæ. zingiberis drach. ii. opobalsami drach. ii. mellis quantum satis est. Datur ad summum nucis ponticæ magnitudine, minimū uero fabæ Aegyptiæ modo. Facit ad colicos ante somnū data ex aqua calida, Stomachicis & qui reuomunt cibum ex posca, in urinæ stillicidio ex aqua calida. Hæmoptoicis ex posca, dysentericis eam in catapocia redigito, & ab eorum deglutitione modicam poscam absorbendam præbeto. I abidis ad noctem cum hydro melite dato, aride uero tussientibus cū melle delingendam exhibeto. Mor/sis à phalangijs & uiperis cū uino mulso. Educit & menses cum uino mulso accepta in quo pulegium, aut calaminthe, aut ruta sint incocta. Colicis cum aqua mulsa datur.

Antidotus Acharistos cui digna gratia referri nō potest. Ca. cix

Casiæ, myrrhæ, piperis albi, piperis nigri, castorij, galbani, styracis, croci, costi, opij, spice nardi, singulorū par pondus. Mellis quantū satis est. Datur magnitudine fabæ: facit ad omnia diuturni temporis purulenta in thorace, & ad hepaticos cum aqua mulsa, & ad colicos eodem modo, ad splenicos cum aceto mulso. Reperias autem ipsam & ad alias plurimas affectiones approbatam.

Philagrii antidotus ex sulphure uluo.

Cap. cx.

Febrem finit. hac inquit philagrius, omnino uitor ad diuturnos per circuitum repetentes rigores. Sulphuris uiui, seminis hyoscyami albi, seminis cardamomi citra medullam, styracis, opij, myrrhæ, cuiusque drach. vii. costi drach. x. rutæ drach. x. croci drach. iiii. casie drach. xi. piperis drach. xii. excipe melle attico despumato. Dato hora una ante impetum exacerbationis ex posca dilutiore calida, & post modicū interstitiū dormire iubeto. Somnum enim inducit, atq; omnes diuturnos febriū insultus soluit. Verū nō conuenientius exhibere quàm bona concoctio manifestissime ex urinis deprehendatur. Bene prospicere etiam oportet, quo is qui accepturus est redundantibus excrementis non sit onustus, & maxime si febres quotidianæ existant. Datur ad summū, quū adhuc in uigore est pharmacū, nucis ponticæ magnitudine.

Theriaca Democratis.

Cap. cxi

Medetur hæc mortibus animantiū uirus iaculantiū, uiperarum, cerasæ, aspidum, naticum terrestriū plagis, & paruorū bestiarum puncturis itemq; uesparū. Et marinæ turturis siue pastinacæ ac draconis ictibus, phalangiorum itē & scorpionū, Apparæt hoc modo. Iridis illyricæ, zingiberis, opopanax, opij, herbæ rosmarini, myrrhæ troglodyticæ, seminis trifolij bitumen

tamen olentis, cuiusq; drach. viii. aristolochiæ drach. xi. feminis rutæ syl-
uestris, drac. xii. radices bryoniæ aridæ albissimæ drach. xvi. serpilli, casto-
rij, radices eryngij, feminis apij, cumini æthiopici recentis, cuiusq; drach. vi.
Alij drach. xii. habent, farinæ erui rufi, drach. xxiii. Omnia hæc contun-
dito & cribrato, opopanaca uero cum uino dissolutio, eiq; arida inspergito
& in pastillos reducto, & ex eis drac. i. cum uino ueteri meraco bibendam
præbeto. Statim enim ut potatur comoditatem suam ostendit. facit ad coli
aut uentris inflationes ex aqua ter potatum. facit & ad eos qui intrinsecus
aliqua parte dolent, citra manifestam causam.

Antidotus theodoretos ex anacardijs.

Cap. cxii

Antidotus theodoretos hoc est diuinum munus, ad totum hominem
utilis est. facit ad uertiginē & omnes capitis affectiones, omniaq; pe-
ctoris uicia emendat, maxime uero suspitiosis, orthopnoicis, tabidis, pleuri-
ticis, hepaticis, splenicis, & quib. exacerbat in uentre cibis, & omnib. diutur-
nis circa stomachū & uentrem affectionibus prodest. His item qui ex lon-
gis morbis se ægre reficere possunt, & qui decolores sunt, & quib. corpus in
arquati colorem mutatur, & quibus aqua subter cutem effundi incipit. rheu-
num etiam affectionibus, & eis qui assiduo coli dolore affliguntur, auxilia-
tur: omnemq; habitū corporis corroborat. Quin & febribus inordinate ue-
terscentibus, atq; etiam per certū circuitū redeuntibus, ante accessiōē da-
ta prodest. Mirabiliter utilis est mulierculis, q̄ purgationis menstruæ stran-
gulatu uexantur, & quæ ab utero suffocantur. Soluit etiam uentrē citra mo-
lestiam. Educit em̄ ea quæ iam longo tempore intestinis inhæserunt. & ut se-
mel dicam est diuinum donum. Huius enim usu in omnibus senties succes-
sum. Quod si quis uere & autumnopraefertim, semel aut bis ea utatur, neq;
circa dietam magnopere delinquat, nullis morbis obnoxius fiet. Nō solum
enim præsentēs affectiones sedat, sed quas etiam futuras timemus impe-
dit. Habet autē hoc modo. Crocī, casia, phylli, spicæ nardj, mei, agarici, rhej
pontici, floris iunci odorati, aconij, epithymi, piperis, sarxiphagi, iridis illyri-
æ, cariophylli, carpobalsami, myrobalani interni, cuiusq; scrupulos ix. ana-
cardiorum, scrupulos x. aloes scrupulos xxxvi. mellis despumati libras iii
Datur ad summum drachmatum iii pondere ex aqua mulsa, aut uino,
aut uino mulso, secundum quod cuiq; affectioni commodum fore putas.
Cæterum si scamoniæ scrupulos ix adsumpserit, præter opinionē flauanti-
bilem purgat. Si uero epithymi scrupulos ix. acceperit & scamoniæ scru-
pulum dimidium, atram bilem expurgat. Id quod multo adhuc efficacius
præstat, si pro epithymo ueratri nigri corticis drachmam unam assumat.
In pituitosis porro utiliter ad eius exhibitionem colocynthidis medulla tu-
sa & tenuissime cribrata ammiscetur.

Theodoretos aliter apparata.

Cap. cxiii

Aloes drach. lx. & siliquas lx. agarici drach. xxiii. croci drach. vi
M 2 theci

*Antidotus ex Anacardijs.
Simulacrum habet cum eo
quod scribitur. Hæc sunt
illa q̄ in diuinum munus
iñuenerunt. Hæc sunt
q̄ in diuinum munus
iñuenerunt.*

rhei pontici, drachmas vi. asari drach. iiii. costi drach. viii. acori drach. vii. cinamomi drachmas vi. xylobalsami drach. iiii. spice nardi drachmas iiii. casia drach. ii. mei drach. ii. chamaedrys drach. iiii. mastiches drach. v. piperis albi drach. iiii. mellis despumati quantum sufficit. Dantur ex ea ad summum drach. iiii. ad emolliendum uentrem. Quod si quotidie ea ut antidoto uti uelis in aliqua ex praedictis affectionibus, nucis ponticae aut amplerum magnitudine praebis. Quidam uero & piperis nigri, & albi, & longi, singulorum drach. ii. addunt, item amomi, floris iunci odorati, zingiberis, cuiusq; drach. ii. Gentianae insuper drach. ii. aliqui adiiciunt.

Theodoretos per acetum mulsum apparatus. Cap. cxiiii

Facit haec magis ad omnes capitis affectiones, & deliria ex atra bile oborta, itemq; insaniam. facit stomachicis & colicis, hepaticis, atque amplius adhuc splenicis. Habet compositio hoc modo. Spice nardi, phylli, croci, mei, casia, epithymi, floris iunci odorati, rhei pontici, myrobalsami, caryophylli, cuiusque drach. iiii. aloes sextantem, carpobalsami scrupulos xvi. zingiberis scrupulos xvi. mastiches scrupulos iiii. iridis trientem. anacardiorum, scrupulos iiii. agarici scrupulos viii. corticis radices foeniculi lib. i. acetum acerrimum sesquiseptarium. Mellis sesquiseptarium. Corticem praeparatum in aceto per triduum macerato, deinde ut dimidium relinquatur coquito, percolato, & ad acetum mel adijcito, rursusq; ad mellis spissitudinem coquito, atq; ubi tepuerit ad arida tenuissime trita in mortarium addito & diligenter unito, reponito ac unitor uelut in prioribus dictum est.

Picra siue amara per acetum mulsum apparatus, Orisalfi. Cap. cxv

Facit ad stomachicos, colicos, uuluae strangulatus, hydropicos. Corticis radices foeniculi lib. ii. acetum acerrimum lib. vi. Radices in aceto ad tertias coquito, & percolato aceto mellis libras iiii. adijcito, & ad mellis spissitudinem coquendo redigito, refrigerato, & paulatim ad subscripta tenuissime trita in mortarium addito. Sunt autem haec. Aloes bessem, iridis sextantem, mastiches unc. i. zingiberis, casia, nardi celticae, elenij, singulorum unc. i. piperis drach. iiii. olei unc. i. aut si non adsit, nihil impedit. Datur cochlearij mensura cum aquae mulsae cyamis iiii (Est id poculi genus & Aegyptio uocabulo ciborium appellatur) Ab acceptione etiam aquae calidae cyamos ii. absorbeant.

Cyphi ex rebus xx xvi. Cap. cxvi

Thuris sexuncem, styracis pinguis lib. i. myrrhae trientem, phylli quadrantem, costi trientem, amomi quadrantem, spice nardi quadrantem, casiae quadrantem, sabinae, cardamomi, ammoniaci thymiamatis, iridis, carpobalsami, singulorum sextantem, nardi celticae, helenij, hypni, floris iunci odorati, aspalathi, cuiusq; unc. i. mastiches, quadrantem, ladanij, quadrantem, baccharum iuniperi magnarum & paruarum, bdellij, singulorum sextantem, seselis unc. i. cyperi, unc. i. croci trientem, seminis cupressi unc. i. Alij drac. i. habent, calami aromatici drac. iiii. rosas uirides numero quingentas, terebinthinae depuratae

depurata: sesquunciam. caricarū pinguium sexuncem, palmarū pinguium quadrantem. caruncule uuarū passarū quadrantem. nucum pinearum quadrantem. succi hastulæ regię unc. i. mellis sesquilibrā. uini odorati quantum satis est. Arida contusa & cribrata cum liquidis excipito, palmis, caricis, uuis passis prius in mortario tuls. deinde mastichen tritā eis addito, & bdelliū ac pineas nuces rosasq; & thus unumquodq; per se tritū. postea etiam styracem adijcito, & ladanum per se mortario contusa, deinde terebinthinam & mel adfundito, & arida infarcito. Ego uero thus, bdellium, myrram, & ladanum cum uino tero, atq; ita ad tusa in mortarium conijcio, & pastillis inde formatis utor. Facit ad capitis dolorem fronti illitum cum aceto, similiter & ad oculorum lippitudinem cum uino. Ad hepatis & renum exulcerationes cum passo, ad obturationes eorundem cum uino mulso, Tussientibus, tabidis, orthopnoicis cum aqua mulsa. Stomachicis, splenicis, ischiadicis cum aceto mulso. Ad tormina, lunaticos & morbum comitalem cum aqua calida. Datur drachmæ ponderæ.

Cyphi ex rebus XXVIII.

Cap. CXVII

A Spalathi, bdellij, helenij, ladani, styracis, myrrhæ, cuiusque drach. vii. baccarum iuniperi magnarum l. paruarum iridem l. succi hastulæ regię, trientem. Sabinæ, trientem. croci, sextantem. costi, sextantem. cardamomi, quincuncem. cyperorū, quincuncem. seminis cupressi, quadrantem. nardi celsici, dextantem. Alij etiam casie habent sextantem, sphagni siue hypni quincuncem, amomi sextantem. spicæ nardi sextantem, rosarum siccarum quadrantē. floris iunci odorati, sextantem. nucum pinearū, quadrantem. phyllorū, quadrantem. caricarum lib. ii. uuarum passarū pinguium sextantem, terebinthinę chie lib. i. palmularū pinguiū caruncule lib. i. mellis lib. v. uini, sextarios ii. Apparato & utitor ut dictum est. Etenim quæ ex huiusmodi rebus adparantur ad prædicta optime faciunt.

Masluaphij confectio.

Cap. CXVIII

C Roci quadrantem, styracis unc. xxx. ladani unc. xxiiii. galbani quadrantem, caryophylli sexuncem, rosarū siccarum unc. xii. sertulæ campanę unc. xviii. hypni, canalicula id parua est ex arbore quæ damascena dicitur, itemq; ea quæ Rhodacinea appellatur ex orta, bessem, malabathri sexuncem. Zarnabo unc. xii. costi, unguium aromaticorum, casie, zacathij, singulorum sexuncem, asari quadrantē, carpobalsami unc. xxiiii. pilularū cupressi, quadrantem, foliorū lauri quadrantē, chachula quod canchryon est unc. i. amomi unc. xii. spicæ nardi, gummi, cuiusq; sexuncem. Vini lib. vi. contere & ad formam quancuncq; uelis redige.

Thymiaia siue suffimentum Berenices.

Cap. CXIX

S Eminis uiticis, melanthij, cornu cerui, samfuci, baccarum lauri, absinthij, sulphuris uiui, bituminis Iudaici, saluie, radices cyclamini, artemisie, origani, rutæ siluestris, cumini, castorij, lapidis gagatæ, anisi, conyzæ, rosma-

M 3 rini

rini, buccinorum ustorum, resinae, singulorum unciam unam, cedriae sextantem, picis zacynthiae pinguis libram unam. Quidam etiam radices praeniae unciam unam, sed nos eam non admittimus. Omnia confusa & tribrata, cedria, resina, ac pice excipito, in pastillosque redigito ac utiror. Facit ad anginam potatum & suffitum, ita ut hiante ore aeger uaporem hauriat. Ad omnem uero uigiliarum speciem uino liquefactum fronti illinito atque ipsi forinfecus naso: quin & intrinfecus nares sublinito, & super prunas proiectum suffito, & somnum aegro conciliabit. Facit & ad ozanas sordidum & foetidum narium ulcus, ipsis naribus ex eo illitis cum aceto. Fugat animalia uenenata & culices suffitu. Et ut quidam tradunt etiam immundos spiritus arceat. Porro de pharmacis dolorem leuantibus scriptum est retro in xiiii. sermone.

De Elephantias. Ex lib. Archigenis.

Cap. cxx

Elephantiasis à quibusdam leontiasis, ab alijs satyriasis appellatur. Elephantiasis quidem à magnitudine & diuturnitate affectionis nomen accepit, imò & propter cutis asperitatem quae in quibusdam succedere consuevit. Leontiasis autem appellatur quia frons aegrorum cum quodam tumore laxior redditur, ad similitudinem pellis flexilis superciliorum leonis. Satyriasis uero dicitur propterea quod male faciei ipsdem cum rubore attolluntur, & musculis maxillaribus ueluti conuulsionem patientibus, mentum ipsum dilatur, quemadmodum etiam ridentibus euenire solet, similitudine quaedam ad picturas satyronum: quin & alacritas uehemens ad coitum ipsis adest, quemadmodum & de satyris fertur. Est autem grauis morbus & propè ex eorum numero qui incurabiles existunt. & grauis quidem est ipsi aegro, intolerabilis autem conspicientibus, utpote qui ipsum omnino auerfantur, adeo ut & plerique ex necessarijs & domesticis aegri, ipsius conuersationem deuient, Etenim suspicionem de se praebet malum tanquam sit contagiosum. Atque ego sanè malum esse affirmo cum ipsis conuersari: inquinatur enim aer quem inspirando adtrahimus ex ulcerum foetore, & ex uiciata spiritus exhalatione. Ceterum affectio ipsa non solum ob id grauis est, quod indissolubilem ferè habeat structuram & apparatus, sed quod principia generationis eius ferè sint ignota. quum enim circa superficiem iam uestigia eius apparent, tunc non gignitur, sed perficitur, intus à uisceribus initio facto, & progressu usque ad cutem dilatato: quare non absimile est, tumentes emittentias etiam in internis oboriri. Apprehenduntur autem hac affectione uiri magis quam foeminae, atque inter illos magis qui crassum & uiscosum ac atra bile redundantem sanguinem habent, & qui pituitam multam salis aut acidam gignunt. Amplius uero & qui uictu crasso & aegre concoctili utuntur, & qui in otio degunt. Non minus uero his & qui multis exercitijs inordinate utuntur, & per hoc sanguinem inspissant, Itemque hi qui cibos assidue in uentre corrumpunt. quod uero ad aetatem attinet, pueri & iuuenes

uenes, maxime quo tempore pubescere incipiunt. Regio uero huius mali inductrix est tum quæ ualde calida est, tum quæ uehementer frigida est. Et altera quidem ob id quod sanguinem adaslet, Altera quod frigore suo eundem congelet, & perspirationes prohibeat, ac insitum calorem suffocet. Consequitur eos qui obnoxij futuri sunt malo, segnicies, spiratio tarda, spirandi difficultas, motus difficilis, assidua constrictio alui, urinarum ueluti sunt iumentorum lotia excretio, respiratio grauis & foetida, ructus continui, qui etiã ipsis ægris aliquid molestiæ addunt, appetitus non obtusi quidem neq; inflammati, impetus in uenerem intensus. Iam uero ubi ad eutem progressum fuerit malum, malæ primum crassiores fiunt & mentum, deinde rubescunt, non florido sed liuido rubore. Et sub lingua uenulæ uaricosæ fiunt ac nigrescunt: quod signum est etiam ulcera ipsa in simili constitutione esse, cuiusmodi plane qualis in porcis quibusdã circa interna uidetur, quæ Grædinis nomine insignitur. Quandoq; uero & per omne corpus eminentiæ apparent, & præsertim iuxta summam frontem ac mentum. Corpus præterea ipsorum magnum esse uidetur, & cuiusdã intolerabilis grauitatis sensus eis adest, unde neq; potu neq; cibo admodum suauiter delectantur. Pusillanimes fiunt ad omnia, neq; præ uitæ amore uitam relinquere & contemnere possunt, neq; affectionem ipsam generoso animo perferre. Verum ueluti scipios condemnantes se occultant, & notos homines uitant. Quiddam porro ex eis, ad modum eorum qui suffocantur aut strangulantur, maxime circa somnos afficiuntur. Quemadmodum igitur perfecte à malo eiusq; diuturnitate uictis frustra manum admouemus, ita & abstinere ab his qui iam affectione corripì & tentari uidentur, planè desperantium hominum est & malignorum. Humanum enim & plenum beneuolentiæ si gnum est, in extremis etiam malis usq; ad experimentũ procedere, ad difficultatem affectionis compescendam.

*Grando mori
bus porcorũ*

Cura Elephantiasi affectorum.

Cap. cxxi

QUum igitur quædam ex prædictis signa affectionis apparuerint, citra dilationem sanguis auferatur particulatim ex utroq; cubito. Reuiuiscit enim inde aliquo modo insitus calor, ut sensibilibus corpus ipsum alieuetur. Habendus tamen est modus in euacuando. In multo enim inutili & uitiatò sanguine parum quiddam genuini sanguinis inest. Post sanguinis autem detractionem paucis diebus interpositis aluus inferne subducatur. & primum quidem colocynthidis pulve utendum est, ex qua catapotia xviii. nucum ponticarum magnitudine exhibeantur. Eius autem apparatus prædictus est in coxendici morbi tractatu. Sequenti deinde die xii. catapotia præbeantur. Si uero ea accipere recusat, per hieram nostram purgato. Mirabiliter autem eis utraq; confectio conducit per mensem semel data. Post dies autem aliquot sero lactis scissi utendum, ex eoq; non minus tribus heminis, neq; ultra quinq; accipendum. Sit autem lac asininum

M 4 si haberi

si haberi potest, ex quo serum ipsum sumitur, Ammiscendum est etiam ipsi ucratrum nigrum trium obolorum pondere, & scamoniæ drachma una, ita ut hæc ipsa cum modico sero ieiunis præbeamus, atq; deinde ipsum serum paulatim exhibeamus. Hæc enim purgatione frequenter utendum esse censeo. Ommino namq; conandum est ut omnem corporis miscellam ab affectione occupatam liquefaciamus, aliamq; quandam ueluti ex integro regeneremus. Id ipsum uero fiet si per interualla oportune purgationes adhibeantur, & cibi apponantur qui facile concoqui, & per corpus distribui possint. Post quorum acceptionem uomitus à cibo fiant, deinde etiam à raphanis à ieiunis, postea ad ucratrum perueniendū: ac primum quidem decoctū ucratri exhibendū est, deinde & bulbos ipsius cōtusos, & ad finē uirgas optimas ex eo præbebimus. Id uero quomodo fieri debeat, iam antea diligentissime traditum est in tertio huius tractationis sermone. Post hæc autem uirium refocillatrice diæta utendum est. Ad os uentris & utrinq; ad uiscera cucurbita inanis affigatur. Et primo quidem circuitu auxiliorum hoc modo perfectō, rursus ad principium reflectendum est. Et uenæ quidem sectio uitetur: ab hiera uero principium purgandi sumatur, & reliqua consequenter facienda uelut prædictum est, ter & quater in anno eodem ductu repetito, Maligna enim & difficulter cedens affectio est, quapropter plurima cura opus est ne in peius euadat.

De his qui castrantur.

Cap. cxxii

Nouimus quosdam audaciores qui sibi ipsis testes ferro resecurunt: castratis enim non in peius malum ipsum procedet. Neq; enim temere reperias, inquit Archigenes, ullum aliquem castratum elephantiasin laborantem, neq; item facile mulierem, Quare etiam quidam ex confidentioribus Medicis manum admouerunt, & quotquot sanè ex eis ex sectione periculum cuaserunt, per consequentis curationis usum perfecte ab hac maligna affectione liberati sunt. Noui etiam quendam qui ualde correptus esse existimabatur, à tali quopiam pharmaco curatum. Aceti optimi & cedriæ, singulorum cyamū I. succi brassicæ cyamū I. cōmisceto & ieiunis mane præbeto, deinde ad uesperā ordeaceū panem medicum exhibeto cum quopiam uolucrum leuiorū, & per solum hoc maximū curationis sperato successum. Vter aut ipso per annū, semel in hebdomade ex eo præbens, quādoq; tamen bis, quantū ad usum eius adsuæfactis etiā rigidius procedendū sit, nimirum ad duplam pharmaci mensuram. Quādo uero & ad comitalem morbum prædare faciat, eo sanè & ad ipsum utor, & præ omnibus alijs eius profectum laudo. Facit & brassicæ decoctum quotidie potatum quum ex cedria Pharmacum non datur. Multi etiam sideritim herbam laudant: datur autem foliorum eius aridorū drach. Lex uino austero. Noui & trifolium herbam bitumem olentem probe huc facientem. Datur autem & ipsa drahmæ pōdere trita ex uini cyatho uno, quibusdam ex aceto, quibusdam cum melle.

Eboris

Cyamus
poculum
Pharmacum
præclarum

Eboris etiam & cornu ceruini ramenta cochlearij mensura sæpe ad prædictam mensuram ammiscentur, Nam & per seipsum unumquodq; eorum potatum utilissimum existit. In regione Indorum Elephantias affectos assidue per sedem eluere per urinæ asinæ infusionem hemina mensura calefacta consueverunt. Crocodilum item terrestrem accipiunt, eiusque extremas partes amputant, ac interiora proiectant, deinde fermento obuolutum assant, deinde ablato fermento, & scabrie eius derafa, carnis ipsius drachmam unam quotidie præbent, & magnum sanè testimonium de hoc remedio præbent. Præclare autem succus cyrenaicus facit, erui magnitudine deuoratus, simul enim ut acceptus est per omne corpus diffusus uehitur. Aselli item sub aquario uase stabulantes, qui & millepedæ appellantur quinque aut sex numero cum hydromelitis cyamis III. trii potati præter opinionem tum his, tum suspiriosis, & omnibus suffocatione apprehensis auxiliantur. Mulcæ commoditatis est & scillæ semen trium obolorum ponere in cyatho mellis semicocti delinctum. Asperam enim arteriam à pituita repurgat, & coarctationem uiarum uocis probe dilatat. Similiter autem & pastillorum scilliticorum, qui in theriacis confectionem coniunguntur drachma una exhibetur cum uino austero meraco trita, Ex calida autem datur. Theriaca porò ex uiperis Andromachi compendium totius medicationis existit, si post purgationes per modica intervalla præbeatur.

De uiperarum esu, & de pruribus. Archigenis.

Caput

CXXIII

Mirabile elephantiasis remedium uiperarum esus existit, eas uero hoc modo apparatus edere oportet. primum quidem amputato capite & cauda, & detracta pelle, exemptisque interioribus uisceribus omnibus caro aqua pura bis ac ter lota, in olla instar anguillarum coquitur, aqua quidem sufficiente affusa, & oleo modico cum anetho & porro. post sufficientem deinde cocturam, iusculum moderato sale conditur, atque ita ægro in sole desidenti exhibeatur, capite tamen probe uelato, Neque uero semel tantum aut bis uiperas edere satis est, sed sæpe id fiat, quum extra periculum sit & insuper commoditatem afferat. Sint autem uiperæ recens capte, & ex humectioribus locis accipiantur. Nam quæ iuxta mare degunt, uehementer siticulosæ existunt. Utimur & ad ipsos salib. theriacis eos quotidie pro liquamentis exhibentes unâ cum obsonijs. Suntque tum sapore, tum odore gratissimi. Quin & ex betonica antidotus ad podagricos præscripta utiliter purgans, etiam his commode exhibetur, Et ut in uniuersum dicam propter incidentes ipsis suffocationes, etiam ea quæ orthopnoicis præbentur, his utilia sunt, utpote quæ crassos humores non modo in thorace, sed & in toto corpore contentos secant & diducunt. At uero ob id quod ferinus est humor, ea quæ lumbricos excant & expellunt etiam his danda sunt. Forissecus porò cuti pilotrum

psilothrum assidue per modica interualla in balneo adhibendū est, oculis probe cōmunitis ne quid ex psilothro in ipsos dilapsū eos lædat. Commode itē facies ipsa ex eo illinitur, utpote quæ maxime ab affectione sit correpta. multo etiā tempore in eius usu perseverandum est, donec cutis ipsa rubescat, nō tamen exulceretur. Quapropter ex psilanthi succo psilothrū appareatur. Urinus autē maxime aut uulpinus adeps, uel si hi haberi nō possint, taurinus cum sarmentio cinere emollitus, & cū lixiuio coctus probo attenuat eminentes tumores. hoc enim modo etiā sapo preparatur, quem in usum conuertere oportet si urinus aut uulpinus adeps non adsit. Bona est & portulaca cum aceto trita, & semperuium minus quod Rhomani illecebram uocant, & Mercurialis decoctum tum per se, tum cum aridis quibusdam mixtum. & sici syluestris folia arida contusa & cribrata cum aceto illita, & in balneo affricta. Optime facit & decoctū ipsorū. & betæ & ocymo cū aceto tritis aut coctis dignam laudem tribues, si per eorum attritum fueris deterfus. Myrobalanus itē cum aceto præstat. probe auxiliatur & alumen cum sale, & sandaracha, æquis partibus in uino & oleo maxime lentiscino, aut si nō adsit, rosaceo tritis. Aridum quoq; inspergimen ad alphas siue uiriliginem à nobis compositū liberaliter extergit & repurgat. Est autē hoc. Alcyonium, nitrum, sulphur uiuum, myrti folia, & sici agrestis folia sicca, singula pari mensura contrundito & cribrato, deinde cum aceto trita oblinito, & in balneo affricato. Cōuenit & alcyonium assatum cum aceto tritum & affricatum: testæ itē ostreorum omnium ustæ & cum pari melle ac modico aceto tritz. Ex aceti fece arida, usta, cū sulphure trita in exudatorio loco cōmode uteris. Amygalino autē oleo inungito, atq; hoc modo corpus forinfecus illinito.

Oribasij smegma ad elephantiasin.

Pumicis, testæ sepiæ, nitri assati, gallæ, cimoliæ, cuiusq; sextantē, gummi unc. i. arida affrica.

Aliud optimum smegma.

Nitri assati, pumicis usti, testæ sepiæ ustæ, gallæ, cimoliæ, cuiusq; sextantem, gummi unc. i. arido utere in balneo aut lauacro & aqua marina ablue. Aliud efficax.

Spumæ nitri albæ drach. xx. cimoliæ drach. xii. melanthij drach. ii. radices bryoniæ drach. ii. alcyonij drach. vi. sulphuris uiui drach. iiii. radices chamaeleonis albi siccæ drach. iiii. trita in balneo inspergito & affricato.

Aliud smegma. Ad omnem corporis pruritum & humoris atræ bilis fluxionem celebre. Veratri albi unc. i. ueratri nigri unc. i. baccarū lauri sextantem, cerusæ, pumicis usti, testarū sepiæ ustarum, pompholygis, rutæ uiridis, singulorum trientem, sulphuris uiui bessem. Spumæ nitri albæ bessem, mellis bessem, cineris mustelæ domesticæ grauidæ bessem. aceti quantum satis est. Vtere in balneo.

Remedium

Remedium ad pforas, Archigenis.

Magni nominis est & ad Elephantiasin laborantes, id quod ad pforam feram à nobis priuatim est apparatus. Id ipsum hoc modo habet: Rumicis satui, & rumicū acutorum radicum, fasciculos manipulares duos in aceto coquito, deinde in mortario tuis, ac postea etiam in pila tritis, acetum paulatim instillato id ipsum in quo decoctæ sunt radices aut etiam aliud, atque deinde hæc ipsis infarcito. Nitri drachmas XLVIII. sulphuris uiui drach. xxv. thuris drachmas xv. Omnia ad limi crassiciem reducta unito, ac æstate quidem ad solem sæpe illinito, hyeme uero in balneo donec exudarint. Apparaturs autem à nobis pharmacum ad Elephantiasin summe congruum, huiusmodi. Rumicis satui & rumicis acuti radicum fasciculos manipulares duos in aceto coquito, tundito, ac terito, ut prædictum est. Deinde hæc quàm tenuissime trita eis infarcito. Alcyonij, libram i. sulphuris uiui libram i. spumæ nitri, besselæ, testarum cochlearum ustarum tridentem. radices chamaeleonis nigri sextantem. Omnia simul conteruntur, donec ad strigmenticiam spissitudinem redigantur. & illinuntur æstate quidem ad solem sæpe, hyeme uero in balneo, donec exudent.

*Pfora fera
remedium*

Illitiones ad tumentes corporis eminentias.

Cap. CXXXIII

Illinantur autem tumores in cute efferati & inflammati ex glaucij succo, aut polij, aut lycij, aut hypocisthidis, aut aloes, & similibus succis. Aut halicæ uel etui farina cum plantaginis, aut polygoni, aut perdicij, aut portulacæ, aut brassicæ succo diluta. Quod si cataplasmatiss opus habeant loci inflammati, cum halica cruda polygoni, aut plantaginis, aut matrubij succo ammixto, contegantur. Postquam uero inflammationes mitigatæ & laxatæ remiserint, herbæ serapiadis tritesticularis uiridis folia tenera aut semina probe terito, & ægrum ad solem calidum locatum ad horas ii. defricato. atque ubi prodierit sudor uinum meracum uetus odoratum bibendum præbeto, rursusq; herbam ipsam affricato. Deinde ipsum in aqua marina abluito, & hoc quotidie per dies aliquot facito, & reperies ad sanitatem consequendam successum.

Optima est & hæc illitio Critonis.

Ad tumentes eminentias, & ad faciei pruritus, ac principium elephantiasis. Gummi albi, spumæ nitri, thuris, sulphuris uiui, singulorum par pondus in aceto dissoluito, & ex probe penitus cōtritiss pastillos formato, eosq; in umbra resiccato. Vtus uero tēpore postulante aceto dilutos illinito. Vbi aut exaruerint subscripta cōfectione defricato. Est aut hæc. Saponis lib. i. ammoniaci thymiamatis lib. i. thuris quadrantē, spumæ nitri albæ quadrantē, mastiches quadrantē. Ammoniacū cū aqua prius tritū, & sapone ei adiecto, in figulino uase coquito, duob. sextarijs aquæ affulsis, atq; ubi dissolutus fuerit, thus, mastichen, spumā nitri, unūq; d; p se tenuissime tritū & unitū adiecit.

Deinde

Deinde in mortarium trāsata & diligenter tusa in uitreum uas reponito ac uitor. Optime faciunt & hæc ad tumores non inflāmatos illita. Ammoniacū cum thymiaia ex aceto, Aut marrubij succus & thus eodem modo, & uerbenaca recta, & fel capræ aut hirci, & flos æris cum melle, & caninum stercus cum aqua, & aloë cum thure ex aceto mulso potata & illita. Vtiliter illinitur & dictamni succus melle cocto & cedria permixtus, & sulphur uiuum cum liquida pice, aut sesamum, aut amygdalæ amaræ, aut chamæleonis nigri radix similiter cum liquida pice, & alcyonium cum cedria. Efficacissima uero est cedria cum phoeæ adipe aut etiam ursino illita, ira ut simul aliquatis sulphur uiuum infarciatur. Valde efficax & hoc est. Si alumen liquidum lincolo illigatum, & ustum, deinde cum aceto acertimo & brassicæ, aut ocymi succo tritum, illiniri præceperis.

Aliud Thuris, aluminis scissi, cuiusq; sextantem. sulphuris uiui, ramentorum plumbi, cuiusq; quantum satis est, unito & leuiter illinito, emmentis ex punice præfricatis.

Aliud.

Ammoniacum thymiaia, & sulphur uiuum, & columbæ stercus, & uitrum tenuissime tritum, in aqua, aut uino, aut aceto terito, & prout commodum assinaueris illinito.

Aliud ualde efficax.

Cedriæ, sesquilibram. aceti lib. ii. foliorū cupressi lib. i. folia tusa ad biduum in aceto macerato, deinde excolato aceto, cyparissum probe terito, eiꝯq; cedriam adijcto ac unito, & cum uulturnis pennis ægro in sole locato illinito.

Aliud Efficacissima est & hæc illitio. Auripigmenti drach. vi. thuris drach. vii. costi drach. ii. calcis drach. iiii. baccarū lauri sextantem, cedriæ drach. iiii. Omnia teruntur, & cum foliorum populi albæ arboris decocto in coquendo inspissato illinuntur.

Aliud ad faciei eminentes tumores præcipue conducens.

Mastiches unc. i. zingiberis drach. iiii. sulphuris uiui drach. iiii. olei omphacini quantum sufficit. utere. Mirabiliter autem prodest ad faciei tumentes eminentias, ex Milesia herba remedium. Tunduntur autem folia herbæ ulridia cum axungia ueteri & imponuntur. Et rubescunt sanè inde plurimum partes quibus imposita sunt, contrahuntur autem facile pane imposito, aut cetato ex oleo amygdalino, rursusq; in naturalē suum colorem restituuntur. Postquam uero exæquata fuerint eminentiæ illitionem talem parato. Thuris unc. i. gummī albi unc. i. cimoliæ rrientem. Vino ueteri aut aceto trita illini.

Emplastrum quod & ipsum ad maiores & liuentes eminentias facit, inquit Archigenes.

Terebinthinæ drach. x. radices aristolochiæ drach. iiii. radices capparis, ueratri albi, sulphuris uiui, lapidis pyritæ, cuiusq; drach. ii. thuris drach. i. terebinthinam liquefacito, & ab igne ablata reliqua tenuissime trita infarcito. Optime facit & Andronis pastillus & Musæ pastillus similiter illitus uterq; Maiores

Milesia herba

Maiores porrò tumores etiam emplastro aliquo discussorio contegantur efficaciter eis auxiliatur emplastrum ex asellis ad meliceridas ulcera mellici humoris & strumas descriptum. Magis proprie autem hoc conuenit. Olei cicini lib. i. spumæ argenti drach. c. picis crudæ heminam i. ad lentum ignem assidue agitando coquito: atq; ubi coacta fuerint, ab igne ablatis chamæleone nigri radicem tenuissime tritam drachmarum x pondere inspergito, & ex tithymalli succo parum. Aliud. Ceram & uiscum cum modica myrto liquefacito, & diphrygis triti quod satis est inspergito, ac utitor. Aliud.

Radiciis panacis drach. iiii, nitri drach. v, calcis drach. i, ceræ drac. ii, adipis ursini sextantem. Liquefacta aridis affundito, & misceto. Cæterum ni gras eminentias, aut ualde liuidas, cum scalpello leuibus uulnusculis impaëtis incidito, deinde splenio cruentis uulneribus destinato, & quod inflamnationem arcere potest, integito. eius generis est emplastrum Barbarū appellatum. aut salem tenuissime tritum oleo subactum, & lanis succidis excerptum imponito, & postea radicem maluæ teneram cataplasmatiss uice adhibeto: aut cerato ex diphryge cicatricem inducente utitor. Audèdum autem in fortioribus corporibus, præsertim ubi prius corpori robur addideris, etià excoriorium ad impetiginem feram descriptū illinere, citra tamen cantharidum ammixtionem apparatus. quod ubi factum fuerit, & bullæ eruperint, eas uiridi Epigoni emplastro, quod Isis à quibusdam appellatur, integito, & per balneas curato: & tunc lac potèdum præbeto. Vlcerationes autem obortas, cerato ex diphryge cicatricè obducente, aut melino cerato ex uino apparato, sanabis. Facit idem & ex pompholyge ceratū, & quod ex cadmia apparatus appellatur. Quod si curationem difficulter accipiant, uelut chironia ulcera tractato. Si uero pascendo proserpant ulcera, corace pastillo ex aceto mulso apparato utitor, aut pastillo Andronis.

Aliud, ad utiliginem quæ leuce dicitur, & ad psoras.

Calx ex uino aut rosaceo expressa cum aqua illinitur, & post hoc ceratum rosaceum adhibetur.

Aliud celebre ad elephantiasim.

Atramenti futorij partes iiii, aluminis scissi madefacti partes v i, luto fusco subigito, & ægro nudato ad ignem locato, corpus eius illinito, deinde lauto, ac rursus eodem modo ad ignem illinito, ac abluito. quod ubi ter feceris, tunc rosaceo inungito, egrūq; per totam noctē contegito, & reperies sanū.

Aliud, ad elephantiasin affectos, carcinomata, podagram, articulum morbum, strumas, condylomata, & conuulsiones neruorum.

Vulturis cerebrum unā cum capitis ossiculis & plumis ac carnibus capitis accipito, & in uino dulci coquito. atq; excolata quidem illa proñcito: cum uisculo uero ipso, euphorbij, croci, atramenti indici, piperis albi, castorij, zingiberis, cuiusq; sextantem coquito, & foliorum rubi, seminis satyrij, cuiusq; quadrantem, picis quadrantem, succi mandragoræ, cedriæ, cuiusq; unciā unam,

Ex uulture
remedium

N feltau

fel tauri aut capræ integrum. uermes ex lignis putrescentibus & marcidis numero tres, addito. Hæc sanè omnia in uini dulcis sextarijs nouem simul coquito. Hoc iuramento adstrictus accepi, ne cuiquam reuelarem. Hic apparatus ad illitionem in nouem dies sufficit, & eminentias ipsas exterit. Cæterum cum penna uulturis etiam illinatur.

Aliud, ad elephantiasim, abscessus, condylomata, strumas, eminentias corporis, tubercula pingue quiddam in se collectum habentia Græcis inde steatomata appellata, unguium abscessus paronychias uocatos, & gutturis tumores qui bronchocele appellantur: ad omnes item malignas eminentias quacunque corporis parte, multo experimento cognitum.

Vulturem uiuum accipito, cumq; in uini dulcis aut sapæ sextarijs nouem aut sex suffocato: aut uulturinum gallum eodem modo tractato, & à uespere usque ad marutinum tempus ad uitis ligna coquito. Cæterum ægrum tenui uictu cōnutrito, sæpe etiam in ediam perferre iubeto, & per subscriptum purgatiuum medicamentum purgato, perq; dies septem ex marina aqua lauato. Postquàm uero uultur coctus fuerit ac excolatus, ossa ipsius contrita cum ægri sudore, præsertim qui à sole prolectus est, cani edenda projicito: massas uero septem inde formatas cani dato. Vulturem autem ipsum per triduum à uespere usque ad matutinum tempus, ne ab aurora conspiciatur, coquito, atq; id similiter tertia die facito, probeq; contextum omni die mane in domo tenebricosa reponito. Atq; ubi tandem ita percoctum ac excolatum habueris, ad iusculum in nocte, minime uero in die, sequentia addito. Salis fossilis marini, in petris condensati trientem, alij unciam unam habent, atramenti sutorij, opopanax, cuiusq; sextantem, colophoniam, picis, cuiusq; quadrantem, euphorbij, castorij, sanguinis capræ, cuiusq; trientem, ammoniaci thymiamatis trientem, foliorum semper uiui numero septem, catanacæ herbæ scrupulos tres, amiantij scrupulum unum, polypodij herbæ quæ per contrariam affectionem luna desinente auxiliatur, lapidis gagatæ, cedræ, singulorum quadrantem, bituminis iudaici, sextarium unum, artemisiæ herbæ, chamæmeli herbæ, cuiusque sextantem. Hæc omnia cum iusculo ut dictum est apparato, probe trita cōmittito & unito. Cæterum uulturem primum unà cum pennis usq; ad pedes excoriato, atque ita in sapam coniectum suffocato. Pellem autem ipsam cum pennis myrrha conditam, & in fumum suspensam exsiccare finito. Pedes uero in oleo coquito, & cum oleo podagricis, per uulturis etiam pennam, illinito. Neros uero ad pedes podagrici pro amuleto appendito, & ab affectione cum liberabis. Porro purgatiuum cuius mentionem feci hocce est. Aloes uncie dimidium, gari, aceti, partem mensuram unito, & octauam sextarij partem bibendam præbeto.

Ad condylomata in facie elephantiasij affectorum.

Thus cum uino austero tritum pinnulis illinito.

Illitio

Polypodium
miræ nature

Illitio alia optima ad elephantiasi laborantes: facit
& ad pruritus.

Gummi, gallarum, singulorum drachmas decem, pumicis drachmas uigin-
ti: contundito & cribrato, ac utitor ut optimo.

Aliud, etiam ad lepram.

Veratri nigri, gummi, cuiusq; quadrantem, spumæ pisanæ quantum suffi-
cit: conijce in ollam, & coque donec succulenta fiant, ac tritis utere.

Dieta elephantiasi correptorum.

Cap. cxxv

Dieta elephantiorum talis sit. A somno membra eorum plurimum &
leniter manibus contrectentur, deinde alius consucta recrementa de-
ponat, & post hæc ipse æger sub diuo aut in porticu deambulet, mollibus
calciamentis subligatis, conficiatq; deambulando usque ad stadia triginta.
Deinde cataplasma ei imponatur primum ex pane, aut saba cocta, aut pisa-
na, aut aliquo consimili illinatur, uerum ad unumquodq; prædictorum ci-
trij acidi succus ammiscetur si haberi possit, aut si desit, peponum aqua, &
post modicum interstitium aqua pura large abluatur. Postea cerato rosa-
ceo liquidiore facies superne leuiter illinatur. Deinde ubi gestationis genere
aliquo fuerit uestus, rursus deambulet concitatore gressu. Postea uero po-
tione aliqua ex prædictis accepta, quotidiano alicui & consueto muneri ua-
let. Circa quartam autem horam concitatore gymnasio exerceatur, & de-
terso sudore, ursino aut uulpino adipe illinatur, qui si non adsint, caprinus
aut taurinus, aut equinus, aut aliquis ex uolucrum genere, aut butyrum re-
cens sumatur. Deinde cum sceni græci aut pisanæ succo, qui parum ammo-
niaci cum aceto liquefacti ammixtum habent, perfundatur, atque ita lau-
cro quodam præscripto utatur. Nocuum est enim affectioni si quis non la-
uet. Per interualla autem psilothro, ut dictum est, defricetur, & quodam ex
prædictis smeigmate quotidie expurgetur. Commoda sunt etiam arida fo-
menta, & post sufficientem ex dictorum usu exudationem, natationes in
mari, aut in sulphurentis & aluminosis aquis, non extreme frigidis, quales
sunt aquæ Albulæ in Italia uocatæ. Quod si tales non adsint, frigidaë lau-
cro assidue utatur, raroq; balneum petat, nisi psilothri gratia, aut altera ali-
qua urgente necessitate cogatur. Si uero quis ad frigidaë lauacrum cunctan-
tior sit, eum in balnei aere plurima aqua frigida perfundi commodius erit.
Præstat item solium ex decocto aliquo eorum quæ adstringunt apparare,
plantaginis præsertim aut rumicis, aut perdicij. quanquam efficacius omni-
no cenleatur betæ decoctum, cui sanè & ex aceto parum est affundendum.
Extergatur etiam ueluti prædictum est, in balneis cum quopiam prædicto
rum smeigmatum, & cum myrobalano assidue ex aceto. Quibus deinde ab-
lutis, ad acrimoniam & mordacitatis curationem ex oleo lentiscino cum ace-
to & uino austero conuassato, aut ex oleo myrteo & pari uino conuassa-
tis illinatur. Licet etiam aliquando parū ammoniaci, aut alumen rotundum

*Aque Albu-
la in Italia*

N 2 in

in uino cōterere. Optimum est & butyrum recens illitum. Post lotionem & extersionem per tenera linteola, ad horæ dimidium quiescat: deinde aqua repida hausta sponte uomat: aut si id facere nequeat, per immisionem digitorum. Postea modico intervallo temporis interposito, uinum absinthites aut origanites bibat non infra heminae mensuram, & paulo post cibus ei apponatur. A uino in posterum omnino abstineat, passioq; & uino mulso, ab omniq; cibo difficulter concoctili, & maxime à frigida potu. Ceterum cibi tempore purgationum qui facile fecerui queant, sumantur. Panis hordeaceus aut triticeus recens calidus. Ex oleribus beta, & porrum capitatum duabus aquis edulcatum: lactucaq; & capparis ex aceto mulso. Ex mari uero herinacci recentes, ostrea, pelorides, pectunculi, tellinae cum beta coctæ, & salsa mentum uetus ex aceto mulso. Vbi uero post purgationes refocillare, & uires restaurare uelimus, acia auferenda sunt, præter condimenta, quorum ut urinam cientium usus commodus est. Exhibendus est autem panis optime præparatus, oua sorbilia, halica lota, & lac cum melle. Omnia tamen cum pane. Ex oleribus, malua, rumex, sisarum, lactuca, seris, sceniculum, ficus coctæ, à quorum acceptione parum aquæ calidæ bibat, in qua decocta sunt, quæ urinam moderate cient. De cætero uero abstineat, ut ne poter usq; ad cenam. Bis enim cibum capere præstat, quàm semel se explere: nam, ut dixi, etiam prandium ipsum simplicissime paretur: cenam magis uariam concedo. In cenam etiam duæ tertiae panis partes referuntur. Prebeatur item in ea piscis molli carne non graueolens, coctus, simplici iusculo apparatus: & ex auiculis montanis, extremæ partes & uentres. ex pedestribus, hœdorum extrema, & leporinæ & dorcadum extremitates. Pro condimento & embammate, sales scillitici commodi sunt. Ex leguminibus, pisana utilissima censetur. Danda tamen & per interualla oryza, porro in cocturam eius addito. Ex fructibus conueniunt, ficus electæ, uua arefacta, pirum coctum in aqua multa, similiter & cotoneæ: unumquodq; certo pro coniectura modo. A reliquis fructibus omnino abstineant. Ex dulciantis mellitis, placet tam dato ex amygdalis modice tostis, & paucis pincis nucleis, & cnici semine confuso & cribrato, ac modico pipere apparatus. Ex bellarijs, parum ex caricis aridis concedito, & uuas passas pingues, amygdala tosta, pistacia, & ercbinthos tostos, & cicer tostum, cnico cum eis torrefacto & muria adstillata. In potu aqua calida eis omnino conuenientior est: sed uiribus restaurandis, uinum album & tenue, ac non ualde uetus in cena post cibos datur: quàm minimum tamen potent, in sitis tantum expletionem. Reliquæ potiones ex uino & melle confectæ, propomata Græce peculiariter appellatæ, uitandæ. Accutum autem nullum non incommode exhibetur tum triuinis, tum inter cibos, si stomachus tolerare possit. Somnus porro diuinus non ciusus elephantis est: nocturnus autem aptissimus. Post longum à cena interstitium, deambulatio lenta ac sensim facta commoda est, quo cibi commodius

Propomata

melius

melius descendant. Matutinarum uero exdationum sint studiosi. Coitus affectioni infestissimus est. Etenim non reperias ullum aliquem temere qui exectus ab elephantiasi apprehendatur, neq; etiam facile mulierem. Fortè ob id quod largior generatio ipsius in seminarijs locis ob materiæ spissitudinem contingat. Multo itaq; semine elephantiasi correpti abundant. Non tamen absurdum fuerit puerorum gignendorū gratia per rariora intervallā coire; neq; enim in totum contagiosæ successiones ipsius affectionis in omnibus fiūt, præsertim si quis optime dispositus, ad uenerem incitetur. Quod si succedat curatio, etiam ad quotidiana uitæ munia obeunda demittantur, & longis peregrinationibus sanitati uberius consulant. Si uero non succedat, procul à mari & urbibus segregentur.

*Elephanticos
pueris gignē-
dis operā da-
re posse*

De pruritu: Archigenis.

Cap. cxxvi

IN omnibus pruritibus uenæ sectione utēdum est: si iuuenes sint, & multo sanguine redūdēt qui ex eo laborant, & nihil aliud impediāt eam admittere: particulatim autem & paulatim eum detrahēre oportet, & quādoq; sequenti die sectione repetita rursus auferre: deinde restauratis uiribus, per purgatiuum pharmacum alius subducatur. Lauandi sunt omnino quidem ieiuni, quandoq; tamen ubi parumquiddam cibi acceperint, à concoctione autem secundo lauentur. ægre enim humectari potest malum. Radenda etiam pilis obrita, & cum maluæ syluestris aut satiuæ, aut betæ, aut foeni græci, aut lesami, aut fursurum decocto repurganda. Totum uero corpus ex farina fabacæ, aut lupinorum, aut myrobalani conspergatur. Quod si diutius duret affectio, fomenta quidem & lotiones ex saluæ, myricæ, mercurialis, origani, pulegij, baccarum lauri, radicum cucumeris agrestis decocto adhibeantur: ex lixiuio item & muria acida. Corpus uero nitro tenuissimè trito conspergatur, uini fece usta & arida adiecta. Aut cum hac mistura. Spumæ nitri libram unam, cimoliæ sexuncem. Aliud. Atramenti sutorij, thuris, sulphuris uiui, nitri, æquales singulorum partes in uino terito, & in prima balnei domo illinito: dein de lauato, & cum uino & oleo inungito.

Aliud, bonum & mitius.

Spumæ nitri libram unam, cimoliæ sexuncem. Aliud. Atramenti sutorij, thuris, sulphuris uiui, nitri, æquales singulorum partes in uino terito, & in prima balnei domo illinito: dein de lauato, & cum uino & oleo inungito.

Aliud, ad pruritum totius corporis.

Plumbaginis, spumæ argenti, nitri, cimoliæ, iridis, chamaeleonis nigri radices, pumicis, aluminis, sulphuris uiui, samuci, lapidis specularis usti, omnium æquales partes committito ac utitor in balneo.

Aliud singma ad pruritus.

Nitri libram unam, pumicis usti librā unam, spumæ nitri sexuncem, ostreorum ustorum quadrantem, baccarum lauri, costi, nardi celticæ, singulorum sextantem, cyperi unciam unam, phylli quantum uoles odoris conciliandi

N 3 gratia

gratia: contusis & cribratis utere in balneo.

Aliud, faciens & ad psoras.

Sulphuris, nitri, spumæ argenti, pumicis usti, cumini, omnium parem modum sume & utere. Inungendi sunt & aceto ac oleo in quibus staphis sylvestris sit contrita. pulegij item ac thuris æquis partibus cum oleo & uino tritis. Frequentius uero cum cimolia in uino madefacta eos expurga, aut cochleas terrestres uistas & tritas cum melle adfrica. Optimum autem est & hoc in balneo. Mellis partes duas, aluminis liquidi partem unam. Coquito ad permutationem aliquantulâ, ac utitor primum in sole, deinde in prima balnei domo: atque ubi parum humectati fuerint, thus cum sulphure uiuo, & nitro, & gummi, æquali pondere trita arida corporibus eorum inspergito.

Critonis, ad pruritus uehementiores.

Foliorum lauri uiridium, fasciculum, salis pinguis cyamum unum, acetii sextarium unum, olei libras tres. Omnia simul coquito, atque ubi bis aut ter effecerint, ab igne auferto, & frige fieri sinito, deinde oleum segregatum inungito.

Aliud, ad ægre tolerabiles pruritus.

Fecis uini uistæ, nitti assati, cimolia, cuiusque libram unam, staphidis sylvestris quincuncem, iridis trientem, acetii sextarios quatuor, olei lentiscini sextarios duos. Arida contusa & cribrata humidis excipito. Vsus eius est in sole, aut in balneo.

Aliud, Critonis.

Radicis rumicis, fœni græci, gummi, singulorum drachmas duodecim, sulphuris uiui, aluminis liquidi, cuiusque drachmas quatuor, myrobalani, cimoliz, fecis uini uistæ, cuiusque drachmas sedecim, acetii sextarios duos, olei sextarium unum. Committito ac utere ut dictum est. Efficax est & id quod ex multis radicibus ad elephantiasim est præscriptum. Probe facit etiam ad omnem pruritus, inquit, oleum in quo rhododaphne incocta sit illitum.

Aliud, ad intolerabilem pruritus, & qui domari non potest.

*Testudinis
remedium*

Cæterum quum neque uenæ sectio, neque defricatio aliqua quicquam profuisset: quidam ex huius remedij usu malum exuperarunt. Testudo terrestris uiua in oleo coquitur, & ex oleo corpus inungitur. Sedant & pruritus ualde egregie, mori folia arida trita affricata, & portulaca trita per se, & perdicium, & apium cum sulphure uiuo & sale. Quum uero caliditas multa affuerit cum pruritu, ptisanæ succus commodissimus est, tum per se, tum modico aceto amixto. Quod si uehementer urgeat afflictio, quædam ex prædictis smegmatis ad ptisanæ succum ammisceto. Vitandæ autem sunt insolationes, præsertim in æstiuo sole. Aqua autem marina maxime frigida conuenientissima est pruritu. Quare tentandum est ut æger bis & ter in die probe perfrictus in ea natet: bis quidem ante prandium, semel uero circa uesperam. Dista boni succi & uentri commoda eligatur. Et si aliud adstricta sit, catapotia ex aloë sex numero in erui magnitudinē formata post cœnam præbe. Abstineat æger ab omni acrim ciborum esu, & ab omni salso edulio, & a cunctis

ctis

etis oleribus crudis.

Ad scabiosos pruritus.

Cæterum ad pruritus scabie perplexos, lac scissum assidue adhibitum commodum est, & smeigmata omnia prædicta utiliter adhibentur. Priuatim autem hæc. Myrrham cum aceto & oleo tritam illinendam præbe donec exudent. Sinapi item & myrobalanum cum aceto & oleo eodem modo.

Aliud. Spumæ nitri, alcyonij usti, sulphuris, singulorum æquales partes tritas & linteolo exceptas in oleo madefacito, & deinde ex arido accipito, locosq; donec erodantur defricato, atque ita aqua abluito.

Aliud. Ammoniæ salis, nitri assati, sulphuris uiui, singulorum unciam unam, myrti aridæ sextantem. Vtere sicco. Aliud celebre.

Farina cicerum cum caprini stercoris pari modo utitor.

Aliud, ad psoras, pruritus, vitiligines, & impetigines.

Bituminis, sulphuris uiui, thuris, buccinorum ustorum, æquales partes cum aceto & melle tritas adhibe. Optime facit & pulegium cum mannâ puluisculo ex oleo & uino illitum.

Vnguentum ad psoras.

Hederæ folia tenerrima & modicum saleem cum uino & oleo trita illinito.

Aliud. Oleum amygdalinum uinumq; ac butyrum conuassata illinito. Aliud. Aloes, cerusæ, spumæ argenti, syriaci, plumbaginis, glaucij, récrementi argenti, saponis constantini, singulorum æquales partes, aceti & rosacei, quantum satis est. Vtere in balneo.

Aliud, ualde celebre.

Nuces rancidas quindecim, sulphuris uiui quadrantem, gari pontici quantum usui opus fuerit tritis utere in balneo. Aliud.

Perdicium herbam cum sale & sulphure affricato.

Aliud, experimento constans.

Nuces rancidas quinquaginta, salis manus plenæ mensuram, sulphuris uiui unciam unam tritis utere in balneo ad defricationem, oleo non adhibito: atq; ubi exudarit, ægrum in solium calida expletum demitto, indeq; egressum rursus defricato, & statim rursus in solium demittito.

Aliud præfens remedium.

Panis aridi, nucum iuglandium rancidarum, æquales partes, sulphuris niui, paulo plus quàm pro panis mensura, optime terito uino austero affuso, donec ad strigmentorum spissitudinem redigantur, & absque oleo in balneo affricanda præbeto. Aliud. Saponis gallici, nitri, pumicis, sulphuris uiui, perdicij herbæ, cuiusq; unciam unam, adipis porcini recentis uncias decem octo, carpobalsami drachmas quatuor. Vtere in balneo. Sapo Gallicus

Vnguentum optimum ad psoras.

Picis sex uncem, ceræ quadrantem & uncie dimidium, spumæ nitri sextantem, sulphuris uiui sextantem, olei myrtæ quod satis est, ut ad limi densioris crassitudinem redigatur. Vtere in balneo.

N 4 Aliud

Aliud. Pyretri drachmas quatuor, herbe lanarie drachmas quatuor, fœni grati drachmas octo, contusa & cribrata reponito. Vſu uero expetente quantum tribus digitis apprehēdi poteſt accipito, & cum aceto acerrimo conquaſſato: deinde roſaceo ſufficienti addito, unā cum ſmegmatis illinito.

Aliud. Aluminis ſciſilis, ſpumæ niri, ſulphuris uiui, cuiuſq; ſextantem, ſtaphidis ſylueſtris ſexuncem. Aceto & roſaceo diluta illinito.

Aliud, ad inueteratas pſoras.

Atramentum ſutorium cum lacte & roſaceo tritum illini. quidam uero cum adipe ſuillo utuntur. **Aliud.** Chalcedidis, miſyos, æquale pondus, tritis cum uino & roſaceo utitor.

Aliud. Nitrum aſſatum, ſulphur uiuum, alumen uſtum, æquis partibus cum oleo circumlinito. Facit & centaurea arida trita adſcripta, ſimiliter & chamæpitys. **Aliud.** Raphani ſuccum cum ouo in balneo diligenter illinito, & in paucis diebus curabit ægrum. idem & rapi ſuccus cum ouo probe facit.

Aliud, ad pſoras.

Spumæ argenti trientem, oua integra quinque, acetī libras quinque & dimidiam, olei myrtici ſextarium unum: trita illini.

Aliud, ad pſoras ſanie fluentes & ſœtidas.

Mali punice ramulos teneriores aut folia tuſa terito, aqua aut poſca prout melius iudicaueris aſſuſa: illine aſſidue, & miraberis.

Aliud, ad pſoras ægte curabiles, & principium elephantiaſis.

ſerapiadis triſteſticularis manus plenæ menſurā, radicis altheæ tantundem, hyoſcyami uiridis tantūdem, ſellam unam mediocriſ magnitudinis aut paruas duas, olei ſextarios tres, ſpumæ argenti dodrantem, ceruſæ trientem, croci ſeſquiunciam, cādidum ouorum decem. Spumam argenti, ceruſam, & crocum cum aceto terito. herbas uero cum oleo & reliquo aceto coquito, peteo lato, ac tritis aſſundito, & candida ouorum addito, unito, utitor. Ego uero & perdicidē herbam adieci. & in magnis affectionibus etiā chamæleōnem, & roſmarinum herbam.

Aliud ad pſoras, quo uſus ſum in elephantiaſis principio.

Nitri, aluminis, ſulphuris uiui, ceræ, cuiuſq; ſextantem, picis trientem, olei in quo rhododaphnæ coctæ ſint libram unam. Cæterū ego ſulphuris uiui ſexuncem conieci, & pro arida pice liquidam indidi: & corpore ex his illito uſq; ad miraculum proſeci. Verum ubi iam ad cicatricem perducta eſſent ulcera, ſulphuris ſextantem, & picem aridam inieci.

Ceratum ad pſoras, ualde celebre.

Colophonix unciam unam, cere unciam unam, emplaſtri ex ſuccis ſeſquiunciam, myrti quadrantem. Vſu expetente, ſiquidem pſoræ fuerint aſperiores ipſum ut habet adhibe. In exulceratis uero roſaceo liquefacito, ac utitor.

Aliud, quo in exulceratis pſoris per omnia utimur.

Ceræ ſextantem, picis aridæ ſextantem, emplaſtri ex ſuccis quadrantem, roſacci trientem: liquefacito, ac utitor ueluti eo quod præter opinionem auxilietur

lietur. Cæterum si diuturna sit affectio, subscriptis uteris.

Epithema præclarum: facit & ad ulcera cicatricem difficulter recipientia. Phu unciam unam, atramenti sutorij unciam unam, ceræ unciam unam, adipis porcini recentis sextantem: liquefacta aridis committito & imponito, ac post triduum soluito. Facta uero exulceratione, uelut igne ambusta curato.

Aliud epithema.

Sandarachæ unciam unam, ammoniaci unciam unam: terito, & terebinthina excipito, ut emplastri accipiant formam, & præfricto loco, pellicula excipita imponito, ac post dies quinque soluito. Vbi uero tectorium ulceri fuerit inductum, eodem pharmaco donec tectorium excidat, utitor. Ad exulceratam autem cutem his quæ ambustis conueniunt utendum est: & maxime emplastro ex hordeo apparato. Porro ubi in callum induruerit affectio, magisq; fuerit exacerbata, sequentibus utendum erit.

Epithema ad psoras in callū obduratas, & ad leprosas dispositiōnes, pharmacum prospere accommodatū: nam & callos coarctet, & ex profundo extirpat, & ulcerationes ad cicatricem perducit: solum enim ea quæ præter naturam accreuerunt corpora contingit.

Farinæ lupinorum tenuissime tritorum, syluestrium quidem malim si adsint, aut satiuorum, si illi haberi non possint, uncias quatuordecim, farinæ lociæ septuaginta, nitri rubri sexuncem, picis liquidæ italicum sextariū unum, aceti acerrimi italicum sextariū unum, terebinthinæ bessem. picem cum aceto coquito, & ubi unita fuerint terebinthinam adijcto, & ab igne ablata alioquo modo frigefieri finito, & inspersis ac infartis farinis, assidue agitato, deinde ad ignem lentissimum admotum coquito, inde finenterq; agitato donec pharmacum à testa in qua coquitur incipit separari. Quo facto ipsum in mortarium translatum & probe tritum reponito. Vfu uero exigente, præfricto ex nitro loco, linteolo exceptum nouo & denso imponito, ac post tertium diem soluito, & alia noua splenia concinnata imponito, atq; id usq; ad perfectam sanationem facito. Oportet autem non modo hoc epithema, uerum etiam alia quæ ex aceto & pice cruda apparantur in loco sub diuo apparare. Facile enim dehiscunt & disparantur. Heraclides in æreo uase coquen-

Heraclides

Oribasij, ad ulceratas & feruidas in suris eruptiones.

In balneis quidem myrobalanum & sulphur cum liquido cerato leuiter illinito: postquam uero frigida aqua solium inscenderit, ex oleo myrteo cum uino inungito, aut ex rosaceo aut lentiscino eodem modo. Potes & leniuscino citra uinum uti.

Ad psoram, Magistriani, ualde necessarium.

Magistriani

Rhododaphnes ramulos in oleo coquito, deinde nuces rancidas & sulphur uiuum in mortario terito, infusoq; ad ea oleo simulq; trito, locos in sole illinito, & post horam lauato, & sanabis.

Aliud

Aliud, præter opinionem ad pforas faciens.

Ceruse, spumæ argenti, sulphuris uiui, ceræ, singulorum sextantem, oua numero duo. Oua recentia in aceto per tres dies ac noctes macerato, deinde unâ cum putaminibus trita, reliquis probe tritis aridis ammisceto, & ceram cum rosacei libris duabus & dimidia liquefactam cum eis committito, ac uti tor in balneo pro unguento.

Aliud ex ochra, ad pforas commodum.

Spumæ argenti trientem, cerusæ unciam unam, ochræ sextantem, cadmiæ unciam unam, ceræ trientem, olei myrtici libras duas: arida cum uino terito, & liquefacta affundito, ac utitor.

Ad pruriginosas papularum eruptiones.

Cap. cxxvii

Diphryges cum aceto illinito, & mori radicem ex aceto, plumbaginem, rubiginem ferri, misy, cyclamini radicem, omnia ex aceto: alumen omne melle coctum, rutam cum sale & oleo, cerusam & argenti spumam ex aceto, rutam cum cerato myrteo quadrupla parte.

Aliud, ad pforas, humentes lichenes, pinguescē & tumentes ac multo humore manantes, mirabile.

Cadmiam uino & oleo tritam illinito.

Ad omnem pforam ulceratam cum pruritu aut dolore, & ad ulcera capitis manantia, erysipelata, & herpetas.

*Helcysina,
scoria argenti*

Plumbi usti, cadmiæ, plumbaginis, cuiusq; unciam unam, scoriz argenti quæ & helcysina sesquunciam, spumæ argenti sesquunciam, uini & olei omphacini aut rosacei quantum sufficit. Vtere ad omne ulcus aut papulam in toto corpore. Præter opinionem enim facit, præsertim in infantibus.

Aliud, ad pforam asperiolem & tubercula, optimum.

Cadmiæ, cerusæ, sulphuris uiui, mastiches, cuiusq; unciam unam, ceræ quincuncem, rosacei sextantem. Vtere, locos ex eo integendo. In balneo autem ex pharmaco unciam i, & sapone sesquunciam misceto, ac illinenda dato.

Ad pustulas psyrdracas Græcis appellatas, & ad papulas ex seruore aut sudore obortas.

Cap. cxxviii

Elunt in toto corpore pustulæ, dolorem inducentes citra saniei collectio- nem. Eas eczemata, ab ebulliente seruore Græci uulgo appellant. In his plumbago conuenit cum uino aut lentiscino oleo trita, aut cerusa cum uino & oleo myrteo: aut minium sinopicum cum adipe suillo recenti, aut misy as- satum cum uino & rosaceo.

Ad exulceratas pustulas.

Vbi uero exulceratæ fuerint pustulæ, subscriptis utendum erit. Scorium plumbi, & spumæ argenti, pari pondere uino & oleo myrteo excepta illine.

Aliud. Malicorij, spumæ argenti, atramenti sutorij, singulorum æ-

quas partes, cum uino & rosaceo illine. Aliud. Baccarum myrti nigra- rum, mali corij, atramenti sutorij, spumæ argenti lotæ, singulorum æqua- le pondus, cum uino & oleo myrteo illinito.

Smegma

Smegma, ad pustularum eruptiones.

Farinæ fabarum, pitisanæ mola trita, radicis polygoni contusæ & cibratæ, terræ cimoliæ tostæ, singulorum drachmas duas, spumæ nitri albæ drachmam unam, thuris tenuissime triti tantundem. Vtius in balneo est. Ex eo autem quantum sufficere putaueris accipito, ac cum oui candido subigitos: deinde corpus ex eo circumlitum exsudare finito. A balneo autem ex rosafacco aut myrteo corpus illinito.

Aliud smegma.

Cimoliæ drachmas duas, farinæ erui drachmas duas, quod ex myrobalano contusa & expressa reliquum est tantundem, iridis tusæ drachmas duas, nitri drachmas duas, myrti siccæ tusæ drachmæ dimidium: tritis utere ut dictum est. Aliud. Radicis hyoscyami contusæ drachmam unam, farinæ lupinorum drachmam unam, cimoliæ drachmæ dimidium, iridis drachmas tres & dimidiam: tritis utere ut dictum est.

Oribasij, ad nigras cicatrices in albandas. Cap. cxxix

Spumæ argenti, mentæ, thuris, æquales omnium partes, cum melle utitor.

Aliud. Stercoris crocodili drachmas decem, thuris drachmam unam, cerusæ drachmas duas: aut ex aqua, aut cum cerato cyprino mixta illinuntur. Aliud. Columbinum stercus ex aqua illinito, ipsumq; cito abluito, ne exulcerationem inducat. Aliud. Cimoliæ, stercoris columbini, saponis, thuris, singulorum pares partes cum aceto illinito.

Aliud. Hirundinis stercus ex aqua illinito. Aliud. Saponis, stercoris canini albi, ceræ, olei in albandi, æquales omnium partes committe acutere. Aliud. Nitri, ammoniaci thymiamatis, zingiberis, sulphuris uiui, singulorum æquas portiones in aceto albo terito, aut uino & aqua trita modice illinito, ne exulceratio succedat.

De impetigine, præscriptum est Sermonē octauo. De herpetis, & similibus, in Sermonē quarto decimo. De uerrucis, tum quæ myrmecitæ, à formicis, tum quæ thymi, à similitudine cacuminum thymi appellantur, item in decimo quarto Sermonē scribetur. Ad papulas autem infantium, in quarto Sermonē tractata sunt remedia.

Ad ulcerosas papularum eruptiones, tum in tibijs, tum in toto crure obortas.

Cap. cxxx

IN balneo ex myrobalano & sulphure cerato liquido exceptis leuiter illinantur, & in aquam leniter calidam demittantur: postquam uero frigidæ aquæ solum infunderint, loci ex myrteo oleo cum uino, aut rosafacco, aut lentiscino cum uino inungantur. Lentiscino etiam per se utendum. Probe faciunt ad eas & mali punici putamina uino cocta & trita, ac cerato modico liquidiore ex myrteo aut rosafacco oleo apparato excepta, & illita. Facit & myrsinarum dictum pharmacum, & emplastrum ex hordeo cum largo rosafacco aut myrteo dilutum & illitum.

Aliud. Valde commodum & hoc est, quod in adolescentulo quopiam

piam sumus experti, qui pforam multam inueteratam iam ac asperimam circum crura habebat, quæq; à genibus usq; ad pedù digitos procedbat.

Seimen lini cum aqua contusum quàm crassissime illinito, & assidue tanquam uehementer approbato utitor.

Aliud, ualde efficax. In quodam qui asperimam pforam circum crura habebat cognitum, in quo adeo affectio ipsa inualuerat, ut elephantiorum corporibus non abssimilis esset: qui sanè in paucis diebus sanatus est.

Sulphur uiuum quàm tenuissime tritum, amurca & oleo exceptum, in balneo ad defricationem exhibeto, & post balneum ex eodem illinatur.

Ad cicatrices nigras ex ulceribus relictas. Cap. cxxxr

Quandoquidem uero in profundorum ulcerum curationibus, cicatrices nigrae conflantur, etiam de his dicere operæ pretium fuerit. Differunt etiam cicatrices à uirilagine nigra, quæ alphos appellatur, in hoc quod leue corpus habent. Vitiligo enim tum ad spectui, tum tactui aspera subiacet. Ad nigras itaq; cicatrices subscriptis utendum est. Plumbi usti, spumæ argenti, æquales partes cum uino tritas, & in cetati crassitiem redactas, reponito. Vbi uero usus expetit, uino & rosacco liquifectas, & ad pinguis emplastri spissitudinem deductas, illinito. Aliud. Sulphuris uiui, & myrobalani, æquas partes cum aqua illine, aut terebinthina exceptas, & uelutis detritæ panniculo infartas impone. Aliud. Myrobalanum, sulphur uiuum, alcyonium, cum aqua ad strigmentorum spissitudinem redacta illinito. Aliud. Buccinorum ustorum sextantem, thuris unciam unam: illine cum aceto.

Onbasij, ad cicatrices nigras.

Radicis cucumeris syluestris uiridis drachmas duodecim, adipis suilli recentis drachmas quindecim, aluminis scissi drachmas duas, sulphuris uiui, nitri, cuiusque drachmas duas. Aliud. Spumæ argenti, cerusæ, æquales partes lotas terito, & cum oui candido illinito.

Smegma, cicatrices inalbens.

Cimoliæ, stercoris columbini, saponis, thuris, æquales omnium partes cum aceto adfricato, & rursus ex eodem illinito. Aliud. Veratri albi drachmas duas, thuris drachmas duas, spumæ nitri drachmam unam, cimoliæ drachmam unam. Vtere cum aceto. Aliud. Bryoniæ radicem concissam, in oleo donec succulenta reddatur coquito, & oleum ipsum assidue illinito. Aliud. Erucæ semen cum felle bubulo, aut alio quod haberi possit, illinito. Aliud. Spumæ argenti sextantem, sulphuris uiui unciam unam, erucæ succo trita illini, ubi uero exaruerint, laua. A balneo uero ex sola argenti spuma cum erucæ succo illine. Aliud. Talum ouillum ustum cum uino terito, ac illinito.

Pastillus

Pastillus ad cicatrices nigras in quacunq; corporis parte.
Cornu ceruini usti, buccinorum ustorum, spumæ argenti, cerusæ, thuris, alcyonij usti, singulorum unciam unam, piperis sesquunciam, sulphuris uiui sesquunciam, gummi unciam unam: cum uino pastillos, quemadmodum nosti, formato.

Alius pastillus, per experientiam concolores cicatrices faciens.
Lapidis pyritæ, comæ absinthij, lupinorum amarorum, pompholygis, cimoliz, stercoris columbini, myrobalani, melanthij, æquales singulorum partes in pastillos cum aceto cogito, similiterq; utitor.

Ad cubitorum & coxendicum nigredines ex cinctura obortas.
Alcyonium ustum, siquidem tenera cute præditus sit: cum aqua: si uero duriorē cutem habeat, cum aceto statim à balneo illinito.

Smegma idemq; illitio, ad nigras in toto corpore cicatrices.
Farinæ fabrarum italicam chœnicem unam, baccarum lauri drachmas octo, ueratri albi drachmas octo, myrobalani drachmas quatuor, spumæ nitri drachmas quatuor: contusa reponito. Vsu uero exigente, cum aqua illinito. Vtere & pro smegmate in balneo. Aliud. Farinæ erui, spumæ nitri albæ, radices bryoniæ, alcyonij asperi, myrobalani, singulorum æquales partes committito, ac utitor ut dictum est.

De uutiligine, seu alphi.

Cap. cxxxii

Utiliginum, quæ alphi Græcis dicuntur, generatio eiusdem speciei est cum leuce & lepra, non tamen omnino in profundo caro in eis affecta est, sed summa tantum cutis, & uelut squamulæ quædam uutiligines ipsæ affixæ inhærēt, albæ quidem ex pituita, nigrae uero ex atra bilis humore obortæ. Dictus est autem Græcis alphas, ex eo quod colorem cutis immutet: immutare enim apud ueteres, alphanein dicebatur. Ad albas igitur uutiligines & nigras communiter faciunt, folia fici, sulphur uiuum, alumen, æqualibus partibus cum aceto illita: quare eis ut præstantissimis utaris.

Alphanein

Aliud, ad utraq;. Calcem aqua multoties lotam in æstiuo sole desiccato: usus uero tempore cum aqua liquefactam dilutiorem illinito.

Ad nigras uutiligines.

Ad nigras uero uutiligines priuatim subscriptis utendum est. Veratri nigri, terræ cimoliz, æquales partes aceto aut aqua dilutas, & ad strigmentitiam spissitudinem reductas in sole illinito, præfrictio antea loco. Aliud.

Radices narcissi, feminis urticæ, cuiusq; sextantem, nitri rubri unciam unam, cum aceto illine. Aliud. Veratri nigri, nitri, æquis partibus ex aceto utere. Aliud.

Cochleas terrestres uistas & cum melle tritas, post modicum temporis interuallum affricato.

Ad inueteratas nigras uutiligines, & superficie iam in callum indurata, subscriptis utendum est.

Radices chamæleonis nigri dodrantem, sulphuris uiui sextantem, spumæ ni

O tri

tri unciam unam. Vtere in aceto dissolutis illinendo ad solem. Aliud. Alcyonij sextantem, nitri sextantem. Staphidis sylvestris unc. i, sulphuris ui ui unc. i. hæc arida adseruato, primum in psilothro utitor, & interiecta una die corpus in balneo humectum ex aridis conspergito, & sudorem ab eo excludet. Aliud. Alcyonij usti, spumæ nitri, sulphuris uiui, ueratri nigri, singulorum æquas partes cum aceto illinito: & cum eodem etiam in balneo defricando repurgato. Aliud odoratum efficacissimum.

Veratri nigri drach. v. iiii, spumæ nitri, costi, cuiusq; drach. iiii, cum aceto illinito, & in balneo citra pinguitudinis ammixtionem affricato. Optime facit & ad hæc, id quod ad albas uirilignes apparatus adiaptoton, ex eo quod citra opem non dilabatur, inscriptum.

Smegma ad nigras uirilignes.

Radice cucumeris sylvestris contusam & cribratam affricadam exhibeto.

Aliud. Foliorum fici in umbra deficatorum drach. v. i, similaginis drach. iiii, nitri drach. v. iiii, alcyonij drach. v. iiii. contusa, cribrata, reponito. Ante usum autem ad solem exudare affectum oportet, deinde inspergere, & sinere exicari, deinde citra olei ammixtionem defricare. Hoc in quinque diebus uirilignes curat. Aliud. Melanthij, ueratri albi, costi, singulorum drach. iiii, nitri drach. xii. Vtere in balneo citra pinguium admixtionem. Manifestum est autem, etiam si nullus dicam, quod prius ex hiera Galeni corpora purgare oporteat, aut ex colocynthide & aloe catapotijs. Deinde uero subscriptis uti. Bulbos cum aceto tritos illinito. Poteris item purgatiuis ex ueratro nigro & epithymo uti.

Ad uirilignes albas.

Hos itidem prius cum Galeni hiera purgare oportet, aut per catapotia ex colocynthide & aloe formata, deinde sequentibus uti. Dracunculi radicem, aut ari radicem, cum farina ordeacea ex aceto illinito. Aliud. Althææ semen cum aceto tritum illinito. Aliud. Bryoniæ radicem concisam cum oleo decoquito, donec instar olei succulenta reddatur, & a seorsum illinito.

Aliud. Baccarum lauri, cimoliz, nitri, æqualibus partibus utere cum aceto. Illine autem ad solem, & post paruum interstitium aqua ablue.

Aliud. Fœni graeci trientem, spumæ nitri sextantem, alcyonij usti unc. i, cum aceto illinito. Eodem etiam pro smegmate in balneo utitor.

Aliud, ualde efficax.

Alcyonij usti, sulphuris uiui, ueratri albi, spumæ nitri, æqualibus partibus in balneo ad defricandum utere: cum aceto item in sole illine.

Aliud adiaptoton, quod citra opem non dilabatur, appellatum.

Radice chamæleonis albi drach. v. i, alcyonij usti, sulphuris uiui, atramenti futuri, spumæ nitri, cardamomi, pyretti, foliorum fici sylvestris, aluminis liquidi, calcis, pulueris qui parietibus adheret domus in qua æger decumbit, singulorum drach. iiii, tere, & in sole cum aceto illine, ægro prius in balneo

neo

neo ex eo defricto. Facit & ad uutiligines nigras.

Aliud ad nigras ac albas uutiligines celeberrimum.

Myrrhæ, sulphuris uiui, spumæ nitri, ueratri albi, cuiusq; sextantem, alcyo/ nij usti sexuncem. Vtere confidenter pro smegmate in balneo: & in sole item cum aceto illinito.

De leuce uutiligine altius insidente, Galeni.

Cap. cxxxiii

Pituitosus & lentus ac uiscosus sanguis, & affectorum locorum debilitas, causæ sunt ob quas leuce generatur. Quum enim ex pituitoso simulq; uiscoso sanguine caro per multum tempus connutritur, facillime leuce om/ nis per profundum ipsius pituitosa oboritur, neq; potest amplius delatum ad locum nutrimentum ad propriam naturam in rubedinem transmutare. Accedit his quod & ipse qui ad locum influit sanguis pituitosus, ueluti prædictum est, existit. Qualem igitur locusta, aut cancer fluuiialis, & ferè omnia exanguia ostrea ex natura sua carnem habent: talem habent & ex transmu/ tatione ac in aliam speciem degeneratione, hi qui leucis corripiuntur. Etenim hanc carnis affectione ita appellant ab albo colore nomine accepto. Quum enim in pilo obstitis locis leuce oboritur, pilo locos ipsos non denudat, sed ca/ nos omnino facit. Si uero loci pilosi glabri & pilis nudi reddantur, incurabi/ lis leuce censetur. Ad leucas igitur subscriptis remedijs utendum est. Fici syluestris nigræ uirgultorum libram unam, rutæ sexuncem, misyos unciam 1, calcis uiuæ unc. 1, aceti acerrimi quantum satis est. Contere obnixæ & pastil/ los informæ, eosq; in umbra resicca. Vsu uero exigente illine in sole, loco prius confricto: & si bullæ oboriantur, eas acicula penetrato, & ceratum im/ ponito. Aliud. Fici nigræ uirgulta in aceto macerato, & quàm tenuis/ sime terito, eisq; spumæ nitri, sulphuris uiui, baccarum myrti, singulorum æ/ quales partes ammisceto, & locum cum nitro prius defricato, indeq; in sole illinito, diligenter obseruans ne ulceratio ex eis consequatur, Aliud. Fici nigræ folia uiridia in aceto macerato: sit autem aceti tantum ut ea supe/ ret & penitus contegat: deinde contusa & trita cum sufficiente calce uiua mis/ ceto, & locis prius exterfis in sole illinito, usquequo lentigini similem imagi/ nem ipsa leuce induat, atque deinde fici succum recentem supra istam illitio/ nem inducito, ipsamq; leucem solam aliquādiu confricato, & ne uicinas par/ tes exulceres obseruato. Egregie enim auxiliatur.

Aliud, ad leucem diuinum donum: facit & ad lepram.

Sandaracham terito, eisq; nucum iuglandium uiridem testam adjecto, ac adfuso aceto, rursus simul probe terito, & loco prius deterfo, in sole illinito. Quod si acre ægro appareat, paucum panem ammisceto, & assidue lauato.

Aliud, ex cuius usu sapicula laudem adeptus sum, citra exulcera/ tionem medetur. Vfus sum eo in muliercula quadam quæ in fron/ te leucem habebat, & ualde egregie uires suas declarauit.

Seminis cardamomi sesquiunciam, atramenti sutorij sextantem, sulphuris

uiui drachmas quatuor, aluminis rotundi & scissi, cuiusque drachmas quatuor. cum aceto diligenter terito, locoque ex nitro & aceto praefricto, in sole illinito. In quibusdam sanè bullam quotiescunque illinitur producit, qua sublata septem ipsam item tollit.

Aliud, ad leucas & lepras.

Nucum iuglandium immaturatum & adhuc acerbarum exteriorem corticem uiridem detrahito, & fici nigrae sylvestris ramulos amputato, & ad hæc spumam argenti coniicito, ac cum aceto coquito, terito, & ad unguenti formam reducto, idque ipsum in sole illinito. In decoquendo etiam hordei grana septem addito. Hinc enim sufficientis decoctionis signum habebis, ubi uidelicet hordei grana octa uideris.

Archelaim
medicus

Aliud, Archelai.

Veratri nigri, radices bryoniae, radices chamaeleonis nigri, sulphuris uiui, atramenti furoris, misyos, alcyonij, foliorum fici nigrae sylvestris, singulorum æquales partes contusas per angustissimum cribrum excutito, deinde in mortarium coniicito, & aceto affuso diligenter terito, atque ubi ad liquidissimam cerati spissitudinem fuerint reducta, in pyxidem plumbeam recondito. Vsi autem expetente, loco prius cum nitro praefricto, ad solem liquidius pharmacum illinito, Summe etiam ad lepras conducit.

Ad leucas quantumuis crassae
existant.

Adarces, canchryos, sulphuris uiui, æquales partes unumquodque per se priuatim contundito & cribrato, deinde simul cum aceto ad multos dies sufficienter in sole terito, & loco prius confrecto non acruatim illinito, sed dilutius, obseruans etiam in principio ne cutis exulceretur. In progressu uero temporis parum quid ex ueratro, tantundemque ex gallis, ad tria praedicta ammiscito.

Aliud.

Olus est in Syria folia habens seridis angusto folio praedita. Vocatur autem lepidium, & cum lacte conditum, seruatur cum radice uero eius lanae tinguntur, & nigrum induunt colorem. Hoc ipsum olus tritum & impositum cutem liuidam reddit, & attollit, ut excoriata similis uideatur. Est autem radix eius alba crassitudine digitali: ex qua in sole siccata corticem detrahare oportet, & per diem unum in acerrimo aceto macerare, deinde mane probe & constanter terere, affusoque aceto sufficienti ad strigmentitiam crassitudinem redigere, atque ita repositum adseruare. Vbi uero usus exegerit, locum nitro defrictum paulisper transpirare sinito, atque ita pharmacum ipsum ad calentissimum solem illinito, & quodam modo adfricato, deinde acetum paulatim ad illitum instillato. Quum uero æger uellicationem ac morsum perceperit, cum ad tolerantiam inhortato. Bullae namque succedent, quas acicula penetratas excoriare oportet. Vbi itaque excoriatae fuerint, siquidem adfectus locus
excoriatus

excoriatus concolor appareat, ipsum ut secundum naturam habentem & restitutum finito: si uero non, rursus ad duos & tres dies idem pharmacum illi nito, donec omnino perfecte uideris locum ipsum sanatum. Aliquibus uero ex hac curatione bullæ non erumpunt, uerum locus ipse excoriatur, hos itaque uelut igne ambusta curare oportet. Aliud. Floris mali punici drachmas octo, spumæ nitri drachmas quinque, alcyonij drachmas tres, sulphuris uiui drachmas duas. Vtere cum aceto. Est item Siccum optimum ad leucias, & inspergitur postquam exciderint crustæ ex acribus pharmacis obortæ. Cæterum ad cicatricem obducendam, & cicatrices reliquo corpori concolor reddendas, aceto excipe, & loco probe præfricto illine. Vbi uero bullæ emerferint, pharmacum ipsum cum melle cataplasmati modo impone. Efficacius autem fit si pro sulphure, ueratrum nigrum coniiciatur. Smegmatis porro ad leucen itemque lepram plurimis ex præscriptis illitionibus uti oportet. Præclarissime autem ad ipsos Siccum magnum facit, quod Indum inscriptum est: quo etiam ad elephantiasim, & omnem cutis scabriedem, ad articulare item morbum, & membrorum resolutiones, & ad hydropicos uti conuenit. Salis ammoniaci, salis communis, salis cappadocici, salis amari, nitri assati, farinæ fabaceæ, pumicis usti, spumæ nitri, singulorum trientem, ueratrum albi, ueratrum nigri, radicis struthij, radicis bryoniæ, cyperorum, aluminis liquidi, aluminis scissi, floris iunci odorati, gummi, iridis, lapidis specularis usti, testarum sepiæ, seminis lini, costij, baccarum lauri, farinæ lupinorum, pulegij, thuris, seminis uiticis, singulorum sextantem, ostreorum ustorij, radicis dracunculi, fecis uini ustæ, pyretri, radicis chamæleonis nigri, sulphuris uiui, staphidis syluestris, sinapis, radicis præoniæ, samosci, spicæ nardi, comæ marubij, foeni græci, grani cnidij, phylli, singulorum unciam unam, radicis cucumeris syluestris, cimolix, gallarum, singulorum scrupulos sedecim.

Siccum magnum Indum

Archigenis ad lepram Magistriani.

Arietis nigri adipem accipito, & locum ex eo assidue inungito, & in paucis omnino diebus citra exulcerationem, eam tollit. Aliud.

Seminis raphani drachmas quatuor, sandarachæ drachmas sedecim, lupinorum aridorum decorticatorum, sulphuris uiui, singulorum drachmas sedecim, gallarum omphacinarum, ueratrum nigri, gummi, singulorum drachmas octo. Aceto excipe, & præfricto ex sic nigra folijs loco, illine in sole. Cum eodem item in balneo citra olei ammixtionem Sicco, per dies nouem defricato.

Critonis, ad lepram, ueluti Oribasius tradit.

Farinæ liliorum chœnicem italicam unam, cardamomi drachmas quatuor, spumæ nitri drachmas quatuor, atramenti futuri drachmas octo, radices hastulæ regiae medias quatuor. terito omnia & misceto. Vsu uero expetente quantum satis uidebitur accipito, acetoque acerrimo coquito, & ubi ad cerati consistudinem redegeris, crassius illinito, loco tamen prius ex nitro confris-

daq; abluito, ac rursus illinito.

Aliud, ut Oribasius tradit, citra exulcerationem perſanat.

Radicis rumicis ſylueſtris drachmas uiginti quatuor, gūmi drachmas duor
decim, ſulphuris uiui drachmas ſex, myrrhæ drachmas quatuor, gallarum
drachmas quatuor. Rumicis radices in aceto ad tertias decoquito, eiſq; tri
tis reliqua ammiſceto, ac ſimul terito, ad finem uero etiam gummi addito.
Uſus autem tempore loco prius conſcripto, illinito: ſequenti uero die lauato
ac ſimiliter curato. Vtere eo & ad impetigines ac pſoras aſperas ac ſcabras.

Oribasij, ad leproſos.

Succi radicis haſtulæ regiæ ſexuncem, ſulphuris uiui drachmas quatuor,
mannæ drachmas decem, nitri drachmas octo: illine cum aceto.

TERTII DECIMI SERMONIS AETII

IANO CORNARIO ZVICCA/

VIENSI INTERPRETE

P I N I S

DE PONDERIBVS

AC MENSVRIS EX PAV/
LO AEGINETA



ONDVS, GRAVITATIS MENSIV/
dicatur: Mensura autem, uasculi capacitate. Vascu-
lum uero, tum aridae tum liquidæ quantitatis
mensura existit. Quare tres omnino dimensæ
quantitatis sunt differentiae: una quidem ponde-
ris: altera uero rerum aridarum, utpote quæ ue-
lut in aggerem accumulantur: tertia autem liqui-
dorum. Cæterum quum penè infinita pondera
ac mensuræ, tum pro locorum, tum pro eorum

qui eis utuntur consuetudine, existant: de his saltem quæ omnibus maxime
familiaria sunt, nobis sermo erit.

DE PONDERVM AC MENSVRARVM NOTIS



ERVVM quum quidam non integris literis, sed per notas
hæc ipsa pondera ac mensuras significant, præstiterit fortas-
sis & nos in hac parte ueteres imitari, atque primum clara-
cteres ipsos declarare. Primum igitur litera χ ubi α li-
teram habuerit incumbentem, Chalcum, id est Æreum, si-
gnificat: hoc modo χ . Si uero σ ipsi χ incubuerit, Choa, id est Con-
gium, demonstrat: sic χ . Si α Chœnicem: χ . Si η Chemam χ .
K uero litera, si incumbens ϵ habeat, & linea recta inferiorem ipsius api-
cem per obliquū secet, Ceratium, id est Siliquam, significat: hoc modo ϵ .
Quod si ν ipsi κ incubat, Cyathum significat: sic ϵ . Si uero σ Co-
tylam, id est Heminam: ϵ . Porro linea circumflexa, quam nihil aliud cir-
cumstat, & quæ omnino per obliquum ponitur, Obolum denotat: \sim .
Si uero duæ sunt lineæ, quas nihil circumstat, duos obolos signant: \approx .
Qui Gramma, hoc est Scrupulū, faciunt, quod per literam γ quæ ρ adie-
ctum habet denotat, recta amplius linea ipsum ρ secante, hoc modo ρ .
Duæ autem lineæ iuxta alteram extremitatem consertæ, angulumque consti-
tuentes, ad similitudinem duorum apicum, qui in ipsius K literæ pictura,
ad rectam lineam adscribuntur, Drachmam significant, quæ & Holca co-
gnominatur: hoc modo \angle . Proprie autem Holca per λ literam nota-
tur, σ litera medium eius occupante: hoc modo λ . Quod si ι litera
ad λ apponatur, Libra significatur: $\lambda\iota$. Aliqui tamen alteram ipsius λ

litera γ intra angulum suum \circ literam habens, Vnciam significat: ρ . M autem iuxta medium ipsius ν habens, Minam denotat: \bar{M} . Si uero ν habeat, Mystum: \bar{M} . Si ς Medimnum: \bar{M} . Si \circ Modium: \bar{M} . Porro τ literam, ρ complectens, & ν incumbens habens, Tryblum significat: $\bar{\tau}$. Ξ autem supra se ς habens, Xesten, id est Sextarium, designat: $\bar{\Xi}$. Si uero \circ habeat superscriptum, Oxybaphum, id est Acetabulum: $\bar{\Xi}$. Aliqui tamen Xesten per ξ denotant, recta linea distinctum, hoc modo, $\bar{\xi}$. H autem incumbens μ habens, Heminam indicat: \bar{H} . K uero cum ρ connexum, incumbente ipsis litera μ , Ceramium signat: $\bar{\mu K}$.

DE PONDERIBVS

MNA Attica & Ægyptia habet Vncias XVI

Mna Romana Vncias

XX

Libra Vncias

XII

Vncia Drachmas

VIII

Drachma Scrupulos

III

Scrupulus Obolos

II

Obolus Siliquas

III

Siliqua Æreos

II duasque tertij partes: ita ut obolus æreos VIII complectatur.

DE MENSVRIS LIQVIDORVM

ITALICVM Ceramium habet Choas VIII

Chus siue Congius Sextarios VI

Sextarius Cotulas II, quæ & Tryblia appellantur.

Cotula autem siue Tryblum, Magna Mystra III, Acetabula uero IIII

Magnum enim mystrum continet Acetabulum I, & Drachmas VI

Acetabulum uero Sesquicyathum habet.

Cyathus Chemas paruas, aut Mystra parua II habet.

Quod si uelis liquidorum iuxta pondus scire dimensionem, multæ enim rerum liquidarum differentia iuxta lancis momentum existunt: id ipsum ex olei, uini, & mellis exemplo docebimus. Mel igitur uino grauius est quarta ampliusque decima parte, quod fere totum tertiam eius partem facit. habet enim eadem mellis ad uinū mensura totum uini pondus, accedente insuper tertia eius ponderis parte. Ad oleum autem mel dimensum, dimidia eius parte ponderosius existit. habet enim totum olei pondus, atque insuper dimidiam eius ponderis partem. Vinum uero nona parte oleum excedit. habet enim pondus ipsius totum, ampliusque nonam eius ponderis partem. Quæ res ut magis

magis euidens & manifesta fiat, omnium mensurarum pondus sigillatim subiecimus, uelut in tabella depictū ita ut manifeste constet, quod per pondera quæ singulis mensuris subiecta sunt, Oleum, Vinum, & Mel, ex ordine demonstrantur.

Ceramium Italicum habet

Olei	Vini	Mellis
libras LXXII	libras LXXX	libras CVIII
	Chus siue Congius habet	
libras IX	libras X	libras XIII & dimidiam
	Sextarius habet	
uncias XVIII	uncias XX	uncias XXVII
	Cotula siue Hemina habet	
uncias IX	uncias X	uncias XIII & dimidiam
	Magnum mystrum habet	
uncias III	uncias III scrupulos VIII	uncias III & dimidiam
	Acetabulum habet	
drachmas XVIII	uncias II scrupulos XII	uncias III scrupulos IX
	Cyathus habet	
drachmas XII	sesquunciam scrupulos IIII. uncias II drachmas II	
	Paruum mystrum habet	
drachmas VI	scrupulos XX	drachmas IX

Orbasius autem iuxta Adamantium, Sextarium Italicum uini quidem iuxta mensuram Vncias uiginti quatuor habere ait: iuxta pondus uero Libram unam, uncias octo. Sextarium autem mellis Librarum duarum & dimidiæ pondus habere tradit.

DE MENSURIS ARIDORVM

ÆGYPTIA Artaba continet Modios III
 Modius Ægyptius & Italicus habet Chœnices VIII
 Chœnix, Sextarios II
 Sextarius habet Semisextarios II, qui & Heminae appellantur.
 Hemina autem habet Cyathos VIII.
 Atticus Medimnus continet Hemicæta XII
 Hemicætum autem seu Semodius, Chœnices IIII. quo fit ut Medimnius habeat Modios VI, chœnices XLVIII, sextarios XCVI.
 Cæterum pondus harum mensurarum non facile est proferte, quod immensa diuersitas rerum aridarum iuxta lancis inclinationem existat.

Index chartarum.

a b c d e f g h i k l m n o
p q r s t u x y z A B C D
E F G H I K L M N O

Omnes terniones.

BASILBAE: IN OFFICINA FROBENIANA
PER HIERONYMVM FROBENIVM
ET NICOLAVM EPISCOPIVM
ANNO M D XXXIII
MENSE AVGVSTO

1801

1801



